



# গাইস্থা-ব্যবস্থা

ও

শিশু-চিকিৎসা

কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)।



২।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হানিম্যান হোম

কর্তৃক প্রকাশিত।



কলিকাতা।

১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

শ্রীটমাচরণ চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৩।





## বিজ্ঞাপন ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সংক্রান্ত “গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা” নামক এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা পরমোৎসাহে প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রণেতা স্বর্গীয় বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বঙ্গোত্তম সন্তান বিদ্বজ্জন সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার জন্য বিদ্যাসাগর ও প্যারিমোহন সরকার প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের মিত্র মণ্ডলী মধ্যে তিনিও একজন মাননীয় বন্ধু রূপে গণ্য ছিলেন। বারাসাতের সন্তান মিত্রবংশে তাঁহার জন্ম হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিভার্য নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র মহোদয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সমুদয় গ্রন্থ তাঁহার আয়ত্ত ছিল। সেই শাস্ত্র-জ্ঞান ও বহুদর্শনের ফল স্বরূপ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হয়। তাহা নিঃশেষিত হইলে তিনি বহু বৎসর-ব্যাপী বহু পরিশ্রমে দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহাতে পুস্তক খানি প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে তাঁহার আত্মীয় বাবু প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতি মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। ছুঃখের বিষয় মুদ্রা কার্য্য পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই তিনি পরলোক-গত হইয়াছেন।

প্যারী বাবু নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করণান্তর স্বয়ং পুস্তক বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন বলিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণের তাবৎ সংখ্যা আমাদিগকে বিক্রয় পূর্বক আমাদিগকেই প্রকাশক হইতে অনুমতি দিয়াছেন। এই বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ সাধারণের বিশেষ হিতকর বুঝিয়া আমরা আত্মলাভ সহকারে ইহার প্রচার করিতেছি। এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথমে প্রায় দ্বিগুণ কলেবর বিশিষ্ট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা বিশদরূপে আয়ত্ত হয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থ মাত্রেই পক্ষে এই গ্রন্থ মহোপকারী হইয়াছে। ইহার সর্ব

প্রাজ্ঞল প্রণালী ও ভাষা দ্বীলোকেরও সুবোধ্য। এখন অনেক গৃহ-  
কর্তা ও কত্রীয়া স্বগৃহের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আপনাই বহু-  
লাংশে করিয়া থাকেন, অতএব প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড  
স্বরে রাখা কর্তব্য। তাঁহাদের সুবিধার জন্যই পুস্তকের আকার, পরিভ্রম  
ও ব্যয়ের তুলনার মূল্য অতি হুলভই করা হইল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই  
কৃতার্থ হইব।

২।১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩০৩।

বশস্বদ

ম্যানেজার,

হোমিনিয়ান হোম।

# ঔষধের তালিকা ।

অরম মেটালিকম্	অরম মিউরিটিকম্	আইওডিয়ম্
আইরিস ভাসি:	আর্জেন্টম্ নাইট্রিকম্	আর্জেন্টম্ মেটালিকম্
আটিকা	আর্গিকা মটে:	আরেনিয়া
আসেনিক এসম্	আসেনিক আইওডিয়ম্	ইউপেটরিয়ম্ পাণ্ডি:
ইউপেটরিয়ম্ পার্ফো:	ইউফর্কিয়ম্	ইউক্রেসিয়া
ইউভা আসাই	ইউরেনিয়ম্ নাইট্রিকম্	ইউক্যালিপ্টাস গ্লো:
ইউজিনিয়া	ইগ্নেসিয়া	ইণ্ডিগো
ইথিউজা	ইপিকাকুয়ানা	ইরিজিয়ণ ক্যানা:
ইলোট্রিয়াম্	একালাইফা	একোনাইট
একোনাইট র্যাড	এথস ক্যাষ্টশ	এগারিকস
এস্পেচুরা	এট্রোপিন	এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্
এণ্টিমোনিয়ম্ টাট:	এনাকার্ডিয়ম্	এপিস মেল:
এপোসাইনম্ ক্যান:	এমিল নাইট্রোশম্	এমোনিয়েকম্
এমন কার্ব:	এমন মিউরি:	এম্ভ্রাগ্রিসিয়া
এমন সেকিউ:	এলুমিনা	এলুমেন
এলোড্র	এসকিউলস হিপো:	এসকিউলস গ্ল্যাত্রা
এসক্রিপিয়াস	এসাফিটিড	এসিড অক্জেলিকম্
এসিড এসেটিকম্	এসিড কার্বলিকম্	এসিড গ্যালিক
এসিড নাইট্রিকম্	এসিড পিক্রিকম্	এসিড ফস্ফরিক
এসিড ফ্লোরিক	এসিড বেঞ্জাইক	এসিড বোরাসেনিক
এসিড মিউরিয়টিক	এসিড ল্যাকটিক	এসিড নাইট্রোমিউরি
এসিড সলফিউরিক	এসিড হাইড্রোসেনিক	ওপিয়ম্
ওরিগেনাম্	ওলিয়েণ্ডার	কাকউলাস
কফিয়া	কলচিকম্	কলেকাইলম্

কলোসিস্থ	কণ্টিকম্	কার্কো এনিমেলিস
কার্কো ভেজিটেবিলিস্	কিউবেব	কুপ্রম ষাসেস নিকম্
কুপ্রম এসেটিকম্	কুপ্রম মেটালিকম্	কুপ্রম সলফিউরিকম্
কিউরারী	কোনাযম	কোপেবা
কোরালিয়ম	কোলিনসোনিয়া	ক্যাটিস গ্রাণ্ডঃ
ক্যাজুপুটম্	ক্যানাবিস ইণ্ডিকা	ক্যানাবিস স্যাটাঃ
ক্যান্ডারিস	ক্যাপসিকম্	ক্যামোমিলা
ক্যান্ফার	ক্যান্ফোরা মনোব্রোমাইড	ক্যাল্কেরিয়া আসেস
ক্যাল্কেরিয়া এসিটঃ	ক্যাল্কেরিয়া কার্কঃ	ক্যাল্কেরিয়া কাষ্টঃ
ক্যাল্কেরিয়া ফস্	ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস	ক্যাল্ ক্রোরেচা
ক্যাল্কেরিয়া আইওডটা	ক্যাল্কেরিয়া মিউরিঃ	ক্যাল্কেরিয়া সল
ক্যালমিয়া ল্যাটিঃ	ক্যালম্বা	ক্যালি কার্কঃ
ক্যালি ক্রোরস	ক্যালি পামেং	ক্যালি ব্রোমাইড
ক্যালি বাইক্রমিকম্	ক্যালি এসিটিকম্	ক্যালি আইওডেট
ক্যালি নাইট্রিক	ক্যালি সারেনেটাম্	ক্যালেলুলা
ক্রিয়োজোট	ক্রোকাস শ্রাটাঃ	ক্রোটন টিল্লিডম্
ক্রোটেলস	ক্রোরাল হাইড্রেঃ	কোকা
গমিগটি	গোয়েকম্	গ্যাম্ফোজিয়া
গ্রানাইটিস	গ্রিণ্ডেলিয়া	গ্লিশিরীপ গ্লোনাইন
চায়না	চিনিম আসেসঃ	চিনিম মিউরিং
চিনিম সলফিউঃ	চিমাফাইলা	চেলিডোনিয়ম্
জিঙ্গম	জিঙ্গম আইওঃ	জিঙ্গম এসিটঃ
জিঙ্গম সলফিউঃ	জিঙ্গম সাইনেটাম্	জিঞ্জিবার
জ্যান্থোক্সিসলাম্	জেল্ মিনিমাম্	জেবোয়ান্ডা
জ্যাট্রোফা	জ্যালোপা	জুগল্যান্ড
টিউক্রিসম্	ট্রিলিয়ম্	টেরিবিছ
ট্যাবাকম্	ট্যাক্সিকম্	ট্যারিফিউলা
ডলকেমারা	ডাইদোরিয়া	ডিজিটেলিস

ডিজিটেলিন	ড্রোসিরা	খুজা
থেরিডিয়ন	নক্স জগ্‌ল্যান্স	নক্স ভমিকা
নক্স মস্কেটা	নার্কোটিন	নিকোটিনাম
নিম্ফিয়া	হুকার	ন্যাজা (কোবরা)
নেট্রম আসে:	নেট্রম কষ্টিকম্	নেট্রম কার্ক:
নেট্রম ক্রোরেটম	নেট্রম নাইট্রি:	নেট্রম মিউরি:
নেট্রম সলফিউ:	পডোফাইলম্	পডোফিলিন
পল্‌মেটীলা	পলিপোরাস	পেট্রোলিয়ম
পেট্রোসেলিনম্	প্যাপেয়া	প্রনাস স্পাই:
প্লানটেগো	প্লাটিনা	প্রশম্
ফস্‌ফরস	ফাইটোলাক্সা	ফিলিক্স মাস
ফেরম আসে:	ফেরম আইও:	ফেরম এসেটি:
ফেরম কার্ক:	ফেরম ফস্	ফেরম পাইরোক্স
ফেরম ম্যাগ্নি:	ফেরম মেটা:	ফেরম মিউরি:
ফেরম সল:	বার্কেরিস	বিউফো
বিসমথ	বেলেডোনা	বোভিষ্টা
বোরাক্স	ব্রাইওনিয়া	ব্রোমিয়ম
ব্যাডিয়েগা	ব্যাপ্টিশিয়া	বেরাইটা কার্ক
বেরাইটা মিউরি:	ভাইবার্গাম্	ভিরেট্রম এন্ডম্
ভিরেট্রম ভিরিডি	ভেলেরিয়ান	মস্কম্
মাইগেল	মারকিউরিয়স আইও:	মারকিউরিয়স এসিটে:
মারকিউরিয়স কর:	মারকিউরিয়স ডল্:	মারকিউরিয়স ভাই:
মারকিউরিয়স বিন:	মারকিউরিয়স সলফিউ:	মারকিউরিয়স সল্
মারকিউরিয়স সায়ে:	মিউরেক্স	মেজেরিয়ম
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ক:	ম্যাগ্নেসিয়া মিউরি:	ম্যাগ্নেসিয়া সল:
মেলিফোলিয়ম	রডোডেণ্ড্রন	রসটেক্স
বিউফ	বিউমেক্স	রিসিনাস
রুটা	রেটানিয়া	র্যানামকিউলাস

লরোসিরেসস্	লাইকোপোডিয়ম	লাইকর আসে :
লিথিয়াম কার্ব	লিডম	লেপ্টেণ্ডা
লিলিয়ম	লোবিলিয়া	ল্যাকটুকা
ল্যাকেসিস্	লুট্যানম্	লুট্যাক্সিসেগ্রিয়া
লুক্‌নাইন্	লুমোনিয়ম্	লুলিথিয়া
সলফর	সলফর আইও:	সাইমেক্স
সম্বল	সারসাপেরিলা	সুকিলি
সিকিউটা ভি:	সিনকোনিয়ম্ সল্	সিনা
সিলিসিয়া	সিনেমন্	সিনোথস্ আমে:
সিড্রন	সিমিসিফিউগা	সিপিয়া
সিনা	সেনেগা	সেনিসিও
সেলিনিয়াম	সোলেনম নাই:	সাসুকস
স্রাসুনেরিয়া	স্রাটোনাইন	স্রাবাইনা
স্রাবাডিলা	স্পাইজিলিয়া	স্পজিয়া
সিম্ফাইটম	সাইপারিকম্	সাইওসায়েমাস
সাইডনটিস্ ক্যান:	সাইড্রোকোটাইল	সিপার সলফর
সেক্সা লাভা	সেমিমিলিস	সেলিয়েনস
সেলিবোরাস	সেলোনিয়স	

---

# সূচী পত্র।

	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকা গৃহ	১
গুত সন্তান	৩
প্রথম শীচ ও প্রস্রাব	৯
স্তনদান	১০
মাই ছাড়ান	১৩
ধাতু পরিবর্তন	১৫
শিশুগণ পক্ষে অপরাপর নিয়ম	১৬
আহার	১৯
নিদ্রা	২০
শিশুদিগের রোগ নির্ণয়	২৬
দীর্ঘ নিশ্বাস	৩০
কাশী	৩১
ঔষধ সেবনের প্রণালী	৩৪
ঔষধ সেবনের নিয়ম	৩৯
নাই পচা	৪১
বুক সাঁই সাঁই করা	৪১
মিয়ানিসিস বা নীল রোগ	৪১
মাথা কুলা	৪২
বুকে ঘুঁটি উঠা	৪৩
চক্ষু উঠা ও চক্ষুর প্রদাহ	৪৪
চক্ষু প্রদাহ	৪৫
হিক্কা	৪৮
বমন ও হৃদ তোলা	৫০
গা বমি বমি ও কাট ন্যাকার	৫১
রক্ত বমন	৫৬
প্রস্রাবের পীড়া	৫৮
অনিচ্ছাধীন বা অসামাল প্রস্রাব	৬৭



মূত্র রোগ বা কচ্ছতা	...	...	...	৭২
রক্ত প্রস্রাব	...	...	...	৮১
পংখুরি	...	...	...	৮২
বালিকার প্রদর	...	...	...	৮৫
আত্মমৈথুন	...	...	...	৮৬
বিচি আশুরান বা প্রদাহ	...	...	...	৯১
প্রমেহ বা ধাতু পীড়া	...	...	...	৯৩
পাকশয়ের ঝিল্লীর শক্তি নাশ হেতু তাহার গলিতাবস্থা	...	...	...	৯৪
অক্ষুধা	...	...	...	৯৬
অতিরিক্ত ক্ষুধা	...	...	...	৯৮
শূলবেদনা, পেট কামড়ান ও ব্যথা	...	...	...	৯৯
শূলবেদনা সহ অপর উপসর্গ	...	...	...	১০২
চিত্রকরের শূল	...	...	...	১০৩
পিত্তশূল	...	...	...	১০৩
বায়ুশূল	...	...	...	১০৪
শূল—পেট বেদনা	...	...	...	১০৬
অপ্যান বা পেট ফাঁপা	...	...	...	১১৪
পাকশয়ের আক্ষেপ—মুখ দিয়া জল উঠা	...	...	...	১১৭
পাকশয় প্রদাহ	...	...	...	১১৯
অন্ন প্রদাহ	...	...	...	১২৪
অহ্নাবর্তম প্রদাহ	...	...	...	১৩৪
কোষ্ঠবদ্ধতা ও মল কঠিনা	...	...	...	১৪০
গোণ্ড—মলশয় বা মলদ্বার বাহির হওয়া	...	...	...	১৫২
প্রীহা	...	...	...	১৫৪
অগ্রমাস ও ন্যাভা	...	...	...	১৫৮
আবা, পাণ্ডু, কামাল	...	...	...	১৫৯
বকুতের পীড়া ও আবা	...	...	...	১৬০
জাহাজ বা নৌকা আরোহণের জন্য গা বমি বমি ও বমন	...	...	...	১৬৭
অন্তরঙ্গি—গোড়	...	...	...	১৬৮

				পৃষ্ঠা
আমরক	...	...	...	১৭১
রকতিমার বা আমরক	...	...	...	১৭২
ক্রোম প্রদাহ	...	...	...	১৮৩
কুমি	...	...	...	১৮৪
অর্শ ও বলি	...	...	...	১৯১
বাত্তাজীর্ণ	...	...	...	১৯৭
উদরাময়—ভেদ	...	...	...	১৯৮
বিশ্চিকা—ওলাউঠা	...	...	...	২২৩
শিরঃপীড়া—মাথাব্যথা বা মাথাবোরা	...	...	...	২৫১
মর্দিগরমি	...	...	...	২৬৬
সন্ন্যাস	...	...	...	২৬৮
মস্তিষ্ক প্রদাহ	...	...	...	২৬৯
মস্তিষ্কের উত্তেজনা	...	...	...	২৭১
মস্তিষ্কে রক্ত সংকট	...	...	...	২৭২
মস্তিষ্কে জল স্রাব	...	...	...	২৭৫
চক্ষুর পাতার প্রদাহ	...	...	...	২৮৪
অজনি বা অজনি	...	...	...	২৮৪
চুল উঠিয়া যাওয়া	...	...	...	২৮৫
কর্ণরোগ	...	...	...	২৮৬
কান হইতে রস বা পুঁজ পড়া	...	...	...	২৮৯
বধিরতা	...	...	...	২৯১
কানের অভ্যন্তরে গেঁজ	...	...	...	২৯৪
কর্ণমূল প্রদাহ	...	...	...	২৯৭
নাসিকা রোগ	...	...	...	২৯৮
নাসিকা প্রদাহ ও নাক ফুলা	...	...	...	২৯৮
নাসারোগ	...	...	...	২৯৯
নাসিকামধ্যে গেঁজ	...	...	...	৩০০
নাক হইতে রক্ত পড়া	...	...	...	৩০০
নাকের হাড় বা বৃদ্ধ	...	...	...	৩০৭

				পৃষ্ঠা
পিনাস	...	...	...	৩০৮
মর্দি	...	...	...	৩০৯
দন্তোদ্যম বা দাঁত উঠা	...	...	...	৩১৭
দন্তমাড়ীর পীড়া	...	...	...	৩২৪
মাড়ীতে ফোটক	...	...	...	৩২৪
মাড়ী দিয়া রক্ত পড়া	...	...	...	৩২৫
দন্তরোগ	...	...	...	৩২৬
দন্তশূল	...	...	...	৩৩৩
মুখ গহ্বর প্রদাহ	...	...	...	৩৪০
জিহ্বা প্রদাহ	...	...	...	৩৪১
জিহ্বার নিম্নে কোম্কা	...	...	...	৩৪৩
উপজিহ্বা বা আলজিভের পীড়া	...	...	...	৩৫৩
জাড়ী-বা	...	...	...	৩৪৩
মুখে পচা ধরা	...	...	...	৩৪৭
স্বরভঙ্গ—গলাভাঙ্গা	...	...	...	৩৪৭
গলাভাঙ্গা	...	...	...	৩৪৮
আলজিব প্রদাহ	...	...	...	৩৪৯
কাশি	...	...	...	৩৫০
ডিপথিম্বিয়া	...	...	...	৩৬৩
বক্ষ-আবরক প্রদাহ (প্লুরিসি)	...	...	...	৩৬৭
হৃৎপিণ্ড ও তদাবর্তন প্রদাহ	...	...	...	৩৬৮
উপখাস-নালী প্রদাহ (ব্রনকাইটিস)	...	...	...	৩৭১
গলনালী প্রদাহ	...	...	...	৩৮১
ক্রেপ বা ঘুংড়ি কাশি	...	...	...	৩৮১
ক্রেপ—কুজিত বা ঘুংড়ি কাশি	...	...	...	৩৮৮
বুক ধড়ফড়ানি—হৃৎকম্প	...	...	...	৩৯২
হৃৎতাক্ষেপ-দড়কা	...	...	...	৩৯৬
মুচ্ছা	...	...	...	৪১২
মৃগী	...	...	...	৪১৭

				পৃষ্ঠা
উষ্ণরূতা—তাপন বেগ	••	•••	••	৪২০
পক্ষাঘাত	•••	•••	•••	৪২০
দাঁতকপাটী—টস্কার	•••	•••	•••	৪২১
দাঁতকপাটী	•••	•••	•••	৪২৭
স্নায়বিক শূল—পায়ের	•••	•••	•••	৪২৮
স্নায়ুশূল	•••	•••	•••	৪৩১
মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল	•••	•••	•••	৪৩৪
বয়স কোড়া	•••	•••	•••	৪৩৭
উদর বা রক্ত সঙ্গক্রীয় ফোটক	•••	•••	•••	৪৩৮
ওষ্ঠত্রণ	•••	•••	•••	৪৪১
পৃষ্ঠত্রণ ইত্যাদি	•••	•••	•••	৪৪২
গাত্র চুলকানি	•••	•••	•••	৪৪২
গলগণ্ড	••	•••	•••	৪৪৩
নাসিকা রোগ—নাক দিয়া রক্তপড়া	•••	•••	•••	৪৪৪
নাক ফুলা	•••	•••	•••	৪৪৪
অস্বথা বাড়	•••	•••	•••	৪৪৫
অঙ্গহাজা	•••	•••	•••	৪৪৬
শীর্ণ হওয়া—চনামারা	•••	•••	•••	৪৪৭
মেহ-অস্বাস্থি—মোট বা ভূঁড়ে হওয়া	•••	•••	•••	৪৫২
দুগ্ধছকণ্ড (Milk crush)	•••	•••	•••	৪৫৩
বিসর্গ	•••	•••	•••	৪৫৪
কৌষিক কিল্লীর কাঠিন্য	••	•••	•••	৪৫৫
চক্ষুর পাতার অজনি	•••	•••	•••	৪৫৬
দড়—দাদ	•••	•••	•••	৪৫৭
আমবাত	•••	•••	•••	৪৫৭
বিস্মিকা	•••	•••	•••	৪৫৭
হাম	•••	•••	•••	৪৫৮
পানবসন্ত	•••	•••	•••	৪৬২
ইচ্ছা বসন্ত বা মসুরিকা বা গোবীজ টিকা	•••	•••	•••	৪৬২

			পৃষ্ঠা
পাঁচড়া	...	...	৪৬৭
আসাত	...	...	৪৬৮
গোকামাকড কামড়ান	...	...	৪৬৯
দহন ও ঝলসান	...	...	৪৭০
গর্শ্বির খাঁড়া ও অধিক পারা ব্যবহার জন্য রোগ	...	...	৪৭২
ক্ষত বা ঘা	...	...	৪৭৩
চুল উঠিয়া যাওয়া	...	...	৪৭৫
খুঁড়িয়া হাঁটা, তোতলা কথা	...	...	৪৭৬
জ্বর	...	...	৪৭৬
সনিরাম বা পালাজ্বর	...	...	৪৯৪
টাইফইড জ্বর	...	...	৪৯৯
পিপাসা	...	...	৫০১
বম্ব	...	...	৫০১
সর্দিজ্বর	...	...	৫১৮
মস্তিষ্কের জ্বর	...	...	৫১৯
পৈত্তিক জ্বর	...	...	৫২০
সরল একজ্বর	...	...	৫২১
বিবিধ রোগ	...	...	৫২৩
অঙ্গের ক্ষয় রোগ	...	...	৫২৩
বালান্সি বিকৃতি	...	...	৫২৪
উরুসন্ধির গ্রন্থি রোগ	...	...	৫২৭
মেরুদণ্ডের বিদার	...	...	৫২৮
মেরুদণ্ডের বক্রতা	...	...	৫২৯

# গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা

৩

শিশু-চিকিৎসা ।

সূতিকা গৃহ ।

মহানগরীতে মেডিকেল কলেজের কল্যাণে এবং পল্লীগ্রামে- হরিয়লুট প্রথা প্রচলিত হওয়াতে সূতিকা গৃহের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে । তাল তাল ঝুল এবং বৃহৎ বৃহৎ কুঁদা-কাঠের তাপসেকের ব্যবহার একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয় । দুঃস্থ ও ইতর, বিশেষ কর্তৃত্বজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসের জোরে প্রভুর অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনার্থ, প্রসবের পরই পুষ্করিণীতে গিয়া অবগাহন ও পর্য্যবিতান্ন ভোজন করে । কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের অতটা দূর সাহস হইয়া উঠে না, তাহারা একটুকু গঙ্গাজল মাত্র স্পর্শ ও একটা মাত্র ভিজা ভাত ভক্তিপূর্বক উদরস্থ করিয়া নিয়ম রক্ষা করে । এতদ্বিন্ন এক্ষণে পূর্বের স্ত্রীর এক মাসকাল আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয় না । পাঁচ, উর্দ্ধ নয় দিনে প্রসূতী শুদ্ধ ও নিজ বাসস্থানে আনীত হয় ।

খটুখুটে বায়ু-পরিচালিত গৃহে প্রসব করান সর্বতোভাবে বিধেয়—সেত-সেতে স্থানে নয়—দোতালার ঘর উত্তম স্থান । ঝাল তাপের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । বর্ষা ও শীতে প্রয়োজনমতে গৃহের এক পার্শ্বে গুলের অথবা যাহাতে ধূম না হয় একপ কয়লার অগ্নি রাখা যাইতে পারে । প্রসূতীর প্রথম প্রথম লঘু-পথ্য বিধি । অন্ন চিড়েভাজা ও তৎসঙ্গে ২।১ টা মরিচ কখন কখন দেশস্থ বিজ্ঞেরা দিতে আপত্তি করেন না ।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে ক্রন্দন-ধ্বনি করে, সেই সময় হইতেই উহার খাস-কার্য্য প্রভূত । ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে নাভির ৪।৫ অঙ্গুলী উপরে রেশমী বা শক্ত সূতা দ্বারা নাড়ী বন্ধন, এবং উহার ২।৩ অঙ্গুল উর্দ্ধে আর একটা বন্ধন দিয়া তাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা মধ্যদেশ বিভাগ

করিবা ; চোঁটাড়ি দিয়া কাটিলে শিশুর সে স্থানে বেদনা হইতে পারে । পরে ঐ অবশিষ্ট নাড়ীকে শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বুকের দিকে ফেলিয়া ফ্লানেশ দিয়া পেটে জড়াইয়া দিবা । ৮।১০ দিন মধ্যে নাড়ী শুকাইয়া আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে । ভাল কাটা না হওন বা ধাতু-বিকৃতি জন্ত নাভি কখন কখন পাকে, পুষ পড়ে এবং দীর্ঘকাল ওরূপ থাকিলে দড়কা হইতেও পারে । ইহার পক্ষে প্রথম নক্স, তাহাতে ফল না দর্শিলে ভেরাট ; পেটের পীড়া থাকিলে কামো ; পুষ পড়িতে থাকিলে সলফর বা হিপার এবং তাহাতে না সারিলে সিলিসা ; ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত সলফর ও কাল্কা ২০০ ক্রমের ; দড়কা হইলে এই পুস্তকে ঐ রোগের চিকিৎসা দেখ ।

নাড়ীছেদেয় কিয়ৎকাল পরে অল্প উষ্ণ জলে শিশুর সর্বদ্বাৰ্দ্ধ ধোত করিবা, গায়ে আটার স্তায় ক্লেদ থাকিলে কেহ কেহ ঐ জলে ভূষী মিশ্রিত করিয়া দেন । পরক্ষণেই শুষ্ক সরু বস্ত্র দ্বারা আশে আশে মুছাইবা । সাবধানি যেন সদ্য-প্রসূতের সুকোমল ত্বক সজোর ঘর্ষণে ছড়িয়া বা উন্টাইয়া না যায় । আবার দীর্ঘকাল গায়ে জল বসিলে সর্দি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । স্নানের পরেই উহাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবা । জঠরে বায়ু বিবর্জিত স্থানে অবস্থান দরুণ ক্রম সর্বদাই গরমে থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথম প্রথম তাহাকে সেইরূপ গরমে রাখিতে যত্ন পাইবা । এজন্ত সচরাচর ফ্লানেল কাপড় ব্যবহার করা হয় । কিন্তু সদ্য-প্রসূতের পক্ষে উহা কর্কশ ও কঠিন হইতে পারে । এজন্ত স্থান মলমলের ওয়াড় দিলে ভাল হয় । গর্ভাবস্থায় সন্তানের ইন্দ্রিয় সকল অক্ষুণ্ণ থাকে, ভূমিষ্ঠ হইলে বিকশিত হয় । একারণ প্রথম প্রথম কোন ইন্দ্রিয়ের এককালে অধিক উত্তেজনা হইতে দেওয়া অনুচিত । ঘর মধ্যে অধিক আলোক বা কটু-দ্রাঘ-বিশিষ্ট দ্রব্য রাখা, অথবা নিকটে অধিক গোলমাল হইতে দেওয়া, সর্বতোভাবে অবিধেয় । সন্তান হইলে আমোদ প্রমোদ দান ধ্যান করিতে চাহ কর, কিন্তু এই উপলক্ষে পল্লির সমস্ত ঢাক চোল কাঁশী একত্র করিয়া মহা কোলাহল করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম ।

## মৃত-সন্তান ।

## মৃত-সন্তান ।

জঠরস্থিত সন্তান মাতার শোণিত দ্বারা পরিবদ্ধিত হয়। পঞ্চম মাসে উহা জীবন-বিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু জীবিতের কিছু মাত্র কার্য্য করে না। মুখ দ্বারা আহাৰ, নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস, গুহ্যদ্বার দিয়া মল মূত্র ত্যাগ, তৎকালে এ সমস্তের প্রয়োজন্যনাভাব। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই জীবনের কার্য্য ও নিয়মের অধীন হয়। জগতে প্রবেশ করিয়াই ট্যা করিয়া কাঁদাই\* সচরাচর ইহার নিশ্বাস তোলা ফেলার প্রথম লক্ষণ। কখন কখন জন্মের পরক্ষণেই শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যায় না, নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিলে সন্তান পেট হইতে মৃত পড়িয়াছে বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না শরীর পচিতে আরম্ভ হয়, সেকাল মধ্যে ত্যাগ করা অবিধেয়।

বিবিধ কারণ বশতঃ ফুস্ফুসের ( ফুস্ফার ) যথা বিহিত কার্য্য না হওয়াতে সন্তান মৃতপ্রায় দেখায়। গ্রীবাদেশে রক্ত চলাচল বন্ধ, গলায় নাড়ী জড়ান, নাড়ী চাপিত হওয়ায় রক্তের গতি-রোধ, হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া, মস্তক বহির্গত হইতে কাল বিলম্ব হওয়া, দীর্ঘকাল প্রসব-যন্ত্রণাভোগ, হস্ত বা যন্ত্র দ্বারা প্রসব করান, পা টানিয়া প্রসব করণ বশতঃ শিশুর মেরুদণ্ডের মৰ্জ্জায় আঘাত লাগা, মুখ ও শ্বাসনালী প্লেগ্গায় অবরোধিত থাকা, ইত্যাদি কারণ উপস্থিত হইলে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস হয় না। চিকিৎসকেরা এইরূপ অবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

এম; দুর্বলতা, অতিরিক্ত বশতঃ শ্বাসাবরোধ। জনক জননী উভয়েই বল ও তেজোহীন থাকিলে, অথবা মাতার পূর্বে গর্ভাবস্থ হইয়া থাকিলে; বা প্রসব কালীন অধিক রক্ত ভাঙ্গিলে, সদ্য-প্রসূত সন্তান এইরূপ মৃতপ্রায় হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় কিছু মাত্র জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না। সর্কাস পাক্কাশবর্ণ ও আঁট হীন; মস্তক, নীচের চোয়াল ও হাত পা ঠাণ্ডা; হাত পা নড়ে না, নড়নড়ে হইয়া কেবল ঝুলিতে থাকে; মলকারের মুখ ফাঁক ও তথা হইতে প্রথম শৌচ বা কৃষ্ণবর্ণ মল অগাড়ে নির্গত হয়; নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করা যায় না।



২য় ; মস্তিষ্ক ও রূপপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার বশতঃ স্বাস্থ্যবিরোধ । দীর্ঘ-কাল প্রসব-বেদনা ও জঠর হইতে সরিয়া আসিয়া অধোদেশে শিশুর বহুক্ষণ অবস্থান ; গলদেশ নাড়ী দ্বারা বেষ্টিত থাকা ; অথবা স্বাস কার্যের আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নাড়ীচ্ছেদ করণাশয়ে স্ত্রী দ্বারা নাড়ী বন্ধ করা ; এই সকল কারণে সদ্যোজাত শিশু এই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় মুখ সরস ও লাল, নাসিকারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে জিহ্বা নীল বর্ণের দাগ, লাল, গরম ও স্থানে স্থানে ছই চারিটা নীল দাগ ; ধমনী ও শিরায় অধিক রক্ত সঞ্চার হওন বশতঃ প্রথম প্রথম উহাদিগের দপ্পনপানি স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহা বন্ধ হইয়া যায় । অপেক্ষাকৃত বৃহৎকার ও শোণিত-প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট \* শিশুদিগের একরূপ হওন সম্ভব ।

৩য় ; স্বাসনীলীতে ও মুখ-গহ্বরে অধিক স্লেয়া থাকা জন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ । ইহাতে দক্ষ-আটকানর শ্রায় নব-প্রসূতের চেহারা দেখা যায় ; মুখ সরস ও নীল-আভাযুক্ত-লাল ; চক্ষু ঠেলে বাহির হওনের স্ভার ; ওষ্ঠ নীল ; মুখ বা নাসিকারন্ধ্রে গেঁজলা'টে ফেলা ; ক্রন্দন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু শব্দ ফোটে না, কেবল গলা'ঘড়'ড়ানি শুনা যায় ; দীর্ঘ ও স্থূলকায় শিশুদিগেরই প্রায় এইরূপ হয় ।

পূর্বলিখিত তিন প্রকার অবস্থাতেই যথেষ্ট আশঙ্কা আছে এবং যতই কাল বিলম্ব হয়, ততই অধিক ভয়াবহ হইয়া পড়ে ।

দেশস্থ বুদ্ধিমতী খাজীরা স্বাস-প্রক্রিয়ার নিমিত্ত মুখে ও ব্রুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারেন ও নাসিকারন্ধ্রে পালক বা কাটি দিয়া, ইঁচাইতে চেষ্টা পান । একবার নিশ্বাসকে তোলাকােলা করিয়া দিতে পারিলে যাব-জীবন ঐরূপ থাকে । পুনর্জীবিত করণোদ্দেশে নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়, অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে পারিলে সকল গুলিতেই ফল দর্শে । তাহার কয়েকটি এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল ।

সর্ব প্রথম কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া মুখের ভিতর হইতে স্লেয়া নির্গত করিবা, অথবা জিহ্বা টুর্নটাইয়া থাকিলে তাহা সরল বা সোজা করিয়া দিবা ।

\* দেহ পুষ্ট, রক্তবহা নাড়ী বৃহৎ বৃহৎ, রক্তের লাল কণার আধিক্য ; নাড়ীপূর্ণ ও বেগবতী, চক্ষু উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল, ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে শোণিত-প্রধান-ধাতু কহে ।

পরে একবার গরম একবার ঠাণ্ডা জলের টবে পর পর খানিক খানিক রাখিবা। এইরূপ দশ পনের মিনিট করিবা। কখন কখন সন্তানকে মাতার বুকের উপর রাখিয়া গাঢ় আবৃত করিলে জননীর গায়ের তাপ, তেজ, বা উষ্ণতা ও সদিচ্ছায় শিশু পুনর্জীবিত হয়। কখনবা শিশুর সর্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বুক, ক্লানেল দিয়া ঘষিতে থাকিবা; কেবল হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ওরূপ না করিয়া ত্রুস দিয়া ঘষণ করিবা। নিশ্বাস করাইবার উদ্দেশে এক জন বলবান ব্যক্তি শিশুর মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দিতে থাকিবে। ইহাতে শিশুর ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করিবে। সেই সময়ে এক হাত দিয়া পেট চাপিয়া রাখিবে—যেন তথায় বায়ু প্রবেশ না করে; ও অপর হাত দিয়া শিশুর নাক টিপিয়া ধরিবে—যেন নাক দিয়া বাতাস বাহির না হয়। ফুসফুস মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চার হইলে পর, বুকে আস্তে আস্তে অল্প চাপ দ্বারা তাহা নির্গত করিতে থাকিবে। যে পর্যন্ত না সন্তান প্রাণের নিশ্বাসের চিহ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে রাখা, মধ্যে মধ্যে বুক ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারা ইত্যাদি উপায় সকলও অবলম্বনীয়। শ্বাসবিরোধ-জনিত মৃত্যুতে, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার হাল সাহেব, যে উপায় উদ্ভাবন ও নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বভাবসম্মত ও বিশেষ ফলদায়ী বলিয়া সর্বত্র আদৃত; তাহার মৰ্ম্ম নিম্নে প্রকটন করা হইল।

১ম, মুখের অভ্যন্তরের স্লেয়া বাহির করিবা। মাথা বালিসের উপর উচ্চ রাখিবা। রোগীকে উপুড় করাইবা। সাবধান, যেন নাক মুখ ঢাকা না পড়ে। পরে তাহাকে কাঁত করিয়া সম্পূর্ণ এক পাশে না গুয়াইয়া কিঞ্চিৎ চিত্তভাবে রাখিয়া পুনরায় উপুড় করিবা। এইরূপ এক মিনিট কাল মধ্যে ১৮২০ বার কাঁত বা পাশ ফিরাইবা ও উপুড় করিবা। উপুড় করার অবস্থায় শরীরে ভার বশতঃ বুকের অভ্যন্তরে চাপ পড়ায়, নিশ্বাস ভাগ বা প্রাণাস ক্রিয়া হয়, এবং পাশ ফিরান কালে ঐ চাপ না থাকায় বা তিরোহিত হওয়ায় ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করে। যেকোন কামারের জাঁতায় চাপ দিলে বাতাস নির্গত হয় ও উপর দিকে টানিলে সেই চাপ হানান্তরিত হওয়ায় জাঁতা বাতাসে পূরিত হয়, চিত্ত উপুড় করার ফুসফুস

## গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা ।

তদ্রূপ কার্যাই করা হয় । এক মিনিট কাল মধ্যে শিশুদিগের স্বভাবতঃ ৩০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে, ৩০ একমুদ্র কৃত্রিম শ্বাস করণ সময়ে রূপ করাই বিধি । উপুড় করাইবার কালে পিঠের দাঁড়ার উপর হস্ত সম চাপ দিবা, পাশ কিরাইবার কালে হাত তুলিয়া লইবা, অর্থাৎ দেওয়া রহিত করিবা । প্রথম উপায় দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে প্রশ্বাস ও শ্বাস দ্বারা শ্বাস করান হয় । রক্ত চলাচলের অবরোধ হওনের উপক্রম হইলে, ২ নাড়ী ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্য হইলে, ছই ব্যক্তি হাতে কাপড় জড়াইয়া র নীচে হইতে উপর দিগে চুঁচিতে থাকিবে ; শ্বাস রোধিত অবস্থায় রক্তের চালনা মাত্র হয়, তখাচ এক্ষণে ইহা করা আবশ্যক, কারণ দ্বারাই-রোগীকে জীবিত রাখা যায় । ইহাৎ নিরাশ হইবে না, এমন কি ঘণ্টা চেষ্টার পর কেহ কেহ কৃতকার্য হইয়া থাকেন । যতক্ষণ শরীর জন্মার্থের জ্ঞান ছইয়া রাসায়নিক নিয়মাধীনে পচিতে আরম্ভ না হয়, তখন পর্যন্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইবা না । মুখের স্থানে স্থানে ক মারা, নড়া ও ওঠঘর লাল ও গরম হওয়া, ক্রমে ক্রমে অন্ন অন্ন নিশ্বাস, ইত্যাদি পুনরায় বাচিয়া উঠিবার লক্ষণ । নাড়ীর গতিবিধি আছে, কিন্তু প্রশ্বাস ও অঙ্গ-চালন রোধ, এমনত অবস্থায়, চিন ৩০ ক্রমের অনুবটিকা প্রস্থতের জিবে দিবা, ১০।১৫ মিনিট মধ্যে উপকার না দেখিলে টার্ট্রএমে, ১। লাকাসি ৩০ বিধি । শেষোক্ত ঔষধে কখন কখন চমৎকার ফল লক্ষিত নিশ্বাস ও রক্ত উভয়ই বন্ধ, কা'ল্চে বর্ণ, ক্ষীত ৩০ সংস্তাসের চেহারা, ইহলে প্রথম আকন, ৩০, অল্পক্ষণ পরে নাড়ী অপ্রাপ্য অবস্থায়, ওপি ; উহা অন্ন অন্ন অহুভূত, অথচ নিশ্বাস অস্পষ্ট, এমন স্থলে টার্ট্রএমে, দিবা । র প্রকার উপসর্গ পক্ষে ইপি ব্যবহার্য্য । নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ।

আন্টিম-ফ্রুড—জীবন-চিহ্ন অভাবে, বা নাড়ী ক্ষীণ ও হ্রাস, মুখ রক্ত-ও ফেকাসে, হস্ত পদাদির আঁট অভাবে ; অথবা মুখ সরস ও লাল ; শ্বাসনালী স্লেষ্মার পূরিত থাকা বিধায় শ্বাসরোধ ; একরূপ অবস্থায় ব্যবহার্য্য । একটা শুষ্ক অনুবটিকা জিহ্বাগ্রে নির্বা অথবা ৪ টি অনু-বটিকা অন্ন ললেংকেলিয়া তাহার এক ফোটা মুখে দিবা ।

**ওপিয়াম**—পূর্ব ঔষধ সেবন করিয়া ১৫ মিনিট মধ্যে কোন ফল প্রত্যক্ষ না করিলে, ইহা দিবা ; অথবা রাস রোধ, মুখ ফুলা ও কৃষ্ণ-নীলবর্ণ ও নিম্নলিখিত (টার্ট-এমিটিকের) অল্প অল্প লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইহা সর্ব প্রথমেই দেওয়া বিধি ।

**টার্ট এমিটিক**—মুখ পান্নাশবর্ণ, রাস রোধ, নাড়ীর দৃঢ়পানি থাকিলেও থাকিতে পারে, এমত অবস্থার দিবা ।

**আর্গিকা**—প্রসববল্লীনা আঘাতাদি লাগায় জখম হইয়া এক্রপ অবস্থ্য হইলে ইহা দেওয়া বিধি ।

**আকনাইট**—পুনর্জীবিত হওনাবস্থার, অথবা নির্জীবিতাবস্থার মুখ সরস ও লাল, ধমনী ও শিরায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, গাত্র গরম এবং সন্তান দীর্ঘকায় ও মোটা, এমত অবস্থায় দেওয়া যায় ।

**বেলেডনা**—বদন অভিশয় লাল ও চক্ষু আরক্ত হইলে ইহা দিবা ।

**চাইনা**—রাসাবরোধাবস্থার বা পুনর্জীবিত হওন (রাস প্রবাস আরম্ভ) কালীন মুখমণ্ডল পান্নাশবর্ণ, শিশু ক্ষুদ্রকায়, দুর্বল ও ক্লীণ থাকিলে, পূর্বমত দেওয়া বিধি ।

**ইপিক্যুয়ানা**—স্থাসাবরোধ অবস্থার স্নেহায় রাস নালী পূর্ণ থাকি বিধায় নির্জীব বোধ ।

৫০ বৎসরের অধিক হইল, সমাধিস্থ হরিদাস বাবাজিউ ৪০ দিবস কবরস্থ থাকার পর পঞ্জাব-সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ও জেনারেল ডেপুটা প্রভৃতি সম্রাজ্ঞ কুরসী সৈন্তাধক্ষ এবং ইংরাজ রেসিডেন্ট ওয়েড সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ এবং অপরাপর অনেক ভদ্র ও সাধারণ লোকের সম্মুখে সাধুর দেহ সিন্দুক হইতে বাহির করা হয় । হাকিম, কবিরাজ, বিশেষতঃ ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইল, শরীর কাঠবৎ ; রাসপ্রবাস ও নাড়ী স্পন্দন রহিত ; কেবল মাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র কিঞ্চিদ্রাজ উষ্ণ ছিল । মুখে আন্ননা ও হতা গুটি করিয়া নাসিকা রন্ধ্রের নিকট ধরা, ষড়ী ধরিয়া নাড়ী টেপা প্রভৃতি বিবিধরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল । বোগী ও মুক্দিদের অদ্ভুত কাহিনী অবগত থাকায় হিন্দু ও মুসলমান টিকিৎসক স্পষ্ট কিছু বলিলেন না, কিন্তু সাহেব ডাক্তার যাহাশয়ের সে বিশ্বাস অভাব, তিনি “মর্গিয়া, লাশ জালায় দেও” এই করতা

দিলেন। অনন্তর রাজাচ্ছা পাইয়া সীধুর শিষ্যেরা তাঁহার রক্ত সকল (নাক কাণ মলদ্বার) হইতে পূৰ্ণ সন্নিবিষ্ট ছিপি বা পুঁটলি খুলিয়া, জিব সরল ভাবে টানিয়া চক্ষুর পাতা ও সমস্ত অঙ্গ দ্বৃত দিয়া মর্দন করিতে এবং এক ইঞ্চি দলের রুটী গরম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর লাগাইতে লাগিল; তৃতীয় বার ঐরূপ দিবার পর, সমস্ত শরীরে খেঁচুনি ধরিল, এবং নাসিকারক্ত বিস্ফারিত হইয়া খাস প্রেচ্ছাস আরম্ভ হইল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (কাষ্ঠভাব গিয়া) সহজ সদৃশ কোমল হইল! কিন্তু তখনও নাড়ী অপ্রাপ্য, পরে দ্বৃত দিয়া জিহ্বা কিছুক্ষণ ডলিতে ডলিতে চক্ষু-গোলক স্বাভাবিক জ্যোতি ধারণ করিল, রক্তের গতিবিধি হইতে লাগিল এবং উদাসীন মুহূৰ্ত্তের বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ফল কথা অল্প অল্প অঙ্গের ও যন্ত্রের অপেক্ষা মস্তিষ্কের মৃত্যু শেষে হয়। অল্প অল্প অঙ্গ নীতল হইবার অনেকক্ষণ পর অবধি ব্রহ্মতালু গরম থাকা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিলাতি দিগ্জান-শাস্ত্রের অপূর্ণতা ও ভ্রম এবং যোগশাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জড়-বাদীর পক্ষে এ প্রমাণ বিশ্বাস ও গ্রাহ্য করার সম্ভাবনা নাই। এ টিপ্পনী লিখিবার অভিপ্রায় এই সদ্যপ্রসূতের, এবং জলে ডুবা, গলায় দড়ি বা দমআটকান, সর্পাঘাত, অপঘাতদ্বারা মৃত ব্যক্তির মাথা গরম থাকিলে ব্রহ্মতালুতে গরম ময়দা বা লবণের সেক দিয়া পরীক্ষা করা, বোধ হয় সর্বতোভাবে কর্তব্য। জড় সম্বন্ধে ইউরোপীয় বৃধেরা অনেক অনেক নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে নত-মন্তক হইয়া বৌদ্ধগণের জীবন ও আত্মা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণে আমাদের মিলনক্ষণ কল্যাণ সম্ভব। জীবাশ্ম শরীর হইতে এককালে পৃথক হইলে আর পুনর্জীবনের আশা নাই। কিন্তু এই পার্থক্য নিশ্চয় করা সহজ নয়। অপঘাত বা হঠাৎ মৃত্যুতে এ নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা অবিহিত। শীত-প্রধান দেশে মৃত্যুর সকল লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিও ৩১ দিন পরে বাঁচিয়া উঠে। দেহে গচা সড়া ধরিলেই নিশ্চয় মৃত্যু বৃদ্ধি। সংশয় স্থলে (মৃতবৎস্রতেও) আশ বা একঘণ্টা মেসমেরাইজ (Mesmerise) করার (বোগ্য ব্যক্তি দ্বারা ঝাড়ান ফুকান) ফল হওয়া বিচিত্র নহে। এক্ষণে করায় সহস্রের মধ্যে একটাও বাঁচিলে আমাদের এ টিপ্পনী লেখা সার্থক বৃদ্ধি। মৃতদেহ ফেলিয়া

দেওয়া কঠিন কার্য নয় ; তাহা দুই ঘণ্টা পরে দিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ;  
তবে মনের ক্ষোভটা থাকে কেন ? আশা মিটানই শ্রেয়ঃ ।

## প্রথম শৌচ ও প্রস্রাব ।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তিন-হইতে পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যায় । তন্মধ্যে ১০ বা ১২ ঘণ্টা মধ্যে সবল হইলে সন্তানকে মাতার স্তন দেওয়া বিধি । ঐ ছুৎকের বিরেচন শক্তি আছে ; উহা পানে সঞ্চিত মল নির্গত হয় এবং স্তন দেওয়ায় মাতারও অধিক শোণিত স্রাব হয় না । জ্বালাপ দিয়া বাছে করান নিত্যন্ত অর্থোক্তিক, কারণ ইহাতে উদরাময় হওন সম্ভব । স্তন-পান করিয়াও দীর্ঘকাল শৌচ বা প্রস্রাব না হইলে ২।১ ঝিহুক ঝিহুক উষ্ণ চিনি বা মিছরির পান দেওয়ার ফল দর্শে । সাহেবেরা কখন কখন এ অবস্থায় উষ্ণ জলের পিচকারী দেন । এ সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য না হইলে নক্সভমিকা, ব্রাইওনিয়া, ওপিয়ম, মার্কুরিয়স, পলসেটিলা, ইহাদিগের মধ্যে যেটা লক্ষণাভিমুখিক হইবে, তাহারই এক অমুণ্ডটিক জিহ্বায়, অথবা এক ঝিহুক জলে দিয়া খাইতে দিবা । ইহাতে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কোষ্ঠ না হইলে অপর একটি ঔষধ দেওয়া বিধি । মাতার কোষ্ঠ-বদ্ধ নিবন্ধন সন্তানের এ রোগ হইলে জননীকে এক মাত্রা পূর্কোক্ত ঔষধ ও সুপথ্য দিবা । এই সম্বন্ধে কোষ্ঠ-বদ্ধ প্রস্তাব পাঠ করিলে যথাবিহিত ঔষধ নির্ণয় অনায়াসে করিতে পারিবা । প্রথম শৌচের পর সন্তানের কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগ দাঁড়াইলে, ডাক্তার তেস্ত, শিশুর যে অবধি উপকার না হয়, প্রাতে পলসেটিলা ও রাতে নক্সভমিকা ব্যবস্থা করেন । প্রথম ৪।৫ দিন কোষ্ঠ না হইলে রাতে নক্স ও প্রাতে কামো দিবা ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রস্রাব বদ্ধ হইলে চিনি বা মিছরির পান ২।১ ঝিহুক দিবা ; তলপেট মস্মের তৈল দিয়া মালিস করিবা ; পরে ফ্লানেল দিয়া ঐ প্রদেশ আবৃত করিবা । ষাহারা মেস্মেরিজমে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শিশুর মাতাকে বা অন্ত কোন গুভাযুধ্যায়ীকে সন্তানের রোগমুক্ত হওয়া মনন করিয়া তলপেটের উপর দিক হইতে নিম্নদিকে পূর্ক প্রকারে তৈল দিয়া

হাত ব্লাইতে আব্রোধ করিবেন । এ অবস্থায় অল্প কোন প্রভিবদ্ধকের কারণ না থাকিলে, মান করানতেও উপকার সম্ভব । আকনাইট প্রস্তাব-বন্ধের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ( শিশুদিগের প্রস্তাব-বন্ধের চিকিৎসা দেখ )

### স্তনদান ।

সন্তানের যথাযোগ্য আহার ভগবান্ন মাতৃ-স্তনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । তথা হইতে নিঃসৃত অমৃতাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অপর কোন খাদ্য দেখা যায় না । জননীর স্তন ধেরূপ হৃৎপূর্ণ, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ বা ততোধিক কারুণ্যরূপে পূর্ণ । সন্তানের হিতোদ্দেশ্যে আপনার সকল সুখ বিসর্জন দিয়া জননী সর্বপ্রকার কষ্ট সহ করিতে প্রস্তুত । আমরাদিগের দেশে এ পর্যন্ত কৃত্রিম সভ্যতার এত দূর উন্নতি বা প্রীতি হয় নাই যে, শারীরিক অধঃক্ষমতা ও ঝড়োট এড়াইবার উদ্দেশ্যে, মাতা সাতিশর প্রিয়তমের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভার অল্প কাহারও উপর ন্যস্ত করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন । কোন কালেই যেন তাঁহাদিগের স্নেহের বিকৃতি না হয়, ইহা আমরাদিগের ঈশ্বরেখ নিকট সতত প্রার্থনা ।

শিশুর নাড়ী কাটা, গা ধোয়া প্রভৃতি কার্যের পর ও প্রসূতীর শ্রান্তি-দূর হইলে সন্তানকে স্তনপানের নিমিত্ত মাতার কোলে দিবা । এই দুখ ঘন ও আটার ভায়, ইহার রেচক শক্তি আছে এবং ইহা ঠিক এই সময়ের উপযুক্ত ; ইহা পানে বিনা কষ্টে প্রথম শোট হইয়া থাকে—সন্তানকে জোলাপ দিতে হয় না । এবং স্তন দেওয়ার প্রসূতীরও জরায়ু সংকোচিত হয় ও অধিক রক্তস্রাব এবং ধুমকা জরও হয় না এবং দুধও শীঘ্র শীঘ্র নামে । মাই টানিতে বা দেওয়ার দুধভারে বোঁটা শক্ত হয় । কোন কোন প্রসূতীর প্রথমতঃ ৩ । ৪ দিন, কাহারও বা সপ্তাহ কাল দুধ ভাল নামে না ; বোধ হয় তাই দেখিয়াই প্রথম ৩ দিন স্থানে স্থানে গোদুগ্ধ সেবন প্রথা প্রচলিত । এটুকু স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য । “আহার উদরে, দেন সন্ধ্যাকারে, জীবের জীবনদাতা । রস রক্ত স্থানে, দুধ দেন স্তনে, গান হেতু বিশ্বপাতা ।” সেই অ ভ্রান্ত শক্তি কি মানবজীবনের প্রথম উদ্যমে সেই

নিয়মের অপূর্ণতা প্রদর্শন করিবেন ? ইহা অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রম । পুরুষানু-  
গত অভ্যাস বশতঃ আত্মাদিগের জীলোকদিগের ধাতু একপ্রকার বিকৃত  
হইয়া গিয়াছে । সেই নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করিয়াও স্তনে দুধ না নামিলে  
একভাগ দুধ ও দুই ভাগ গরম জল মিশাইয়া খাইতে দিবা ।

মাতা নিত্য দুর্বল ও রুগ্ন হইলে, অথবা দুধে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর  
পদার্থের অভাব থাকিলে, সন্তানের মঙ্গল নিমিত্ত তাহাকে মাতার স্তন  
দেওয়া অবিধেয় । স্তনে স্ফোটক বা বোঁটা কাটা হইলে, তাহা আরোগ্য  
না হওন পর্য্যন্ত শিশুকে মাই খাইতে দেওয়া সৎপরামর্শ নহে । গরমির পীড়া,  
মৃগী, মুছা প্রভৃতি বায়ুরোগ ও ক্ষয়-বক্ষা-কাশপ্রভৃতিগের সন্তানকে আপন  
স্তন পান করান অবিধেয় । উহাদের দুধ পানে শিশুগণের ধাতু বিকৃত হইয়া  
তদ্রোগাক্রান্ত হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা । এমত স্থলে ধাত্রী নিযুক্ত  
করাই কর্তব্য । অস্থ ও সবলকল্প, প্রসূতীর সমবয়স্ক ও সমকাল-প্রসবিনী,  
শান্ত, ধীর, ও শিশুপ্রিয় ; সে ধাত্রীতে এই সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক ।  
তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রাখিবা । উত্তম পুরাতন তেল, মূগ  
ও মাসকড়াই, দেশী টাটকা মৎস্ত, পটল, আলু, কলা, মানকচু প্রভৃতি  
তরকারী, লেবু, পুরাতন ত্রৈল, দুধ ইত্যাদি অনায়াস-জীর্ণ বলকারী  
পথ্য দিবা । অতিরিক্ত কাল প্যাজ প্রভৃতি গরম মসলা নিষিদ্ধ । এককালে  
নিত্য অন্ন বা অধিক আহার না হয় দেখিবা । সাবধান, যেন ইহারা  
কোন নেশা, বিশেষতঃ অহিফেনথোর না হয় ।

ধাত্রী অপ্রাপ্য হইলে, গাধার, ছাগের বা গোরুর দুধ দেওয়া হইয়া  
থাকে । গাধারদুধ সর্কাপেক্ষা লঘু ও নর-দুধ সদৃশ বলিয়া অত্মাপেক্ষা ইহার  
অধিক আদর । ইহা সোড়াওয়াটারের বোতলে পুরিয়া রাখিবা, জ্বাল দিয়া  
সিদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই । খাওয়াইবার কালে বোতল উষ্ণ জলে ডুবাইয়া  
লইলেই যথেষ্ট হয় । কিন্তু ইহা দুপ্রাপ্য ও দুর্মূল্য । ছাগ-দুধ সর্কাপেক্ষা  
ভারি ; দেশী ছাগলের দুধে বোটকা গন্ধ, পশ্চিমের ছাগে তত অধিক দুর্গন্ধ  
নাই । গো-দুধই অনায়াসে প্রাপ্য এবং সেই জন্য সর্বত্র সচরাচর ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে । গাভীর দুধে অর্দ্ধ-তেহাই বা সিকি জল ও কিয়ৎ পরিমাণে  
ত্বকের চিনি (Sugar of milk) বা তাহার অভাবে, অন্ন পরিমাণে উত্তম চিনি



মিশাইয়া খাইতে দিবা । যে গাভীর দুধ সহ্য হইয়াছে, প্রত্যহ তাহাই দেওয়া উচিত । বাচ্চরহীন বা খেঁড়ে অথবা গভীর গাভীর দুধ নব-প্রসূতকে কোন ক্রমে দেওয়া উচিত নহে । দুই তিন সপ্তাহ ঐরূপ আহার সহ্য হইলে ক্রমশঃ জলের ভাগ কমাইতে থাকিবা । ১২।১৪ বর্টার অধিক সময়ের দোহা দুধের ব্যবহার করিবে না । বাসি দুধে পীড়া জন্মায় । ঢোকা দুধ খাওয়াইতে কষ্ট হয় এবং ওরূপ খাওয়ানতে পরিমাণ বৃদ্ধা যায় না । কাঁচের কৃত্রিম স্তন (Suckling bottle) ব্যবহারে সকল প্রকারে সুবিধা । ইহা হইতে শিশুরা যথা প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ করে, ইচ্ছার অধিক খায় না এবং সেই নিমিত্ত ক্রন্দনও করে না । রৌশ্যক্সবিশুদ্ধ অপেক্ষা ইহা সুলভ । এই বোতল ব্যবহারের পরক্ষণেই উহা গরম জলে ধুইবা । যে পর্য্যন্ত না পুনব্যবহার হয়, উহার বোঁটাটি বিলক্ষণ পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবা । স্তন-দুধ কম হইলে শুভ্র দুধ দ্বারা অভাব পূরণ কর, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে স্তন-দুধও খাইতে দেও । বাহাদিগের স্তনে যথেষ্ট দুধ নামে, তাহাদিগের স্তন্যনকে অন্য দুধ দিবার প্রয়োজন নাই । পর্য্যায়ক্রমে উভয় স্তন তুল্যরূপে পানি করান উচিত । ইহার অন্তথা হইলে অব্যবহার্য্য স্তনে অধিক দুধ সঞ্চয় হইয়া থুঁক হইতে পারে এবং শিশুর একপেশে হইয়া অধিক থাকা বশতঃ অঙ্গ বক্র হওয়া সম্ভব । প্রথম প্রথম মাতা দুই বর্টা অন্তর স্তন দিতে পারেন । নিম্নতই মাই দেওয়া অপরামর্শ । বিশ্রাম না দিলে দুধ বিকৃতভাবাপন্ন হয় । দুধ-হীন স্তন টানার শিশুর পেট্ কামড়ান ও উদরাময় রোগ হইতে পারে । ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্তন দেওয়া অবিধেয় । জননী, নিদ্রা-বস্থায় মাই দেওয়া অসুচিত । ঘুমন্ত অবস্থায় স্তনের চাপ মুখে পড়ায় ক্টিৎ শিশু দম আটকাইয়া মারা যায় । স্তন্যন দুই তিন মাসের হইলে, রাত্রে তিন চারি বার ও তৎপরে দুই তিন বার দিলেই যথেষ্ট হয় । ক্রন্দন করিলেই স্তন দিয়া ধামান বুদ্ধির কার্য্য নহে । শিশুরা অসুস্থতা বশতঃ অনেক সময় চিৎকার করিয়া থাকে, পেট পূরণ দ্বারা শান্ত করিলে রোগ নির্ণয় করা হয় না । স্তনে দুধ কম হইলে, তাহা অধিক করণাভিপ্রায়ে, পোষ্যতি জীর্ণ করিতে পারেন এমন পরিমাণে অধিক গাভী-দুধ, চিড়ি কাঁকড়া, গেঁড়ি এবং শিল্পী, মাগুর, কাইন ও পাকাল মৎস্যের ঝোল খাইতে দেওয়া উচিত ।

সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, লাল ভেরেণ্ডার পাতার ভাব্রা লইলে বক্ষ্যারও মাইতে দুধ নামে । অথবা ঐ পাতা গরম করিয়া স্তনে লাগাইলেও ঐ ফল হয় । ঐশ্বরীর এককালে স্তন-দুগ্ধ বন্ধ হইলে—পলস, ডকা, বেল, ব্রাই, রস ।

দুধ কমিলে—আকন, কষ্টিক, পলস, রস ।

বিকৃত হইলে (ঝিছুকে ঞ্খানিক গালিয়া ইহার আকার ও বর্ণ দেখিয়া প্রবীণা গিন্নিরা অনায়াসে বুঝেন ) বোরাক্স, সিলিসা, কামো, মার্ক, সিনা ।

শিশু স্তন-দুগ্ধ মাইতে অনিচ্ছুক হইলে—মার্ক, সিলিসা ।

পানের পরই তুলে ফেলা—সিলিসা, কামো, বোরাক্স ।

বন্ধ হইয়া উদরাময় হইলে—পলস, বেল, ব্রাই, রস ব্যবহারে পেটের পীড়া সূত্রে এবং পূর্ববৎ দুধ সঞ্চার হয় ।

অতিরিক্ত হইলে—কাফা, পলস, বেল, ব্রাই ।

মাই দেওয়ার সময় ভিন্ন অস্ত্র সময়ে দুগ্ধক্ষরণ পক্ষে—কাফা, ব্রাই, রস ।

## মাই ছাড়ান ।

প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্র মতে সৰল শিশুকে এক বৎসরের পর স্তন পান করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ । দুৰ্ব্বলকায়, রুগ্ন এবং যাহার অবিলম্বে দন্ত উঠে, এক্রপ শিশুকে ১৮।২০ মাস পর্য্যন্ত স্তন দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত অস্ত্র সন্তান নী হয়, এমন কি কখন কখন সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেকে মাই দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা নিতান্ত অর্থো-ক্তিক ও স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য । ডাক্তর চিভস সাহেব তাঁহার পুস্তকে, কোন বালকের এক টান করিয়া শুড়ুক তামাক টানা ও পরক্ষণই মাই টানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও সচরাচর এক্রপ দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহার উদাহরণ কোনমতে কাল্পনিক নহে । দীর্ঘ কাল স্তন পানে মাতা ও সন্তান উভয়েই ক্লিষ্ট ও রুগ্ন হয় । দুই তিন বৎসরের শিশুর ভয়ানক উদরাময় কেবল স্তনপান বন্ধে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । অনেক যোবা সঙ্গী হইয়াও কোলের ছেলেকে আদর করিয়া স্তন দেন । ইহাতে

আপনিও দুর্বল হন, ছেলেরও পীড়া হওয়া সম্ভব এবং অর্ধরক্ষিত সন্তানও যথা প্রয়োজনীয় রসভাবে সম্যক পুষ্টি লাভে বঞ্চিত হয়। বিকৃত-বাহু-বিশিষ্টের ঋতাবস্থায় কোলের ছেলেকে মাই দেওয়ার কখন কখন গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা। শিশুর পেট ভাগরা হাত ছুলা দেখিয়া অনেকে বলেন যে হিংসা-জন্তু শরীর এইরূপ হইতেছে, তাঁহারা বুঝেন না যে অবস্থা আহাররূপ স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করার শিশু এই দশা প্রাপ্ত হয়। স্তনপান হঠাৎ এককালে বন্ধ করা গর্হিত। ইহাতে মাতা ও সন্তান উভয়েরই পীড়া সম্ভব। দন্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে মাই দেওয়া ক্রমে ক্রমে বারে কুমাইবা ও গাভি-দুগ্ধ দ্বারা স্তন-দুগ্ধের অভাব পূরণ করিবা। অরে বা দন্তোদগম বশতঃ পীড়ার, স্তনপান বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইবা না। নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে, মাতাকে ২৪ ঘণ্টা অন্তর তিন অম্লবটিকা কস্করস ও সন্তানকে ১২ ঘণ্টা অন্তর এক অম্লবটিকা বেলেডনা দিবা। দন্ত উঠিতে আরম্ভ হওনের পর, অর্ধাংশ শিশু নয় দশ মাসের হইলে, দুগ্ধের সহিত এক এক বার আরোক্ত বা সাণ্ডি, পরে ক্রমশঃ সূজি বা যবের কাণ্ড বা ফেন দেওয়া যাইতে পারে। ভক্ত গৃহিণীরা চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানগণকে তাহাদিগের ইচ্ছা বিরুদ্ধে কেবল দুগ্ধ-খাওয়ান এবং দুঃস্থ ইত্যাদিগের ন্যায় ভাত খাইতে দেন না বলিয়া ঘর্প করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, অন্নপ্রাশন কেবল ধর্ম সংস্কার নহে, ইহা ঐহিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান নিয়ম। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বহুদর্শনের পর নিশ্চয় করিয়াছেন যে, দন্ত নির্গমের পর হইতে কেবল জলীয় আহার অনিচ্ছক এবং সেই জন্ত ক্রমশঃ ইচ্ছাভাজ্য দেওয়া নিত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সন্তান প্রসবের পর মাতার সর্চরাচর ছয় সাত মাস ঋতু বন্ধ থাকে। পুনরায় মাসিক শোণিত নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে সেই তিন চারি দিবস সন্তানকে স্তন না দিলে ভাল হয়। তাহা পানে শিশুর পীড়া হওয়া সম্ভব। স্নেহ ও স্বচ্ছন্দ, স্নেহপূর্ণ ও আনন্দিত মনে সন্তানকে মাই দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে উহার দেহের পুষ্টি হয়। জননী রোগগ্রস্ত হইলে যে পর্য্যন্ত স্নেহ না হন, সন্তানকে স্তনপান করান অপরাধমূল্য। ইহাতে প্রসূতী দুর্বল এবং শিশুও তজ্জোগাক্রান্ত হইতে পারে। মনের অবস্থা বিকৃত হইলে, স্তন-দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণের বৈলক্ষণ্য হওনের সম্ভাবনা

আছে ; যথা—ভয় দ্বারা হৃৎ এককালে বন্ধ হইতে পারে । বিরক্তি বা দ্বিষাদে উহা কমিয়া যায় এবং স্বাভাবিক গুণের ব্যতিক্রম ঘটে । ক্রোধ ও উদ্বিগ্নতায় এরূপ বিকৃত হয়, যে উহা পানে শিশুর পেট কামড়ায় ও সবজা ভেদ হয় । অত্যন্ত ভয়ের অবস্থায় সন্তানকে মাই দিলে তদগে দড়কা এবং কচিং বা মৃত্যুও হইয়া থাকে । অজানতাবশতঃ এইরূপে কত মাতাই স্ব স্ব প্রিয়তমকে কষ্ট দেন । বামাগণ ধোসগন্ন, তাসাদি ক্রীড়া ও উপাঙ্গাসাদি পাঠে বৃথা দীর্ঘকাল ক্ষেপণ না করিয়া, স্বাস্থ্যের নিয়ম ও শিশু-পালন সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ এবং বিজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের বথার্থই কর্তব্য কর্ম সাধিত হয় ; তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত-রূপে গৃহিণীপদবাচ্য এবং নিজ নিজ ও সাধারণের মঙ্গল সাধন করেন ।

শিশুকে মাই ছাড়ান কালীন মাতার গুচ্চ গুচ্চ আহার বিধি—ঝোল অধিক নী দিয়া তৎ পরিবর্তে চড়চড়ি, কাবাবাদি দিবা । অধিক জল ও লবণ নিবেধ । হৃৎ টানিয়া বাইবার নিমিত্ত গিল্লীরা স্তনে মুহুরীর লেপ লাগান । অধিক ক্ষীত হইলে গরম দ্বত দিয়া স্তন মালিস, পরে পেঁজা তুলা দিয়া উহা আবৃত করিবা এবং আবশ্যক মতে অল্প সন্তান দ্বারা হৃৎ টানিয়া ফেলা-ইবা । স্তন দেওয়া বন্ধের পর মাইতে হৃৎ সঞ্চয় হইতে থাকিলে এবং ঐ সম্বন্ধে মাতার সদা শীত শীত ও কাঁদিবার ইচ্ছা থাকিলে পলস ; স্তনে অধিক হৃৎ ও গাত্র জ্বালা পক্ষে—রস ; স্তনের প্রদাহে অর্থাৎ উহা শক্ত, ফুলা ও লাল হইলে—বেল দ্রব্য ।

## ধাতু পরিবর্তন ।

জনক জননীর কোন কোন বিশেষ রোগ থাকিলে, বা তাঁহাদিগের ধাতু বিকৃত হইলে, সন্তানেরও তদবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । হাজারই সাবধান হও, আহার ও ব্যায়ামের নিয়ম কর, কিছুতেই নিষ্ফল নাই । চিকিৎসকেরা রোগ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহা প্রকাশিত হইলে যথা বিহিত ঔষধ প্রদান করেন । হোমিওপেথিক্ ভিষকেরা ধাতু পরিবর্তনে সক্ষম । ডাক্তার গাস্টিয়র পারিস মহানগরের শিশু হাসপাতালে দীর্ঘকাল

বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া এবিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন । দুর্বলকার ও রুগ্ন শিশু সন্তানদিগকে নাড়ীচ্ছেদনের অব্যবহিত পরক্ষণে, সলফর ২০০ ক্রমের দুই অম্লবটিকা দেন । এক মাস পরে পুনরায় ঐরূপ এক মাত্রা ঔষধ দিয়া থাকেন । নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতিবিধায়ী (Antidote) ঔষধ প্রয়োগ করেন, নতুবা তিন মাস পড়িলে, এক মাত্রা কাকারিয়া ২০০ ক্রমের ব্যবহার করিয়া থাকেন । শেযোক্ত প্রয়োগে দন্ত উদগমেরও সুবিধা হয় । পূর্ব ঔষধদ্বয় ব্যবহারে ইহাদিগের শরীর এরূপ সুস্থ ও নির্মল হয় যে, তৎকালে ইহাদিগের ত্বকো-গো-বীজ ঢাকা বা বসন্তের রস লাগাইলে গাত্রে শুটি বাহির হওয়া বা অন্য কোন ফল দেখা যায় না । সলফর ও কাকারিয়া ভিন্ন অস্ট্রা-নিক, গ্রাফাইটস প্রভৃতি অপর লক্ষণানুযায়িক ভৈষজ্যও যথা সময়ে ব্যবহার হইয়া থাকে । এই সকল শিশুদিগের রোগ হইলেও তাহা ভয়াবহ ও দুঃসাধ্য হয় না । যাহাদিগের সন্তান হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচে না, তাহাদিগের নব-প্রসূতদিগকে পূর্ব নিয়মে ঔষধ সেবন করান কর্তব্য ।

### শিশুগণ পক্ষে অপরাপর নিয়ম ।

কোন পীড়া না থাকিলে বর্ষা ও মেঘাচ্ছন্ন দিন ভিন্ন, শিশুকে প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করাইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হইলে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা জল সহান বিধি । স্নানকালীন বাতাস না লাগে ও পরক্ষণেই যেন শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গা মুছান ও আবরণ দেওয়ান হয় । শরীরের অনেক ময়লা ঘাম সহ ত্বক দিয়া নির্গত হয় । ঐ অন্বাস্থ্যকর পরমাণুগণ দ্বারা লোমকূপের দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে অনেক পীড়ার সম্ভাবনা । এই নিমিত্ত চন্দ্রকে পরিষ্কার রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । যে সমস্ত গরু ও ঘোড়ার ডলাই মলাই করা হয়, তাহারা অত্যাশঙ্ক্য অধিক বলিষ্ঠ, কন্দুশীল ও তেজস্কর হয় । জলকে হিন্দুরা জীবন কহে, ইহা রক্তের গরমত্ব দূর এবং কত প্রকারে নীরের হিতসাধন করে তাহা বর্ণনাতীত । ঋষিরা পুরাকালে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং এখনও বামাগণ দুই বার করিয়া গাত্র ধৌত করাতে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী থাকেন ।

গরম জলে স্নান দৌর্জল্যজনক ; তবে বয়স, ধাতু, কাল ও অবস্থা বুঝিয়া কাঁচা বা পাকা বা উভয় মিশাইয়া স্নান বিধি । ইউরোপ ও আমেরিকায় হাইড্রোপ্যাথি বা কেবল মাত্র জল প্রয়োগে পীড়িতকে নিরাময় করে । “স্নেদ ভেদ বমন ও বারি” এই চারি উপায়ে কবিরাজ মহাশয়েরা পূর্বে অরাদিকে তাড়াইতেন । এখন কবিরাজ জলকে জীবন না বুঝিয়া যমবৎ দেখেন ! তবে আনন্দের বিষয় এই যে, পূর্বের ত্রায় আ’জকা’ল ততটা ক’টুকেনা নাই । জল ব্যবহার না করিলে অপকার সম্ভাবনা । অরুণ সহজ শরীরের সকল অবস্থায় ও সকল সময়েই যে নাওয়া উচিত, তাহা নয়—অতিশয় রোজে ও ঘর্মাক্ত শরীরে, আহ্বারের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে স্নান অপরামর্শ । ইহাতে সর্দিগর্শ্ম বা পরিপাক কার্যের ব্যাঘাত হইতে পারে । প্রত্যহ স্নান করিতে পারিলেই ভাল হয়, যথায় তাহা সম্ভব হয় না, তথায় অন্ততঃ দুইবার করিয়া গা মোছা, কাপড় ছাড়া ও উহা কাচিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক । দৈনিক কার্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অকাট্য ও চমৎকার বলিয়া বোধ হয় । তবে ইহা ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় কাহার কাহার আপত্তি । কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সেটি আমাদেরই ভ্রমাত্মক সংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক । “কার্য” শব্দেই ধর্ম—তবে কিনা কতকগুলি শারীরিক, কতকগুলি বা মানসিক ; কতক নিজ সম্বন্ধে, কতক বা সমাজ সম্বন্ধে । আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ যদিও আমরা পৃথক পৃথক দেখি, কিন্তু তলাইয়া বুঝিলে ইহাদিগের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ । মহাত্মা ও যোগীগণের কথা স্মরণ ; তাঁহারা পাশব নিয়ম কতকটা এড়াইয়াছেন—কিন্তু সাধারণ পক্ষে দেহ অপরিষ্কার ও রোগগ্রস্ত হইলে, মনের মালিন্য দূর অথবা উন্নতি সাধিত হওয়া সুদূর ।

শিশুদিগকে পিঁড়াতে শোয়াইয়া বৃকে ও কঠায় তৈল লাগাইয়া সূর্য্যপক্ব করা নিতান্ত গর্হিত । ১৫।১৬ দিনের হইলে, প্রত্যহ অপরাহ্নে কতক সময় বাহিরে আনিয়া পরিষ্কৃত বায়ু সেবন করান কৰ্ত্তব্য । মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গৃহ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ লইয়া বেড়াইবা । সাবধান, যেন কোন মতেই হিম না লাগে । ৫।৭ মাসের হইলেই, ইহাদিগকে বসাইতে চেষ্টা করিবা না, তাহা হইলে শিশুর কুজ হওন সম্ভব ; অনেকে আদর করিয়া নিতান্ত শিশুকে

তোলাফেলা করেন ও অথাকালে বসান দাঁড়ান, হামাগুড়ি এবং হাঁটি হাঁটি পা পা ইত্যাদি অভ্যাস করাইতে বিশেষ যত্ন পান। এটি সর্বতোভাবে অনুচিত কর্ম। স্বভাবের নিয়মানুসারে ও আপনার বলানুযায়িক সন্তানেরা যখন যাহা ইচ্ছাপূর্বক করে তাহাই ভাল, অথবা চেষ্টায় অঙ্গ বক্র প্রভৃতি মন্দ ফল মাত্র উৎপন্ন হয়।

শরীরের ত্রায় শিশুদিগের বিছানা ও গাত্রাবরণ পরিষ্কার রাখিবা, ইহাতে অধিক ব্যয় নাই; একটুকু মাত্র যত্ন থাকিলে ইহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। আমরা একপ্রকার শুচিবেয়ে—গোবর ও গঙ্গাজল ভিন্ন আমাদিগের এক দণ্ড চলাভার। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে আমাদিগের ত্রায় অপরিষ্কার জাতি কম দেখা যায়। শিশুদিগের গাত্র আবরণ ও শয্যার ক্রেদ উহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। স্বাস্থ্য ও পরিষ্কারিতা, এই উভয়ের পরস্পরের কত নিকট সম্বন্ধ, তাহা না জানাতেই আমাদিগের সন্তানগণ এত অধিক কষ্ট ভোগ করে। স্ত্রীশিক্ষা এক্ষণে ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। কাব্য উপন্যাসাদিতে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন না করিয়া, সহজ বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে নিঃসন্দেহ অধিক ফল লাভ হইবে। মাতারা কেবল আমাদিগের জন্মদাত্রী নহেন—শৈশব ও বাল্যকালে তাঁহারা ই আমাদিগের রক্ষক ও শিক্ষক। মাতা সুবোধ না হইলে, বৈদ্যরাজ ধষন্তরীও প্রকৃতরূপ প্রতিকারে অসমর্থ।

কোন কোন শিশু যথাকালে দাঁড়াইতে ও চলিতে পারে না, কাহারও কাহারও বা ঘাড় শক্ত হয় না। ইহাদিগকে পূর্বাঙ্কে যদি পূর্বলিখিত ধাতু পরিবর্তনের ঔষধ দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে প্রাথমিক কাক্সারিয়া ১ অনুবটিকা করিয়া প্রত্যহ দিবা। ৪ দিবস পরে সপ্তাহ বিরাম দিয়া পুনরায় পূর্বমত ঔষধ সেবন ও বিরাম। ইহাতে প্রতিকার না হইলে সিলিস দিবা। বিশেষ দুর্বল ও গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত বা যাহাদিগের গাঁইট ফুলে বা অস্থি না বক্র হয়, এমন সকল শিশু পক্ষে বিশেষ ফল দর্শে। পূর্ব নিয়মে ঔষধ সেবনে কোন ফল না দর্শিলে সল্ফর পূর্ব মত ব্যবহার বিধি।

একবার প্রতিকার আশস্ত হইলে ঔষধ বন্ধ করিয়া ফল প্রতীক্ষা করিবা। ঔষধের ক্রম কুরাইলে অর্থাৎ আর উপকার হইতেছে না বুঝিলে, পুনরায়

সেবন বিধি । বিশেষ পুরাতন অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে এই নিয়ম বলবৎ হুনিবা । অল্পে উপকার হইয়াছে, অতএব অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবনে অধিক ফল লাভ হইবে, হোমিওপেথিক চিকিৎসাশ্রমণালী সম্বন্ধে ইটি ভ্রমাত্মক সংস্কার ও আরোগ্য প্রতিরোধক ।

## আহার ।

মাই ছাড়িলে শিশুকে ক্রমে ক্রমে কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবা । শিশুদিগের ক্ষুধা প্রবল থাকায় তাহারা সদা খাই খাই করে বলিয়া সর্বদা তাহাদিগকে কেবল আহারে ব্যাপ্ত থাকিতে দিবা না ; অথবা বড়দিগের আহার দুই কালে মাত্র ভোজন করিতে দেওয়া অপরাধ । বারে অধিক, মাত্রায় কম, অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে এমন দ্রব্যই ইহাদিগকে আহার করিতে দেওয়া কর্তব্য । গিলিয়া খাওয়ান বিলক্ষণ দোষাবহ । অনেক স্থানে গৃহিণীরা বাটীর ৫৭ টি সন্তান একত্র করিয়া এক পাত্রে ভাত মাখিয়া ডেলা পাকাইয়া সকলের মুখে তুলিয়া দেন, যাহাদিগের গলাধঃকরণ বিলম্বে হয় তাহাদিগকে ভৎসনা করেন । কাজে কাজেই উহারা আহাৰ্য্য কিছু মাত্র চর্ষণ না করিয়া কৌত কৌত করিয়া গিলিয়া ফেলে । পেট ভরিলেও অবশিষ্ট অন্ন উদরস্থ করাইবার উদ্দেশে “কাগারে বগারে হস্” অথবা আপনারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাতের ডেল গুলিকে কাঁকুড় নাম দিয়া ছেলেদের শেয়াল হইয়া খাইতে অনুরোধ করেন ; সুতরাং অনেকের এই অবস্থা হইতেই আহাৰ্য্য দ্রব্য গিলিয়া খাইতে অভ্যাস হয়, পরে তাহা আর শুধরাইতে পারে না এবং পরিশেষে শুধরাইবার জগৎ কুতাই যে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, বলা যায় না । দস্ত যে কেবল মুখের শোভা সম্পাদনার্থ ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন এমত নহে । চর্ষণ ভিন্ন অনেক খাদ্য পরিপাক হয় না ; স্ত্রীলোকদিগের এটি জানা নিতান্ত আবশ্যক । শিশুই হউক, আর বড়ই হউক, কি পরিমাণে খাওয়া উচিত বা খাইলে পেট ভরে, ইহা যেমন আপনাপনি জানিতে পারা যায়, অপরের দ্বারা সেরূপ প্রায় হয় না ; এটিকে এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলিলে বলা যায় । কেবল বাসনমাজের শ্রম লাঘব করণাভিপ্রায়ে



এরূপ স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য করা নিতান্তই অমঙ্গলকর। সন্তানগণকে এক স্থানে বসাইয়া খাওয়ানতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে আপনাপনি থাইতে দেওয়া ভাল। কোন কোন বালিকা অভ্যাস বশতঃ বিবাহের পর স্বশ্রুরালয়ে গিয়া ভাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকে, পরে স্বাভূতী বা ননদ বৃত্তিতে পারিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দেন। কি ছুংথ ও লজ্জার কথা!

ভেলেরা রাত্রে ১০।১২ ঘণ্টা উপবাসী থাকে, প্রাতে উঠিলে মুখে জল দিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য। সে সময় টাটকা দোয়া ছুন্ধ দিলে উত্তমই হয়। পরে ১০।১১ টার সময় অন্ন, ১।২ টার সময় কিছু জলযোগ ও অপরাহ্নে অন্ন বা রুটী। ইহাদিগকে অন্ততঃ চারি বার আহার দেওয়া বিধি।

ছুন্ধপোষ্য ভিন্ন আহার সম্বন্ধে একটা সামান্য নিয়ম সকলের পক্ষে হিতকর; পাকাশয়ের অর্দ্ধভাগ কঠিন দ্রব্য, যথা, অন্ন রুটী ডাউল, সিকি জলীয় পদার্থে এবং বক্রী সিকি খালি বা বায়ু দ্বারা পূরণ করিলে পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ হওন সম্ভব। অভ্যাসে সকলই সহ্য হয়, কিন্তু অপাচ্য গুরুপাক ও অধিক খাদ্য, কাঁচা ফল, পচা সড়া মাংসাদি, অতিরিক্ত ঘি ও মসলা এবং অধিক রাত্রে ভোজন সকলের পক্ষেই বর্জনীয়।

## নিদ্রা।

জঠরস্থিত সন্তান গরমে থাকে। ভূনিষ্ঠ হওনের পর দেড় বা দুই মাস পর্য্যন্ত উহাকে তজ্রপ গরম অবস্থায় রাখা কর্তব্য। সেই জন্ত সর্ষদা কোলে বা কাছে রাখিবা; পরে রাত্রে নিদ্রাকালীন উহাকে স্বতন্ত্র শয্যায় একটুকু অন্তরে রাখিলে ভাল হয়। এরূপ করিলে শিশুর নিয়ত মাই মুখে দিয়া থাকা ও যখন ইচ্ছা ছুন্ধ টানার অভ্যাস যায় ও মাতার প্রেমসিত দূষিত বায়ু তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় না এবং ঘুমের ব্যাঘাত না হওয়ায় প্রস্তুতী পুষ্টিকর ছুন্ধ উৎপাদনে সক্ষম হন। এতদ্ব্যতীত ইঁহা একটি স্বভাবের নিয়ম যে, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ব্যক্তির একত্র শয়ন করিলে অধিক ব্যয়স্ফেরা

অল্প বয়স্কদিগের তেজঃ বা উদ্ভা কতক পরিমাণে হরণ করে এবং তজ্জন্ত শোষোক্তেয়া ক্লশাঙ্গ ও দুর্বল হয়। প্রাচীনদিগের যুবতী ভাৰ্যা হইলে অল্প কাল সহবাসে যোষাকে বৃদ্ধার আয় দেখায়। শিশুগণও উক্ত নিয়মের অধীন জানিবা। বৃদ্ধা মাতামহির বা পিতামহির নিকট দুগ্ধপোষাকে রাত্রে শয়ন করান এবং অপর্যক্ল কথ বুড়া মির কোলে সর্বদা শিশুকে রাখা সং পরামর্শ নহে। সুম বয়স্ক সহক্ৰীড়া করিতে এবং ৪৫ বৎসরের হইলে মাতার নিকট অথচ স্বতন্ত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতে দেওয়া বিহিত।

প্রথম দুই মাস পর্য্যন্ত শিশুর ইন্দ্রিয় সকল শিথিল এবং কেবল আহাৰ ও নিদ্রা প্রবল থাকে; তৎকালে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষাকৃত পাতলা থাকাতে ও শিশু এককালে অল্প পরিমাণে আহাৰ করিতে, খাইবার পরক্ষণই নিদ্রা যাওয়াতে হানিজনক হয় না। কিন্তু দুগ্ধনামিলে সন্তান যখন এককালে অধিক খাইয়া থাকে, অথবা যথায় পেট ভরিয়া ঢোকা দুগ্ধ খাওয়ান পদ্ধতি, এমনত স্থলে আহাৰের পরক্ষণই ঘুম পাড়ান অনুচিত। ভরা পেটে নিদ্রায় পরিপকের ব্যাঘাত জন্মায় এবং সেই কারণে স্ননিদ্রাও হয় না। শিশুর মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠের দাঁড়া অপরিণত থাকায় উহাতে কোনমতে অধিক চাপ না পড়ে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এই জন্ত তাহাকে দীর্ঘকাল চিত হইয়া শুইতে দেওয়া অবিধি। নিদ্রাকালে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করান কর্তব্য। দক্ষিণের দুস্কৃৎ বামের অপেক্ষা বৃহৎ, এই জন্ত দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়ান বিধি। ইহার বিপরীতে শ্বাস কার্যের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত সম্ভব। এতদ্ভিন্ন সুকলেরই উত্তরে বা পূর্বে বা ঈশান কোণে শিয়ার করা উচিত। হিন্দুরা সন্ধ্যাও আত্মিক পূজা উত্তর বা পূর্ব মুখ হইয়া করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আছে—ঋষিগণ খামখেয়ালি নিয়ম প্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা জ্ঞানমান—মূর্থ ছিলেন না। পরাবিদ্যার বলে অমেক বিষয়ে অধিক বুদ্ধিতেন। পৃথিবী একটি বৃহৎ চুম্বক পাথর এবং সেই জন্যই পূর্ব নিয়মের বিপরীত কার্য করিলে নিদ্রার ব্যাঘাত ও ধাতুর বিকৃতি হওন সম্ভব।

দুই তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুদিগের মধ্যাহ্নে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিদ্রা বিধি। নিয়মিত সময় ভিন্ন যখন তখন কোলে দোলাইয়া ও গীত গাইয়া ঘুম পাড়ান সংপরামর্শ নহে। বিদেশস্থ বাঙ্গালীরা শিশুগণকে

নিম্নরূপ রাখিবার জন্ত, অথবা উৎপাত ও সামান্য পীড়া নিবারণোদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে আফিম ধরান। এ প্রথা যে কতদূর অত্যাচার ও অমঙ্গলকর, তাহা বলি যার না। সন্তান ও মাতার অস্বাস্থ্যকর বা অতিরিক্ত আহার হইতেই শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, এ বিধায়ে প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অনিদ্রার কারণ জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবা; যথা—মশা, মাছি, ছারপোকা, পীপিলিকা, শয্যার কুটা ধুলা সমস্ত দূর করা এবং পীড়া হইলে যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি। শিশুর নিদ্রার নিমিত্ত কোলে শয়নাবস্থায় দোলান বা নাচান, কান চাপড়ান, এবং এক ঘেয়ে হুয়ে “ঘুমপাড়ানি” প্রভৃতি অল্পপ্রাস বিশিষ্ট সংগীত করার প্রথা দেশে প্রচলিত। অধিক বা অগ্নাহার উভয়ই নিদ্রার ব্যাঘাতকারী। মাথা ঠাণ্ডা ও পায়ের পাতা গরম রাখা বিহিত। বড়দের মাথা গায়ে হাতবুলান বা টেপায় ঘুম আনে। উদ্ধৃষ্টিতে এক মনে কোন বিশেষ শব্দ কিছুক্ষণ উচ্চারণ করিতে থাকিলে (প্রণব ৫০০ বা সহস্রবার আবৃত্তি করায় আহার ঔষধ দুইই হয়) মনস্কামনা প্রায়ই সিদ্ধ হয়। মোট কথা উদ্বেগ ও ভাবনা শূন্য হইলেই নিদ্রা হইয়া থাকে।

দুই প্রহর রাত্রের পূর্বে ঘুম না হওয়া পক্ষে—আনুমিনা, কার্বো, নক্স, পল্‌স, ফস, রস্।

দুই প্রহর রাত্রের পর ঘুম না হওয়া পক্ষে—নক্স, আর্স, কফি, ক্যাপ্স, নাইট্‌ আ, সিলিসা, সেপি, হিপর।

অনিদ্রা সহ বিমন—ওপি, কফি, ক্যামো, পল্‌স্ ফস, বেল, লাকাসি, সিলিসা।

অনিদ্রা—কাওয়া পান জন্য—নক্স, ইপি, ককু, ক্যামো।

অনিদ্রা—চা পান জন্ত—কফি, চিন।

অনিদ্রা—যথোচিত ঘাম না হওন জন্ত—কাক্স, গ্রাফাইট, নাইট্‌ আ, সল্‌ফর, সিলিসা।

অনিদ্রা—অসহ্য গরম বোধ ও শয্যায় এগোড় ওগোড়—ভেরাট।

অনিদ্রা—পায়ের পাতা গরম জন্ত—লাকাসি, আর্স, পল্‌স, লাইক, সিকেল।

অনিদ্রা—পায়ের পাতা ঠাণ্ডা জন্ত—আম-কা, কার্বো, গ্রাফাইট, সল্ফর; বরফবৎ ঠাণ্ডা পক্ষে—নাইট্রী আ।

অনিদ্রা—পেট অত্যন্ত বেদনা জন্ত—আনা কার্ড।

—বাতিক বা স্নায়ুপ্রধান ধাতু পক্ষে—জেন্স, বেগ, হাইয়স।

—বহু দিন—প্লাস্ম।

—বুক চাপা রোগ জন্য—আকন, নক্স, পল্‌স।

—বুক বেদনা জন্ত—আকন।

—ভয় জন্ত—আস, চিন, পল্‌স, সল্ফর।

—চোরের ভয় জন্ত—আস, লাকাসি, সিলিসা।

—ভূতের ভয় জন্ত—আস, পল্‌স, সল্ফর।

—রক্ত গরম ও খস্‌খসে তাপ জন্য—কাষ্টিক, ব্রাই।

—রাত্রে, কিন্তু দিনে অধিক ঘুম—মার্ক।

—শরীর ঠাণ্ডা ও তৃষ্ণা জন্য—বোরাক্স।

—সারা রাত ও মাঝে মাঝে চমকান—মক্স।

—সদা প্রস্রাব বেগ জন্য—ডিজিট।

—দুই প্রহর রাত্রে পর—রেগানফিউলস।

—দুইটা রাত্রে পূর্বে—কামো, গ্রাফাইট।

—৪টা রাত্রে পূর্বে—কাষ্টিক।

•—স্বোরে অল্পকাল মাত্র নিদ্রা, কিন্তু উহা তৃপ্তিকর—ফোরিক আ।

•নিশ্চিত অবস্থায় সর্বদা চমকান বশতঃ—ভাল নিদ্রার ব্যাবাত—লেডস, হাইয়স।

আহারের ঞায় নিদ্রা সকলেরই আবশ্যক। ইহা দ্বারা আমরা সুস্থ ও সবল থাকি। শিশু ও প্রাচীন ব্যক্তিরা অধিক ঘুমার্ণ। স্তন্যপায়ীরা ১৮ ঘণ্টা; দুই হইতে ষোল বৎসরের বালকের ১৪ হইতে ১০ ঘণ্টা এবং যুবকের ৮ ঘণ্টা-কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলে যথেষ্ট হয়। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট মহান আলফ্রেড দিবারাত্রিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার এক ভাগ নিদ্রায়, এক ভাগ আহার ও বিষয় কার্যে এবং এক অংশ মন ও আত্মার উন্নতি জন্ত নিয়োজিত করিতেন। সর্ববিষয়ে এরূপ নিয়মে চলি স্নেহঃ। দুঃস্থ

ব্যক্তির অনেক সময় পেটের দায়ে ১০।১২ ঘণ্টা অপেক্ষাও শারীরিক পরিশ্রম করেন এবং আত্মোন্নতির কালটা হয়ত নেশায় কিংবা অলীল আমোদ বা ক্রীড়ায় কাটান—লেখা পড়া হইতে এক কালে বিমুখ থাকেন। ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ আট মাস ইয়াকিতে কাটাইয়া পরীক্ষার পূর্বে অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ১০।১২ ঘণ্টা পড়া শুনা করেন এবং ঘুম নিবারণ নিমিত্ত অনেকে চা বা তমাক ব্যবহারে বাধ্য হন। বুদ্ধিমানেরা সিদ্ধমনোরথ হন বটে, কিন্তু পশ্চাতে ইহার নিমিত্ত হয় তো শ্বিলক্ষণ রোগ ভোগ করেন। ইহার পরিবর্তে প্রত্যহ যথানিয়মে ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে সকল দিক বজায় থাকে। অনিদ্রা নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহারে উপকার দর্শে।

**আঁকন**—বিশেষ রক্ত প্রধান ধাতু পক্ষে। জ্বর বশতঃ অনিদ্রা। উদ্বিগ্নতা, ভয় ও দাঁত উঠা জন্ত ঘুম না হওয়া। মুজিত চক্ষু, কিন্তু ঘুম নাই এবং রোগী মাঝে মাঝে বলিতে থাকে আর আমি বাঁচিব না।

**আমত্ৰা গ্রীসা**—রাত্রিতে ঘুমের অভাব, কেন তাহা বুঝিতে না পারা।

**ইগ্নে**—শোক, বিরক্তি, মনোমালিন্য জন্ত অনিদ্রা। ঘুমন্ত সব শুনিতে পাওয়া।

**ওপি**—ভয় বা আতঙ্ক জন্য অনিদ্রা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাদৃশ্যিক্যতা। রাত্রে জাগরণ এবং ঘুমাইলে সর্ব শরীর বা অঙ্গবিশেষের উৎক্ষেপণ নিবন্ধন নিদ্রা ভঙ্গ, পরে শেষ রাত্রে স্বপ্নবিশিষ্ট অতৃপ্ত ঘুম ও বেলায় উঠা।

**কফি**—বাতিকের আধিক্য বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম হয় না; শিশু খেলাইতে থাকে, এমত স্থলে ২০৬ ক্রমের ঔষধ কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন। অতিরিক্ত আত্মাদ বা রাত জাগা জন্য ঘুমে ইচ্ছার অভাব। সবুজ চা ব্যবহার জন্য অনিদ্রা। ইহাতে ফল না দর্শিলে—**চিন** বিধি।

**কামো**—অনিদ্রা, মাথাধরা, অস্থিরতা, পেট ফাঁপা ও কামড়ান জন্ত কাম্লা, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ চিড়িক মারা বা চম্কে উঠা, গাত্র তাপ, একটা গাল অপর গাল অপেক্ষা অধিক লাল, ক্রোধন স্বভাব ও ঘুমাইলে হৃঃস্পন্দ দেখা। মাতার অধিক কাওয়া পান জন্য নিদ্রের ও স্তন্যপায়ীর অনিদ্রার উভয়কে বা কেবল মাত্র জননীকে এই ঔষধ দিবা।

এই ঔষধে ফল না দর্শিলে কক, বিশেষ যখন শরীর হালকা বা খালি খালি বোধ ।

চিন—কোন পীড়া সারিয়া চক্কলতা জন্ম ঘুম না হওয়া ।

জেলস—চক্ষুপাতা ভারি ও মুদিত, কিন্তু নিদ্রার অভাব, যদিই হয় তবে অতৃপ্তকর ও বিষয় কর্মের স্বপ্নবিশিষ্ট । চা বা কাওয়া ব্যবহার জন্ম অনিদ্রা ।

নক্স—কুওয়া ব্যবহার, আহারের ব্যতিক্রম, যথোচিত ব্যায়াম অভাব, অধিক মানসিক চিন্তা ইত্যাদি কারণে ঘুমের ব্যাঘাত । ৩৪ টা রাত্রে জাগ্রত হইয়া ২৩ ঘণ্টার পর ঘুমাইয়া পড়া, তাহার পর নিদ্রাভঙ্গে শরীরের বিলক্ষণ শ্রানি ।

পলস—অধিক বা গুরুতর কিছা তৈলাক্ত আহার বা চিন্তা জন্ম উদরাময় ও অনিদ্রা । প্রথম রাত্রে নিদ্রার অভাব, কিন্তু ভোরে ঘুম ।

ইপি—অধিক বা গুরু আহার জন্ম ঘুমের অভাব ।

মক্সস—স্বাভাবিক উত্তেজনা বা বাতিক বৃদ্ধি জন্ম ঘুমের ব্যাঘাত (হাইয়স) ।

বেল—কক্ষিত প্রতিকার না হইলে, অথবা মাইছাড়ান বশতঃ শিশুর অনিদ্রা, কিছা সে বিম্ব অথচ তাহার নিদ্রা হয় না, বা অল্প ঘুমের পর চমকিয়া উঠিয়া কাঁদে, পুনঃ পুনঃ নিশ্বল নিদ্রার ইচ্ছা, খেয়াল বা ভয় দেখা । সন্ধ্যা ও সকালে অনিদ্রা । মানসিক উত্তেজনা জন্ম ঘুম না হওয়া ।

রিয়স—পট কামড়ান, ছেকড়া ও অল্পগন্ধযুক্ত ভেদ এবং অনিদ্রা ।

লাইক—দিনে বিম্ব ও রাত্রে ঘুম না হওয়া ।

লাকাসি—শ্রান্তি, ভোরে স্বপ্নকল্প, বাতিক বৃদ্ধি এবং সমস্ত রাত্রি এপাশ ও পাশ করা, সর্বদা বিম্ব থাকে ।

ষ্টাকিস—সমস্ত দিন ঘুম ঘুম, সারারাত্রি জাগা, সর্বত্র কামড়ান ব্যথা ।

ট্রাম—অতৃপ্ত নিদ্রা, শয্যায় সর্পাদি থাকা বোধে চমকান ও ঘুমের ব্যাঘাত ।

সাইপ্রিপিডিয়ম—নিদ্রা না হওয়া বশতঃ বিলক্ষণ বলক্ষয় ।

স্টুটেলারিয়া—অনিদ্রা, ঘুম হইলে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

হাইয়স—বিম্ব, চমকান, কেবল মাত্র রাত্রে কাশী জন্ম অনিদ্রা ।

### শিশুদিগের রোগনির্ণয়।

হোমিওপেথি চিকিৎসায় ব্যাধি ও ঔষধের পরস্পরের লক্ষণের সৌসা-  
দৃশ্য থাকিলেই উপকার দেয়। এই মতাবলম্বী ভিষকেরা বহুবিধ ঔষধ স্বস্থ-  
শরীরে পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।  
রোগের সঙ্গে মিলাইয়া তাহা দিতে পারিলেই পীড়ার নাশ হয়। শিশুরা  
আপন আপন শরীরের অবস্থা বলিতে অক্ষম। এক মাত্র কান্না দ্বারা তাহা-  
দিগের অন্তরের সকল কষ্ট প্রকাশ করে। এই নিমিত্ত ইহাদিগের রোগ  
নির্ণয়ার্থ বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। নূতন চিকিৎসকের স্বয়ং নিম্নলিখিত  
বিষয় গুলি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

১. অত্যন্ত গাত্র-তাপে জ্বর জানায়। তরুণজরে গাত্র এককালে শীতল হয়  
না; হঠাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হওয়া কুলক্ষণ জানিবা। যথা হাম, পানবসন্ত  
রোগে গুটি বাহির হওন কালিন হিমাঙ্গ হইলে সাংঘাতিক হওয়া সম্ভব।

নাড়ী—এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত নাড়ী অসমান বহে। তৎপরে  
উহার স্পন্দনের সমতা হয়। অবস্থাদর্শীদিগের ইহা জানা আবশ্যক যে,  
নিদ্রিতাবস্থায় ও স্বায়ংকালে স্পন্দন কম হয়। কান্না, ভয়, উদ্বিগ্নতা ও আহা-  
রের এবং শ্রমের পর এবং প্রাতে নাড়ীর স্পন্দন ১০০ হইতে ১৩০ শেরও অধিক  
হইয়া থাকে। ঐশ্বরিক বা স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জ্বপিও সংকোচিত হওয়ায়  
তথাকার রক্ত ধমনী দ্বারা সর্ব শরীরে ব্যাপিয়া পড়ে। শিরা টিপিলেই দপ্  
দপ্ করে। এট স্পন্দনকেই নাড়ী কহে। উহার গতি দ্বারা দেহের স্বস্থতা  
অনুভব করা যায়। সচরাচর পুরুষের এক মিনিটে ৬৮ হইতে ৭৫, স্ত্রীলোকের  
৭৪ হইতে ৮৫, বালকের ৮০ এবং অদন্ত দুগ্ধপোষ্যের ১০০ হইতে ১২০ বার  
স্পন্দন হইয়া থাকে। পীড়ার উহার কম বেশী হইতে দেখা যায়। স্বাভা-  
বিক অপেক্ষা অধিক স্পন্দন সহ গাত্রতাপ ও দ্রুত শ্বাসে জ্বর এবং ১৪০ অপেক্ষা  
বেশী নাড়ী টিপ টিপ করিলে আভ্যন্তরিক প্রদাহ জানিবা। ৮০ বা আরো  
কম এবং ক্ষীণ ও অসম স্পন্দনে ভয়াবহ দুর্বলতা এবং নাড়ীর স্বতাবৎ  
স্থলতা ও অগণনীয় স্পন্দন আসন্ন মৃত্যু লক্ষণ বুঝিবা। রক্ত উর্দ্ধগ হইলে  
উহার গতি মৃদু হয় এবং সদা পরিবর্তনশীল হইলে স্নায়বিক বা বাতিকের

পীড়া, সবিরাম জ্বর বা হৃদ-রোগ বুঝায় । রোগ নির্ণয় জন্ত সাহেব ডাক্তরেরা নানা যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু নাড়ী পরীক্ষায় প্রাচীন বৈদ্যেরা অভূত্যা ।

**জিহ্বা**—সাদা লেপযুক্ত হইলে উদরের সামান্য বিশৃঙ্খলা ; জর্দা হইলে অম্ল ও যকৃৎ-প্রদাহ এবং পিত্তের অযথা সঞ্চার ; পুরু লেপযুক্ত ও মাঝে মাঝে লাল লাল কাঁটাল (Scarlet) আরক্ত জ্বর ; লাল এবং আগা গুফ ও লাল হইলে অস্ত্রের অতিরিক্ত উপদাহ ; মাঝে মাঝে লেপ হইলে পাকাশয়ের প্রদাহ ; চক্চকে ও ফাটা হইলে অস্ত্রে ক্ষত বা ঘা হওয়া বুঝায় । জিবে ও মাড়িতে ঘা হইলে উদরাময় ও অজীর্ণতা ; গুফ ও গাঢ় পাটলবর্ণ হইলে পিত্তশ্লেষ্মা-বিকার ; কাল, গুফ, ফাটা ও কম্পিত হইলে বিকার এবং পীড়াশবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দুধের ন্যায় সাদা ফুস্ফুড়ি ও জাড়ি ঘা যুক্ত হইলে পুঁতি জ্বর ; ঔদরিক (Gastric) জ্বরে জিব ফুলা, সাদালেপ যুক্ত ও কিনারা কাঁটাময় হয় ; এবং বন্ধ মাতালের জিহ্বা ছুঁচলা ও কম্পান্বিত হইয়া থাকে এবং পেটের বা দাঁতের পীড়াও বুঝায় ।

মুখের বদগন্ধ, চেতুর, পেট ফাঁপা ইত্যাদি উদরাময়ের চিহ্ন । শিশু বা মাতার অজীর্ণতা বা ঠাণ্ডী লাগার দ্রবণ সম্বন্ধে ঐ সব উপসর্গ দেখা দেয় ।

**ক্ষুধা**—বায়স-ক্ষুধা অর্থাৎ না চর্চন করিয়া, যা পায় কাকের ন্যায় কঁোত করিয়া গেলা । কুমি বা ক্রোম গ্রন্থীর পীড়ায় এইরূপ হইয়া থাকে । কুকুরবৎ ক্ষুধা বা বাগ্রতা সহ আহার করা, কিছুতেই ক্ষুধিবৃত্তি না হওয়া, অমেক সময় ইহা ফিতা কুমির লক্ষণ । \* অক্ষুধা ও অরুচি, পেটের পীড়া, জ্বর, নেবা, ( বিশেষ পুরাতন ) রোগে এবং হাম বসন্তাদির পূর্বাঙ্কে অথবা অতিরিক্ত ঔষধ সেবন হেতুতে প্রকাশ পায় ।

**পিপাসা**—প্রবল জ্বরে, পাকাশয় ও অস্ত্রের আমাশয়িক ঝিল্লির প্রদাহে, কখন বা উদরাময়ে, বিশেষতঃ ওলাউঠায় এবং বহুমূত্র রোগে অতিরিক্ত তৃষ্ণা হয় ।

**বমন**—আহারের পরই শিশুকে নাচান বা তোলাপাড়া করা বা শয্যায় গড়ান, দাঁত উঠা, কষিয়া কাপড় পরা, অধিক বা গুরু আহার



এবং খাদ্য মধ্যে পোকা মাকড় খাকা, ইত্যাদি বিধায়ে বমি হয়। প্রসূতির মনের উত্তেজনা কালে মাই দিলেই উহা প্রায় উঠিয়া পড়ে। হাম বসন্তের পূর্বাঙ্কে, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় অথবা পেটে কুমি থাকিলে বমি হইয়া থাকে। স্থগিত কাশের প্রতি দমকে বা ক্ষেপে বমন হইতে পারে। বমন ও বাহ্যে এক কালে বন্ধ হইলে অন্ত্রের পথ রোধ বা অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ বুঝায়। অধিক বা গুরু আহারের দরুণ দুধ তোলা ঢেঁকড়া ছেকুড়া হয়। এবং অল্প বমনে জীর্ণতা ও কিছু মাত্র রূপান্তর না হইয়া অবিকৃত দুধ বমনে পাক-শক্তির এককালে সম্পূর্ণ হীনতার পরিচয় দেয়।

পেট—উদরীঃ এবং প্রীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিতে পেট ডাগুয়া হয়। অধিক আহার, বিশেষতঃ শাক পাতাড় ও তৈল দ্রব্যাক্ত দ্রব্য আহার করিলে ও বর্ণায়াম রহিত হইলে পেট মোটা বা ভুঁড়ি হয়। আমাদের দেশে এরকম ভুঁড়ে লোকের বিশেষ আদর। ইহারা সামান্য শ্রমী নয়, ভাগ্যধর বড় মানুষ। অজীর্ণতায় পেট স্ফীত এবং বায়ু-পূরিত হইলে, ঘর্ষণে বিশেষ তেলে জলে মর্দনে সমতা হয়। অন্ত্রের প্রদাহ জন্ত পেট স্ফীত হইলে তথায় স্পর্শ করিলে লাগে। অরকালিন পেট ফুলা কুলক্ষণ; তৎকালে জ্বালাপ দিয়া বাহ্যে করানর চেষ্টা করা গর্হিত—অনেক সময় মন্দ ফল অতি শীঘ্রই দেখা যায়।

সুস্থাবস্থায় মল উজ্জল হরিদ্রা বর্ণ থাকে। ফাঁক্যাশে বা মেটে বর্ণের মল পিত্তের স্বল্পতা, কালবর্ণের মল পিত্তের আধিক্য বশতঃ হয়। শিশুর পাকাশয়ে অল্প হইলে সবুজ, পেট ফাঁপিলে উহা দীর্ঘ সবুজ হয়। এবং অন্ত্র প্রদাহে কিঞ্চিৎ আরক্ত স্বচ্ছ আম বেগ সহ ত্যাগ হয়। কখন তেদ কখন কোষ্ঠ কাঠিন্য, ক্রোম গ্রন্থির পীড়া হইতে উদ্ভব। এককালে কোষ্ঠবন্ধ ও বমন, অথবা শাক ছেঁচানির ত্রায় হইলে মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়ের (Hydrocephalus) পূর্ব লক্ষণ। অন্ত্রের যথা বিহিত শক্তির শিথিলতা জন্ত মল কঠিন হয়।

পাতলা পুনঃ পুনঃ ভেদ—ইহা আহারের ব্যতিক্রম, ঠাণ্ডা লাগা, দাত উঠা ও কুমি জন্ম হইয়া থাকে। সবুজ পাতলা বাহ্যে—অল্প ও পিত্তাধিক্য বশতঃ এবং সবুজ ও সাদা ভেদ—অজীর্ণতা ও পিত্ত জন্ত; মল ও আম—অল্প

শ্লেষ্মা বা সর্দি জন্ম ; চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায়—ওলাউঠার ভেদ ; গাঁজলাটে—অজীর্ণের ভেদ ; কদর্য গন্ধের জলবৎ ভেদ—পুরাতন জরে ; কাল বর্ণের ভেদ—উপরিস্থিত অন্ত্রমধ্যে রক্ত সঞ্চয় জন্ম ; মেটে বর্ণের ভেদ—পিত্তের যথোচিত ক্ষরণাভাবে ; পুনঃ পুনঃ বাহ্যে ও বেগ এবং আম ও রক্ত ত্যাগ—মলাশয়ের প্রদাহ বা আমরক্ত রোগে হয় ।

**কোষ্ঠবদ্ধ**—জর কালীন অস্ত্রের প্রদাহ, পিত্তের অথবা সঞ্চয়, অস্ত্রের দুর্বলতা বা অস্ত্রের পথরোধ ইত্যাদি কারণে প্রকাশ পায় ।

**প্রশ্রাব**—স্বভাবতঃ দ্রব্য লালচে ও কিঞ্চিৎ স্বাভাবিশিষ্ট প্রত্যাহ, সচরাচর পাঁচপোয়া ত্যাগ হয় । কিন্তু জরে মূত্র গাঢ় ও ডগ্‌ডগে লাল ; উদরাময়ে ও অধিক ঘর্ম্ম হইলে অল্প ও লাল ; স্নায়বিক বা বাতিকের পীড়ায় পরিমাণে অধিক ও স্বচ্ছ । কৃমি রোগে হৃদযৎ সাদা ও প্রচুর ; নেবায় মেহাগ্নি কোষ্ঠের বর্ণ বা গাঢ় হলুদে ; পিত্তের গোল হইলে কোন পাত্রে ধরিলে তলায় খাঁকরি পড়ে ; মূত্রাশয়ের পীড়ায় পরিমাণে অতিরিক্ত ; মূত্রস্থালি বা মূত্রনালীর প্রদাহে প্রশ্রাব বন্ধ বা অল্প মাত্রায় ফোটা ফোটা নির্গত, লাল ও গরম এবং তৎপ্রদেশ বেদনায়ুক্ত ; মূত্রস্থালির গ্রীবীর দুর্বলতা ও কৃমি জন্ম অনিচ্ছাধীন ( অসামান ) প্রশ্রাব ; এবং বাত রোগে প্রশ্রাব ধরিয়া থিতুলে লাল তলানিও পড়ে । জর কিছু দিনের হইলে প্রশ্রাব প্রচুর হইলে ও তাহারে তলানি পড়িলে সুলক্ষণ বুঝিবা ।

**নিঃশ্বাস**—স্বভাবতঃ নিত্রা বা বিরাম কালে, শিশু মিনিটে ২০ । ২৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে । বুক উঠা নামায় উহা গণনা করা যায় । ইহার বিপর্যয় হইলে রোগ জানিবা ।

দ্রুত নিঃশ্বাস, জর বা কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহে হয় । জরে মিনিটে ৪০।৫০ বার শ্বাস প্রশ্বাস ; ইহাপেক্ষা অধিক হইলে ভয়াবহ প্রদাহের চিহ্ন । জরের প্রথমে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস, হাম ও বসন্তের পূর্বে লক্ষণ । শ্বাস-থর্ব্বতা ও নাসিকার ঘন ঘন বিস্ফারণ ও চোপসান, বুকঃস্থলের প্রদাহ লক্ষণ এবং দুর্বল বা মন্দ মন্দ শ্বাসের পর হঠাৎ অসামান প্রশ্বাস হইলে, কুস্কুসে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে জানিবা । গরম নিঃশ্বাস, জর ও প্রদাহে ; ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস, রক্তের মুহু গতিতে এবং কোন যন্ত্রের জীবনী শক্তি বিনীশে ও চরমা-

বস্থায় ; ক্রুত ও ঘন শ্বাস, বেদনা জ্ঞাত অথবা প্লুরেসি বা অস্ত্রাবর্তন প্রদাহে ; ঘড়ঘড়ে নিঃশ্বাস, শ্বাস-নালীতে অধিক স্লেমা ও তথাকার প্রদাহে হয় । কেবল মাত্র বুকের পেশী দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নির্বাহ, পেটের প্রদাহে ; অসম ও নাক ডাকাইয়া নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কের চাপ বা অতিরিক্ত আক্ৰিম সেবনে হয় ; জর ভিন্ন সাঁই সাঁই কষ্টকর নিঃশ্বাস, হাঁপানি কালীতে ; কর্কশ, স্বরভঙ্গ ও শিথ দেওয়ার ন্যায় শব্দ-বিশিষ্ট শ্বাস, ক্রুপ বা ঘুঙুড়ী কালীতে ; কদর্যা গন্ধের শ্বাস—পেটের পীড়া, ক্রিমিরোগ ও জরের শেষাবস্থায় ; টক নিঃশ্বাস, পাকাশয়ে অল্প জ্ঞাত ; কষ্টকর নিঃশ্বাস অথবা শ্বাসের অভাব, অজীর্ণ জ্ঞাত ; শ্বাস খর্ব্ব এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও কষ্টকর, ইহা ফুস্ফুসে রক্ত বা উহার চতুর্দিকে জল সঞ্চার জ্ঞাত হইয়া থাকে ; প্রশ্বাসকালীন হিঙ্কা, অস্ত্রাবর্তন প্রদেশের কোন বস্তুর প্রদাহে দেখা দেয় ও পরেই ঐ বস্তুর পচা ধরিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে । রোগের শেষাবস্থায় নিঃশ্বাস শীতল ও দুর্গন্ধ হইলে সাংঘাতিক জানিবা ।

### দীর্ঘনিঃশ্বাস ।

মস্তিষ্কের পীড়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস, ফোস ফোস করা ও কান্না পক্ষে—ইথে ।  
অধিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ও গৌঁ গৌঁ করা এবং ঠোঁঠ ও নাক হাজা পক্ষে—  
আরম ট, মর আ ।

ঘুমন্ত ঘোঁত ঘোঁত করা—লাউক ।

শ্বাসনালীর প্রদাহকালীন দ্বিতীয় দিবসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ও বিলাপ  
পক্ষে—কুপ্রাম ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস, বিলাপ, ভয়ানক খেয়াল বা দৃষ্ট দেখা ও হাঁটু লটপট  
করা পক্ষে—পল্স ।

কান্না।

ক্রন্দনই শিশুর বল। উহা এক প্রকার তাহার বাক্য। উহা দ্বারাই সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে। অবিবেচক নব প্রহৃতী শিশু কঁাদিলেই মাই মুখে দিয়া শাস্ত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু শ্রবোধ প্রবীণারা শিশুর চেহারা দৃষ্টে রোদনের কারণ নিশ্চয় করেন, সুতরাং তদনুযায়ী কার্য দ্বারা তাহাকে যাতনা হইতে মুক্ত করেন। সন্তান উদ্বেগে পেটের দিকে পা তুলিলে, পেট কামড়ান; মুখে অঙ্গুলি কিংবা হাত পুরিলে বা মাই-বোঁটা কামড়াইলে, ঠাট উঠা; কান্নাশ্রিতে কান্নাশ্রিতে কান্নায় বকে বাথা। বুঝায়। কান লাল ও ফুলা এবং তথার হাত লইয়া গেলে ভয় পাওয়া ও কান্না, ইহা কান কামড়ান এবং তন্মধ্যে পুষের লক্ষণ। ভেদ হওয়া ও মাঝে মাঝে মলদ্বারে হাত দেওয়া এবং থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌ড়িয়া উঠা, ইহা ক্ষুদ্রে ক্রমির লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন কান্না, ঢেকুর, স্বর পরিবর্তন, নিদ্রা কম বেশী হওয়া, ঘুমন্ত চমকান ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া বিজ্ঞেরা যথোচিত ব্যবস্থা করেন। সহজেই কেহ শিশুর কান্না সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে সর্বদা ও দীর্ঘ চেক্‌ড়ানয় শিশুর মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয় এবং গেঁড় বা অস্ত্র বৃদ্ধি হওন সম্ভব। সে বিধায় কান্না নিবারণের উপায় চেষ্টা করা সর্বথা কর্তব্য। বহু পরীক্ষার পর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি শিশুর বিবিধ প্রকারের কান্না, চীৎকার ও চেক্‌ড়ান পক্ষে বিশেষ উপকারী বোধে অবধারিত হইয়াছে। সদৃশ ঔষধে ঔষতিকার হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে অধিক ব্যবহার্য গুলি বড় বড় অক্ষরে দেওয়া গেল।

আকন—অর, কান্না, অনিদ্রা। নিম্নত কান্না ও অস্থিরতা (ফুস্‌ফুস প্রদাহে)। দাঁত উঠা কালিন—খেলায় না; সর্বদা অস্থির থাকে; মাট, আঙ্গুল, ঝিঝুক বা চুপি কামড়ায়; ঘুম ভাঙ্গার পর কঁাদে; এ অবস্থা। প্রস্তাব বন্ধ এবং কান্না ও অস্থিরতা।

আণ্ট জু—শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিলে বা গাত্র স্পর্শ করিলে ভ্যাক করিয়া কঁাদিয়া ফেলা।

আপিস—হঠাৎ ও নিদ্রাকালিন চেক্‌ড়ান, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অধিক, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে কিছুই নহে, অধিকন্তু—জরে।

আর্গিকা—রাগ বশতঃ কান্না ও কাশী। কাশীকালিন এবং উহা আসি-  
বার আতঙ্কে কান্না।

আর্স—মাই খাওয়া বা আহারকালিন, বা তৎপরে কান্না।

আলুমি—বিনা কারণে হঠাৎ খানিক কান্না।

ইগ্রে—চীৎকার ও ঘুম ভাঙ্গা এবং সর্বশরীর কাঁপা।

ইথুসা—যেন পেট ব্যথার দরুণ কান্না ও সর্বদা জল চাওয়া।

ইপি—হাতের মুঠা মুখে দিয়া কান্না থামা, বদন পাকাস ও শরীর ঠাণ্ডা।

ওপি—আক্ষেপকালিন বা পূর্বে ক্রন্দন। চীৎকার, কাঁপুনি, হাত পায়  
চিড়িক মারা।

কফি—বিরক্তি বশতঃ হঠাৎ ঘুমভাঙ্গার দরুণ কান্না। সামান্য কারণে  
কান্না, আবার হঠাৎ হাসি এবং পুনরায় ক্রন্দন।

কলসি—পেটব্যথা জন্ত শরীর দোমড়ান ও কান্না, পেট চাপায় স্বস্তি।

কল্চি—( আমরক্তে ) মলাশয়ে ও মলহারের যাতনা নিমিত্ত কান্না।

কামো—( বিশেষ ১২ ক্রমের ) কোলে করিয়া বেড়াইলে শান্ত হয়,  
শোয়াইয়া দিলেই কান্না ধরে ; অথবা পেট ফাঁপা ও কামড়ান, সাদা সজাটে  
ভেদ, কান্না, অনিদ্রা, দড়্কা।

কান্দুর—কান্না ও কোলে লুকান—সব বিষয় কুভাবে লওয়া ও বিরক্তি  
প্রকাশ।

কান্কা—যতই সাহনার চেষ্টা কর ততই কান্না বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী ক্রন্দন।

কালী—ঘুমন্ত কান্না ও এগোড় ওগোড় করা।

কুপ্রম—ভীত চেক্‌ডান, চীৎকারকালিন দম আটকান সহ পেটব্যথা ও  
আক্ষেপ।

জিঙ্ক—খাকিয়া খাকিয়া কান্না, অচেতন, কাষ্ঠবৎ শক্ত বিশেষ।  
(Scarlatina) আরক্ত জ্বরে। মস্তিষ্কের সীড়ায় ঘুমন্ত বা ঘুম ভাঙ্গার পর  
চেক্‌ডান, লাকান ও মাথা ঘন্ড়ান।

জোলোপা—কান্না, অনিদ্রা ও অতিশয় পেট কামড়ান, কিন্তু এক  
কালে বাহ্যের অভাব বা রক্তমিশ্রিত মল ত্যাগ। সারারাত অস্থিরতা ও কান্না  
এবং সমস্ত দিবস ভাল থাক।

ডঙ্কা—কামো সদৃশ লক্ষণ, বিশেষ কঁফাংশ ধাতু পক্ষে ; দাঁত উঠিবার সময়, চক্ষু উঠা থাকিলে এবং বাতনাজ্বর বাহ্যল্য ক্রন্দন ।

নক্স—পেটে বায়ু সঞ্চয়, পেটবাথা দরুণ পা উপর দিকে তোলা বা অশুকোষ শিট্‌কুনি, কোষ্ঠবদ্ধ ও দম্‌কা কান্না ।

পড—দাঁত কিড়্‌মিড় ও কান্না ।

পল্‌স—জ্বরিত্ত বা গুরুপাক খাদ্য আহার বশতঃ পেটফাঁপা, বাথা, ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা ও কান্না ; সর্বদা বিলাপ ও নিয়ত কান্না ।

বেল—বিশেষ কারণ, অভাব, অথচ বায়না ধরিয়া সদাই কঁাদা, ও অনিদ্রা ; অথবা এক দমে দীর্ঘ ক্রন্দন । সামান্য দ্রব্য না দিলে চেক্‌ড়ান, মিষ্ট কথায় আরো চটিয়া উঠা, চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত বা সংকোচিত হওয়া ও ঘুমন্ত চমকান । হঠাৎ কঁাদিয়া উঠা আশ্চর্য হঠাৎ শান্ত হওয়া, যেন কিছুই হয় নাই । মস্তিকে রক্ত সঞ্চয় ও প্রচণ্ড দড়্‌কা (এমত স্থলে আকন ও ব্যবহার্য) ।

বোরাক্স—মাই ধরে না ও কান্না, ঘুমন্ত চমকান, একপুঁয়ে । নিদ্র হইতে উচ্চ স্থানে যথা, দোলায় লইয়া গেলে, যেন পড়িয়া বাইকার আতঙ্কে শিশু নিকটস্থ বস্তু জড়াইয়া ধরে ।

ব্রাই—জরকালিন নড়া চড়ায় কান্না ও হাত মাথার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া বা বালিসে মাথা গোঁজ্‌ড়ান ।

রিয়ম—অনিদ্রা, পেট কামড়ান জ্বর চিংকার, কৌতুপাড়া কিন্তু বাহ্যে না হওয়া বা টক ও ধূসর বর্ণের মল পরিত্যাগ এবং উহা ত্যাগে বাতনার সমতা না হওয়া ।

লাইক—প্রস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে চিংকার এবং ত্যাগে বাতনা যাওয়া ।

ষ্টানম—পেট বাথা জ্বর কান্না, স্বল্পে শিশুকে শোয়াইলে বা তাহার পেট চাপিলে স্থিতি বোধ ও শান্ত হওয়া ।

ষ্ট্রাম—দিন রাত কান্না সহ ছপিং কাশী । যেন কোন ভয়ঙ্কর পদার্থ সম্মুখে আছে, সেই জ্বর আতঙ্ক ।

স্কল্‌কার—হিঁচকান্না, রাগে অধিক এবং অস্থিরতা ও কাশী । অকারণে চিংকার—কিছুতে থামে না, মাথা ঘন্‌ড়ান, ঠাণ্ডা স্থানে যাওয়ায় কষ্টের লাঘব ও স্থিরতা ।

সিকুটা—কান্না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেড়াবৈকা হওয়া।

সিনা—ঘুমন্ত চেকড়ান। হাত ধরিয়া বেড়ানয় অতিশয় কান্না।

সিলিসা—শিশু সহ কথা কহিলেই তাহার কাঁদিয়া ফেলা।

কষ্ট হইলে শিশু কাঁদে। ক্ষুধা, দীর্ঘকাল এক পেশে থাকা, অধিক বস্ত্রে আবরণ জন্ত শরীর গরম হওয়া, শয্যার মল মূত্র বা কাঁকর থাকা, শিশুগণিক, মশা, মাছি ও ছারপোকা কামড়ান, এই সকল সর্বাগ্রে দেখা ও তাহার প্রতিবিধান করা উচিত। মাতার রোগ বশতঃ সন্তানের পীড়ার প্রসূতীকে ঔষধ ও স্নপথ্য এবং যত্নগা জন্ত শিশু অধিক ক্রন্দন করিলে তাহাকেও ঐ ভেবজ দিবা।

### ঔষধ সেবনের প্রণালী।

স্তন্যপায়ী শিশুরা অনেক সময় মাতার পীড়ায় পীড়িত হয়। কেবল জননীকে যথা বিহিত ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিলে, সন্তান অনেক সময় নিরাময় হইয়া থাকে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে উভয়কেই এক ঔষধ দিবা। সর্ক প্রথম রোগের কারণ, যথা, অপরিমিত আহার, হিম লাগা, জলে ভেজা, আঘাত লাগা, রাত্রি জাগরণ, তন্দ্র, শোকাদি মনের সমতানাসক অবস্থা প্রাপ্তি, ইত্যাদি কোন্ কারণে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে সত্ববান হইবা, তৎপরে উপসর্গ সমুদায় অমুখাবন করিবা এবং সর্বশেষে ঔষধ অধিকাংশ লক্ষণে মিলে তাহাই ব্যবস্থা করিবা। রোগ সন্ধান-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ঔষধে প্রতিকার না হইলে, নিশ্চয়ই জানিবা যে, সন্তান খাত্ত বিকৃত হওয়াই ইহার মূল কারণ; তত স্থলে খাত্ত প্রকৃতিহীন (anti-psoric) ঔষধ ছই এক মাত্রা দিবা। তৎপরে সন্ধান-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ আরোগ করিলে রোগ দেখিতে পাইবা। পুরাতন বা দীর্ঘকালস্থায়ী রোগেই এরূপ করিতে হয়; তরুণ বয়সেই প্রায়ই উহার আবশ্যক হয় না। চিকিৎসক রোগীর সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থা নিজে পরীক্ষা করিষেন। শিশু যখন বাহিরে বাহা দেখিবার, তাহা দেখিরা, মাতার মুখে সমস্ত সুনিরা, মরকার মতে তাঁহাকে পুনর্বার বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করা বিধেয়। কিন্তু সকল সময়ে

মাতার সকল কথাই পূর্ণ বিশ্বাস করা বুদ্ধিযুক্ত নহে। স্নেহ বশতঃ অপত্যকে শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় দেখিবার আশঙ্কায় মাতা হয় তো ভিলকে ভাল করেন, ভাবেন যে বাহ্যিক বর্ণনে আরও ভাল ঔষধই দিবেক। কোথাও বা ইহার বিপরীত ঘটে; পাছে ঠিক ঠিক বলিলে সন্তানের ও নিজের দ্বান আহ্বারের কটকেনা ঘটে, এই আশঙ্কায় অনেক মাতা কোন কোন উপসর্গ ঢাকিয়া রাখেন। এই সকল জননীর “লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যার” এই প্রাচীন বচনটা শিরোধার্য। এই কারণে হয় তো নিজ নিজ সন্তানকে কুপথ্য দিতে কিছু করেন না। এই উভয় সঙ্কটাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত ইহাদের বাক্য গ্রহণ করেন। অধিক বয়স্ক রোগী নিজে সব বলিতে পারে, স্ততরাং সে স্থলে বিশেষ সুরিধা। কিন্তু এ চিকিৎসার স্রোগ নির্ণয় অনেক সময় লাগে। নাদী টিপিয়া, “জিব দেখাও এবং ঝাড়া কেয়াসা”, ২১৩ প্রশ্ন করিয়া কাগজ কলম লইয়া ঝাড়া করিয়া প্রেসক্রিপসন লিখিয়া দর্শনীটা সংগ্রহ করিয়া পীঠটান দেওয়া হোমিওপেথিতে চলে না। পীড়িতের নিকট কখন কখন দীর্ঘকাল বসি আবশ্যক। লক্ষণসকল বিশেষরূপে দেখিতে হয়। খানিক বসিয়া দেখা উচিত যে, এক পাঙ্গরম্ব অপর পা ঠাণ্ডা কি না, বা অঙ্গসকল কিয়দংশে উষ্ণ, কিংকিংশ শীতল কি না, ইত্যাদি। শরীরাপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট পদার্থ এবং মনের বিশৃঙ্খলাই অনেক ব্যাধির মূল কারণ, সেই নিমিত্ত মনোবৃত্তি স্থানিমান ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে। রাগ ঘেষ ভয় হিংসাতে কষ্ট অনিষ্টই করে এবং ইহাদের হইতে কত উৎকট ব্যাধি, অধিক কি, আত্মহত্যা পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। কত শাস্ত প্রকৃতির লোক রোগে উগ্র স্বভাববিশিষ্ট এবং কত রাগী লোক রোগে মাটির মাছুষ হইয়া পড়ে। মনের অবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবা। সাহেবগণের অমুকরণ করিয়া রোগ সম্বন্ধে ভিধি নক্ষত্র বার, এক কালে অগ্রাহ্য করা সুস্বাধীন কার্য্য নহে। সংস্যাতি জলচরের ভাৱ আমরাও যে অমাবস্তা ও পূর্ণিমার বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হই, এ কথা আত্মযানিক বা কাল্পনিক নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। পীড়িতের ধর্ম, বরংক্রম, জাতি, বাসস্থান, ব্যবস্থা, আহার, পরিধান, ব্যবহার, ধাতু, স্বভাব—পরে পীড়ার কারণ, উপস্থিত উপদ্রব, অঙ্গ



কোন মতের ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে কি না, এ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া যথাবিহিত তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ মিলাইয়া দিবা। এরূপ করিতে প্রথম প্রথম অনেক সময় যার যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে অধিক কল ও ক্রমে বহু-দর্শন জন্মে। ইহার বাঁধা গত নাই। ডাক্তারেরা যাহা বুঝেন করুন, কিন্তু বিষয়ী চিকিৎসকের পক্ষে যথাবৎ স্বভাবের অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে অধিকতর কৃতকার্য হইবেন এবং অসিদ্ধ হইলেও ঋনঃ-ক্ষোভ হইবে না। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা গল্প এ স্থলে উল্লেখ করি। তাঁহার পরমাত্মীয় সুবিক্ত, তেজস্বী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ এবং উদার-স্বভাব জর্জনক বাঙ্গালি ডাক্তার হৃদয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশেষ যত্ন সহ দেখিতেন। আপনার অর্থের বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার এবং রাত্রি জাগরণ করিয়াও পীড়িতের কাছ ছাড়া হইতেন না। কখনও কখনও তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। এবং সেইরূপ ঘটিলে বাসায় আসিয়া ডাক্তারী পুস্তক ওলট পালট করিয়া যদি কোন অংশে আপন কিঞ্চিৎ ভ্রম অনুভব করিতেন, তাহা হইলে বালকের ভায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া এমত অনিশ্চিত ব্যবসা ও জহাদ-বৃত্তি আর অবলম্বন করিবেন না স্থির করিয়া, ঘরে নির্জনে থাকিতেন। পরে পেটের দায়ে এবং জহাদগণের উত্তেজনা ও অনুরোধে পুনর্বার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আলোপ্যাথরা এক স্কাফি অনেক গুলি ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহার অধিকাংশ কম বেশী বিধাক্ত। তবে বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে উহাদের বিশেষ ফল দেখা যায়। কিন্তু অল্পকালে রোগ-নির্গম সহজ ব্যাপার নহে। শত জনের মধ্যে দুই জনকে ঐরূপ ক্ষমতাবান দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক ভেষজ না পড়িলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিলক্ষণ অপকার সম্ভাবনা। এমত স্থলে অভ্যাস দ্রুপ মুদাকরাসের ভায় কঠিন হৃদয় ব্যক্তি ভিন্ন কোন দয়াজ্ঞ চিন্তা এ ব্যবসা অবলম্বন করিবেন ? কিন্তু মহাত্মা হানিমান তাঁহার অভিনব মতের আবিষ্কার করিয়া কি মহৎ কার্যই সাধিয়াছেন। রোগের উপসর্গের ভায় সুস্থদেহে পরীক্ষিত ভেষজের সদৃশ-লক্ষণ থাকিলে তাহা ব্যবহারে নিরাময় হয়, ইহা স্বভাবের একটা নিয়ম। এ মতের চিকিৎসকের রোগ নিরূপণের বিশেষ আবশ্যকতার অভাব। বাতনাগুলি অতি নিকরোধেও বুঝিতে সক্ষম। সদৃশ-

লক্ষণযুক্ত কোনও একটা ঔষধ দেও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সকল কষ্টের মুক্তি হইবে, তোমার আর কি চাই?° বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার নিজের স্বায় হোমিওপ্যাথ হইতেন, স্ততরাং তাহার আত্মাদের আর সীমা থাকিত না ।

কোন কোন ঔষধের পরস্পর লক্ষণের এত নৈকট্য দেখা যায় যে, তাহা-দিগের বাছন্নি করিয়া প্রয়োগ করা সহজ ব্যাপার নহে । বিশেষ নূতন চিকিৎসকের এমত স্থলে ভারি গোলমাল লাগে । বিজ্ঞেরা বহু দর্শনের পর ঔষধ বিশেষের হই একটা গুণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বারা প্রায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত ভেদকে অনায়াসে পৃথক করিতে সক্ষম হন । যেরূপ যমজ ভাই ভগ্নী মধ্যে অবয়বের তাদৃশ বিভিন্নতা থাকে না ; কিন্তু টেরা, নাক লম্বা, কপালে আঁচিল, বর্ষ কটা প্রভৃতি বাহ্যিক চেহারা ; অথবা রাগী, কুরুট, শান্ত, প্রভৃতি মানসিক গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা আমরা সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া জানি ; এবং কেবল সেই গুণটা মাত্র উল্লেখ করিলেই এক এক জনকে চিনিতে পারি ; ঔষধ সম্বন্ধে তদ্রূপ জানিবাণ যত দূর পারিয়াছি এই প্রবন্ধে ঔষধ সকলের বিশেষ গুণ সর্বোপায়ে উল্লেখ করিয়াছি ; তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ভেদজ প্রয়োগ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি ।

অল্প অল্প চিকিৎসা প্রণালীতে ৪।৫ রকম ঔষধ একত্র করিয়া রোগীকে খাওয়ান হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথেরা সচরাচর এক সময়ে একটির অধিক রোগনাশক জব্য ব্যবহার করেন না । নিতান্ত আবশ্যক হইলে কখন কখন দুইটা ভেদজ ইহার ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু একত্রিত উদরস্থ হইলে পাছে অন্তরে ইহাদের গুণাত্তর হয়, এই আশঙ্কায় ঔষধদ্বয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে রাখা হয়, কোন ক্রমে একত্র মিশান হয় না, পরে ব্যবহারসারে অল্প বা দীর্ঘকাল অন্তর একটীর পর অপরটা দেওয়া হয় । অতঃপর যেখানে “পর পর দিবে” বলা যাইবে, সেখানে উপরিউক্ত ভাব বুঝিতে হইবে ।

হোমিওপেথিক ভেদজ স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রস্তুত হয় । এ চিকিৎসায় আদ্যত ধাতু বা উদ্ভিজ্জ প্রায়ই ব্যবহার হয় না । কোন ঔষধের কণামাত্র লইয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ছুধের চিনি প্রভৃতি নিস্তেজ অবিস

পদার্থ সহ দীর্ঘকাল মর্দন ও ঘর্ষণ করিলে ইহাদিগের প্রথম ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়। আবার উহার অনুমাত্র লইয়া পূর্বমত হৃথের চিনি সহ মাড়িলে দ্বিতীয় ক্রমের হয়। এইরূপ সহস্রাধিক ক্রমের ঔষধ আছে। বৈদ্যদিগের পোরের জ্ঞান ইহাদিগের ক্রমের বতই আধিক্য হয়, ততই জড়পদার্থের নূনতা ও বিবাক্ত-শক্তি-হ্রাসতা হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে রোগ নাশ করিবার শক্তিও বাড়ে। সকল ক্রমের ঔষধই ব্যবহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের ভিন্ন ভিন্ন গুণ; অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারিলে দফলগুলিতেই উপকার দর্শে। মজ্জাগত, স্নায়ু সঙ্কীর্ণ এবং পুরাতন পীড়ায় উচ্চ ও মধ্যম ক্রমের ঔষধ দেওয়া বিধি। তরুণ রোগে ও শিশু পক্ষে নিম্ন ক্রমের সচরাচর প্রয়োগ হয়। এক হইতে ২২ ক্রমকে নিরুষ্ট, ৩০ হইতে ১৯৯ মধ্যবিত এবং ২০০ ও তদুর্দ্ধ হইলে উচ্চ ক্রমের কহে। শিশু ও বালক পক্ষে সচরাচর গাছ, গাছড়া ৬ ক্রম এবং ধাতু ১২ বা ৩০ ক্রমের দেওয়া বিধি। এই পুস্তকের বথায় ক্রমের উল্লেখ না থাকিলেও, তথায় উল্লিখিত ক্রমের ঔষধ বুঝিয়া লইবা।

অম্বটিকা, বটিকা, গুঁড়া ও আরক, সচরাচর এই কয় প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। শিশুদিগকে এককালে এক অম্বটিকা দিলে বথেষ্ট হয়। আরকের এক বৃন্দ বা ফোটা বয়ঃক্রমাত্মসারে ৩ হইতে ৬ মাত্রা করিবা। সামান্যতঃ ছয়টা অম্বটিকা বা ২টা বটিকা বা ৩ ধান গুঁড়া বা এক ফোটা আরকে ৬ ঝিহুক বা পলা পরিষ্কার জল দিয়া কাচের বা পাথরের বাটীতে খানিক রাখিয়া, পরে তাহা ঝিহুক দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া এক ঝিহুক মাত্র এক একবারে খাওয়াইবা। গুঁড়া কিংওক অম্বটিকা দেওয়া আবশ্যক হইলে কোন ক্রমে হস্তের দ্বারা উহা লম্বা করিবা না; পরিষ্কার কাগজে করিয়া মুখে দিবা। চোয়ান জল সর্বাঙ্গেকা উৎকৃষ্ট, তৎপরে সিদ্ধ জল, নিদান পক্ষে পরিষ্কার জলে ঔষধ ফেলিবা। বস্ত্রের ঔষধ গলাধঃকরণের উপায় নাই, তথায় ঔষধের শিপিং ছিপি খুলিয়া বা তুলার আরক ফেলিয়া নাসিকারন্ধ্রে মধ্যে মধ্যে ২-৩ বার একেও ধরিলে উপকার দর্শে। অথবা ঐ গুঁড়া, বড়ি বা আরকের জল, জিব চোটে বগল প্রভৃতি কোমল স্থানে ঘর্ষণ বা মালিস করিবা। ঔষধ জলে ফেলিলে

শীতকালে ৩ দিবস, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ৪৮ ঘণ্টার অধিক রাখা উচিত নহে । ইহার অতিরিক্ত কালে গুণের বিকৃতি হওন সম্ভব ।

### ঔষধ সেবনের নিয়ম ।

একটা ঔষধে প্রতিকারীনা হইলে অপর একটা দেওয়া বিধি । পুরাতন রোগে সপ্তাহ, অন্ততঃ ৩৪ দিবস, ঔষধের ফল প্রতীক্ষা করা কর্তব্য । যে সমস্ত নব বা তরুণ ব্যক্তি আত্মসংহারক নহে, যাহার উপসর্গ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হয় না, তাহাতে একটা যোগ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবা । এই কাল মধ্যে কিছু মাত্র অবস্থার অন্তর না হইলে, অর্থাৎ হাস বা বৃদ্ধি, কিছুই হইতেছে না বৃদ্ধিলে, উহার পরিবর্তে অল্প ঔষধ দিবা ; বা প্রথম ভেষজ তখনও রোগের উপসর্গ সদৃশ থাকিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় ঔষধের উভয়কে পর পর ব্যবহার করিবা । কিন্তু ভয়াবহ অসহ-বয়্রণাদায়ক সাংঘাতিক, ক্রম-পরিবর্তনশীল উপসর্গবিশিষ্ট গীড়া সম্বন্ধে ঔষধ পরিবর্তনের কোন নিয়ম থাকে না । ঘন ঘন তিন চারিবার খাওয়াইয়া কোন ফল দেখিতে না পাইলে, লক্ষণ সদৃশ অপর কোন ঔষধ দিবা, তাহাও পূর্বমত ব্যবহারে নিষ্ফল হইলে, অল্প ভেষজ ব্যবহার করিতে সংশয় করিবা না । এই সমস্ত সাধারণ নিয়ম ; স্থান ও অবস্থা বিশেষে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় ।

পুরাতন রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার, বড় জোর দুই বার, ঔষধ দেওয়া বিধি ; তাহাও প্রত্যহ দেওয়া আবশ্যক নহে । দুই তিন দিবস এইরূপ দিয়া তিন চারি দিবস বন্ধ রাখিবা, পরে বিবেচনা মতে ঐ বা অপর কোন ঔষধ দিবা ; হোমিওপেথিক বটিকা ও অম্লবটিকা ময়দা ও হৃদয়ের চিনি দিয়া প্রস্তুত হয় ; উহাতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আরক মাখাইলেই উহার ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ হয় । চিকিৎসকের নিকট কতকগুলি ঔষধ-অমিশ্রিত বটিকা রাখা উচিত । যখন ঔষধের প্রয়োজনাত্যাব, অথচ রোগী বা তাঁহার আত্মীয়-গণ ঔষধের প্রয়োজনাত্যাব শুনিলে অসন্তুষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের তৃপ্তি জন্য শুদ্ধ সাধা ঔষধ-অমিশ্রিত বটিকা দেওয়া বিধেয় । একমাত্র উপযুক্ত

ঔষধ খাইয়া বহুদিবসের রোগ এককালে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। আবার পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডলীয় বাতিকের পীড়া এবং স্নায়ু-প্রধান \* বাতুলে, উপযুক্ত উপায় এক সপ্তাহ ঔষধ সেবনে ভয়ানক তিরোহিত হইয়া অপর ভয়াবহ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, চিকিৎসকের এটা সর্বদা মনে রাখা অতীব কর্তব্য। সাংঘাতিক বা কঠোর পীড়ার বতকণ না যন্ত্রণার সমতা হয়, ঘন ঘন ঔষধ দেওয়া বিধি। আবশ্যক হইলে এক, অর্ধ বা সিকি ঘণ্টা; কখন কখন দুই, পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। সামান্যতঃ তরুণরোগে দিনে তিন চারি বার মাত্র খাইতে দিবা। এই প্রবন্ধে যথায় কোন বিশেষ উল্লেখ নাই, তথায় এই নিয়মেই ঔষধ খাওয়াইবা। নব প্রসূতদিগের সচরাচর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে এক মাত্রা দিলে যথেষ্ট হয়, তবে তেমন প্রয়োজনে অধিক বার দেওয়া যাইতে পারে।

অভুক্ত অবস্থাই ঔষধ খাইবার উত্তম কাল; ঔষধ খাওয়াইয়া খানিক ক্ষণ কিছু খাইতে না দেওয়া পরামর্শ। যথায় তিন চারি বার ঔষধ খাওয়াইতে হয়, আহ্বারের দেড় বা দুই ঘণ্টা পরে দিবা। নক্সভমিকা প্রাতে, ও ইয়েসা অপরাহ্নে দেওয়া অবিধি। তবে নিতান্ত প্রয়োজন পক্ষে কোন নিয়মই খাটে না। কটু ভ্রাগবিশিষ্ট জব্য নিকটে রাখিবে না। পাথর বা কাচের বাটীতে ঔষধ রাখিবা। আমাদিগের সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, হোমিওপেথিক চিকিৎসায় ঔষধ নির্ণয় করাই কঠিন কার্য। স্থির চিন্তে রোগের উপসর্গ সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগে যে ব্যক্তি সক্ষম, তিনিই অধিকতর কৃতকার্য হন। ইহাতে অধিক বিদ্যা, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই, কেবল মনোনিবেশ, যত্ন, শ্রম ও একাগ্রতা থাকিলেই ফল লাভ হয়।

এক ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের ভিন্ন ভিন্ন গুণ সর্বদাই দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন সুবিজ্ঞ হোমিওপেথিক চিকিৎসকের বিশ্বাস যে, যে কোন ক্রমের ভেদজ হউক না কেন, রোগসাদৃশ্য হইলেই তাহাতে উপকার দর্শিবে। হানিমান সচরাচর ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিতে কহেন।

\* নাড়ী ক্ষুদ্র, হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক এবং বেগবতী, ইঞ্জির লক্ষণ অতি ভীষণ এবং সানাত কারণে উহাদিগের উদ্দীপকতা জন্মে, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্টকে স্নায়ু-প্রধান বা বাতিকের বাতুল কহে।

### নাই পচা ।

ভাল রূপ কাটা না হওয়ারই দরুণ নাই পচিয়া তথা হইতে পুষ পড়ে এবং দীর্ঘকাল ঐরূপ থাকিলে দড়কা হইতে পারে । কর্তৃ-পক্ষেরা নারিকেল তৈল গরম করিয়া ঐ স্থানে লাগান । ঔষধ প্রথম প্রথম নম্র, তাহাতে না সারিলে তেরাট পেটের পীড়া থাকিলে কামো ; পুষ পড়িলে সলফর এবং সস্তাহ মধ্যে উহাতে না সারিলে সিলিসা ।

### বুক সাঁই সাঁই করা ।

কোন কোন সদ্য প্রসূতের বুক বা খাস-নালীতে স্লেয়া জমিয়া গলা সাঁই সাঁই করে । খাসভাগের বা চিংকার করিয়া কাঁদিবার সময় কখন কখন ঐ স্লেয়া বাহির হইয়া পড়ে । ক'ড়ে আঙ্গুল বা নেকড়া দিয়া উহা মুছাইয়া লইবা । কখন কখন প্রথম শোচ পর্য্যন্ত ইহা অবস্থিতি করে । ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল থাকিলে ঔষধ দেওয়া কর্তব্য । প্রথমতঃ এক মাত্রা এক অম্লবাটিকা উপেক্ষাকুরানা দিবা । ৬৮ ঘণ্টা মধ্যে কোন প্রতিকার না বুঝিলে এক মাত্রা মার্কুরিয়স্ দিবা ।

### সিয়নোসিস বা নীলরোগ ।

ভূমিষ্ট হইবার কিছুদিন পরে কোন কোন শিশুর মুখ হাত পা, বিশেষতঃ অঙ্গুলী ও নখের অগ্রভাগ নীল বর্ণ হয় । শ্বসনপান বা ক্রন্দন কালীন উহার আধিক্য লক্ষ্য্য রাবা । স্বাভাবিক অপেক্ষা গাত্র-তাপের ন্যূনতা, নিঃশ্বাস-রুট ও নিঃশব্দ হওয়া, পীড়ার অপর লক্ষণ । এরূপ অবস্থায় সামান্যতঃ ডিজিটেলিস দেওয়া বিধি । তিন দিবস প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া দিয়া, পরে চারি দিন বিরাম আবশ্যক ; পরে পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবা । হৃৎপিণ্ডের গঠন-বিকৃতি বলতঃ হইলে আরোগ্য হওয়া দুঃস্থ । এই রোগগ্রস্ত হইলে অল্পকাল সময় শৈশবকালে মৃত্যু হয় । বিশেষ সাবধানে থাকিলে কেহ কেহ বৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । রোগ পুরাতন পক্ষে এবং লক্ষণাভ্যাসী হইলে তরুণ অবস্থায়ও নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার্য্য ।

আকনাইট। গাত্র-তাপ, জ্বর, অস্থিরতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে।  
 আর্গিকা। নাক মুখ দিরা রক্ত পড়িলে ও হতাশ অবস্থায়।  
 আর্সনিক। অত্যন্ত হুর্দল, ক্লেশ, ঠাণ্ডা ঘর্ম এবং অল্প মাত্র প্রমে উপ-  
 সর্গের আধিক্য।

কাকারিয়া। কফজ ধাতু, বিস্তৃত ব্রক্ষরস এবং মস্তকে অধিক ঘর্ম।  
 কার্বোভেজিটেব্লিস। ঘাড়ের শিরা স্পষ্ট নীলবর্ণের লক্ষিত হইলে।  
 ডিজিটেলিস। নড়িতে চড়িতে গেলে মুর্ছা; বমন; চক্ষের পাতা,  
 ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ নীলবর্ণের; নাড়ী অসম স্পন্দন।

লাকুসিস। নিদ্রার পর নিঃশ্বাসের কষ্ট ও বর্ণের গাঢ়তা বাড়ে, অঙ্গ-  
 স্পন্দন মাত্রেই লাগে। গাত্রে কালচে দাগ।

লারোসিরেসস্। একটুকু মাত্র প্রমে হাঁস ফাঁস করে, বর্ণের গাঢ়তা  
 হয়, হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক বিকৃতি জন্ম যোগী স্থির হইয়া শরন করিয়া থাকিলে  
 কিঞ্চিৎ ভাল থাকে।\*

ফস্ফরস। রোগের সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্টাধিক্য ও পা ফুলা।

সিকেল। শীর্ণ ভোবড়ান চর্ম, জ্বর-বিশিষ্ট নাড়ী, সর্বদা কান্না, পেশীর  
 আক্লেপ।

চায়না। গাত্র ঠাণ্ডা, পাল্লাস বর্ণ, হুর্দল, শিশুর চরমাবস্থার।

এতদ্বিন্ন ওপি, কাম্ফর, কুপ্রম, সলফর প্রযুক্ত্য।

### মাথা ফুলা।

সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর উহার মাথা কন্ন বেগী ফুলিয়া থাকে।  
 অনেক স্থলে ইহা আপুনা হইতেই সারে, কিন্তু কখন কখন ঔষধ প্রয়োগ  
 আবশ্যক।

আর্গিকা। এক অম্লবটিকা জিহ্বায় দিবা, অথবা এক বিহুক জলে  
 ভিজাইয়া আস্তে আস্তে ও সাবধানে ধোয়াইবা। ফুলাটা অধিক ও বিস্তৃত  
 হইলে ইহার আদিত আরকের (Mother Tincture) ছয় ফোটা লইয়া  
 দুই বিহুক জলে ফেলিয়া, ঐ জল দিয়া ক্ষীত স্থান ধোত করিবা। প্রয়ো-  
 জন হইলে ১২ ঘণ্টা পরে পুনরায় ধুইবা।

ভূমিট হওয়ার পর মস্তকের অস্থি সমস্ত সংমিলিত হয় না। নব-প্রসূতদিগের অসংমিলিত স্থান দৃশ্য দৃশ্য করিতে দেখা যায়। সামান্য ভাবার ঐ স্থানকে ব্রঙ্কারক বা ব্রঙ্কতালু কহে। মস্তকোপরি সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে এইরূপ এক একটি রন্ধু আছে।

যথা সময়ে ক্রমশঃ ঐ রন্ধু পুরিয়া শক্ত অর্থাৎ অস্থি দ্বারা আবৃত হইতে না থাকিলে, সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা কাঙ্কারিয়া ছইবার দেওয়া বিধি; তাহাতে বিশেষ ফল লক্ষ্য না হইলে সিলিসা ও সল্ফার সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা করিয়া পর পর দিবা।

রস্ট্রা। ব্রঙ্কতালু অধিক ফুলিলে, অথবা পূর্ব ঔষধে প্রতিকার না হইলে পূর্ব মত এক অনুবটিকা।

## বুকে ঘুঁটি উঠা।

প্রায় শিশু মাজেরই মাইয়ের বোঁটা সাদা ছধের দ্বারা রসে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া থাকে। টিপিয়া ইহা হইতে রস বা ভাত বাহির করা অনুচিত। কন্যাসন্তানের ওরূপ রস বাহির করায় বয়স্কা হইলে উহার স্তন প্রকাশ না হওয়া সম্ভব—কাজেই ইহাতে শ্রীহীনা হয় ও নিজ সন্তানকে মাই দিতে পারে না।

ইহা স্থানিক প্রদাহ মাত্র; এবং তদুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহার সমতার বৃত্তবান হইবা। লক্ষণানুযায়ী নিম্নলিখিত ঔষধগুলি এই রোগে ব্যবহার্য।

বুক কবিরি বাঁধিবীর দক্ষণ ঘুঁটি হইলে আর্গিকা; বুক লালে কামো; ইহাতে ফুলা না কমিলে ব্রাই ও বেল পর পর; পাকিলে হিপার ও মার্ক এবং ফাটিলে সিলিসা। বুক গরম জলে ধরাইবা। তথা গরম গরম ঘৃত (বা শূকরের চর্কির) পটি লাগাইবা।

আকনাইট। মাইয়ের বোঁটার প্রদাহ ও উহার সঙ্গে অধিক জর থাকিলে।

আর্গিকা। ঘুঁটিটা মাত্র শক্ত ও লাল।



বেলেডোনা । ঘুঁটা ও উহার চতুর্দ্বার্ষ আওরান ।

ব্রাইওনিয়া । ঘুঁটা অতিশয় শক্ত, গরম ও ফেঁকাশে লালবর্ণের ; মাঝে মাঝে শীত ।

কানোমিলা । ঘুঁটা শক্ত কিন্তু লাল নয়, বৃক ছুঁইতে দেয় না, খ্যাতি-থোঁতে, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে শান্ত থাকে ।

পূর্বোক্ত ঔষধগুলি যথাযোগ্যরূপে খাওয়াইয়া ও যদি বসিন্দা না যায় এবং পাকিবার মত হয়, তবে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর স্নজ্জীর পুলটাস ঐ স্থানে লাগাইবা এবং হিপারসল্ফার খাইতে দিবা । হিপরের এক বিশেষ গুণ আছে, ফোটকাদি বসাইতে হইলে ঘন ঘন, অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিন চারি বার এবং পাকাইতে হইলে দীর্ঘকাল অন্তর ( দিনে একবার ) দেওয়া বিধি । নিম্ন ক্রমের ঔষধে পাকায়, উচ্চ ক্রমে বসায় ।

সল্ফার । পাকিয়া পুষ নির্গত হওয়ার পর ক্ষত আরোগ্য নিমিত্ত । যা অনেক দিন না শুকাইলে এবং তজ্জন্য জ্বর বা নালি হইলে সিলিসা অথবা মাকু'রিয়স বা কস্ফরস্ দেওয়া বিধি । (জ্বর ও নালি যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখ)

কাক্কারিয়া । কফজ ধাতু\* ও বিস্তৃত ব্রক্ষরক্ক-বিশিষ্ট শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ খাটে । ঘুঁটা শক্ত কিন্তু লাল নয় ।

সিলিসা—ঘুঁটা শক্ত থাকিলে অথবা কাটিয়া গেলে ।

## চক্ষু উঠা ও চক্ষুর প্রদাহ ।

ভূমিষ্ট হওয়ার ঘণ্টা কতক পর হইতে ছয় সপ্তাহ কাল মধ্যে শিশুর এই রোগ হইবার সম্ভাবনা ।

সেঁৎসেঁতে ও আর্দ্র গৃহে বাস ; ঠাণ্ডা বাতাস ও হিম লাগা ; চক্ষু অধিক আলোক, ধূম বা ধূলা লাগা ; বস্ত্রাদি দ্বারা মুখমণ্ডল অধিক গরম রাখা ; মাতার স্নেহ প্রদর অথবা জনক জননীর গরমির পীড়া বা ধাতু-বিকৃতি

\* নাড়ী ক্ষীণ, রক্তের গতি বন্ধ, হস্ত পদাদি শীতল, চর্ম ফিকা, নাড়ীর শক্তি ও ক্রিয়া অভাবতঃ স্বপ্ন, ছলকাহ, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইলে, কক, স্নেহ বা স্নেহ-প্রদান গাছ কহে ।

বশতঃ সন্তানের এই রোগ হয় । কখন কখন ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে ।

প্রথমে, চক্ষুর উপরের পাতার কিনারা লাল হয়, শিশু আলোক সহ্য করিতে পারে না, কেবল অন্ধকারে চক্ষু মেলে । ক্রমে নীচের পাতায় রোগ ধরে । চক্ষের কোণ দিয়া জল পড়িতে থাকে এবং পাতা ফোলে ও জোড়া লাগে । তৎপরে পাতার ভিতরের দিকের সর্বোপরি আবর্তন ফুলিয়া অত্যন্ত লাল হয় । তথা হইতে জলের দ্বারা রস নির্গত হইলে, চক্ষু নষ্ট হওয়া সম্ভব । কিন্তু তাহা না হইয়া তথা হইতে আপনা আপনি রক্ত নির্গত হইলে প্রদাহ কমিয়া যায় । ক্রমশঃ রস গাঢ়, জর্দা এবং অবশেষে শুধা হইতে পুষ্টি নির্গত হয় । ইহার সঙ্গে চক্ষুর প্রদাহ হইলে অরু, টাটান ও সাংকালে রোগের বৃদ্ধি হয় ; ক্রমশঃ তারকে ক্ষত, পুতুলিকা সঙ্কোচিত এবং অল্প অল্প বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয় । রোগ-বৃদ্ধির অবস্থায় শিশু সর্বদা অস্থির থাকে ও ক্রন্দন করে, তাহার ক্ষুধা ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং সে ক্রমশঃই দুর্বল ও ক্লান্ত হইতে থাকে । পীড়া কঠিন হইয়া পড়িলে বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী দ্বারা চিকিৎসা করান আবশ্যক । সপ্তাহ হইতে এক মাস কাল পর্য্যন্ত এই রোগ অবস্থান করে ।

মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ ২।৪ ফোটা প্রত্যহ ৩।৪ বার চক্ষে দিবা, অথবা শুভ্র সূক্ষ্ম নেকড়া অল্প উষ্ণ দুধ ও জলে ভিজাইয়া তদ্বারা পাতা মুছাইয়া লইবা । ঐ বস্ত্র যেন দ্বিতীয় বার ব্যবহৃত না হয় । চক্ষে অধিক আলোক বা দম্কা বাতাস যাহাতে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবা ।

## চক্ষু-প্রদাহ ।

আকন—ঠাণ্ডা বাতাস, অধিক আলোক লাগা বা ধূলাদি অপর পদার্থ চক্ষে পড়া বশতঃ চক্ষু বা ইহার পাতার প্রদাহ ; অরু, অস্থিরতা, অনিদ্রা, প্রচুর জল ঝরা, গোলক লাল হওয়া, ব্যথা ; পাতা শক্ত হওয়া, ফুলা, লাল হওয়া ও শেঁটে থাকা ; প্রাতে বৃদ্ধি হওয়া ।

আপিস—প্রদাহের উত্তম ঔষধ । হাম বসন্তাদি ফোটক' রে, অত্যন্ত

আলোকে দেব, প্রচুর জল খরা, চক্ষু মধ্যে কালশিরা পড়া এবং দপদপানি, ব্যথা, বেঁদা । জোরে বাতাস লাগা ও রাত্রে বাতনা বৃদ্ধি এবং তাপের সমতা । পুরাতন রোগে রাত্রে পাতা জোড়া লাগা, অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে সর্ব প্রথম ইহা ব্যবহার্য্য, পরে আবশ্যক মতে নাইট্রী-আ, সল্ফার বিধি । যথায় জনক জননীৰ ধাতু বিকৃতিই সন্তানের রোগের মূল কারণ, তথায় অপরাপর লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া প্রবল শক্তগা নিবারণ করিবা । কিন্তু রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত সপ্তাহ অন্তর সল্ফার ও কাকা পর দিবা । আরোগ্য হইলেই ঔষধ বন্ধ ।

### হিকা ।

স্তন পান করাইলে বা অল্প উষ্ণ চিনি বা মিছরির পান্য থাইতে দিলে, এবং বাতাস লাগার দরুণ হইলে গাত্রাবরণে, সামান্যরূপ হিকার নিবারণ হয় ।

অবস্থান্তে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিকায় ব্যবহার্য্য ।

( পেটে ) অস্ত্র করার পর হিকা—হাইয়স ।

আহারকালিন হিকা—ইউজিনা, কালী-কা, নেটুন, মাগ্ন-মি, সাঙ্খুকা ।

আহারের পর—টগে, কার্বো-আ, মার্ক, লাইক, সাইক্রে, হাইয়স ।

আহারের পূর্ব—নক্স, ফস ।

আক্ষেপযুক্ত হিকা—নক্স, বেল, ষ্ট্রাম ।

উদগার ও হিকা পর পর হওয়া—ডক্স ও সেপি ।

পানের পর হিকা—টগে, আর্স, পল্‌স, লিকাসি ।

গরম পানের পর হিকা—ষ্ট্রাম, ভেরাট ।

পূর্বাহ্নে—বারাইটা, মার্ক ।

প্রাতে তমাক টানায়—ভেরাট ।

প্রচণ্ড হিকা—নক্স, বেল ।

বৈকালে—আম-কা, কাস্‌ ।

রাত্রে হিকা ও মুখ বেতার—আর্স ।

রাত্রে হিকা ও ঘুমন্ত—পলস ।

সন্ধ্যায় হিকা—উথুসা, কফি । দীর্ঘস্থায়ী হইলে—সল্ফর, সার্সা ।

সন্ধ্যায় হিকা, প্রচণ্ড উল্কারের পর—রস ।

শয্যা হইতে উঠায় হিকা, পরে ঢেকুর তোলা—মাগ্ন-কা ।

স্তন দিবার পর—টিউক্রীম, গ্যারম ।

আমিল-না—হিকায় বেশ খাটে ।

আর্স—পালা জ্বরে ঝুঁকা নির্দ্ধারিত সময়ে জ্বর না আসিয়া তৎকালে হিকা হইতে থাকে ।

ইথর—আক্ষেপ যুক্ত ঝায়বিক হিকার ব্রক্ষ-অন্ত্র ।

ইপি—হিকা ও নিয়ত গা বমি বমি ।

কার্বো—প্রতি শৌচকালিন হিকা ।

নক্স—হিকা ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য—অথবা কোষ্ঠ-বদ্ধ দ্রুণ হিকা । বিশেষ কারণ ভিন্ন পুনঃ পুনঃ হিকা ।

পলস—নিদ্রাকালিন ও পানের পর রাত্রে অধিক হিকা, কখন কখন দম আটকান-প্রায় হওয়া ।

ফস্—আহারের পর ও তজ্জন্ত পেটব্যথা ।

বেল—হিকার কষ্টে বদন ও চক্ষু আরক্তিম হওয়া ও কান্না । ইহার ধমকে উঠিয়া বসা, অথবা রাত্রে হিকা ও ঘাম, কিম্বা হিকার সহ দড়কা ও তাহার পরই গা বমি বমি । ইহার পর দীর্ঘকাল ভাল শুনিতে না পাওয়া ।

মক্স—আক্ষেপযুক্ত ঝায়বিক হিকা, বিশেষ ( হিষ্টিরিয়া ) বায়ু রোগ-গ্রস্তের পক্ষে ।

ষ্টাফিসিগ্রিয়া—হিকা, গা বমি বমি ও অঘোর থাকা ।

সল্ফর—হিকা ও আল্জিব সম্মিহিত স্থানের বেদনা ।

হাইয়স—হিকার পর অল্প প্রত্যঙ্গ চিড়িক মারা ও কম্পন ।

ওলাউঠার পর হিকায় ব্রক্ষতালুতে লবণের সেক প্রয়োগ করায় আশু ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । প্রকৃত মেস্মেরিজ্মে অনেক স্থলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা ।

## বমন ও দুধ তোলা ।

অতিরিক্ত বা গুরুপাক ও অযথা আহার করা, পেটে অগ্নি হওয়া, ঠাণ্ডী লাগা, দস্ত উঠা, শিরঃপীড়া এবং ভয় রাগাদি প্রভৃতি কারণে শিশুর বমন হয় । মাতার বা স্তনদাত্রী ধাত্রীর রোগ হইলে স্তন্যপায়ীরা দুধ তুলে । মস্তিষ্ক, পাকাশয়, বক্ৰ, প্লীহা, মূত্রাশয়, জরায়ু ও অন্ত্রের প্রদাহ এবং জরাদির ইহা আত্মবজিক । দুর্বলতা, কৃমি, গর্ভসঞ্চার, শকট বা নৌকারোহণ এবং অত্যন্ত কদর্যা ও দুর্গন্ধ পদার্থ অবলোকনে বা উহার স্বাণে অনেকে আহার তুলিয়া ফেলে ।

বমন—অতিরিক্ত আহার বা পানে—আম্‌ট, ইপি, নক্স, পল্‌স ।

কাল্‌চে বর্ণের—আর্স, ভেরাট, চিন, প্রথম, ফস, সিকেল ।

কৃমি, অথবা কৃমি জন্ম—ইপি, ফেরম, সিনা, সিকুটা, সিলিস ।

গাঁজলাটে—ভেরাট ।

জলবৎ—কাষ্টিক, কুপ্রম, ব্রাই, ভেরাট, সল্‌ফর ।

জর্দা বর্ণের—আর্স, ভেরাট ।

টক—কাক্স, নক্স, সল্‌ফর, হিপার । ( কামো ও ফস মুখে টক গন্ধে ) ।

দুধ—আইড, ইপি, ইথুসা, কাক্স, নক্স, ব্রাই, লাইক, সল্‌ফর, সিনা, সিলিস ।

দুর্গন্ধ ( অত্যন্ত )—সেপি, ওপি, কাক্স, নক্স ।

পানীয় পদার্থ—আর্স, ফস ।

পানের পর—আর্স, ইউপাট, ভেরাট, আকন, ইপি, পল্‌স, ব্রাই, সিলিস ।

পিত্ত—আর্স, ইউপাট, ইপি, কামো, চিন, ডায়োক্স, নক্স, পড, পল্‌স, ব্রাই, ভেরাট ।

পেটের পীড়া জন্ম—নক্স, পল্‌স, ব্রাই ।

প্রচণ্ড—আর্স, এক্সলস, কুপ্রম, নক্স, ভেরাট, ভেরাট-ভি ।

প্রচুঃ—ইপি ।

প্রাতে—আর্স, ডিজিট, ড্রোস, নক্স, লাইক ।

বিবক্তি জন্ত—কাসো ।

ভয় জন্ত—আকন, ওপি ।

ভুক্ত পদার্থ—আর্স, নক্স, পল্‌স, ফেরম, ব্রাই, ভেরাট, লাকাসি, হাইয়স ।

মল—ওপি, নক্স, প্লম্বম ।

মস্তকে আঘাত জন্ত—আর্গিকা ।

মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্ত—বেল, লাকাসি ।

রক্ত—আর্গিকা, ইপি, ফস ।

রাত্রে—আর্স, চিন, টার্ট, নক্স, পল্‌স, ফস, ফেরম, সিলিসা ।

লোন্তা—পল্‌স ।

শোক, মনস্তাপ, অপমান জন্ত—ইগ্নে, ফস, আ ।

শ্লেষ্মা—ইপি, পল্‌স, আকন, ইগ্নে, এস্কুলস, নক্স, সল্‌ফর ।

সবুজ শ্লেষ্মা—ভেরাট ।

হিংসা জন্ত—হাইয়স, ইগ্নে ।

## গা বমি বমি ও কাট নেকার ।

গা বমি বমি—আর্স, ইপি, কাষ্টিক, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, ভেরাট, সল্‌ফর ।

গা বমি বমি—আহার কালিন—কাষ্টিক, নক্স, পল্‌স, ফেরম, বেল ।

আহারের পর—নক্স, নেট্রম, পল্‌স, আর্স, ফস, রস, সল্‌ফর ।

পানের পর—পল্‌স ।

প্রাতে—গ্রাফাইট, নক্স, সিলিসা, আর্গিকা, ফস, সল্‌ফর ।

রাত্রে—কার্বো-আ, পল্‌স ।

সহ ক্ষুধা—ফস, ভেলিরিয়ান, হেল ।

কাট নেকার—ক্রিয়োস, ইপি, নক্স, পলস, ভেরাট, বেল, চিন, ব্রাই ।

নিম্নে কতকগুলি ব্যবহার্য ঔষধের উল্লেখ করা হইল—যেটা অধিক লক্ষণ যুক্ত হইবে, তাহারই ব্যবহারে অধিক ফল আশা করা যায় ।

আইরিস—গা বমি বমি ও টক জলীয় পদার্থ বমন, সর্বদা শরীরে টক গন্ধ, পিত্ত বমন ও পাকাশয় জ্বালা, বমন ও পিত্ত ভেদ, নেতিয়া পড়া, অস্ত্রে বেদনা, কাট নেকার এবং কতকটা বায়ু মাত্রাভেদে উদ্ভারিত হওয়া ।

আকন—তিক্ত বমন সহ ঠাণ্ডা ঘাম । পিত্ত ও প্লেগ্মা, বা রক্ত ও প্লেগ্মা মুখ দিয়া উঠা সহ অত্যন্ত তৃষ্ণা । সবুজ জ্বর, বমন ও ভেদ; টক ও দুর্গন্ধ বমন এবং ঐ সঙ্গে জ্বর ।

আর্ট-ক্লু—গা বমি বমি, কাট নেকার, প্রচণ্ড প্লেগ্মা ও পিত্ত বমন, কিছুতেই থামে না; আহার করায় আবাস বমন হওয়া ।

আর্ট-টার্ট—ক্রমাগত গা বমি বমি, কাট নেকার জন্তু কপালে ঘাম; অধিক প্লেগ্মা বমন ( ইপি ) ।

আপো-মরফিয়া—মস্তিষ্কের পীড়া জন্তু বমন ( গ্লোমিন ) । থাকিয়া থাকিয়া গা বমি বমি, বিশেষ আহারের পর ( ইপি ) ।

আপিস—পাকাশয় প্রদাহে বমন ।

আর্গিকা—মাথায় আঘাত জন্তু বমন, জমাট রক্ত উঠা এবং আহার ও পানে পুনঃ পুনঃ বমন ।

আর্স—জলীয় পদার্থ ও আহার-দ্রব্য বমন । বরফ জল বা কুন্নি অধিক ব্যবহারে বমন । পেট ফাঁকা, গা বমি বমি ও বমন । বমন, ভেদ, পাকাশয় ও গলা জ্বালা এবং হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা । জল পান মাত্রেই বমন, বিশেষ রাত্রে ও প্রাতে বমন, অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প অল্প মাত্র পানে সক্ষম হওয়া । বমন করিয়াই নেতিয়া পড়া ও ঐ সঙ্গে ভেদ ও অম্মাহারীর পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড বমনবেগ, অথচ অতি কষ্টে অল্প মাত্রাহ কখন, অথবা বমনের পূর্বে বা পরে আদ্যকপালে মাথাধরা, মুখ চোপান । রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণের পিত্ত বমন । পাকাশয়ে ক্ষত থাকা জন্তু বমন পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

আর্সনেট-কপর—ক্রুর রোগ এবং অন্ত্র ঔষধে ফল না দর্শিলে । গা বমি বমি আরম্ভ হইলে, ইহার এক মাত্রা দিবা ।

ইউপাট—সবিরাম জরের শীতের পর কষ্টকর বমন ।

ইথুসা—হৃৎ পান মাত্রেই রূপান্তর না হইয়া অমনি উঠা । অথবা পানের ১০।১৫ মিনিট পরে অতিবেগে ছেক্ড়া ছেক্ড়া সবুজ বমন ; পর-ক্ষণেই নিদ্রা এবং ঘুম ভাঙ্গিলে ক্ষুধা ; শিশু দিন দিন ক্ষীণ ও হ্রস্বল হয় । ঢোকা হৃৎপায়ীদের একরূপ পীড়া অধিক দেখা যায় । বাহাদের গোহৃৎখে দ্বেষ, তাহাদের এই ঔষধ সেবনে সে ভাব ণ্যওয়ার সম্ভাবনা । বিশেষ দাঁত উঠা কালিন, বদন পাক্সাশ, মাড়ি ব্যথা, টাটান ও চক্ষুর চতুর্দিকে কালশিরা । ভেদ, বমন, দড়্কা, ফ্যাল ফ্যালে দৃষ্টি ; চক্ষু পুত্তলির বিস্তৃতি ; অচেতন থাকা । এই ঔষধ আট সদৃশ, তবে তাহার লক্ষণের ঞ্চায় ইহার লক্ষণ জিব হৃৎখে সাদা নয় ।

ইপি—সর্বদা গা বমি বমি ও বমন ; কাশীর পর ও টক খাইলে বমন ; বমনে অধিক শ্লেষ্মা উঠা ; সবজাটে বা কাল্চে বমন ; মাথা নত করায় বমন ; অধিক বা গুরু আহার কিম্বা হিম লাগা দরুণ রোগ । মাই খেলেই তুলিয়া ফেলা ; অথবা অনেক ঘণ্টা পরে হৃৎ উঠিয়া পড়া ; ঢোকা হৃৎপায়ীদের রোগ ।

কাডমিয়ম-স—গা বমি বমি, জর্দাটে বা কাল্চে বমন, শোস্তা ও পচা গন্ধের উদগার, পাকায় জ্বালা ও কনকন করা এবং তলপেট কামড়ান ।

কামো—মুখের তিক্ত তার, তিক্ত বমন । বমন ও ভেদ, বা দড়্কা ও জর, পেট ব্যথা ।

কালী-বাই—গর্ভবতীর গা বমি বমি, তিক্ত বা টক বমন, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি । শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন ।

কাঙ্কা-কা—হৃৎ নয় না—পান মাত্রেই দই হইয়া উঠা, অথবা থানা থানা হৃৎ বাহ্যে । রাক্সবৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা সন্ধ্যায় অধিক ও তৎকালে ভেদ । টক ও ভুক্ত পদার্থ বমন, অস্ত্র ফুলা ও শক্ত হওয়া । অতিশয় হ্রস্বল ( উচ্চ ক্রমের ঔষধ ) ; ডিম খাইবার বড় ইচ্ছা ।

কুপ্রম—সদত হিকা, সমস্ত বৈকাল ও রাত্রে প্রবল বেগে হৃৎ তোলা ।

কোনাই—বাই ভাজু গুঁড়ার ঞ্চায় বমন ।

ক্রিয়োস—শিশুর দাঁত উঠা ও বামার গর্ভকালিন বমন । আহার মাত্র বা ঘণ্টা কয়েক পরে উহা তুলিয়া ফেলা । এক লাগাড়ে বমন । পুরাতন



রোগ। অজীর্ণতা ভিন্ন অল্প কারণ বশতঃ পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ক্রমাগত কাট নেকার।

চিন—বমন ও পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত অম্ল হওয়া; কখন কখন প্রচুর ভেদ। পুঁতি জরে অধিক পিত্ত উঠা। বমি বন্ধের পর অধিক দুর্বলতা পক্ষে উপকারী।

জাটোফা—গা বমি বমি, প্রচণ্ড বমন ও ভেদ, গলা ও পাকায় জ্বালা এবং রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া। অধিক পরিমাণে ডিম্বের শাদা অংশের স্থায় জলবৎ পদার্থ উঠা, শরীর ঠাণ্ডা ও ঘর্মাক্ত এবং পায়ের বেতের খাল লাগা।

জিহ্ব—পুরাতন রোগে, ভুক্তদ্রব্য হঠাৎ বমন এবং রোগীর দিন দিন শীর্ণ হওয়া।

ডিজিট—দিন রাত বমন, বিশেষ প্রাতে। মস্তিষ্ক পীড়া জন্ত ভয়ানক গা বমি বমি ও বমন। অতিরিক্ত ও সবুজ পিত্ত বমন, কিছুতেই থামে না ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল, তৎসহ ঠাণ্ডা ঘাম।

নক্স—আহারের অনিয়ম, কার্যিক শ্রম অভাব ও মানসিক অতিরিক্ত পরিশ্রম। মাতার মাদক সেবন জন্ত পীড়া। টক, দুর্গন্ধ ও সবুজ বা তিক্ত বমন। পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়, কোষ্ঠ বদ্ধ ও অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ বাহ্যে বা বৃহদাকৃতি মল ও তাহা কষ্টে তাগ। গা বমি বমি, আহার ও পানে ঘৃণা। ভয়ানক কাট নেকার। চক্ষুর উপর প্রদেশ বেদনা—প্রাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ রাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া; বড় চটা।

পল্‌স—গা বমি বমি, তিক্ত ও টক বমন, প্রাতে মুখ দিয়া জল উঠা, শ্লেষ্মা বমন, অত্যল্প ভিন্ন এককালে অধিক আহারে পেট ফাঁপা ও ব্যথা, মাথাঘোরা, কখন বা মুচ্ছা—ইহাতে না সারিলে ককু। গাড়ি চড়িয়া বা জাহাজ আরোহণে পেট আড়ুমাড়ু ও জল বমন করা পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ফেরম—কঠিন দ্রব্য (জলীয় নয়) আহার করিলেই তুলিয়া ফেলা ও বদন লাল হওয়া। দুই প্রহর রাজে কাশীতে কাশীতে বমন।

বিস্মথ—পুরাতন পাকায়ের উপদাহ সহ বেদনা ও জিব লাল হওয়া। পুনঃ পুনঃ বিনা ক্রেশে পিত্ত-বমন, গা-বমি-বমি ও উদগার, গলা জ্বালা ও ভেদ।

বেল—অতি কষ্টে অত্যন্ত বমন । পিত্ত ও প্লেগ্মা, বা কখন জলবৎ টক বমন, পরে হয়ত নিদ্রা ।

ব্রাই—হৃৎ তোগা সম্বন্ধে ইহার আস সদৃশ লক্ষণ, এই মাত্র বিশেষ—ব্রাইয়ের বমনে অধিক জল ও প্লেগ্মা থাকে । আহ্বারের পরক্ষণই তুলিয়া ফেলা, সেই সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং ঠোঁঠ শুষ্ক হওয়া ও ফাটা । টক বমন এবং তিক্ত ও টক উদগার ।

ভেরাট-আ—প্রচণ্ড বেগে খাদ্য এবং টক ও সবুজ গাঁজলাটে প্লেগ্মা বমন । পুনঃ পুনঃ গা বমি বমি ও বম্ব, বদন রক্তহীন হওয়া এবং ঠাণ্ডা ঘাম, বিশেষ ক্ಷণে । অত্যন্ত পানে বা নড়া চড়ায় গা বমি বমি ও বমন ; পিত্ত বমন, মাথা ব্যথা, অধিক জলবৎ প্রস্রাব এবং কখন কখন মুচ্ছা ।

ভেরাট-ভি—একটুকু আহ্বার মাঝেই তুলিয়া ফেলা, পাকাশয় ব্যথা ও হড় হড় কুরিয়া তেজে হৃৎ উঠা, ইহার পূর্বে গা বমি বমি না থাকা ।

মার্ক—হৃৎ তোগা । গা বমি বমি ও তিক্ত বমন সহ মুখ আসা । বমি, পেট দম্ভমে ফুলা এবং মাথা যেন শক্ত রূপে বাঁধা থাকার বোধ হওয়া ।

লাকাসি—পিত্ত বম্বপ্লেগ্মা বমন । রক্ত উঠা ।

সল্ফর—টক বমন ; পুরাতন রোগে ইহার উচ্চ ক্রমের প্রয়োগে অধিক ফল দেখা যায় । অথবা ধাতু বিকৃতি জন্ত কোন ঔষধ কাজ করিতেছে না, তখন । এক সপ্তাহ পরে কাক্স সাত দিন—কিছুকাল বিরাম—পুনর্বার ঐরূপ বা ঐপর লক্ষণাক্রান্ত ভেষজ । কেহ কেহ প্রাতে সল্ফর, বৈকালে কাক্স দেন ; ৩।৪ দিন বিরাম দিয়া, পরে আবশ্যক বুঝিলে পুনর্মত পুনর্বার প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।

সিকেল—টক বমন ও কদর্য উদগার ।

হিপার—অনেক কাট নেকার, পরে পিত্ত বমন এবং প্রাতে অধিক । অল্প মতের চিকিৎসায় অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ খাটে । আহ্বারের পর একটু আদর্শ ছেঁকড়া হৃৎ তোলা ; বিশেষ কোন পীড়ার চিহ্ন নহে, অথচ রূপাঙ্কর না ইইয়া সহজ হৃৎ উঠিলে পাকাশয়ের কোন যান্ত্রিক রোগ বুঝায় ।

বমনের পরই হৃৎ খাওয়ান নিরোধের কন্ম, ইহাতে কেবল বাতনার

বৃদ্ধি হয় মাত্র । খাইলেই তুলে, এমত স্থলে ১০।১৫ মিনিট অন্তর ১০।২০ ফোটা করিয়া দুধ দিলে মাত্রার স্বল্পতা বশতঃ কখন কখন উগা পেটে থাকে । বয়োধিকের পক্ষে জলীয় পদার্থ না তলাইলে, সিদ্ধ গুড় মাংস ( কাবাব ) ব্যবহারে বিশেষ ফল হয় ।

পুৰাতন রোগে পথোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবা । অনেক উৎকট রোগে ইহাতেই জীবিত রাখে ও যাতনা অনেক পরিমাণে লাঘব করে ।

বমি নিবারণার্থ টুকরা টুকরা বরফ মুখে রাখিতে ও তাহা একটু একটু খাইতে দেওয়া যায় । শিশুরা না গিলিয়া ফেলে, এজন্ত পুঁটলী করিয়া দিবা ও সেই পুঁটলীর গোড়া যেন মুখের বাহিরে থাকে । কখন কখন সমভাগে দুধ ও সোডাওয়ারটার টাটকা মিশাইয়া, অথবা এক ছটাক দুধে ৬।৮ ফোটা টাটকা বাথারি চুনের জল দিয়া খাইতে দিলে ফল দর্শে । এ প্রকার রোগীর পাকাশয় গরম রাখা নিতান্ত আবশ্যক । পরিপাক কার্যের নিম্নম বিশিষ্ট-রূপে অবগত থাকিলে, অনেক উপায় ও পস্থা মনে উদ্ভূত হয় । স্তম্ভ-পায়ীর মাতার আহাংের ক'ট্‌কেনা করা নিতান্ত আবশ্যক । বয়স্কদিগের আহাংের প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্তন—যথা কিছু দিন কেবল মাত্র শূন্য মাংস ।

### রক্ত বমন ।

ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পরে শিশু কখন কখন, রক্ত বমন করে । এতদ্ভিন্ন মাতার স্তনে বা শিশুর নাকে মুখে ক্ষত থাকিলে ঐ রক্ত উদরস্থ হইয়া কখন কখন উঠিয়া পড়ে । পেটের পীড়া, পুনঃ পুনঃ ও প্রচণ্ড বমন অত্যন্ত গরম হইলেও রক্ত বমন হয় । ইহার ঔষধ আণিকা, ইপি, ফস, ফেরম ; আর্স চিন, নক্স, সল্‌ফর ।

আকন—বদন আরক্তিম হওয়া, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী থাকা এবং রক্তাধিক্য ধাতুর শোণিত বমন । অর ও রক্ত উঠা ।

আর্স—গা বমি বমি ও পাটকেলে পাঙ্গাশ বা কাল্‌চে বর্ণের বমন । তৎসঙ্গে রক্ত পাকা ; শ্বাসক্লান্ততা, খুব বুক ধড় ফড় করা, জ্বালা করা, তথা নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হওয়া, অত্যন্ত অস্থিরতা, পাকাশয় স্পর্শে লাগা, অত্যন্ত দুর্বলতা ।

কাস্ত—প্রচণ্ড হিকা ও রক্ত মাথা জল তোলা, নিয়ত কাট নেকার ও রক্ত বমন ।

সিটোল—রক্ত ও পিত্ত বমন ।

মার্ক-ক—ক্রমাগত রক্ত বমন ।

লাইক—জমাট রক্ত বমন ; এবং নক্স লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও তাহাতে ফল না পাওয়া ।

ইপি—পিত্ত ও প্লেগ্মা-মিশ্রিত রক্ত বমন এবং সর্বদা গা বমি বমি ; ভয়ানক পাকাশয় ব্যথা ; ইঠাৎ টক কাল রক্ত বমন, অথবা উজ্জল লাল রক্ত বমন ; বদন পাকাশয় হওয়া, গা বমি বমি, পুনঃ পুনঃ খুঁকুকে কাশী, লোন্তা ও রক্ত মাথা গয়ার ; আকনের পর, বা উভয় পর পর ।

চিন—রক্ত উঠার পর নেতিয়ে পড়িলে, মুচ্ছা, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হইলে ।

আর্গিকা—আঘাত লাগা বা অতিরিক্ত শ্রম জন্ত কাল রক্ত উঠা অথবা ঐ সঙ্গে সর্ব শরীরে ব্যথা ।

হামেমেল—পাকাশয় জ্বালা ও যাতনা, প্লেগ্মা সহ কাল রক্ত উঠা ।

নক্স—সূরাপায়ীর পীড়া, অথবা অর্শ ও ঋতুর শোণিত বদ্ধ দক্ষণ পীড়া । চটা স্বভাব ও কোষ্ঠবদ্ধ পক্ষে, পাকাশয় হইতে রক্ত উঠা ।

পল্‌স—নম্র প্রকৃতি এবং কফাংশ ধাতু পক্ষে অধিক খাটে ; জীলোকের রক্ত বদ্ধ হইয়া রক্ত বমন অথবা ঐ সঙ্গে উদরাময় ।

সল্‌ফর—গণ্ডমালা ধাতু ও অর্শের রক্ত বদ্ধ জন্ত অথবা জীলোকের রক্ত সম্বন্ধে গোল জন্ত পীড়া ।

সিকেল—হৃৎকলীর কাল্পে রক্ত বমন ; শরীর রক্ত হীন হওয়া ও ত্বকে ঠাণ্ডা ঘাম ।

ফেরম—খুঁকুর সঙ্গে বা কাশীতে কাশীতে রক্ত উঠা, হৃৎকম্প, মুচ্ছা ।

ফস্—উজ্জল লাল রক্ত বমন ; বদন, চোঁঠ, মাড়ি ও জিব পাকাশয় হওয়া ; জল পানের পর পেট পুরম হইলেই উঠা ; রক্ত বমন হইলে রোগীর তাকিয়া বা উচ্চ বালিসে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া স্থির থাকা, বাক্যাদি না কথা । এইরূপ অবস্থায় ঘর ঠাণ্ডা রাখিয়া সর্বদা বরফ টুকুরা গিলিতে দিবা ।

বরফ জল ও লেমনেড বা লেবু দেওয়া চিনি মিছরির পান্য ভিন্ন, মুখ দ্বারা কিছু খাইতে দিবা না। পিচকারি করিয়া দুধ বা কোল অস্ত্রে প্রবেশ করাইবা। মুচ্ছা হইয়া কখনও বমন বন্ধ হয়। রক্ত উঠার অনেকক্ষণ পরে খাদ্য দেওয়া বিধি। তাহাও সমুদয় যেন জলীয় এবং শীতল ও মাত্রায় অল্প অল্প হয়। তলপেটে ঠাণ্ডা জলের পটিতে বিশেষ উপকার হয়; সেই স্থান কোন মতে গরম হইতে দিবা না। “

পাকাশয় হইতে খাদ্য সহ যে রক্ত উঠে, তাহা কাল্চে বর্ণের হয় এবং অনেক সময় অস্ত্র দিয়া বাহ্যের সঙ্গেও নামে। মুস্কুস্ হইতে উজ্জল লাল রক্ত, থুথু ও গয়ালের সঙ্গে উঠে এবং তাহার সহিত কানী থাকে।

রক্ত বমনের পূর্বে পাকাশয় ভার, ব্যথায়ুক্ত ও ক্ষীত; মুখে লোস্তা তার, গা বমি বমি, উদ্বিগ্নতা, মাথা ঘোরা, কখন কখন জ্বর, ঠাণ্ডী, মাঝে মাঝে মুচ্ছা, মূত্ৰ্যর চেহারা। কখনও রক্ত উজ্জল লাল ও পাতলা, কখনও কাল ও জমাট। এক এক সময়ে, এমন কি, এক সেরেরও অধিক রক্ত উঠে। না উঠিলে কাল কাল বা আলকাতরার তায় রক্ত অস্ত্র দিয়া নামে। পাকাশয়ের রক্তের শিরা ছেঁড়া বা উহার অপর কঠিন পীড়া, অধিক স্ফুৰা বা শক্ত ওষধ সেবন, আঘাত লাগা, অর্শের রক্ত পড়া বা বামার রজঃ হঠাৎ বন্ধ, ইত্যাদি কারণে এই রোগ প্রকাশ পায়।

### প্রস্রাবের পীড়া।

প্রস্রাবের স্বাভাবিক বর্ণ খড়ের তায় দীর্ঘ লালচে। জরে উহার বর্ণ গাঢ় এবং কখন কখন খাঁকুরি বিশিষ্ট হয়। বাত রোগের মূত্র থিতুলে তলানি-লাল, নেভায় উহা হরিদ্রা বর্ণ এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় প্রস্রাব অধিক মাত্রায় নির্গত হয়। মূত্রস্থালী ও মূত্রনালির প্রদাহে প্রস্রাব এককালে সঞ্চয় হয় না; অথবা অত্যল্প মাত্রায় গরম ও লাল মূত্র ক্ষরণ এবং তলপেটে ব্যথা হইয়া থাকে। কুমিরোগ থাকিলে ইহা দুধবৎ শাদা ও প্রচুর। জরের শেষা-শেষিতে তলানি পড়া সুলক্ষণ। মূত্রস্থালীর গ্রীবার দুর্বলতা জন্মিলে ও কুমিরোগ থাকিলে, মূত্র অসামান্য বা অনিচ্ছাধীন রূপে পতনের সম্ভাবনা।

উদরাময় অবস্থায় ও অধিক ঘর্মের পরে প্রস্রাব হয়, তাহাকে সচরাচর অল্প ও গাঢ় হইতে দেখা যায় ।

কখন কখন প্রস্রাব মাত্রায় ও বারে অধিক, এমন কি মাত্রায় এক বা দুই সের পর্য্যন্ত, এবং দিন রাত্রে ৩০৪০ বারও হয় ; এবং তজ্জন্ত নিদ্রার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে । শরীর, বিশেষতঃ মুড়া ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্বল ও ক্ষুদ্র হয় এবং অতিশয় তৃষ্ণা থাকে । মূল প্রায় কঠিন ও অল্প মাত্রায় হয় । চিনি হওয়ার দরুণ প্রস্রাবে মিষ্ট গন্ধ হয় এবং তজ্জন্ত পিপড়া ও মাছি লাগে ; রোগী দিন দিন শীর্ণ এবং অবশেষে ক্ষয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু কবলে কবলিত হয় । ঠাণ্ডী লাগা ; মস্তিষ্কের ও উদরের, বিশেষ যকৃতের পীড়া ; মাথার পশ্চাৎ ভাগে আঘাত এবং অতিরিক্ত হর্ডাবনা ও মনোকষ্ট হইতে এই ব্যাধির উদ্ভব হয় ।

বঙ্গদেশে অন্ততঃ ভদ্রদিগের মধ্যে এই রোগ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ, বোধ হয়, শারীরিক শ্রম-বিমুখতা এবং সর্বদা অতিরিক্ত মনের উত্তেজনা । হাঁটিতে শিথিতে না শিথিতেই শিশুকে পাঠ-শালায় পাঠান হয় । বালকদিগকে আর পূর্বের ছাত্র ডাংগুলি, কপাটি, কুস্তি ও সুস্তরণাদি ক্রীড়া করিতে দেখা যায় না । আট দশ বৎসর বয়স্কের বালক-গণ ভূতস্থ, রসায়ণ প্রভৃতি ৪৫ রকম অভিনব বিদ্যার গ্রন্থ ; এবং ১০১২ খানা কটমটে ভাষায় নীরস সাহিত্যাদির বই মুখস্থ করিতে বাধ্য হয় । প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত এবং উত্তীর্ণ হইলে পরেও ছাত্রগণ ৫৬ বৎসর কাল কেবল বই লইয়া থাকে ।

স্নান ও জ্বাহারের অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, কার্যিক শ্রমের অভাব জন্ত অনেকের তৎকালে গৃহিণী রোগ হইয়া পড়ে । ইংলণ্ডে বাঙ্গালীর সমবয়স্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাঠাবস্থায় নোক্সি বাচ খেলা, ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলার অধিক সময় ক্ষেপণ করে । কর্তৃপক্ষেরা ইহাতে উৎসাহ দেন এবং বৎসর বৎসর বাজির ক্রীড়ার সময় উহাদের কতই আমোদ । বাজি জেতাদের ধী ধী সুখ্যাতি । প্রধান প্রধান ( Wrangler ) র্যাংগার অপেক্ষা দেশ মধ্যে তাহাদের অধিক আদর । অপর সাধারণ সকলের মুখে তাহাদের নাম । আর আমাদিগের শাস্ত্র ও বিজ্ঞের উক্তি “মল্ল বিদ্যাধমাবন ।” ঘোড়া হইতে দশ ও হাতি হইতে শত হাত অন্তরে চলা এবং গঙ্গায় কিনারা

কিনারা দিয়া নৌকা চালান, এ সমস্ত সুবোধের লক্ষণ । এই হিতোপদেশের ফল কি হইয়াছে ? দুই জন গোরা ক্ষেপিলে সহরের শত সহস্র বাঙ্গালীকে গোবেড়েন করিতে সক্ষম । সকাল বিকাল কাজ করা স্বাস্থ্য পক্ষে মঙ্গল জনক, সন্দেহ নাই এবং সেই নিমিত্তই দেশ মধ্যে সর্বত্র ইহা প্রচলিত ছিল । এক্ষণে নয়টার সময় চারিটা ভাত নাকে মুখে শুঁজিয়া কাছারি বা আফিসে বাইতে বাধ্য, তাহাতে রেলওয়ে হওয়ায় সহরের নিকটস্থ প্রাত্যহিক যাত্রীদের তো (Daily passengers) মধ্যে মধ্যে গাড়ি ধরিবার জন্ত বেদন দোড়াইতে হয় । দশ জনে একত্রে বসিয়া খোসগল্প, আমোদ আহ্লাদ করা ও নৃত্য গীত দেখা শুনা উঠিয়া গিয়াছে বলিলে চলে, তৎপরিবর্তে দিবা রাত্রি সংসার ও অর্থ চিন্তা ! এমত স্থলে আমাদের যে বহুমুত্র পীড়া অধিক হইবে, বিচিৎ কি ? বুদ্ধিতে পারিলেই ইহার যথাবিহিত উপায়ও উদ্ভাবিত হইবে ।

বালকের এ পীড়া অধিক হয় না । কিন্তু জনক জননীর এ ব্যাধি থাকিলে তাঁহাদের সন্তানের সুনিয়মে থাকা নিতান্ত আবশ্যক । তাহা ইহলে ভবিষ্যতে রোগ না হইবারই কথা এবং হইলেও সুসাধ্য হয় । যদিও বহু পূর্বে ইহার সূত্রপাত হয়, কিন্তু ২৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সেই রোগ অধিক প্রকাশ পায় । প্রথম প্রথম সূচিকিৎসায় ব্যাধি নিরাময় হইবার সম্ভাবনা । দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্য দুঃসাধ্য । তবে সাবধানে বিনাশ নাই । সুনিয়মে থাকিলে বহু দিন বাঁচে । অনেক সময় পৃষ্ঠত্রণ জন্মিয়া সাংঘাতিক হয় ।

স্নায়বিক দুর্বলতা হইতে বহুমুত্রে—কস্-আ ।

উদরের পীড়া হইতে—নাইট্রেট-ইউরেনিয়াম ।

যকৃতের বিকৃতি অথবা ক্লোম রোগের সঙ্গে বা পরে মধুমেহ পক্ষে—কস্ ব্যবহার্য্য ।

নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি এই রোগে কম বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে ।

১। আকন—যকৃতের পীড়া জন্ত প্রস্রাবে চিনি হওয়া ।

২। আম-কা—প্রচুর প্রস্রাব ও পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ইচ্ছা, অধিক তৃষ্ণা ও স্খা । গাটে মুখে তিক্ত, তার, মিষ্টান্ন প্রতি লালসা ।

৩। আয়ু-গ্রী—অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ও প্রাতে উহা ধারণে অক্ষমতা । সকালে নিদ্রাভঞ্জে মুখ, ঠোঁঠ ও জিহ্বা শুষ্ক ।

৪। আরম—প্রচুর ও ছানার জলের স্থায় প্রস্রাব ।

৫। আরম-ট্রি—পুনঃ পুনঃ অধিক মাত্রায় বর্ণহীন প্রস্রাব এবং তাহাতে সিং গোড়ার স্থায় দুর্গন্ধ ।

৬। আজেন্ট-না—চড়াগন্ধের প্রচুর মূত্র ত্যাগের পর ফোটা কতক পড়া, এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ার দরুণ মুখ তোবড়ান, রোগীর মিষ্ট খাদ্যে সমধিক ইচ্ছা ।

৭। আজেন্ট-মে—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা ও অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ত্যাগ, অতিরিক্ত ক্ষুধা—নিবৃত্তি না হওয়া এবং আহারে বল পাওয়া । প্রস্রাবে পিপড়া লাগা ।

৮। আর্গিকা—যুক্ত প্রদেশে আঘাত দরুণ বহুমূত্র । পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ইচ্ছা ও অধিক ত্যাগ, মুখ শুষ্ক হওয়া এবং অধিক তৃষ্ণা ।

৯। আর্স—বহুমূত্রের অবস্থা বিশেষে ব্যবহার্য্য । বিশেষতঃ ফোড়া এবং ওষ্ঠ বা পৃষ্ঠত্রণ ও উহার পচা ধরা আরম্ভ হইলে—ইহার নিম্ন ক্রমের ( ৪ ) ব্যবহার্য্য । অধিক প্রস্রাব, জ্বিৰ ও গলা অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়া, অনিবার্য্য পিপাসা, অরুচি ও কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া ইহার লক্ষণ ।

১০। আলুমিনা—পুনঃ পুনঃ অধিক প্রস্রাব । রাত্রে মূত্র-ত্যাগ নিমিত্ত অনেকবার উঠা ।

১১। অক্সলিগন-সি—শারীরিক দ্বায়বিক প্রাধান্য অবস্থায় অধিক ও পুনঃ পুনঃ ফেঁকাসে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব-হীন ( Specific gravity ) প্রস্রাব । জরে অধিক প্রস্রাবের সঙ্গে কঠিন ও বিবাক্ত পদার্থ ত্যাগে সমতা ।

১২। ইউপাট—সবিরাম জ্বর ও প্লীহা বৃদ্ধি জন্ম বহুমূত্র ।

১৩। ইউরেনিয়ম-না—প্রচুর শাদা প্রস্রাব এবং উহাতে পিপড়া বা মাছি লাগা, চক্ষুর চতুর্দর্শে কালশিরা, তৃষ্ণা, রাত্রে জ্বর ও অস্থিরতা । হইা ব্যবহারে প্রস্রাবে চিনির ভাগ ও পরিমাণ নিশ্চয় কমায়, উত্তাপ ও পিপাসার হ্রাস হয় এবং পীড়িতের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে । ইহার পর জিহ্বা ব্যবহার্য্য ।



১৪। ইকুইসেটম-হা—মূত্রস্থালী ব্যাথায়ুক্ত, কখন কখন ক্ষীত, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ ইচ্ছা এবং অধিক মাত্রার, নির্গমন ও তৎকালে জ্বালা, এবং মূত্রে রক্ত, শ্লেষ্মা ও খেতসার থাকা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে ।

১৫। ওপি—ইহা ব্যবহারে তৃষ্ণা হ্রাস হয় এবং প্রথম প্রথম চিনির মাত্রাও কমে ।

১৬। কলসি—প্রস্রাবের প্রচুরতা, পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, অতিশয় অসহ্য কদর্যা ভ্রাণ বিশিষ্ট এবং রাত্রে উহা চট্‌চটে ও ডিঘের খেতাংশের জ্বায় হওয়া ।

১৭। কার্বো—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রচুর মূত্র ত্যাগ । পেটের গোল, সামান্য খাদ্য ও ভাল রূপে পরিপাক না হওয়া, প্রাতে মুখ অতিশয় শুষ্ক হওয়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও ক্ষুধা, যকৃত ও খ্যাখলান, উদ্বিগ্নতা, অবসাদ, অধীরতা ও চট্টা । রাত্রে সেজে মোতা ।

১৮। কালী-কা—পুনঃ পুনঃ বেগ এবং সজাটে বা কিকে প্রস্রাব, স্বক শুষ্ক হওয়া, যকৃতের ব্যাথা ও চাপুনি, রোগী দুঃখিত ও চট্টা ।

১৯। বাঙ্কা-ফস্—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ত্যাগ জন্ত অবসাদ ও দৌর্যেলা । কখন কখন প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা ।

২০। ক্রিয়োস—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, অক্ষুধা, বিমূনি এবং সর্বদা হাই উঠা, স্বক শুষ্ক হওন ও চুলকুনি, যকৃতের নিয়ত হল ফুটুনি, কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া ।

২১। ক্রেমেটিস-ই—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব । অকষ্টকর ও প্রচুর পরিমাণে লালচে প্রস্রাব । ডাক্তার জারাইহা মধুমেহে দিতে কহেন ।

২২। কোনাই—রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব । বহুমূত্র সহ অতিশয় যাতনা, রাত্রে সেজে মোতা, রক্ত প্রস্রাব ।

২৩। ক্লোরাল—বিশেষ মস্তিষ্কের অধিক চালনা জন্ত বহুমূত্র ।

২৪। গ্রাফাইট—বেতো ধাতু, ভগ্ন শরীর, জীর্ণতা, নাক দিয়া রক্ত পড়া, অধিক ক্ষুধা, পুনঃ পুনঃ ও কখন কখন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, রাত্রে সেজে মোতা ।

২৫। চিন—স্নীহা ও ক্লোমের পীড়া জন্ত বহুমূত্র ।

২৬। চিমিফিলা—পুনঃ পুনঃ বেগ ও অধিক মাত্রায় সজ্ঞাতে প্রস্রাব ও তৎসঙ্গে স্রুতাবৎ শ্লেষ্মা ও কখন কখন রক্ত স্রবণ ।

২৭। জিঙ্ক। পুনঃ পুনঃ অধিক শাদা প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে ; মূত্রা-ধারের ( বিশেষ বাম দিকে ) অধিক বেদনা—মূত্রস্থালীতে চাপুনি ।

২৮। টেরিবিষ্ট—ইহা সেবনে প্রথম প্রথম প্রস্রাব বৃদ্ধি ও তাহাতে চিনি থাকে, কাজেই ইহা মধুমেহে খাটিবার সম্ভব । অসামান্য প্রস্রাব ।

২৯। ডিজিট—পুনঃ পুনঃ বেগ, কখন কখন অধিক মাত্রায় মূত্র ত্যাগ, গলা শুষ্ক হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ । প্রাচীরের রোগে অধিক খাটে ।

৩০। নক্স—মধুমেহ বা বহুমূত্র এবং ঐ সঙ্গে উদরাময় । ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমে । নিম্ন ক্রম দিতে কহেন ।

৩১। নেট্রম-ম—পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, রাত্রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ত্যাগ, সর্বদা ক্ষুধা, নিয়ত তৃষ্ণা, যকৃৎ ব্যথা ও ফুঁড়ুনি । রাতগ্রস্ত বা গণ্ডমালাশীল ধাতু পক্ষে । হিষ্টিরিয়া বা পক্ষাঘাত গ্রস্তের বহুমূত্র ।

৩২। পড—যকৃৎ ও প্লীহায় রক্ত সঞ্চয় ও আকার বৃদ্ধি জন্ম-পীড়া ।

৩৩। পলস—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের জলবৎ ও অধিক প্রস্রাব ।

৩৪। প্লম-প্রচুর লাল বর্ণ সবুজ প্রস্রাব, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, মুখে মিষ্ট তার, মিষ্ট উদ্গার ও বমন—ক্ষয় জ্বর, অতিশয় শীর্ণ হওয়া ।

৩৫। ফস—প্রচুর ও জলবৎ প্রস্রাব, কখনও কখনও রক্তন এবং গন্ধকের গন্ধময় । সুরকার হ্রাস তলানি পড়া, রোগী শীর্ণ ও সামান্যতেই শ্রান্ত হওয়া এবং দুর্বলতা জন্ম কাঁপা । পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে ।

৩৬। ফস-আ—পুনঃ পুনঃ প্রচুর দুর্গন্ধ প্রস্রাব, শাদা তলানি, রাত্রে বারে ও মাত্রায় অধিক ত্যাগ এবং তৎকালে জ্বালা, কনকনানি ও অনিদ্রা । ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্বল হওয়া এবং প্রস্রাবে চিনি থাকা । হৃৎকের হ্রাস মূত্র ও তৎসঙ্গে চটুচটে টুকরা টুকরা জমাট রক্ত ।

৩৭। বারাইটা-কা—দ্রুত প্রস্রাব অধিক প্রস্রাব ও প্রাতে জিব শুষ্ক । এক দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর মূত্রত্যাগ । গণ্ডমালা-ধাতু ও থর্কস এবং যাহার অধিক বিলম্বে অঙ্গ বৃদ্ধি হয় ( বাড়ে ), ইহাদিগের পক্ষে বিশেষ খাটে ।

৩৮। বেল—মাথায় আঘাত লাগা দরুণ বহুমূত্র ।

৩৯। ভারবেসকম—পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা ও অধিক প্রস্রাব ত্যাগ, ঘর্ষের এককালে অভাব ।

৪০। মর-আ—অধিক প্রস্রাব ও উহা ত্যাগ কালীন প্রতিবার অল্প অল্প বাহে ।

৪১। মঙ্গস—অধিক প্রস্রাব ও উহাতে চিনি থাকা ; তৃষ্ণা, শীর্ণতা ও সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বা শক্তি-হীনতা ।

৪২। মাগিসা-কা—ফেঁকাসে বা সবুজ বর্ণের প্রস্রাব, প্রবল পিপাসা, যকৃতে ব্যাথা ও তন্মধ্যে যেন কঠিন পদার্থ থাকা বোধ, শক্তিহীন হওয়া ।

৪৩। মার্ক-স—যে পরিমাণে জল পান করা হয়, তদপেক্ষা অধিক প্রস্রাব, বিশেষ গরমির পীড়া দরুণ বহুমূত্র ।

৪৪। মিউরেট-কুইনাইন—ইহা সেবনে প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমিয়া যায় ।

৪৫। রস—রাত্রে প্রস্রাব বৃদ্ধি ও অস্থিরতা । অধিক জলে থাকা বা ভেজা দরুণ রোগ । বাতগ্রস্তের পক্ষে অধিক খাটে ।

৪৬। লেডম—পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, স্বক শুষ্ক এবং চুলকনা ও স্ফোটক বিশিষ্ট হওয়া, হাত ও পায়ের পাতা গরম হওয়া, সর্সাদা নেসার জ্বায় অনুভব করা ।

৪৭। লেপ্টাণ্ডা—বিশেষ যকৃতে অধিক রক্ত সঞ্চয় জন্ম বহুমূত্র ।

৪৮। ষ্টাফিস—পুনঃ পুনঃ অধিক প্রস্রাব—কখন কখন তাহা কষ্টকর ।

৪৯। সল্ফর—প্রেম্মাধিক্য ধাতু, অর্শগ্রস্তের বহুমূত্র । পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্রস্রাব, যকৃতে চাপুনি, বেদনা ও সংকোচ হওয়া এবং গাত্রে চুলকনা ।

৫০। সিড্রন—অধিক প্রস্রাব ও পুনঃ পুনঃ বেগ, মূত্রনালি জালা এবং মূত্রাধারে অতিশয় বেদনা ।

৫১। সিগা বা স্কটলা—পুনঃ পুনঃ প্রচুর ফিকে-জর্দা প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রে ; মূত্রস্থলীতে সর্সাদা কষ্টকর চাপুনি, ও মূত্র ধারণে অসামর্থ্য ; অতিশয় তৃষ্ণা ও ককুরবৎ ক্ষুধা ।

৫২। সিলিসা—যথেষ্ট পরিমাণে, বিশেষ রাত্রি, প্রস্রাব এবং তাহা ত্যাগ কালে তদ্বারে চিন্ চিন্ বা চিড়্-চিড়্ করা। পেট-ডাগরা ও বাহার মাথা অধিক ঘামে, এমত রোগীর পক্ষে।

৫৩। স্পাইজিলা—কুমি রোগগ্রস্তের অধিক প্রস্রাব থাকিলে।

৫৪। হাইড্রোসিয়ানিক-আ—পুনঃ পুনঃ ও অধিক প্রস্রাব, দেহ শীর্ণ, স্বক চুলকনা-বিশিষ্ট ও গুরু, অন্মিত্রা কঠিন কোষ্ঠ। (নাইট্রিক আসিডের স্রাব গুণ)

৫৫। হেলোনিয়স—সহজ শরীরে ব্যবহার করিলে প্রস্রাব মাত্রায় অধিক হয় এবং উহাতে চিনিও যথেষ্ট থাকে। কেবল মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে মধুমেহ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

সিজিজিয়ম যথু—(দেশী কাল জাম্বু)—ইহার সমস্ত আটি বা উহার উপরের ছালটী শুকাইয়া খুব চূর্ণ করিবা। ঐ ফাকি বা গুঁড়া নূতন ও পরিষ্কার শিশিতে রাখিবা; উহার এক কুঁচ বা দুই গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ দুই বার করিয়া সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। দুই একটা স্লেমিওপেথিক বাঙ্গালী ডাক্তার কহেন যে, কেবল মাত্র এই ঔষধ দ্বারা মধুমেহ আরোগ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের দেশী গাছ, কিন্তু আমেরিকানেরা ইহার গুণ আনাদিগকে শিখাইয়াছে।

এ সকল ঔষধ মধ্যে হেলোনিয়স, ফস-আ, নাইট্রেট্ ইউরেনিয়ম্, সিজিজিয়ম, লেপ্টাণ্ড্রাপড, ইহারা মধুমেহে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগ পুরাতন হইলে স্তনিয়মে থাকিলেই অনেকটা ভাল থাকা যায়। অনেক পরীক্ষার পর পথ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, সূরা, মিষ্ট \* ও টক সামগ্রী এক কালে নিষিদ্ধ। স্বৈতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য, যথা—আলু, কলা, বেগুন, চাউল, যব, গম, ফল, বিশেষ ফুটি ও কাঁকড় অবৈধ। ভূষির রুচী, মোচা, খোড়, ডুমুর, পটল, কলাইগুঁটা, শিম,

\* পাথুরে কয়লার আলকাভ্রার স্রাব রস হইতে এক প্রকার মিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহার ভার চিনি অপেক্ষা মধুর এবং তাহা বহুমূত্রে হানিকর নহে; স্তব্রাং মিষ্ট-প্রিয় ব্যক্তির অনায়াসে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

কপি, মৎস্ত, মাংস, দুধ, বিশেষ মাটা-তোলা মাখন, ছানা, এই সমস্ত পরিমিত রূপে দেওয়া যায়। পথ্য কালিন' মাটা-তোলা-দুধ কেবল ৫ বা ৬ সের ভিন্ন ভিন্ন আকারে ( দধি, কীর, ছানা ) কিছু দিন খাইতে দিবা। তৎকালে মাংসাদি ব্যবহার করিলে তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

ঘাম অধিক হইলে প্রস্রাব কমে, এবং নিক্রম্যদেরই এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা; সেই নিমিত্তই সকাল সন্ধ্যায় অধিক শ্রম, যথা, পদ সঞ্চালন, কুস্তি, দৌড়াদৌড়ির ক্রীড়া, ( যে পর্য্যন্ত না যথেষ্ট ঘাম হয় ) করা বিহিত। গরম বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করা ও উষ্ণ প্রদেশে বাস ব্যবস্থা।

বহুমাত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, কর্ত্তাপক্ষীরণ এখন হইতে সম্ভানগণকে সুনিয়মে না চালাইলে, ভবিষ্যতে অধিক অনিষ্টপাত হইবে। আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিতে যাই—মন্দটী আগে গ্রহণ করি, ভালটীর বেলা পিছু পা হই। ১৭ বৎসরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া, সাহেব বালকের ত্রায় যথোচিত ব্যায়াম না হওয়া ও অবথাকালে মানসিক শক্তির অধিক উত্তেজনার দরুণ শারীরিক পীড়া এবং অল্পকাল মধ্যে বুদ্ধির ক্ষয় বা হ্রাস্তা হয় এবং অল্প কালে বুড়িয়া যায়। তোমাদের হিত হয় হউক, কিন্তু ব্রিটন যুবকের মঙ্গল জন্ত তাঁহার পরীক্ষার বয়ঃক্রম এক্ষণে বাড়াইয়াছেন ( ২৩ করিয়াছেন )। তাঁহার ইচ্চে পাকাইতে চান না। যথাকালে সুমিষ্ট ফল অস্বাদনে সমিচ্ছুক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কতকটা বুঝেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়, না করিলে তাঁহার কালেজ ও স্কুল ছাত্র-শূন্য হইবে। \*

\* কতিপ্রদেশে মেন্দগের দুই পার্শ্বে দুইটি গ্রন্থি আছে, একটি যকৃতের, অপরটি প্লীহার ঠিক নীচে—ইহাদিগকে (Kidney) মূত্রাধার বা মূত্রাশয় বা মূত্রগ্রন্থি কহে। ইহার আকার শিমের দানার ন্যায়, লম্বায় ৪, চৌড়ায় ২ ও দলে ১ ইঞ্চি এবং ওজনে দুই হইতে তিন ছটাক। বামেরটা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণিঃ অধিক ভারি। রক্তের ইউরিয়া নামক বিষাক্ত ভাগ ও অপর ত্যজ্য পদার্থ সকল এই যন্ত্র দ্বয় হইতে প্রস্রাব রূপে শরীর হইতে বিদূরিত হয়। প্রস্রাব সামান্যতঃ ১/১ বা ১/১০ পোয়া প্রত্যহ ত্যাগ করা যায়। উহার মধ্যে হাজার করা জল ৯৬, চূর্ণ, ক্ষারাদি পদার্থ ১০ এবং ইউরিয়া ও স্নেহা প্রভৃতি ৩১ ভাগ থাকে। জল

## অনিচ্ছাধীন বা অসামাল প্রস্রাব।

( সেজেমোতা ও মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা )

অজীর্ণতা বা দুর্বলতা জন্ত সেজে মোতা—হাম-কা।

আত্মমৈথুন জন্ত—ফস-আ।

কাশিবার সময় অসামাল প্রস্রাব—পল্‌স, সল্‌ফর ( কাষ্টিক—জীলো-কের পক্ষে )

কৃমি রোগ জন্ত—সিনা, স্পাইজিলা, আর্জেন্ট-না।

চর্ম রোগগ্রস্তের—সল্‌ফর।

চড়া ছাণের ও খুব লাল প্রস্রাব—অনিচ্ছাধীন—ওপ্লি, কান্স, নাইট্রী-আ, পড, বেঞ্জ-আ, লাইক।

দিবসে প্রস্রাব—অনিচ্ছাধীন—ফেরম্ ও সিলিসা এবং গাঢ় নিদ্রা কালীন বেল।

নড়া চড়ায় ফোটা কতক গরম মূত্র—আস, ব্রাই।

নেশা দরুণ অসামাল প্রস্রাব—নক্স।

প্রাচীনের—কোনাই, জেল্‌স, বেল।

প্রচুর পরিমাণে সেজে মোতা—সিলা।

প্রথম রক্তে বা ভাতঘূমে—সেপিয়া, কাষ্টিক।

অপেক্ষা প্রস্রাব কিঞ্চিৎ অধিক ভারি। জলের ১০০<sup>০</sup> ধরিলে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ( Specific gravity ) ১০২০। অর্থাৎ মাপে সমান—যথা, এক বাটি বা এক ভাঁড় জল যদি ওজনে ১০০০ ধান বা রতি হয়, সেই বাটি বা সেই ভাঁড়ের মাপে প্রস্রাব তাহা হইলে ১০২০ ধান বা রতি হইবে; ইহাকেই আপেক্ষিক গুরুত্ব কহে। ইউরিয়া বিব নির্গত না হইলে উহা ধমনীর রক্তে মিশিয়া যায় এবং তজ্জন্ত ভেদ, বমি, অঙ্গ খেঁচুনি বা মৃগী এবং শেষ ঘোর স্ফ্রা বা তামসী নিদ্রা ও মৃত্যু। অপর, মূত্রাশয়ে যথা-বিস্তৃত কার্য্য না হওয়ার জন্য তথায় অধিক শোণিত সঞ্চয় এবং প্রস্রাবে রক্তের বেতসাব নির্গত হয়। মূত্রাশয় হইতে ( Ureters ) মূত্রনালী দিয়া মূত্রহালীতে ( Bladder ) প্রস্রাব সঞ্চয় এবং তথা ( Urethra ) মূত্র মার্গ দিয়া প্রস্রাব বাহিরে পড়ে।

বেড়ান কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব—নেট্রম, পলস; (কাষ্টিক—ড্রীলো-কের পক্ষে)

মস্তিষ্কের উপদাহ জন্ত—বেল ।

মরুৎ ক্রিয়া কালীন অসামান্য প্রস্রাব—সল্ফর ।

শিশুর সঙ্গে মোতা ও ত্যাগ কালিন যাতনা—আকন, কাস্ত, ফেরম, বেল, সিকেল ।

হিষ্টিরিয়া, বায়ুগ্রন্থের অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ও উহাতে অধিক ক্ষার থাকিলে—কাস্ত, নক্স, ফস-আ ।

১৪ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়, বিশেষ রাত্রি । বেগ হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব ত্যাগ না করিলে কোন কষ্ট বিনা আপনা হইতেই মূত্র পড়ে । দমকা কাশী বা হাঁচি কালিন এবং মূত্র সঞ্চার হইলেই উহার পতন হয়, গাত্রে প্রস্রাবের গন্ধ এবং দেহের যে স্থানে উহা লাগে সে স্থান হাজিয়া যায় ।

মূত্রস্থালী বা মলাশয়ে কুমি, মস্তিষ্কের বা মেরুদণ্ডের পীড়া, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা (যথা আত্মমৈথুন), সন্ধ্যা বা রাত্রে অধিক ও গুরুপাক দ্রব্য আহার ও তজ্জন্ত গাঢ় নিদ্রা, অধিক জলীয়, বিশেষ গরম চা, দুধ পান মূত্রস্থালীর দৌর্বল্য ইত্যাদি কারণে এবং গণ্ডমালা ধাতুতে প্রবীণদেরও এই রোগ হইতে দেখা যায় । বালিকা অপেক্ষা বালকেরই অধিক হইয়া থাকে । যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনেক সময় আপনা হইতেই স্নরে ।- মূত্রস্থালীতে পাথুরী থাকিলে দিবসে ঘন ঘন এবং মূত্রস্থালীর গ্রীবার গ্রন্থির আকার বৃদ্ধিতে রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় ।

প্রবীণারা রাত্রে শয়নের পূর্বে শিশুকে প্রস্রাব করাইয়া শোয়ান এবং নিদ্রা কালিন চিত বা উপুড় থাকিলে পাশ ফিরাইয়া দেন । প্রথম ঘুমেই প্রায় সঙ্গে মোতে, সে নিমিত্ত ২।৩ ঘণ্টা নিদ্রার পর সন্তানকে তুলিয়া প্রস্রাব করান বিধি । অল্পবয়সকে পায়ের উপর বসাইয়া শিশু দিতে থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় । বড় ছেলেদের প্রতি ভয় প্রদর্শনে কখনও ফল দেয় । সঙ্গে মোতাদের সর্বদা বায়ু সঞ্চালিত স্থানে অবস্থান, বালিসহীন ও কঠিন শয্যা শয়ন এবং সকাগ সন্ধ্যায় স্নান অথবা মোটা গামছা বা তোয়ালে

দিয়া গাত্র মার্জন বিধি । নিম্ন লিখিতের মধ্যে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য ।

আপিস—কাশী বা হাঁচি কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ( আন্ট, কাষ্টিক, পলস, ভেরাটুরস, সিলি। )

আপোসাইনম-কা—অধিক মাত্রায় প্রস্রাব ও মূত্র পথের শিথিলতা ।  
কখন কখন রাত্রে অনিচ্ছাধীন মূত্রত্যাগ ।

আম-কা—শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও পরিপাক কার্য্য সূচক রূপে না হওন জন্ত রোগ । ঘুমন্ত সেজে মোতা, বিশেষ শেষ রাত্রে বা ভোরে ।

আর্গিকা—প্রসবের পর অসামান মূত্রত্যাগ ।

ইলাট—নিম্ন ( ২ ) ক্রমের ৫ ফোটা করিয়া প্রত্যহ দিয়া একজন ডাক্তার অনেক বয়স্ক রোগীর উপকার করিয়াছেন ।

কাঁহ—মূত্র লাল ও ত্যাগ কালিন গরম হওয়া ও অধিক বাতনা, জ্বর ।  
ডাং এডমণ্ড্-ইহার ৩য় ক্রমের ঔষধ প্রত্যহ শয়ন কালিন দিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন । ইহাতে একান্ত না সারিলে তিনি ঐ রূপে বেল দিতে কহেন ।

কামো—অধিক মাত্রায় টক গন্ধের মূত্র কষ্টে ত্যাগ, বিশেষ রাত্রে এবং ঐ সঙ্গে অজীর্ণতা । অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ।

কাকা—বেড়ান কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, পাটকেলে বর্ণের ও রক্ত মিশ্রিত । ( মোটাসোটা কফজ ধাতু, যথেষ্ট মাথা ঘামে এমত শিশু পক্ষে )

কাষ্টিক—দুর্ব্বল ও ক্ষীণ পক্ষে । প্রথম রাত্রে সেজে মোতা । শীত-কালে দিবসে অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, কিন্তু গরমিতে প্রায় ওরূপ হয় না ।  
স্ট্রীলোকের কাশী বা বেড়ানকালিন অনিচ্ছাধীন ত্যাগ ।

ক্রিয়োস—যাহাদের অঘোর নিদ্রা, কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গে না, এমত সকলের সেজে মোতা । শীর্ণ ও খর্ব্বকায় এবং বাল্যকাল হইতে বহু দিনের পীড়িত পক্ষে । ইহার ৬ ক্রম সেবনে রোগ বন্ধ ; পুনঃ প্রকাশ হওয়ায় সল্ফর ৩০ দেওয়ায় সম্পূর্ণ আরোগ্য ।

কোনাই—রাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ও ধারণে অসামর্থ্য । রাত্রে সেজে মোতা । প্রাচীনের পক্ষে অধিক উপযোগী ।



জেলস।—মূত্রস্থালীর পেশীর দুর্বলতা বা এককালে শক্তি-হীনতা জন্ম। দিন রাত অসামান প্রস্রাব। প্রাচীনের রোগে ব্যবহার্য।

খুজা—ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রস্রাব ত্যাগের পরও ফোটা ফোটা অনিচ্ছাধীন মূত্র পতন; বিশেষ বাহাদের প্রস্রাব দ্বারের নিকট আঁচিল আছে বা ছিল।

নক্স—মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশের উপদাহ জন্ম প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা। অতিরিক্ত নেসা বা অনিয়মে থাকা জন্ম রোগ।

নাইটেট ইউরেনিয়ম—রাত্রে শিশুর অসামান প্রস্রাব; অনেক সময় উহা দেহের যে স্থানে লাগে, সে স্থান হাজিয়া যায়। কমি জন্ম সেজে মোতা।

নাইট্র-আ—অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা বোড়ার চোনার তায় মূত্র। প্রস্রাব-দ্বার দিয়া পূষবৎ গরন, বিশেষ রাত্রে। প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, বিশেষ শিশুর।  
পড—ঘুমন্ত প্রস্রাব।

পলস—বসা বা বেড়ান কালিন ফোটা ফোটা পড়া; কান্ধি বা নিদ্রা কালিন অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব (রস)। রাত্রে সেজে মোতা, বিশেষ নক্স-প্রকৃতি ও ক্ষীণ-কায় পক্ষে এবং সে বিধায় বালকাপেক্ষা বালিকার অধিক খাটে (সেপি)। প্রস্রাব পাইলে ক্ষণকালও ধারণে অক্ষমতা। ইহাদের মূত্রদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয়। বর্ষায় রোগ বৃদ্ধি। প্রসবের পর অসামান প্রস্রাব। আর্গিকায় প্রতিকার না হইলে ইহা দিবা এবং ইহাতেও না সারিলে বেল বিধি। বামার রোগ পুরাতন হইলে—সল্ফর, সিকুটা, সেপি—ইহার এক একটা পরে এক সপ্তাহ বিরাম।

প্লান্টানগো—দ্বারের পেশীর দুর্বলতা জন্ম অসামান প্রস্রাব; প্রচুর পরিমাণে সেজেমোতা; চক্ষুর নীচে কুলা; বিলক্ষণ ক্ষুধা ও স্থনিদ্রা।

পিটোল—মূত্রস্থালীর গ্রীবার দুর্বলতা জন্ম প্রস্রাব ত্যাগের পর ফোটা ফোটা অনিচ্ছাধীন পড়া।

ফস-আ—রাত্রে বিছানা ভাঙাইয়া দেওয়া। আত্ম-মৈথুন জন্ম রোগ। বাহাদিগের অতিরিক্ত বাড়ন্ত গড়ন, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে।

ফেরম—দিবসে প্রস্রাব ধারণে অক্ষম, রাত্রে কোন গোল নাই।

বেল—মস্তিষ্কের উপদাহ বশতঃ রোগ সহ প্রচুর ঘাম। মূত্রস্থালীর দ্বারের পেশীর শিথিলতা জন্ম নিয়ত মূত্র বরা। প্রাচীনের পীড়া।

বেঙ্গ-আ—রাত্রি সেজে মোতা—প্রস্রাব খুব লাল, কটু স্বাদের এবং ইহার আক্ষেপিক তার ( Specific gravity ) স্বাভাবিক প্রস্রাব অপেক্ষা অধিক ।

মার্ক—যাহারা অল্পে ঘামে ও যাহাদের প্রস্রাব কটু ও টক গন্ধের এবং যাহারা বেগ হইলে ধারণে অশক্ত, তাহাদের পক্ষে ।

রস—অনিচ্ছাধীন পুনঃ পুনঃ প্রচুর প্রস্রাব, বিশেষ রাত্রি ও স্থির থাকিলে । বাতগ্রস্তের পীড়া ।

কটী—রাত্রি বিছানায় মূত্র ত্যাগ এবং দিবসেও নড়া চড়ায় অসামান প্রস্রাব । পুনঃ পুনঃ বেঙ্গ ও সবুজ বর্ণের মূত্র ।

লাইকপ—অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, রাত্রি বৃদ্ধি ; বিশেষতঃ তলানিতে লাল লাল বালির কণা থাকিলে ।

ষ্টাফিস—কাশিতে কাশিতে ফিন্‌কি দিয়া প্রস্রাব, ( সিল! ) ।

সল্‌ফর—ধাতু বিকৃতি বশতঃ, বিশেষ, চর্ম্ম রোগ-গ্রস্তে এবং একহারা, পেটডাগ্‌রা, মিষ্টপ্রিয়, মানে বিমুখ, এমত সকলের মূত্র তারণে অক্ষমতা ; বিশেষ দুইপ্রহর রাত্রের পর । ২।৩ ঘণ্টা অন্তর মূত্র ত্যাগ । জল পতনের শব্দ শুনিলেই প্রস্রাব না করিলে কাপড় নষ্ট । কিছুকাল রাত্রি জাগরণের পর গাঢ় নিদ্রা ও তৎকালে সেজে মোতা । সকালে ১১ টায় গাত্র তাপ, দুই ক্ষুধা ।

সল্‌ফ-আ—রাত্রি সেজ ভাসিয়া যাওয়া ।

ফিনা—নাক খোঁটা, দাঁত কিড়মিড়ি, বায়সবৎ ক্ষুধা ও অপর ক্রমির লক্ষণ । অনিচ্ছাধীন প্রস্রাবের পরই উহা ঘোলামারা এবং ঝানিকক্ষণ ধরিয়া রাগিলে ছধবৎ শাদা হওয়া ।

সিলা—কাশিতে কাশিতে মূত্র ফিন্‌কি দিয়া ত্যাগ ।

সিলিসা—কুমি জন্তু রোগ, বহু দিনের পীড়া । ৩০ ক্রমের বহুবার সেবনে আরোগ্য । রাত্রি সেজে মোতা ।

সেপি—বৃমস্ত ও প্রথম রাত্রি প্রস্রাব দ্বার দিয়া অধিক শ্লেষ্মার নির্গমন ; সর্বদা ত্যাগ ইচ্ছা ; মূত্রস্থালীতে চাপ ও উহার গ্রীবার আক্ষেপ ; কদম্ব গন্ধের প্রস্রাব এবং মেটেবর্ণের চট্‌চটে তলানি পড়া । আত্ম-মৈথুন-কারীর রোগ ।

### মূত্র রোধ বা কুচ্ছতা ।

প্রস্রাবের বিবিধ যন্ত্রের পীড়ায় নানা উপসর্গ উপস্থিত হয় । মূত্রাশয়ের প্রদাহে ঐ প্রদেশে ব্যথা হয় এবং চাপ দিলে কি নড়িলে চড়িলে যাতনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে—শীত ও তাপ, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, কখন বা তাহা রক্ত মিশ্রিত, গা বমি বমি, বমন । প্রদাহ অধিক বা উভয় কোষে হইলে হয়তো প্রস্রাব এক কালেই সঞ্চয় না হইতে পারে এবং তদবস্থায় ইউরিয়া বিষ ধমনী রক্ত মধ্যে সঞ্চালিত হওয়াতে প্রলাপ, অচৈতন্যময় গাঢ় নিদ্রা এবং দঙ্কা উপস্থিত হয়, এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রতিকার না হইলে আশু মৃত্যু সম্ভাবনা । মিয়তো রোগ পুরাতন মধ্যে পরিগণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব সহ বেগ ও বেদনা আনে এবং ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্বল করিতে থাকে । এ পীড়ায় হৃৎ ও নিরমিষ খাদ্যই পথ্য এবং পরিমিত ব্যায়াম ও গরম লেঙ্গান বৈধ । কখন কখন মূত্রস্থালীতে প্রস্রাব সঞ্চিত হইয়া উহার গন্ধ প্রদাহ, পক্ষাঘাত বা সংকোচন ঘটে । একজন্ত অথবা পাথুরী থাকে । ইচ্ছা সত্ত্বে প্রস্রাব ত্যাগ হয় না । বস্তি প্রদেশ ক্ষীণ ও উচ্চ হয় । হয়তো ঘুমন্ত ধড়মড়িয়া উঠিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে যায়, বেগ দেয়, কিছুই পড়ে না । বাত রক্ত ( Gout ) অধিক পরিমাণে ডাক্তারি চিকিৎসায় কাস্টারিস ব্যবহার, অধিকক্ষণ জলে থাকা বা ভেজা, হিম লাগা ও অতিরিক্ত স্নান পান বশতঃ এই ব্যাধি হইয়া থাকে । প্রদাহের পর মূত্র-মার্গ অধিক পুরু অথবা তথায় আক্ষেপ জন্ত পথ রোধ হওয়া, এমত স্থলে প্রথমতঃ যন্ত্র দ্বারা পথ পরিসর করিয়া পশ্চাৎ উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবা ।

ঠাণ্ডী বা আঘাত, জ্বর বা অপর রোগে রক্তের বিকৃতি-ভাবে জন্ত মূত্রাধারে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার ( Albumen ) দেখা দেয় ও ইহার আকার বৃদ্ধি হয় । জ্বর, মূত্রাশয় বেদনা, অল্প অল্প ঘন ঘন লাল প্রস্রাব ইহার লক্ষণ । প্রথম প্রথম বদন ও চক্ষুর পাতা পরে ন্যূনাতিরেকে হাত ও পায়ের পাতা ফুলে ; শ্বাস-কুচ্ছতা ঘটে ; কাহারও বা অঘোর অবস্থা ও আক্ষেপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ; এবং ১০।১৫ দিনের পর কমিতে থাকে । রোগ পুরাতন হইলে শরীর ফুলে, দিন দিন দুর্বল করে ও প্রস্রাবে বিলক্ষণ শ্বেত-

সার দেখা যায়। পূর্বোক্ত যে কোন ব্যাধি জন্ম মূত্র-রোধ, কৃচ্ছতা ও অপর বাতনা উপস্থিত হয়, তাহার সদৃশ ঔষধ নিম্নে প্রকাশিত হইল। উপসর্গ দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রোগ নির্ণয় করিতে পার, ভালই! কিন্তু লক্ষণানুযায়ী ভেষজ দিয়া যন্ত্রণা নিবারণ করিলেই আমরা সিদ্ধ-মনস্কাম হইব। আমাদিগের দেশের ছরবস্থায় ইহাপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করা, বোধ হয়, সম্ভব নহে।

ভূমিষ্ঠ হইবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হইলে, মূত্রস্থালী বিলক্ষণ কুলিয়া উঠে ও ঐ সঙ্গে কখন কখন জ্বর, অস্থিরতা, কান্না, অঙ্গবিকৃতি এবং কচিং বা দড়কা কিম্বা অপর কোন ভয়াবহ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। গরম জল দিয়া তলপেটে ফোমেন্ট বা সেক দিবা, অথবা সহ্য হয়তো ঐরূপ গরম জলের টবে বসাইবা; বস্ত্রপ্রদেশে হস্ত বুলাইতে থাকিবা। ইহাতে প্রতিকার না হইলে, অথবা প্রথম হইতেই স্থানীয় প্রদাহের উপশমার্থ আকন দিবা। গিন্নিরা কখনও এক আদ্‌ঝিছুক মিছরির পান দিতে কহেন।

আকন—সদ্য প্রস্রাবের প্রস্রাব বন্ধ হইলে, ইহার প্রয়োগে দুই ঘণ্টা মধ্যে মূত্রত্যাগ সম্ভাবনা। তাহা না হইলে, এবং ঐ সঙ্গে দড়কা ও হাত পা ঠাণ্ডা থাকিলে ইপি ব্যবস্থা। জ্বর বা প্রদাহ; বদন সরস ও গাঢ় বর্ণের হওয়া; প্রস্রাব ত্যাগের খুব ইচ্ছা কিন্তু হয়না, এমন অবস্থা; তলপেটে হাত দিয়া কান্না; অস্থিরতা এবং বসিলে দুর্বলতা বোধ। হিমলাগার দরুণ রোগে বিশেষ উপকারী। মূত্রমার্গের মাংস বৃদ্ধি জন্ম শলা বা যন্ত্র দ্বারা প্রস্রাব করাইবার পর অনেক সময় ইহা ও কাছ পর পর, অথবা জেন্স ব্যবহারে মূত্র-পথ সরল হওয়ার সম্ভব।

• আগিস—জরের পর অত্যন্ত প্রস্রাব, এবং ত্যাগের পূর্বে ও পরে জালা, চিড়্‌চিড়নী এবং বেগ দিলে যেন উদরস্থিত কোন পদার্থ ছিঁড়িয়া নির্গত হইবে, এমন বোধ হওয়া; হঠাৎ কোন অঙ্গ ফুলা ও তথায় হল ফুটনি; শ্বাস কষ্ট।

আপোসাইনম-কা—প্রস্রাব কখন কখন সঞ্চারিত না হওয়া বা সঞ্চার হইয়া আটকান, অথবা অত্যন্ত ও হরিদ্রা বর্ণের হওয়া; বিশেষ শোথগ্রস্তের মূত্রপীড়া।

আরম-ফ—প্রস্রাব আটকান ও বিলক্ষণ যাতনা এবং মূত্রস্থালীতে চাপুনি ; ছানার জলের ত্রায় ও কটুভ্রাণের অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হওয়া এবং উহার সঙ্গে শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

আর্জেন্ট-না—প্রস্রাব বন্ধ, অথবা অত্যন্ত ও ঐ সঙ্গে পুষ্য ত্যাগ। মূত্রনাগী ফুলা ও টাটান। প্রমেহ (Gonorrhoea) পীড়া থাকে জন্ত মূত্ররোধ।

আর্গিকা—পড়া, আঘাত বা অতিরিক্ত শ্রম জন্ত প্রস্রাব রোধ। মূত্র সঞ্চয় হইলেই যাতনা, মূত্রস্থালীতে ব্যাথা ও টাটান।

আর্সি—মূত্ররোধ বা ক্লান্ততা, ত্যাগ আরম্ভে জ্বালা। মূত্রস্থালী অধিক ক্ষীত ও শক্তিহীন হওয়া, এবং পুষ্য-রক্ত-মিশ্রিত ঘোলাটে প্রস্রাব। পুঁতি (Malaria) জরের পর এবং এককালে বলহীনতা অবস্থায় ইহা প্রযুক্ত। প্রসবের পর স্ত্রীলোকের প্রস্রাব আটকান।

ইউপাট-পর—সদা ত্যাগ ইচ্ছা সহ মূত্রস্থালীতে কনকনানি এবং মূত্রনাগী চিড়্ চিড়্ ও জ্বালা করা, এবং ফোটা কতক মাত্র ডগ্‌ডগে লাল ও শ্লেষ্মা-মিশ্রিত প্রস্রাব পতন। প্রস্রাব আটকান এবং তলপেট ফুল ও গরম হওয়া ; অল্প প্রস্রাব ও শ্বাস কষ্ট, এবং সর্বশরীর ফুলা। মূত্রাশয়ের প্রদাহ।

ইণ্ডিগো—নীল বর্ণের প্রস্রাব, কাপড় ধুইলেও দাগ না উঠা ; দিন রাত পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা ও প্রতিবার কষ্টে স্বল্প মাত্রায় ঘোলাটে প্রস্রাব সহ মূত্রস্থালীর তলা জ্বালা। মূত্রাশয়ের শূল বেদনা।

ইপি—অত্যন্ত ঘন, লালচে ও ঘোলা মূত্র এবং লাল তলানি পড়া। প্রস্রাব আটকান ও দড়কা।

ইরিডিরণ—মূত্রস্থালীর গ্রীষ্মার উপদাহ বশতঃ প্রস্রাবে অধিক রক্ত বা প্রচুর পরিমাণে স্বেতসার ক্ষরণ। দাঁত উঠাকালীন বা পাথুরী জন্ত মূত্র-ক্লান্ততা। পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ইচ্ছা ও তীব্র ঘ্রাণের প্রস্রাব।

উভা-আর্সি—পুনঃ পুনঃ বেগ ও অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ, পরে জ্বালা ও কনকনানি ; অধিক বেগ দিলে রক্ত ও শ্লেষ্মা ক্ষরণ।

ওপি—মূত্র সঞ্চয় না হওয়া অথবা আটকান—যেন পথ বন্ধ হইয়াছে ; কিম্বা অত্যন্ত প্রস্রাব এবং মূত্রস্থালী হইতে রক্ত পড়া। শৌচ প্রস্রাব বন্ধ ও বায়ু পর্য্যন্ত নিঃসরণ না হওয়া, পেট ফাঁপা এবং কিমন। ভয় জন্ত

ও প্রসবের পর রোগ । প্রসাব ( ও শৌচ ) বন্ধের ( বিস্ফটিকায় ) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

কফি—প্রসাব বন্ধ, পুনঃ পুনঃ কষ্টকর বেগ, এবং সময় সময় ফোটা-কতক মাত্র ত্যাগ ।

কলসিহ—বৃথা বেগ, অত্যন্ত মূত্র এবং ত্যাগকালীন পূর্বে ও পরে যাতনা, চট্‌চটে প্রসাব ।

কল্‌চি—অত্যন্ত ও কালীর যতন এবং ফোটা ফোটা ত্যাগ, শাদাটে তলানি; অথবা রক্ত বিশিষ্ট ও জ্বালাকর প্রসাব এবং কোমর হইতে উরু পর্য্যন্ত বাতের ব্যথা ।

কাঁহ—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রসাব বন্ধ, অথবা রক্তবিশিষ্ট ফোটা ফোটা ত্যাগ ও তৎকালে জ্বালা এবং পরে আরো অধিক যাতনা জ্বর কাতরানি ও চীৎকার । মূত্রাশয়ে প্রদাহ ও ছেঁড়া, বেঁটা । মূত্রস্থালীপ্রদেশ ফুলা, জ্বালা, কঁকন করা ও ছুঁইলে বেদনা এবং কোমর সেঁটে ধরা; কখন কখন শ্লেষ্মা ও পুষ্করণ । অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পানি, এমন কি, জল দেখা-তেও যাতনার বৃদ্ধি । ঠাণ্ডা বা আতঙ্ক জ্বর পীড়ার ব্যবহার্য্য ।

কানাবিস-ই—জ্বালাকর রক্তবিশিষ্ট ফোটা ফোটা প্রসাব ও কষ্টে ত্যাগ এবং বস্তিপ্রদেশ সেঁটে ধরা ।

কানাবিস-সা—মূত্রাশয়ে অতিশয় যাতনা । মিনিট কতক অন্তর রক্ত প্রসাব ও ত্যাগকালীন মূত্রনালী ছেঁড়া । বেগ দিলে অল্প অল্প ঘন মূত্র ত্যাগ । প্রথম প্রথম প্রসাবকালীন জ্বালা, পরে পুরুষ অঙ্গ ও কোষ জ্বালা ।

কাপ্প—পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা, ফোটা ফোটা গরম জর্দা মূত্র ত্যাগ । মূত্র লাল এবং মূত্রনালী জ্বালা ও চিড়্‌চিড়্‌ করা ।

কান্দর—মূত্রস্থালীর গ্রীবারী আক্ষেপ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা, বিশেষ অধিক পরিমাণে টারপিন তৈল ও কান্সারিস ব্যবহারের পর । প্রসাব আটকান বা অত্যন্ত ত্যাগ—মূত্রস্থালীর চাপুনি, মুড়া ঠাণ্ডা ও পায়ের ডিমে খাল লাগা । মূত্রনালী ও স্থালীর জ্বালা হইলে এবং প্রসাব সঞ্চয় না হইলে, ইহার আদত আরক নাকের গোড়ায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর ধরিলে ফল দেখা যায় ।

কালী-কা—মূত্রকৃচ্ছ্রতা; পাত্রে ধরিয়া নাড়া চাড়ায় প্রসাবে গঁজলা

উঠা ও থিতুলে লালচে তলানি পড়া। ডাইনে আরম্ভ হয় বাম পাতা, পরে সর্বশরীর ফুলা। চোট লাগা বা দীর্ঘকাল আর্দ্রস্থানে বাস জন্ম রোগ।

কালী-না—প্রসাব ত্যাগকালীন জ্বালা ও মূত্রমার্গে ফুঁড়ুনি। কাস্ত্র ও কাস্কর ব্যবহারে রোগ উপশমিত না হইলে।

কালী-বাই—মূত্রাশয়ে রক্ত সঞ্চয় ও তথায় প্রসাব সঞ্চয় না হওয়া। গাঢ় লাল প্রসাব ও পীঠ বেদনা। প্রসাব বন্ধ এবং কোমর ব্যথা।

কালী-হা—গণ্ডমালা ধাতুর মূত্রকৃচ্ছতা। দ্বার দিয়া সব্জ ধাতু ক্ষরণ। কষ্টে অত্যন্ত লাল প্রসাব, জর্দাটে তলানি, অত্যন্ত তৃষ্ণা, খ্যাখলানির ছায় পীঠে ব্যথা।

কিউবেব—প্রসাবের পর দ্বার কন্কনানি ও সঙ্কোচন।

ক্লেমেটিস—প্রদাহিক অবস্থার প্রথমে ব্যবহার্য। মূত্রমার্গের দীর্ঘকাল সঙ্কোচন জন্ম থাকিয়া থাকিয়া অল্প অল্প বা ফোটা ফোটা প্রসাব, ও তৎকালে জ্বালা, ফুঁড়ুনি।

কোনাই—অত্যন্ত মূত্র ও অতি কষ্টে শ্লেষ্মা পূষ ক্ষরণ; থাকিয়া থাকিয়া ডিড়িক ডিড়িক প্রসাব। পুরাতন রোগে বিশেষ উপকারী।

চিনিফিলা—প্রসাব খুব লাল ও তলানি রক্ত-বিশিষ্ট; রাত্রি পুনঃ পুনঃ ত্যাগ, অথচ কোন বারই ক্ষেপে না হওয়া; অতিশয় দুর্বলতা।

চেলিডন—মূত্রাশয়ে প্রদাহ। যকৃতের পীড়া জন্ম মূত্রকৃচ্ছতা।

জেল্গ—আক্ষেপ জন্ম প্রসাব বন্ধ ও সময়ে সময়ে থোলসা প্রসাব।

টেরিবিল্ড—মূত্রাশয়ে প্রদাহ, তথায় জ্বালা ৩ সেন্টে ধরা; পতি রাত্রি কাল রক্ত-মিশ্রিত প্রসাব, এবং তলানি গাঢ় ও বাঁই গুঁড়ার ছায়; কষ্টে মূত্রত্যাগ ও মূত্রস্থালীতে জ্বালা এবং মূত্রদ্বারের সঙ্কোচন। এককালে মূত্র বন্ধ।

ডক্কা—ঠাণ্ডা বায়ু বা হিমলাগা, অধিকক্ষণ জলে থাকা বা ভেজার দক্ষণ রোগ, ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। মূত্রস্থালী পূর্ণ, অথচ অনেক বেগ দিলে ফোটা কতক মাত্র কষ্টে ত্যাগ। প্রসাব ঘোলাটে, দুধের ছায় বর্ণ ও দুর্গন্ধ, এবং উহার সঙ্গে শ্লেষ্মা, পুষ ও খাঁকরি নির্গত হয়। শিশু মূত্রস্থালী-প্রদেশ হাত দিয়া চাপে, পা উপর দিকে তুলে ও কাতরাইতে থাকে।

ডি, —মূত্রাশয়ের কার্য্য রাহিত্য জন্ত প্রস্রাবের সঞ্চার না হওয়া বা অত্যন্ত ত্যাগ। মূত্রস্থালীর গ্রীবা-প্রদাহ ও তথা হইতে এক গাছা বিচালি বেন বাহির হইতেছে, এমন বোধ হওয়া। সৰ্বদা ত্যাগের ইচ্ছা ও প্রতিবার জ্বালা করা, ফোটা ফোটা গরম মূত্র পড়া, শয়ন করিলে প্রস্রাব অনিচ্ছাধীন ত্যাগ হইয়া যাতনার সমতা।

খুজা—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, অত্যন্ত বেগ; ফোটা ফোটা রক্ত-মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ, তাহা না হইলে অত্যন্ত চুলকুনি। প্রস্রাব পাতলা ও সবুজ। প্রমেহগ্রস্তের কিঞ্চিৎ বাহাদের মলাশয় বা জননেন্দ্রিয়ে আঁচিল থাকে, তাহাদের মূত্রকুচ্ছতায় অধিক থাকে।

নাইট্র-আ—মূত্রাশয়ে প্রদাহ—শ্বেতসার (Albumen) ক্ষরণ। কদর্য্য গন্ধের গরম অত্যন্ত কৃষ্ণ বা গাঢ় নীল বর্ণের রক্ত প্রস্রাব; প্রত্যহ একবার, বা এক অথবা সাত দিন অন্তর প্রস্রাব।

পলিগনস-প—ত্যাগকালীন মূত্রস্থালীর গ্রীবার কন্কনানি ও তথায় অবরোধ বোধ হওয়া এবং অনেকক্ষণ ঐ ভাব থাকা।

পল্‌স—ভিজ়ে কাঁথায় অনেকক্ষণ শয়ন জন্ত শিশুর প্রস্রাব বন্ধ। কফজ ধাতু; বিশেষ তলপেট অধিক গরম থাকিলে, অথবা আকন ও নক্স দিয়া প্রতিকার না হইলে ইহা দেওয়া বিধি। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা, কিন্তু নির্গত না হওয়া; তৎসহ মূত্রস্থালীর কন্কনানি ও জ্বালা এবং কোমর শক্ত হওয়া; শীত; ঠাণ্ডা বাতাসের ইচ্ছা। মূত্রস্থালীর গ্রীবার উপদাহ; ত্যাগের পর কন্কনানি ও তলপেট ভার এবং টাটানি। নড়া ব্যথা, শ্লেষ্মা বা রক্তবিশিষ্ট ও লাল্চে প্রস্রাব।

পিটোল—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত পাটলবর্ণের দুর্গন্ধ প্রস্রাব, অথবা ফোটা ফোটা পড়া ও মূত্রনালীর জ্বালা। পুরাতন রোগে ব্যবহার্য্য।

পিটোসিলিনম—হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হওয়া ও তৎক্ষণাৎ ত্যাগ না করিলে যাতনার জন্ত ওঁগট পালট খাওয়া। প্রমেহগ্রস্তের মূত্রকুচ্ছতা।

পেরেরা—অতি কষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ বা এককালে বন্ধ এবং মূত্র-স্থালীতে ও সময়ে সময়ে পীঠে অত্যন্ত ব্যথা, জোরে কান্না; কেবল হাঁটু গাড়িয়া প্রস্রাবে সক্ষমতা; উরু হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত ব্যথার



বিস্তার ও তজ্জন্য চীৎকার। শ্বেতাবিশিষ্ট ও নিসাদলের চড়া  
স্রাবের মূত্র।

কস্—ছেঁড়া হৃদের স্রাব প্রস্রাব, ঘন ও ঘোলাটে—শ্বেত-  
বিশিষ্ট তলানি। মূত্রনালী চিড়্ চিড়্ ও কনকন্ করা। মূত্র-  
শ্বেতসার থাকিলে ও রক্ত প্রস্রাবে ব্যবহার্য। ঐ স্রাব-  
ফুসফুসের প্রদাহ, সর্দি, হাড়ে ক্ষত থাকা, ইত্যাদি অ-  
ইচ্ছা বিশেষ খাটে। রক্ত প্রস্রাব ও অধিক বাতন।  
কীড়ার পর। এইরূপ রোগীদিগের প্রায়ই লম্বা, ও শক্ত মল কষ্টে ত্যাগ  
অথবা পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ হইয়া থাকে।

কস-আ—প্রস্রাব শাদা ও ঐ সঙ্গে হয়ত টুক টুক  
শ্বেতসার, তাপ, তৃষ্ণা ও ফেঁকাসে বদন, এবং হ্রস্বলভ। অথবা বাহারক  
অথবা (শীঘ্র শীঘ্র) বাড়—(বাড়ন্ত গড়ন) এমন শিশুর পক্ষে।

ফাইটোলাকা—শ্বেতসার-বিশিষ্ট ও গাঢ় লাল প্রস্রাব। মূত্রাশয় প্রদেশ,  
বিশেষ ডান দিকে, টাটান ও উত্তপ্ত। ত্যাগকালীন ও পূর্বে মূত্রস্থালী  
প্রদেশে ব্যথা এবং অধিক মাত্রায় তলানি পড়া।

ফেরম—রক্ত প্রস্রাব। মেরুদণ্ডের পীড়া বা আঘাত বশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

ফেরম-মে—প্রস্রাব ত্যাগে যাতনার সমতা, অধিক দাঁড়াইয়া থাকায়  
কষ্ট বৃদ্ধি।

বার্ব—মূত্রাধার প্রদাহ। মূত্র বহুসমূহে জালা, কনকনানি, ছেঁড়া।  
গাঢ় জর্দি বা রক্তের স্রাব প্রস্রাব ও লাল ভূমির স্রাব তলানি। সমস্ত  
তলপেট ও কঁকাল ব্যথা।

ব্রাই—মূত্র গরম, লাল, অত্যন্ত এবং ত্যাগের পূর্বে জালা ও  
কনকনানি।

বেনজ-আ—ব্রাণ্ডী সুরাপের স্রাব লাল ও বড় কড়া স্রাবের প্রস্রাব এবং  
এত গরম, সেন প্রস্রাবস্রাব পুড়িয়া যায়, স্তত্রাং সেই নিমিত্ত দিবা রাত্রে  
এক বারের অধিক ত্যাগে অক্ষম।

বেল—এককালে বহু বা ফোটা ফোটা গরম লাল প্রস্রাব, অতিশয়  
কাতরানি ও হঠাৎ চিক্ড়ে উঠা। অথবা ঘুমন্ত আক্কেপ হইয়া জাগা বা

মূত্রস্থালী স্পর্শ মাত্র দড়কা ও তজ্জন্তু কখন কখন হাত পা বাঁধিয়া কাষ্ঠবৎ হওয়া । ভয় হইতে রোগের উৎপত্তি ; বিশেষ শোণিত-প্রধান ধাতুতে ইহা উত্তম খাটে (ইপি, ইগ্নে, হাইয়স) । মূত্রাশয় হইতে মূত্রস্থালীতে তীব্র বেদনা—হঠাৎ ধরা ও হঠাৎ ছাড়া (এটা ঔষধের বিশেষ লক্ষণ) । মূত্রাশয়-প্রদেশ গরম হওয়া ও ফুলা । মূত্রস্থালীর মধ্যে যেন কুমি সড় সড় করা, কোমর ভেঙ্গে পড়া ।

বোরাঙ্ক—প্রস্রাবের পূর্বে চেকড়ান—মূত্র ঝাঁঝাল ও গরম এবং তাহাতে দুর্গন্ধ হওয়া ।

মার্ক—সর্বদা ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব গাঢ় লাল, কখন সবুজ, অত্যন্ত, এবং ধরিয়া রাখিলে শীঘ্রই ঘোলা ও দুর্গন্ধ হয় । সুকুধারে বা ফোটা ফোটা পতন ও শ্লেষ্মা, পূষ বা রক্তবিশিষ্ট হুওন এবং ত্যাগকালীন ঘাম, রাত্রী যন্ত্রণার বৃদ্ধি । প্রস্রাব আট্‌কান ও মূত্রস্থালীর বেগ । ত্যাগের পর পুনর্বার প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বার জালা । জনক জননীর গরমির পীড়া জন্ত সন্তানের গাত্রে ক্ষত, ফুস্‌কুড়ি ও মূত্রকৃচ্ছ্রতায় বিশেষ খাটে । মূত্রাধারে ফোড়া ও তাহা পাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ।

মার্ক-ক—প্রস্রাবে অতিরিক্ত শ্বেতসার থাকা (বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রস্রাবের পর), এবং চড়া ভ্রাণের অত্যন্ত লাল মূত্র ত্যাগ ।

রস—রক্তের ন্যায় প্রস্রাব এবং ফোটা ফোটা ও কষ্টে ত্যাগ ; অধঃ অঙ্গ নাড়িতে ওরুল । বাতগ্রস্তের মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও তলানি বরফবৎ শাদা । ভেজা বা অঙ্গ কচিয়া যাওয়ায় রোগ । মূত্রাধারপ্রদেশ ছেঁড়া, অস্থিরতা, পাশ ফেরায় স্বস্তি ; সর্ব স্বরীর ফুলা ।

লাইক—মূত্ররোধ বা কৃচ্ছ্রতা ও বায়ু জন্ত পেট ডাকা । প্রস্রাবের পূর্বে কোমর ব্যথা জন্ত শিশুর চীৎকার, ত্যাগ আরম্ভে স্বস্তি, তলানিতে টক গন্ধের লাল বালি ; ঐ সঙ্গে উদরাময় থাকিলে বিশেষ খাটে । প্রস্রাব আট্‌কান ; ত্যাগ করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর নির্গত হওয়া, এবং উহা ঘোলাটে শর্টাদা ও ঘন পূষবৎ, ভ্রাণে বমি আইসে । মূত্রাধারে বেদনা । পাখুরীর জন্ত দ্বার দিয়া রক্ত পড়া ।

লাকাসি—বিলক্ষণ বেগ আসে কিন্তু বাহির হয় না । গাঢ় হরিদ্রা বা

লাল, কিম্বা কৃষ্ণবর্ণের এবং কখন কখন গাঁজলাটে প্রস্রাব। মূত্রনালী জালা ও কদর্য স্লেয়ার্গ নির্গমন। মূত্রস্থালী বা পেটে যেন একটা গোলা ঘুরিতেছে, বোধ হওয়া। স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া, বায়ু বা শেষ ঋতু-সন্ধি বা প্রৌঢ় কালে প্রস্রাব-কষ্টে ব্যবহার্য্য।

লিলিয়ম—মূত্রস্থালীতে নিয়ত চাপ জন্ম সর্বদা প্রস্রাব ত্যাগে ইচ্ছা, অত্যন্ত ত্যাগ, পরে অধিক চিন্চিনানি ও বেগ।

লোবেলিয়া—গাঢ় লাল বর্ণের প্রস্রাব ও প্রচুর পরিমাণে লাল তলানি পড়া। মূত্র-স্থতসার রোগে ব্যবহার্য্য।

ট্রাম—প্রস্রাব সঞ্চয় না হওয়া বা অবরোধ হওয়া, বিশেষ জ্বর রোগে।

সল্ফর—বিকৃত বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পীড়া। ঠাণ্ডী লাগিলেই মূত্ররোধ। অথবা ক্রূপ রোগ; হৃগন্ধ ফোটা ফোটা মূত্রসহ স্লেয়া ও পুষ-মিশ্রিত রক্ত ক্ষরণ। ত্যাগের পূর্বে মূত্রনালীতে জালা। অর্শগ্রস্তের মূত্রকৃচ্ছ তার প্রাতে এইটী ও বৈকালে নম্ন।

সার্সা—প্রস্রাব বেগ কালে কনকন করা, ত্যাগকালীন ও পূর্বে কান্না, মূত্রনালীতে অতিশয় বেদনা এবং তথা হইতে উর্দ্ধে পেটে যাওয়া। শেষাশেষি রক্ত নির্গত হইয়া বাতনা দূর হওয়া। মূত্রে অনেক লাল বালিকণা থাকা। প্রস্রাব কালে মূত্রস্থালী হইতে বায়ু নির্গমন।

সেনেসিও—পাথুরী নির্গত হওয়ার পর মূত্রাধার ও নালীর প্রদাহ।

সেপি—ত্যাগকালীন অধিক জালা ও কনকনানি, মূত্রে ভয়ানক হৃগন্ধ ও তলানি কাদার ছায় (সরায় লেগে থাকা), মলদ্বার ভাঁর, এবং বদন জর্দা, বিশেষ নাকের এড্‌এড়িতে হল্‌দে দাগ পড়া।

হাইয়স—মূত্রস্থালী স্ফীত হওয়া ও প্রস্রাব আটকান। বোলাটে প্রস্রাব সহ তলানিতে স্লেয়া বা পুষ; জিব শুষ্ক হওয়া ও তৃষ্ণা; প্রলাপ। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর এবং শিশুর মস্তকের পীড়া সহ মূত্ররোধ।

হেল—প্রদাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়া, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও তজ্জন্ম আক্ষেপ।

গরম জলে স্নান ও পীড়িত প্রদেশে গরম জলে সেক দেওয়া বা ফোমেন্ট করা; কখন কখন মলদ্বার দিয়া পিচকারী এবং নিত্য আবশ্যক হইলে যন্ত্র

দ্বারা প্রস্রাব করান বিধি । পথ্য লঘু ; মাংসাদি নিষিদ্ধ ; যব ও গঁদের জল, মাশকলাইয়ের যুস, পুরাতন তেঁতুল, ইত্যাদি ব্যবহার্য্য ।

## রক্ত প্রস্রাব ।

পূর্ব প্রবন্ধে রক্ত প্রস্রাবের কয়েকটি ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে । এ স্থলে বিশেষ করিয়া লেখা যাইতেছে । মূত্রগ্রস্থি ( মূত্রাশয় ), মূত্রনালী, মূত্রস্থালী, মূত্রমার্গ, ইহাদের সকল গুলি হইতেই রক্ত পতন হয় । সর্ব প্রথম মূত্রাশয় হইতে হইলে, তৎপ্রদেশ বেদনা ও অধিক রক্তযুক্ত হয় । প্রস্রাবের সহিত সেই রক্ত মিশ্রিত থাকে । মূত্রস্থালী বা নালী হইতে হইলে, অত্যধিক রক্ত থাকে না বা ওরূপে মিশে না, প্রায় প্রস্রাবের শেষে নির্গত হয় । মূত্রমার্গ হইতে হইলে, প্রস্রাব হয় না, ঐ পথ হইতে চোয়াইয়া ফোটা ফোটা শোণিত পতিত হয় এবং ইহার পর কখন কখন শ্লেষ্মাও দেখা যায় । অর্শ, পাথুরী, প্রস্রাবে স্বেতস্মার, মূত্রমার্গে রক্ত সঞ্চয় বা তথায় ক্ষত থাকি, ইত্যাদি কারণে প্রস্রাবযন্ত্র দিয়া রক্ত পতন ঘটে । হাম, বসন্ত এবং পিত্তশ্লেষ্মা জরের রক্তপ্রস্রাব কুলক্ষণ ।

আণিকা—পতন, আঘাত বা পাথুরী জন্ত রক্ত পড়া ।

ইপি—প্রচুর রক্তপ্রস্রাব, বদন পান্সাশ বর্ণ, গা বমি বমি, পেট ও মূত্রমার্গ কনকনানি ।

কাশ—সর্বদা ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব সহ রক্ত বা পুষ্ ক্রমাগত ফোটা ফোটা পড়া ।

কাম্ফর—টারপিন তৈল বা ব্লেস্তারা ব্যবহার জন্ত রক্ত প্রস্রাব ।

ট্রিলিয়ম—হৃৎসলীর অধিক পরিমাণে প্রস্রাবদ্বারা দিয়া রক্ত পড়া ।

নক্স—অধিক ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার, অতিরিক্ত সুরাপান, অর্শ বা ঋতু-বন্ধ নিবন্ধন প্রস্রাবে শোণিত ।

নাইট্রি-আ—অধিক পারা ব্যবহার বশতঃ প্রস্রাবদ্বারা দিয়া অধিক শোণিত নির্গত হওয়া, ঘোড়ার চোনার ত্রায় চড়া মূত্র ।

ক্ষম—যথায় রক্ত বিকৃত হইয়াছে ( সিকেল ) ; ষাঁহাদের সামান্য চোটে অধিক রক্ত-পতন হয়, এমনত অবস্থায় শোণিত প্রস্রাব ।

মার্ক—মূত্রমার্গ হঠাতে রক্তস্রাব । •প্রস্রাবে যেন রক্ত ও পুষ্টি মিশ্রিত ।

মিলিফলিয়ম—প্রস্রাব ত্যাগের সমধিক ইচ্ছা এবং দ্বার দিয়া অতিরিক্ত শোণিত স্রাব ।

মেজেরিয়ম—রক্ত পাতলা, প্রায় জমাট হই না এবং সামান্য ব্যথা ।

সিকেল—মূত্রাশয়ের পীড়া জন্ত কষ্ট না হইয়া পাতলা শোণিত পতন ; খুব দুর্বল ও শরীর ঠাণ্ডা ।

হ্যামেমেলিস—প্রস্রাব সহ রক্ত পাত ।

পথ্যের ব্যবস্থা—অগুণ ।

## পাথুরী ।

এই রোগ সকলেরই হয় । প্রস্রাব সহ কঁাকর নির্গত হইলে রোগ নির্ণয়ের সন্দেহ থাকে না ; তদভাবে নিম্নস্থ উপসর্গ দ্বারা ব্যাধি নিশ্চয় করা যায় । আঁত কষ্টে কোটা কতক রক্তের ভ্রায় লাল প্রস্রাব ত্যাগ, এবং পাত্রে ধরিয়া রাখিলে হড়্‌হড়ে আম বা পুষের ভ্রায় তলানি পড়া । পাথুরীকণা বা মূত্র-রেণু নামিবার সময় কষ্টের একশেষ হয় । যাতনার ধমকে চীৎকার ও কান্না এবং হাত দিয়া পেট চাপিয়া শিশু ছুটাছুটি করে । কখন কখন হাত মুঠা করিয়া বাঁধে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়, সর্ব শরীর কাঁপিতে থাকে, হাত পায় চিড়িক্‌ মারে এবং কচিং বা দড়্‌কা হইয়া জীবন যাত্রা সমাপ্ত করে । ইহার সঙ্গে পেট ব্যথা, বমন ও কখন কখন ভেদ হইয়া থাকে । মূত্রস্থালীতে পাথুরী হইলে, ঘন ঘন অত্যন্ত ঝাঁঝাল প্রস্রাব হয় ও উহাতে অধিক প্লেগ্মা থাকে । মূত্র ত্যাগ হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধ হয় এবং ষোড়া বা গাড়ি চড়ায় কিম্বা আবড়খাবড় ( অসম ) রাস্তায় চলা ফেরা করায় প্রস্রাবের সাঁহিত রক্ত মিশ্রিত হইয়া পড়ে ।

মূত্রাধার, পিত্তকোষ ও মূত্রস্থালীতে পাথুরীর সঞ্চার হয় । মূত্রাশয়ের রোগে তৎপ্রদেশে বেদনা ও চাপুনি বোধ হয় ; হঠাৎ ব্যথা ধরে ও ক্রমে

সমস্ত পেটে উহা বিস্তৃত হয়। বমন ও টাঁৎকার এবং যে দিকের মূত্রগ্রস্থির পীড়া, সেই দিগের ঔষধকোষের শিট্‌কিনি ও পায়ের যাতনা হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা পাথুরীতে বালুকা, এটেল মাটি ও চূর্ণ পাওয়া যায়, তবে ইহাদের এক বা অল্পের আধিক্য ইহার গঠনে দেখা গিয়া থাকে। সেই সমস্ত বৃষ্টিয়া তাহার সঙ্গ ঔষধ, যথা—প্রথম পক্ষে সিলিসা ; দ্বিতীয় পক্ষে আলুমিনা এবং তৃতীয় পক্ষে কাল্কা, ফস্ বা ফস্-আ দেওয়া বিধি।

পিত্ত জমাট হইয়া কখন কখন পাথুরী হয়, এবং কোষ হইতে নামিবার সময় উপর পেট ও যকৃৎ প্রদেশে ইঠাৎ ভয়ানক বেদনা ধরে এবং ঐ সঙ্গে কাট নেকার বা বমন হইতে থাকে ; ত্বক হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং ব্যাথা আবার ইঠাৎ ছাড়ে। ইহার ঔষধ—ইলাট, কাল্কা, লাটিক, সল্‌ফর, সিলিসা ইত্যাদি। ব্যাথা ধরা কালে—আকন। ডাং এঞ্জেল কহেন, যে চিন ঔষধে পাথুরীকে দ্রব করে এবং সে বিষয়ে ইহা এ ব্যাধির ব্রহ্ম অস্ত্র।

মূত্রস্থালীর পাথুরীতে মূদার বেদনা, মূত্রমার্গের চুলকুনি, কষ্টে প্রস্রাব, এবং ত্যাগ হইতে হইতে বন্ধ ও তলানিতে বালুকা এবং কখন কখন (বিশেষ অধিক শ্রমের পর) প্রস্রাবে রক্ত থাকা লক্ষণ। ক্ষুদ্রাকারের হইলে ইহা প্রস্রাব সহ নির্গত হয়। অথবা জলের টবে বসিয়া তাহার মধ্যে মূত্র ত্যাগ করা বিধি। বড় হইলে সূদগ্ধ চিকিৎসক দ্বারা উহা মূত্রস্থালীতে চাপিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া, অথবা যন্ত্রদ্বারা কাটিয়া বাহির করা ঘাইতে পারে। ইহার ঔষধ সার্সা, আন্ট, কানাবিস, কাস্ত, কাল্কা, পিট্টোল, ফস, রুটা, সিলিসা।

মূত্রস্থালীতে পাথুরী নামিলে যাতনা যায়। পাথুরী নামার বেদনা ভয়ানক ও অসহ্য। নিতান্ত শিশু না হইলে, গরম জলের টবে বসাইয়া নিয়ত গরম জলের ধারাগী দিলে, পাথুরী শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হওয়া সম্ভব। অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণার্থ সর্ব প্রথম কাম্‌ফর ওয় ক্রমের এবং বয়স্কদের আদত আরক পাঁচ মিনিট অন্তর চিনিতে ফেলিয়া থাইতে দিবা। ইহাতে প্রতি-কার না হইলে আকন ও কাসো ৫।১০ মিনিট অন্তর এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে কানাবিস ও কাস্ত পর পর অথবা জেলস, বা নক্স বা লোবেল

এবং ঐ সঙ্গে ফ্লানেল বা কষল দিয়া গরম জলের সেক এবং প্রচুর পরিমাণে বার্লি বা জবের জল পান করিতে দিবা ।

আসপারেগস—পুনঃ পুনঃ ত্যাগের ইচ্ছা, প্রস্রাব কালে মূত্রাধার ও নালীতে কন্কনানি—অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও শাদাটে তলানি ।

ইউপাট-পর—মূত্রস্থালীর উপর ইহার বিশেষ কার্য দেখা যায় । প্রস্রাব অত্যন্ত ও সেই সঙ্গে মূত্রেণু ( Gravel ) নির্গত হয় । কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে পাথুরীকে দ্রব করে—সঞ্চয় হইয়া বাঁধিতে দেয় না ।

ওপি—মূত্র যন্ত্রে-বেন কসিয়া চাপুনি বোধ ও সন্ধীর্ণ স্থান দিয়া কোন পদার্থের নির্গমন । মূত্রস্থালী ও অণ্ডকোষে বিহ্বলি । হড়্‌হড়ে লালা ও পিত্ত বমন উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা । নাড়ীর মৃদু গতি ।

ইলাট—পিত্তিকোষের পাথুরী । ডান কোঁক ও উপর পেটে মৃদু মৃদু বেদনা । ইহা কিছু দিন সেবনে মলের সহ পাথুরী নির্গত হয় ।

কাস্তু—মূত্রাধার হইতে মূত্রস্থালীতে চাপুনি ভার বোধ—ফোটা ফোটা জ্বালাকর রক্ত বিশিষ্ট প্রস্রাব এবং মূত্রনালী ও স্থালী সেঁটে থাকা । বালকের পাথুরীতে পুরুষ অঙ্গ পর্য্যন্ত উপদাহ ও সর্বদা উহা টেনে ধরা ।

নক্স—বেদনা, বিশেষ ডান মূত্রাশয়ে, এবং জননযন্ত্রে ও ডান পা অবধি তাহার বিস্তৃতি ; কুচকি দ্বয়ের সংকোচন এবং অণ্ডকোষ উর্দ্ধে উঠা ; গা বমি, বমি, বমন ও মূত্রস্থালীর বেগ । বুথা বাহ্যের চেষ্টা ।

পড—কোষে পিত্তের জমাট বাধিয়া তথায় পাথুরী ও অত্যন্ত বেদনা । ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়—যথা এক হইতে পাঁচ গ্রেণ । তৎপূর্বে এক সপ্তাহ তিন বার করিয়া জলপাইয়ের তৈল অস্ততঃ অর্দ্ধ পাইন্ট খাইতে দেওয়া হয় । প্রথম বারে পাথুরী নির্গত না হইলে ক্যালামেল ১০ গ্রেণ খাওয়াইয়া ইহা দিলে অধিক ফল হয় ।

ফস—প্রাচীন ও ভূয়কায় ব্যক্তির এক সময়েই অসামান শৌচ ও প্রস্রাব । ত্যাগ করিতে করিতে প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ । নিসাদলের ত্রায় মূত্রের ঝাঁঝ এবং শাদাটে বা স্নরকীর ন্যায় তলানি ।

বার্ভ-ভ—পিত্তজনিত পাথুরী, বিশেষ ডান দিকের অধঃপঞ্জরের নিম্ন প্রদেশে শূল ব্যথার ত্রায় বেদনা ; পৈত্তিকের ভেদ বমন ।

বেল—প্রস্রাব আটকান ও ফোটা ফোটা পড়া। মূত্রনালী হইতে মূত্রস্থালী পর্য্যন্ত আক্ষেপযুক্ত বেগ ।

লাইক—পাথুরীসহ রক্ত প্রস্রাব ; ডেলা ডেলা রক্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরী-কণা নামিবার সময় যাতনার একশেষ। মূত্রাধার ও স্থালীর বেদনা ; জালা, কনকনানি, প্রস্রাবে কাল কাল বালুকা থাকা ও ছুঁগন্ধ হওয়া এবং ত্যাগের পূর্বে কান্না । লাল ও জর্দা তলানি। পাথুরী নামিবার কালে ইহার ব্যবহারে যাতনা কমায় এবং ঐ বালিকণাকে জমাট বাঁধিয়া পাথুরী হইতে দেয় না। ,

লেপ্টাণ্ডা—পিত্তকোষ বেদনা, কৃষ্ণবর্ণের মল এবং পাথুরীতে এ ঔষধে বিশেষ ফল পাইবার সম্ভাবনা।

সার্সা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরীকণা ত্যাগ ও প্রস্রাবসহ রক্ত। মূত্র কাদাটে বালুকাকৃতি বিশিষ্ট। ত্যাগের পূর্বে চেকড়ান এবং বিছানায় বালুকা পড়া। প্রস্রাবের পর বড় যাতনা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে অসহনীয়। বাত রোগের সঙ্গে পাথুরী থাকিলে এই ঔষধ বিলক্ষণ ফলদায়ক।

সিকুটা—পাথুরীর যাতনা জন্ত হাত পা কাষ্ঠবৎ। অত্যন্ত কাঁপুনি থাকিলে ইহার এক মাত্রা, পরে দড়কা উপস্থিত হইলে আর এক ঔষধ বিধি।

পাথুরী নির্গমনকালীন আক্ষেপ ও বেদনা অতিরিক্ত হইলে যুবার পক্ষে আধ ঘণ্টা অন্তর (যে পর্য্যন্ত সমতা না হয়) এক ড্রাম করিয়া ইথর দেওয়া উচিত। ডাঃ ডুবাস্ত কহেন যে, সমভাগ ইথর ও টারপিনতৈল প্রয়োগে পাথুরী গলিয়া গিয়া সকল বস্তু দূর করে। বিষয়ীর অধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হইলে আলোপ্যাথিক স্ফটিকিংসকের মত লওয়া কর্তব্য। সাবধান, যেন কোন মতে অপকার না হয়। 'অনুগ্রহ আহার এবং চোয়ান জল পান বিধি।

## বালিকার প্রদর।

বয়স্কার ছায় বালিকারও গুহ অঙ্গ দিয়া ধাতু ভাঙ্গে। স্ত্রীঅঙ্গ অপরি-কার থাকা, কুমির উপদাহ অথবা ধাতুর বিকৃতি জন্ত এই পীড়া দেখা দেয়।



অল্প উষ্ণ জলে অঙ্গ পুনঃ পুনঃ ধোত করা, ষট্খটে পরিষ্কার ও বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস এবং পুষ্টিকর ও অনায়াস-জীর্ণ আহার বিধি ।

কাক্সা—গণ্ডমালা ধাতু, শরীর ফেঁকাসে ও লোলত্বক হওয়া, পায়ের পাতা সঁর্বদা ঠাণ্ডা ও আর্দ্র থাকা, জ্বীঅঙ্গ দিয়া সিক্কনির ত্রায় ধাতুর কারণ ।

গ্রাফাইট—প্রচুর ও জলবৎ প্রদর এবং নির্গমন কালে দ্বার কুট্‌কুটনি । চর্ম্ম রোগগ্রস্তের, বিশেষ যাহার খাঁজের স্থানে (যথা কাণের পেছন) হাজ্জে ।

নক্স—জর্দা ও হুর্গন্ধ প্রদর এবং নির্গমন কালে দ্বার শুড়্‌শুড়্‌নি, স্বভাবতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্ত ।

পলস—প্রদর ঘন, জ্বালাকর ও দুধের ত্রায় এবং জ্বীঅঙ্গের বহির্ভাগ ফুলা ।

সল্‌ফর—চর্ম্মরোগগ্রস্তের পীড়া, কটু ও ক্ষয়কারী প্রদর ; বিশেষ যথায় টিহা লাগে, তথায় হাজ্জিয়া যাওয়া ।

ঔষধ প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এক মাত্রা করিয়া এক সপ্তাহ দিয়া, ১০ দিন বন্ধ । অবস্থা বুঝিয়া প্রথম বা তৎকালোচিত অপর ঔষধ পূর্ব্ব নিয়মে দিবা ।

### আত্মমৈথুন ।

বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের গঠন ও মনের ভাব রূপান্তর প্রাপ্ত হয় । সৌন্দর্য্যরাশি এবং লজ্জা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আর একরূপ করিয়া তুলে । তখন আর বাল্য ক্রীড়া লাগে না । এই অভিনব শক্তিই সংসার বন্ধনের মূল । ইহা হইতেই বিবাহাদি সম্বন্ধ, 'ইহা' হইতেই সম্ভান উৎপাদন এবং ইহাই সমাজ বন্ধন ও উন্নতির আকর । কামটা পাশব বৃত্তি বলিয়া ভদ্র ও সভ্য মহাশয়েরা ইহার কথা উল্লেখ করিতে কিস্ত করেন । ইহা যেন অপবিত্র ও ইহা হইতে অন্তর থাকা যেন শ্রেয়ঃ । তজ্জন্ত ইহার কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন । কিন্তু ভগবানের সংসারে কিছুই লুক্কায়িত বা অপবিত্র নাই । পবিত্র মনের পক্ষে সকলই পবিত্র । এইজন্ত প্রেম, রূপ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্ভানকে হিতকর উপদেশ দেওয়া গুরুজনের একান্ত কর্তব্য । তাহা না দিলে কুসঙ্গ ও কুমন্ত্রণার

বশবর্তী হইয়া তাহারা মন্দ মার্গ অবলম্বন করিবে এবং নিজের ও সমাজের ধ্বংসপর্যন্ত অহিত সাধিবে । ধর্মলীলা বিবাহ প্রচলিত থাকায় বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অনেকটা অমঙ্গলের হাত এড়ান যায়, তবু যে সব কুপ্রথা প্রচলিত আছে, বিশেষ সহর অঞ্চলে, তৎসম্বন্ধে গির্নাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক । আমরা এস্থলে বালক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব এবং বাটীর কর্তা মাত্রেয়ই এ সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করা উচিত ।

পাঠশালা ও স্কুল, বিশেষ বোর্ডিং বাটীতে, অধিকাংশ সময়ে এই কুসংস্কারে বালকগণ দীক্ষিত হয় । বুড়া খাড়িরা ছোটদের গুরু হন । একজনে সমুদয় ক্লাশ বা স্কুলের সর্বনাশ করিতে সক্ষম ।

আত্মমৈথুন আপাততঃ স্বত্বকর । নূতন কাকের বিষ্ঠা ভোজনের ঞায়, ইহারা অল্পে তৃপ্ত হয় না । এই কু অভ্যাসের চালনা যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া উঠা ভার । অল্পে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে শরীর, মন ও জীবাত্মার দুর্বলতা এবং অধোগতি ঘটে । স্মরণশক্তি কমায়, মনোমালিন্য ও বুদ্ধিব ক্ষীণতা হয়, পবিত্রতা ও নির্মলতার চেহার্য অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং স্মারকিক ও জীবনী শক্তির বিলক্ষণ হ্রাসতা হইতে থাকে । এই জঘন্য কু-অভ্যাসের অধিক চালনায় অনেক সময় পুংঅঙ্গ দিয়া রক্ত নিঃসরণ, সৈকদা স্বপ্ন ভগ্ন এবং কেহ কেহ বা এককালে পুরুষত্ব বর্জিত হইয়া জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ থাকেন । ডাক্তার গ্যাস্ট্রন এ বিষয়ে যে বৃহৎ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িলে এই অস্বাভাবিক পথের পথিক নিতান্ত পাপমতির ও শরীর সিহরিয় উঠে—ভাবী অমঙ্গলের সম্পূর্ণ ছৎপ্রত্যয় জন্মে—অতএব ইহরাজীতে অভিজ্ঞ বালক মাত্রেয়ই সে পুস্তক পাঠ করা উচিত । এবং ভরসা করি, কোনো সুযোগ্য সমাজ-হিতৈষী বৃথা লজ্জা ত্যাগ পূর্বক সেই মহোপকারী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া এ দুর্জয় অনিষ্ট শ্রোতের রোধ করেন । ডাং গ্যাস্ট্রন পুনঃ পুনঃ অভিভাবকগণকে লজ্জা ছাড়িয়া স্ব স্ব অধীন বালকগণকে ইহার ভয়ানক অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন ।

স্কুলে সম-বয়স্কদের এক শ্রেণী বন্ধ করা উচিত, মাঝে মাঝে দুই একটা বুড়া ছোকরা থাকায় সব খারাপ করে । বোর্ডিং স্কুল বড় ভয়ঙ্কর স্থান, ইহার অধ্যক্ষ ধর্মভীরু চৌকোস লোক হওয়া আবশ্যিক । বাঙ্গালার প্রথম বোর্ডিং

স্কুল স্থাপক ৮প্যারীচরণ সরকার প্রকৃত পক্ষে যোগ্য লোক ছিলেন। যে পক্ষে ভাবি, তাঁহার তুল্য লোক মেলা ভার। চরিত্র সম্বন্ধে সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট আদর্শ স্বরূপ হইবেন। বোর্ডারেরা তাঁহাকে পরম বন্ধু বলিয়া জানিবে। ছুট বালকেরাও যেন ভয় অপেক্ষা তাঁহাকে প্রেম অধিক করে। ছাত্র-বৃন্দের তো কথাই নাই, তথাকার কর্মচারিরাও যেন তাঁহার প্রতি ভক্তিবান থাকে। ছুট গুরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। ইহা ভাবিয়া অধ্যক্ষের কর্ম করা কৰ্ত্তব্য।

মদ্যপায়ীর ন্যায় এই কুঅভ্যাসে যে পাকা হইয়াছে, তাহার ইহা ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য। আপন ইচ্ছার উপর তাহাদের কর্তৃত্ব শক্তি থাকে না। বেচারী এই নেসার নিতান্ত অধীন হইয়া পড়ে। “ক্রমে ক্রমে ইহাকে ছাড়িব” এরূপ মনে করা হুরাশী মাত্র। এককালে পরিত্যাগ করাই আবশ্যক এবং আদিরস ঘটিত দৃশ্য বা কথোপকথন বা পুস্তকাদি পাঠ অকৰ্ত্তব্য। অধিক কি মনেও এরূপ ভাব উপস্থিত হইতে দেওয়া অমুচিত। সংসঙ্গ, সুপুস্তক পাঠ, ধর্ম্মে আস্থা, সুনীতির চর্চা এবং আপনি যে দেবাংশ, ইহার চিস্তন সহিত সংকার্য্যে মনোনিবেশ, এ রোগের মহৌষধ। স্তদতিরেকে, প্রত্যহ, সহ্য হয় তো, দুই বার স্নান, সকাল সন্ধ্যায় ব্যায়াম, খালি তক্তায় কাঠের উপর (লেপ কাঁথা ভিন্ন) শয়ন এবং খুব প্রত্যাষে উঠিয়া ধীর বায়ু সেবন, ইত্যাদি সূনিয়মে কিছুকাল চলিলে এবং মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে পুনর্ব্বার সহজ পবিত্র ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবে। এবং সেইরূপে পুনঃ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই উন্নতির পথে অগ্রসর ও সুস্থ দেহে ষথার্থ মানব নামের যোগ্য হইতে পারে।

কাক্সা—ক্ষুধি হীনতা এবং কাদিবার ইচ্ছা। রাত্রে পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা-ধীন বীৰ্য্যস্থলন। পায়ে পাতা শীতল হওয়া, দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

কার্বো—পুনঃ পুনঃ বীৰ্য্যস্থলন, পরে মূত্রমার্গে জালা এবং প্রস্রাব ত্যাগে প্রচণ্ড কনকনানি ও জালা, এবং উহা অনেকক্ষণ অবধি থাকা।

কুপ্রম-স—রাত্রে স্বপ্নদোষ; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিক খাটে।

খুচিন--আল্‌মেন-কারীর রাত্রে দুর্ব্বলতাজনক স্বপ্নদোষ (ফস-আ);

জীর্ণ শক্তির ন্যূনতা ; অক্ষুধা ; রাত্রে ঘাম বশতঃ বড় কাবু ও কাহিল বোধ হওয়া ।

নক্স—রাত্রে বীৰ্য্যস্থলন ও স্নায়ুর পাতা ঠাণ্ডা হওয়া । রাগী, হিংস্রটে, চট্টাভাব ও একা থাকিতে ভালবাসা । রাত্রে রক্তমিশ্রিত রেতঃপাত । স্বভাবতঃ কঠিন ও বৃহদাকৃতি মল । যে সকল ব্যক্তি বড় অনিয়মে থাকে ও যাহারা ঔষধখোর ( অধিক পরিমাণে ঔষধ খায় ) তাহাদের ইহা উপযোগী ।

পল্‌স—আত্মমৈথুনকারীরা বীৰ্য্য পতন । রাত্রি দুইবার স্বপ্নভঙ্গ । নিদ্রাকালে বীৰ্য্য ক্ষরণ এবং পর দিন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ORCHIS ভয়ানক ভার ভার । প্রস্রাবের পরই বীৰ্য্যের আকার ও বর্ণের ধাতুর ক্ষরণ সহ জালা । রাত্রে পুং অঙ্গের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা এবং মূত্রাশীর গ্রীবীর নিকটস্থ গ্রন্থি ( Prostate Gland ) হইতে রস ( ধাতু ) ক্ষরণ ।

ফস-আ—পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছাধীন বীৰ্য্য ক্ষরণ—বিশেষ আত্মমৈথুনকারীরা প্রচুর পরিমাণে ভোরে দুর্বলতাজনক ঘাম । স্নায়ুগুলীর উপর অধিক কার্য্য । সৰ্ব্ব বিষয়ে ঔদাস্য—এমন কি কথার উত্তর করিতেও রাজি নয়, একরূপ অবস্থায় ।

মক্সস—অনিচ্ছাধীন রেতঃপাত, এবং প্রস্রাব ত্যাগের সময় কষ্ট ।

মার্ক-স—দিবসে আহারান্তে অল্প বা আদু ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নভঙ্গ, পরে প্রস্রাব ত্যাগে দ্বন্দ্ব জালা ।

মেজের—অনিচ্ছাধীন রেতঃপাত, পরে উত্তেজনা ও সৰ্ব্বশরীর শিড়-শিড়নি ।

• লেডম—রাত্রে রক্ত বা জলব্লব রেতঃপাত এবং তাহার পর নেতিয়া পড়া বা নির্জীব হওয়া, অঙ্গ নাড়িতে অক্ষমতা ।

ষ্টাফিস—আদিরস বাটত স্বপ্ন ও রেতঃপাত ; একরূপ উপর্য্যাপরি পাঁচ রাত্রি হওয়া । স্বপ্নদোষের পর উভয় বাহু দুর্বল ও ভারি ভারি—যেন সীমা পোরা । দিবসে আহারান্তে সামান্য তন্দ্রাকালে অতি প্রাচীনের স্বপ্ন ভঙ্গ । অত্যন্ত বদ্-মেজাজ, চট্টা ভাব, আপন রোগের কথা লইয়া অগ্নিকে জ্বালাতন করা, চক্ষুর পাতার কিনারায় প্রদাহ । স্রবণশক্তির দুর্বলতা ।

পথ্য—নিরামিষ আহারই শ্রেয়ঃ ; স্মরার কথা ত মনেই—চা পান পর্য্যন্ত নিবদ্ধ । তবে বহুকালের অভ্যাস থাকিলে একদলে ছাড়া কঠিন । পেঁয়াজ অবিধি । খাঁসাহেবেরা ইহা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যবহার করেন—ফল, গায়ের গন্ধে নিকটে বসা যায় না । উদর মধ্যে বাহ্য প্রবেশ করে, তাহাতে তত দোষ নাই, কিন্তু শরীর হইতে বাহ্য বহির্গত হয়, তাহাই অস্থখের ও দোষের আকর । ঐ কথা আঁপাততঃ স্মৃতিতে মন্দ, কিন্তু আহার সম্বন্ধে আর্থা বুধেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন গাং নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয় । বীর ক্ষত্রিয়-গণের জন্ত বন্য বরাহ পত্যাংসে খাইতে বিধি, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী শূকর এবং মুবগী বারণ । স্বেচ্ছার উৎকর্ষ ব্যবস্থা ? তবে চলতি বচন শিরোধার্য্য কর, “আপুর্কি খান”—যার যেমন প্রবৃত্তি ।

যে কোন সদৃশ ঔষধ সপ্তাহ সেবনের পর সপ্তাহ বন্ধ, তৎপরে সেই বা অপঃ ঔষধ । কিন্তু স্মৃতিতে থাকিতে বিরত হইবে না । আর কিছু না ৩, ইহাতে বাতনা কমাইবে । অবিবাহিত যুবকের পক্ষে উত্তেজক দ্রব্য কম ব্যবহার করাই সম্ভব । প্রসাবে অধিক স্বেতসার থাকা ( Bright's disease ) সম্বন্ধে বাহ্য ব্যক্তব্য, তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা বোগ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । ইহার তরুণ রোগে—আকন, আপিস, আপোসাইনম, আস, কাস্ত, জেল্‌স, ডিজিট, ফস-আ, স্কটেল, হেল, ইত্যাদি । সজরি ও শীত শীত অবস্থায় আকন ; অল্প প্রসাবে সহ অস্থখে—অপিস, কাস্ত, জেল্‌স, স্কটেল । শোথের ফুলা থাকিলে—অপিস, আপোসাইনম, হেল । দুর্বলতা—আপো-সাইনম, ফস-আ । নেতিয়ে পড়া—আস, ডিজিট । পুরাতন আল্‌বুমিনে-রিয়াতে অর থাকিলে—আকন । স্বেতসার প্রথম প্রথম দেখা দিলে—ইউপাট, ফাইটোলাকা ।

প্রসাবে স্বেতসার সহ রক্ত—চিমাফিলা ।

সহ শিরঃপীড়া—আস্কেপ্লিয়াস ।

সহ গা বমি বমি ও বমন—আস্কেপ্লি, ফস-আ ।

সহ উদরী—আপসাই, চেলি ।

সহ কুস্‌কুস্‌ প্রদাহ—চেলি ।

সহ কুস্কুস্ আবর্তন পীড়া—আন্ধেপি, ডল ।

উচ্চ ও শুষ্ক স্থানে বাস, শীত গ্রীষ্মে সর্বদা গরম থাকা, এবং গাত্রে ফ্লুনেলের জামা ব্যবহার কর্তব্য—যেন কোন রকমে হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে। গরম জলে স্নান, অধিক শ্রম ব্যতীত ব্যায়াম। পথ্য, অনায়াস-জীর্ণ অথচ সবলকারী; হৃদয়ের ভাগ বেশী এবং মিষ্টের ভাগ কম। সন্ধ্যায় লঘু আহার এবং অন্ততঃ দুই ঘণ্টার পর নিদ্রা।

বীচি আওয়ারণ বা প্রদাহ। (ORCHITIS)

আঘাত বা হিমলাগা কিম্বা প্রমেহ পীড়া জ্বর<sup>৫</sup> রোগের উপশান্তি হয়। ইহাতে বীচি ফুলে ও টাটায় এবং ঐ ১ বর্ষ<sup>৬</sup> বেশী জর থাকে। শীত কখন কখন এমন ভয়ানক হয় যে, কাঁথা কিছুতেই ঠক্কানি কম্প নিবারণ হয় না। স্থির থাকা ও প্রদাহিত স্থানে ফোমেন্ট বা সেক দেওয়া, এবং পায়ের পাতা গরম রাখা বিহিত।

আঘাত ও পতনাদির দ্রুণ রোগে—আণিকা, পল্‌স, বস ; কোনাই,  
জিঙ্ক রুটা । কর্ণমূল ফুলা সঠিরা, কোষের প্রদাহে নক্স, পল্‌স, জিঙ্ক ।  
প্রমেহ পীড়া বন্ধ হওয়া জন্ত রোগ—পল্‌স ; আরম, কানাবিস, নাট্ট -আ ।

আকন—খুব জরের অবস্থায়।

আরম্ভ-মে-উভয়, কিশব ডান দিকের, বীচির প্রদাহ। নৃতনাপেক্ষা  
বহু দিনের পীড়ায় অধিক উপকারী। বীচির ব্যথা ও লালবর্ণ গিয়া, উহা  
যদি খব ফলে ও শক্ত হয়। পুং অঙ্গ উচ্চ হওয়া।

ক্রেমেটিস—প্রমেহ রোগের সূচিকিৎসা না হওয়া বিধায় বীচি-প্রদাহ ও শক্ত হওয়া। বীচি ফুলা ও শক্ত হওয়া ও তথায় থ্যাথলান, খাল লাগা ও স্বেটেধরা। বীচির প্রদাহ, বিশেষতঃ প্রমেহ সহ, হইলে। কোষে ফুলা।

কোনায়ম—খ্যাখলানি বা ষড়্‌ডানি লাগার দরুণ বীচি প্রত্নাহ। উপদংশ  
ও প্রমেহ জন্ত বীচি ফলা ও শক্ত হওয়া।

জেন্স—বিশেষতঃ রোগের প্রথম প্রথম স্তর অবস্থায় ।

খুজা—বীচি ফুলা ও ব্যথা। ‘বাম বীচি পেট মধ্যে টানা, ও কুচ্কির গ্রন্থি ফুলা।

পল্‌স—এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাত লাগা, খ্যাখলান, ঘস্‌র্ডান ও ছাল উঠা, অথবা প্রমেহর পীড়া বন্ধ জন্ম রোগ। বীচি প্রদাহ, তৎ-প্রদেশ বড় হওয়া, গাঢ় লাল হওয়া, স্পর্শে লাগা ও বীৰ্য্য বহনকারী (Spermatic Cord) শির শেঁটে ধরা ও তথায় তীব্র বেদনা। জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর বিধি।

মার্ক-স—যথায় কোষ চক্চকে ও বীচি শক্ত হয়; বিশেষ যথায় জর্দাটে সবজা ধাতু ক্ষরে।

রোড—পুরাতন রোগ—বীচি প্রদাহিত ও শক্ত হওয়া—চাপ পাইয়া যেন শীর্ণ বা ছোট হওয়া। বীচি আকারে বড় ও শক্ত এবং তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা হওয়া। পা উচ্চ করিয়া থাকাতে যাতনার সমতা। কোষ (Scrotum) ক্ষীত হওয়া।

স্পঞ্জিয়া—বীচি শক্ত হওয়া ও ফুলা এবং তথায় কুচ্কির দড়িৎ শিরায় কসিয়া চাপার ছায় বেদনা এবং কাপড়ের ঘর্ষণে যাতনা বৃদ্ধি।

হামমে—বীচি ফুলা ও স্পর্শে অতিশয় লাগা—ধাতু ক্ষরণ বন্ধ জন্ম রোগ। ইহা অনেক সময় ব্যবহার্য্য এবং ইহাতে ব্যথা ও টাটানি কমায়।

ইরিজিরম—বীচির প্রদাহ, বিশেষতঃ আঘাত জন্ম রোগ।

জলদোষ, একশিরা, কোষ বৃদ্ধি (Hydrocele), কোষে জল সঞ্চয় বা শোথ হইলে; বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে জল জন্মিলে ট্যাপ (Tap) বা ফুটা করিয়া তাহা নির্গত করা হয়। যদিও বিরল, কিন্তু ঐরূপ করায় পীড়া কখন কখন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হোমিওপ্যাথেরা ঔষধ উদরস্থ করাইয়া নির্ব্যাধি করণে সক্ষম। আপোসাইনম-কা দিবসে দুই বার এবং মাঝে মাঝে রাত্রে ২১১ মাত্রা; মার্ক-প্রটো-আইড ঐরূপে কিছু দিন দিয়া শেষে ২১৪ মাত্রা কাল্‌কা দিতে কহেন। এ ভিন্ন আর্স, কোনাই, চিন, পল্‌স, সল্‌ফর, সিলিসা, ইহারাও ব্যবহার্য্য।

.. প্রমেহ বা ধাতুর পীড়া ।

মূত্রমার্গ হইতে শাদা বা সজ্জাটে বা জর্দা পদার্থের নিঃস্রবণ ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প জ্বর । প্রস্রাব কালে চিড়্‌চিড়্‌ ও জ্বালা করা । স্ত্রীলোকের স্ত্রী অঙ্গ ফুলা ও তাহাতে ব্যথা এবং বেড়াইতে কষ্ট বোধ । বালিকার রোগ বড়-দের সংস্পর্শে ; যুবতীর রোগ অসৎ সহবাসে ; পুরুষেরও তাই ; অধিকন্তু ঋতুবতী বা প্রদরগ্রস্তা সহ সম্মিলনে অথবা হিমলাগা জন্তুও প্রমেহ পীড়া দেখা দেয় । ইহা উপদংশের আনুসঙ্গিক রোগ ।

প্রদাহ অবস্থায়—আকন, কানাবিস, মার্ক, সল্‌ফর । ক্ষরিত ধাতু, ( ঘন হইলে ) কাপ্‌, মার্ক । ( জর্দাটে ও পুষবৎ হইলে ) কোপেবা, মার্ক । ( সবুজ হইলে ) মার্ক । ( শাদাটে হইলে ) কাপ্‌স, সল্‌ফর, সেলেনম ।

রক্ত-মিশ্রিত ধাতু—কাস্ত, নাইট্‌-আ, সল্‌ফর + কলতানির ত্রায় হইলে—সল্‌ফর ; কানাবিস, মার্ক । পিচ্ছিল ও যথায় লাগে তথায় হাজে, এরূপ হইলে—মেজের ।

আকন—প্রথম প্রথম ও জ্বর থাকিলে ।

কাস্ত—রোগ ১০।১৫ দিনের এবং কনকনানি ও জ্বালা থাকিলে ।

কানাবিস—প্রচুর পরিমাণে ধাতু ক্ষরণে ।

পিট্রোসিলিনম—পুরাতন রোগ ও মূত্রমার্গ শুষ্কভূনি ।

সেলেনম—পুষ ও হৃদবৎ প্রমেহ এবং রোগ ক্রমশঃ কমিতেছে, এমন অবস্থায় ।

ধাতু ক্ষরণ, কিন্তু গরমির পীড়া হইতে উদ্ধৃত নয়—নাইট্‌-আ, মার্ক, খুজা, সল্‌ফর, সিনেবার, সেপি ।

প্রমেহ পীড়া গিয়া কখন কখন অল্প অল্প ও পাতলা ধাতু ক্ষরণ থাকে । স্নায়িমে থাকিলে ও আবশ্যক মতে লক্ষণানুযায়ী ফেরম, নক্স বা চিন ব্যবহারে উহা প্রায়ই সারিয়া যায় ।

জলদোষ, বীচি প্রদাহ প্রভৃতি রোগের তিথি নক্ষত্র সহ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা অনেক স্থলে স্পষ্টই দেখা যায় । পাশ্চাত্য বিদ্যা ইহা এককালে



অগ্রাহ্য করেন বটে, কিন্তু তাহা কোনমতে সম্ভব বোধ হয় না। একাদশীতে অন্ন ত্যাগ এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নিশি পালন করা একান্ত আবশ্যিক। বেতো ও জলদোষাদি পীড়াগ্রস্তের ইহা না করার বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এমত সকল রোগীর নিবামিষ ভোজনই বিধি।

### পাকাশয়ের ঝিল্লির শক্তিশূন্য হেতু তাহার গলিতাবস্থা।

( Softening of stomach. )

শিশুদিগের নিম্নলিখিতরূপে ভয়াবহ রোগ হয় ও অনেক সময় সেই রোগকে সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়। ইহা বহুরূপ। কখন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ নাশ করে। কোন পূর্ব উপসর্গ না থাকিয়া হঠাৎ প্রবল জ্বর, অত্যন্ত কান্না, নাড়ীর দ্রুত গতি, অনিবার্য পিপাসা, পেট ফুলা; উপর পেট গরম, চাপিলে ব্যথা বা টাটান; সজ্জা, টক্, হড়্ হড়্ বমন ও মলদ্বার ক্ষয়কারী (হাজাটে) টক্ গন্ধ বিশিষ্ট সজ্জাটে জলবৎ ভেদ; নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট; উৎকাশী; ত্বক ও শ্বাস ঠাণ্ডা এবং শিশু অল্পকাল মধ্যেই শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া পড়ে; কাঁদিবার শক্তি পর্যন্ত থাকে না, অঘোর অবস্থায় গৌঁ গৌঁ মাত্র করে। নাড়ী অসম, ও তাহার স্পন্দন সংখ্যা করা যায় না, এবং দড়্কা ঘটয়া বা এককালে দুর্বল হইয়া মৃত্যু হয়।

কখন বা রূপান্তর হইয়া রোগ ইহাপেক্ষা দীর্ঘকাল থাকে। প্রথমে অক্ষুধা, একগুঁয়েমো, তেজোহীনতা, সর্বদা উদগার, মুখে ঘা; অথবা বহু দিন হইতে ভেদ, বমি; কখন একটু ভাল অবস্থা, কখন বৃদ্ধি; অনিদ্রা, পাল্লশবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া হঠাৎ জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালে ভেদ ও বমন বারে এবং মাত্রায় অধিক হইতে থাকে, ও পেট ফাঁপে; সর্বাঙ্গ বিশেষতঃ, উদর অত্যন্ত গরম, কিন্তু মুখ ও হাত পা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়, অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ গলায় মাংস থাকে না। কখন মস্তিষ্কের উপসর্গ প্রবল দেখা যায়। এইরূপ হইয়া রোগী ৫।৬ দিন জীবিত থাকে।

কখন বা ব্যাধি বহু সপ্তাহ অবস্থান করে। উদরাময়, বমন, অত্যন্ত

## পাকাশয়ের বিব্লির শক্তিনাশ হেতু তাহার গলিতাবস্থা। ১৯৫

পিপাসা, পেট ব্যথা, কান্ধী, ক্রমশঃ বলক্ষয় এবং কাহার কাহার ক্ষয়-জ্বরের লক্ষণও দেখা যায়।

জ্বরোচ্ছ্ব, বা মনের শমতা নাশক কারণে মাতার রক্তঃস্রাব অবস্থার স্তন-দুগ্ধ পান, অধিক রেচক ব্যবহার, মুখে ঘা-বিশিষ্ট ব্যক্তির লালী উদরস্থ করা, ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু মাই ছাড়ানোর পরই এই রোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাই ছাড়ানোর পরই এই ব্যাধি অধিক হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত দুর্বল শিশু সবল না হইলে, বা সন্তানের উদরাময় থাকিলে, বা তরুণ ব্যক্তি হইতে সংপ্রতি মুক্ত হইয়াছে, এমন অবস্থায় মাই ছাড়ান উচিত নয়। এতদ্বিন্ন হঠাৎ স্তন দেওয়া বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে ছাড়ান যুক্তিসঙ্গত। একারণে রোগোৎপত্তি হইলে আবার স্তন ধরাইতে চেষ্টা পাইবা। দুই বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের প্রায় এ রোগ হয় না।

পাকাশয়ে আমাশয়িক বিব্লিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বা ন্যূন পরিমাণে রক্ত চলাচল বশতঃ পূর্বরূপ উপদ্রব সকল হয়।

সর্ব প্রথমজর দমন নিমিত্ত এক অল্পটিকা আকন; এক ঘণ্টায় প্রতি-কার না, হইলে এবং পেট ফাঁপু বা গরম, ছুঁইলে ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা, হীত পা ঠাণ্ডা হইলে, ব্রাই; অঘোর হওয়া, কাটনেকার, গয়ার উঠা, ও মস্তিষ্কের উপসর্গে, বেল বিধি। মাই ছাড়ানর দরুণ রোগে শেষোক্ত দুইটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ভয়াবহ উপসর্গে আকনে উপকার না হইলে আস একমাত্রা ব্যবস্থা করিবাণ। আবশ্যক মতে ইহা পুনরায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগ ওরূপ তীব্র না হইলে ও বমনের আধিক্য থাকিলে আনটিমকুড ইপিকা, পল্‌স, নক্স, আনটিম-টার্ট ব্যবহৃত হয়। বমনাপেক্ষা ভেদের আধিক্য, তাহাতে টক গন্ধ ও মেটেরজের বাহ্যে, অক্ষুধা, অস্থিরতা, ক্ষীণ ও ক্লান্ত হইতে থাকা পক্ষে, বিশেষতঃ তৎকালে দস্ত উঠিতে থাকিলে, কাল্লা সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এই সম্বন্ধে উদরাময় ও বমন, রোগ দেখিয়া লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রদান কর। রোগের আরম্ভে বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ, এমন কি ১০।১৫

মিনিট অন্তর হড়্‌হড়ে শাদাটে ভেদ, অথচ তাহাতে তাদৃশ হ্রস্বল করে না, এমত হইলে ফস্-আসিড দিবা ।

### অক্ষুধা ।

অযথা ও অতিরিক্ত আহার হেতু পেটের গোল ; অধিক মদ, আফিম ও তামাক ব্যবহার ; রাশি রাশি ঔষধ সেবন ; বহির্বিভাসে ব্যায়াম না করা ; বায়ু-অপরিচালিত আবদ্ধ গৃহে নিদ্রা ; না চিবাইয়া কৌৎ কৌৎ করিয়া অন্ন গেলা ; আহার করিতে করিতে অধিক বার জল পান ; খাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঘুমান ; রাত্রি জাগরণ ও তৎকালে গুরু আহার ; এই সমস্ত কারণে ক্ষুধামান্দ্য হয় । রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলে নির্ব্যাধি হওন সম্ভব । প্রত্যুষে উঠিবার পর এবং আহার ও রাত্রি শয়নের একঘণ্টা পূর্বে এক এক গ্লাস শীতল জল পান, প্রত্যাহ স্নান ও তৎকালে পেট ঘর্ষণ, এবং অনায়াসজীর্ণ পথ্য সেবনের বিধান করা উচিত । মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধাবলীর মধ্যে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যিক ।

আইরিস—পাকাশয় মধ্যে চিবান বা জালা, ঠাণ্ডা জলে উহাদের বৃদ্ধি, কিছু থাইলে যাতনার সমতা, বিশেষ পৈত্তিকের সহ ক্ষুধা থাকিলে ।

আণ্ট—অক্ষুধা, মুখের শুষ্কতা, অতিশয় তৃষ্ণা—বিশেষ রাত্রি ; গা বমি বমি—বমন উঠিতে উদ্যত ; আহারের কিছু পরেই উহা জাবরের হ্রাস মুখে উঠা ; নূতন নূতন অবস্থায় ও ইহাতে না সারিলে (ব্রাই) ।

আলাট্রিস—সকল খাদ্যেই বিতৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, মুচ্ছা এবং অবস্থা, অন্ন থাইলে পাকাশয়ে যাতনা । অধিক লেখা পড়া করার দরুণ ক্ষুধামান্দ্য ।

ইঞ্জে—নাম গুনিবা মাত্র বা খাম খেয়ালি খাইবার ইচ্ছা ; একটু কিছু মুখে দিলে আর খাইতে না চাওয়া ; গরম খাদ্য ও মাংসে ঘ্বেষ ; রুটী মাখন, হুধ ও ফলে ইচ্ছা ।

ইপি—বিষেষতঃ যে সকল শিশু নির্কোষ জননীর হাতে পড়িয়া কৌৎ

কৌৎ করিয়া গ্রাস গিলে, তাহাদিগের মন্দাঘি হইলে । অপরিষ্কার জিভ এবং গা বমি বমি ও বমন, আহাৰে ঘৃণা । তামাকখোরেরও উহা টানার বমন ।

• কার্বো—বায়ু বা আত্মান জন্মিয়া নিয়ত যাতনা ; উহা উদগারে ফল না হইয়া, তখনি আবার সঞ্চার ; বুক জ্বালা ; মুখে তিক্ত বা টক তার । ছধ, মাখন, খাসির মাংসে ঘৃণা ; মিষ্ট বা লোস্তা খাদ্য ও কাওয়াতে স্পৃহা । চেহারার জর্দা বা অতিশয় ফেঁকাশে ।

ক্রিয়োস—কোন রোগে আরোগ্যকালীন এক কালে অক্ষুধা, অথবা খাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভাল না লাগা ; কিম্বা অল্প ক্ষুধা, এবং আহাৰ ও পানের পর অজীর্ণতার লক্ষণ ।

কামো—মন্দাঘি, অরুচি, কাঁচা তরকারি খাইবার ইচ্ছা, ঝোলে ঘণা । মাথাভার ও কামড়ান, অতৃপ্ত নিদ্রা, মুখে তিক্ত তার, পিত্ত বা তিক্ত গয়ার বমন, পেট ফাঁপা ও সজাটে ভেদ ; কখন কখন জরভাব ।

চিন—সকল খাদ্যে ঘেষ । সব তিক্ত লাগা (পলস, হাই) । জিভ ফাটা ও উহাতে জর্দা বা শাদা লেপ ; তৃষ্ণার অভাব ; টক, ঝাল ও অধিক মসলা দেওয়া ব্যঞ্জন ইচ্ছা ; আহাৰের পর উদগার ; থাকিয়া থাকিয়া ঘুম ভাঙ্গা ; খুঁতখুঁতে ও একগুঁয়ে ভাব । অধিক রস-রক্তক্ষয় হেতু বা চা পান কারণে, বা কোয়াসা লাগান বা জ্বার নিকট বাস জন্ম মন্দাঘি ।

জাহুলিয়ম—মুখ-গহ্বর উত্তপ্ত ; মুখে কদর্য তার ; প্রকাশয়ে ভূট ভাট সহ গা বমি বমি ও উদগার ; অতিরিক্ত ছেপ উঠা ; মাথা ভার ; কাণ মধ্যে টুন টুন শব্দ বোধ এবং আতঙ্ক ও কষ্টের চেহারা ।

নক্স—মুখে তিক্ত তার, তিক্ত উদগার ও তিক্ত বমন (পলস) । সকল খাদ্যই বেতার লাগা । রুটী ও তমাকে ঘেষ ; ব্রাণ্ডী ও চাখড়িতে লালসা । মল কঠিন ও বৃহদাকার । কায়িক ব্যায়ামের ন্যূনতা, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ; রাত্রি জাগরণ ও অধিক হুঁরাপন নিমিত্ত মন্দাঘি । সকালে উপসর্গের বৃদ্ধি ।

পলস—দ্রুত ও তৈলীকৃত দ্রব্য বা অধিক গুরু আহাৰ, অধিক তরকারি খাওয়ার দরুণ উদর আত্মান । জিব শাদাটে ও ফাটা । মুখে তিক্ত, লোস্তা বা পচা তাঁর । তিক্ত উদগার ও জ্বল উঠা, পেট ডাকা, পাজরার নীচে ফাঁপা । গরম খাদ্যে,

মাংসে ও তামাকে ঘেব ; মাখন, কটী ও ফলে ইচ্ছা । কষ্টে বাহে, বা ভেদ, জন্তন ও আড়ামোড়া ভাঙ্গা—সন্ধ্যায় উপসর্গ বৃদ্ধি । ভাল চিবাইয়া না খাওয়ার দরুণ পীড়া ।

প্রথম—অক্ষুধা, অতৃষ্ণা, ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, বড়ুটে চেহারা ।

ব্রাই—তরুণ মন্দাগি ; দিবা অপেক্ষা রাত্রে তৃষ্ণা অধিক ও গলা শুষ্ক ; পূর্বে বা জলো বাতাসে পীড়ারূদ্ধি ।

মার্ক—এককালে ক্ষুধাহীনতা ( চিন, নম্ব ) । মুখে পচা তার, বিশেষ প্রাতে ( পল্স ) । বসিয়া থাকার অবস্থায় পাকাশয়ে যেন একখানা পাথর রহিয়াছে, একপ বোধ ।

লাকাসি—একাদিক্রমে কয়েক দিন আহারে অনিচ্ছা । বেশ ক্ষুধা, অথচ খাদ্যে ঘৃণা । দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা এবং টক খাওয়াতে যাতনার বৃদ্ধি ।

সলুফ-আ—অধিক সুরা পান, রস-রক্তক্ষয় বা অধিক পড়ার জন্য অক্ষুধা । মুখে কটু বা পচা তার । জিভের শুষ্কতা, গলা জ্বালা, কদর্য্য ভ্রাণের নিখাস—বিশেষ প্রাতে ; -মুখ-গম্বরে ছোট ছোট শাদা শাদা দাগ, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় গলার মধ্যে কাঁটা ফুটনি ।

হিপার—অধিক পারা বা কুইনাইন ব্যবহারের পর । খুব সাবধানে থাকিলেও পেটের গোল, মুখে পচা তার ও সকল খাদ্যে ঘেব । বিশেষ পুরাতন রোগে । টক এবং খুব মসলা দেওয়া ব্যঞ্জন ও সুরায় স্পৃহা ।

### অতিরিক্ত—রাক্ষসবৎ বা দুষ্ট ক্ষুধা ।

আহারের অব্যবহিত পর ক্ষুধা—লাইক ।

আহারের কিছু পরই নিয়ত ক্ষুধা—সিকুটা ।

সারাদিন ক্ষুধাবোধ, আহার করিলেও ক্ষুধা থাকা—ককু ।

আহারের পর অতিরিক্ত ক্ষুধা—আক্স, গ্রনাইট ।

পাক-যন্ত্রের বিকৃতি ভাব লভাই অতিরিক্ত ক্ষুধা হইয়া থাকে ।

চিন—কিছুতেই ক্ষুধিবৃদ্ধি হয় না, বিশেষ রাত্রে । টক দ্রব্য, ফল ও

সূরাপে স্পৃহা। উপাদেয় সামগ্রীতে লালসা। অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প মাত্র পান।

ষ্টাফিস—খাদ্যে পেট পূর্ণ, এমন অবস্থায়ও রাক্ষসবৎ ক্ষুধা। সূরা ও তাঁমাকে স্পৃহা। (নক্স)

সিনা—কুমি থাকার দরুণ রোগ। অতিরিক্ত খাইবার ইচ্ছা। আহারের পরই ক্ষুধা (মার্ক, ষ্টাফিস)। প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দুধবৎ শাদা।

সিলিসা—থুব ক্ষুধা, কিন্তু রুচির অভাব। মল খানিকটা দ্বার হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার অন্ত্রে প্রবেশ করে।

### শূল বেদনা—পেট কামড়ান, ও ব্যথা।

বৃহৎ, অস্ত্র বা নাভি প্রদেশ থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপযুক্ত মোচড়ান ও কামড়ান ব্যথাকে শূলবেদনা কহে। ইহা কখন কখন এরূপ প্রবল ও ক্লেশকর হয় যে, রোগী যাতনার ধমকে ছট্‌ফট্‌, এগোড় ওগোড় ও অঙ্গ বক্র করিতে বাধ্য হয়। গা বমি বমি, উদগার ও বমন; পেট স্ফীত ও চাপায় স্বস্তি; বদন ঘামা ও অভ্যস্ত কণ্ঠের চেহারা এবং প্রায়ই কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও সদা শৌচত্যাগে ইচ্ছা, রোগের এই সমস্ত আনুসঙ্গিক। অপক ও টক ফল, কাঁচা তরকারী, যথা শসা, কাঁকুড়, ও গরমাবস্থায় বরফ, বা বরফের কুলপি খাওয়া ইত্যাদি কারণে রোগ দেখা দেয়।

শিশুর এক প্রকার দায়ুশূল হয়। ভুমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া ৮।৯ মাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। ঢোকা দুধ-খৈগদের এই পীড়া অধিক হইয়া থাকে। ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া ধরে এবং ১০।১১ মিনিটের অধিক ক্ষণ থাকে না। কাহারও কাহারও ইহা বিশেষ কষ্টকর হয়, কিন্তু সন্তানকে প্রায়ই মোটা হইতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময় মল কঠিন। শিশু আগ্রহ সহ দুধ পান করে এবং পীড়ার আশেগ কাল ভিন্ন ভাহার বিলক্ষণ স্ননিদ্রা হয়। এক হাত উর্দ্ধ হইতে সরু ধারায় ঠাণ্ডা জলের ধারাগী দিলে তদগ্বেই যাতনার সমতা হইয়া থাকে।

শিশু বা স্নাতার রাগ ও বিরক্তি বশতঃ পেট ব্যথায় কামো; ইঠাৎ

আহ্লাদ বা ভয় জন্ম—আকন বা ওপি ; শোকে—ইগ্নে, ফস-আ বিধি ; অজীর্ণতা ও হিম লাগা দরুণ রোগে—কামো ; ভাঁহার সহিত অকষ্টকর ভেদ থাকিলে—ডঙ্কা ; ক্রমশঃ কান্না বা পা পেটের দিকে তোলায়—কামো, কলসি ; ইহাতে না সারিলে ও আইটাই করিলে—জোলাফ ; ফল মূল এবং গুরু আহার দরুণ পেট ব্যথা, গা বমি বমি ও ভেদ পক্ষে—ইপি বা পল্‌স ; পেট ব্যথা ও কোষ্ঠ বদ্ধে—নক্সা ।

বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হওন কালে ঠাণ্ডী লাগায় কখন কখন নাভির উর্দ্ধে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয় । বাহ্যের বৃথা চেষ্টা, অনেক বেগ দিলে হয়ত কেবল বায়ু নিঃসরণ বা অল্প মাত্রায় মল ত্যাগ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্যথার কিছু মাত্র প্রতিকার হয় না ; এমত স্থলে ও ক্রমির দরুণ ব্যথায় ১৫ মিনিট অন্তর সিনা দিলে বিশেষ উপকার সম্ভব ।

উষ্ণ জলের সেকে কখন কখন ব্যথার সমতা হয় ।

পিত্তশূল—যক্ষ্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তের কুচি অল্পে নামায় ভয়ানক যাতনা হয় । যক্ষ্ম প্রদেশে বা মেটেতে অসহ্য বেদনা সহ গা বমি বমি এবং প্রচণ্ড বেগে অতিরিক্ত পিত্ত বমন—এই সকলই রোগের লক্ষণ । সময়ে প্রতিকার না হইলে ইহা হইতে যক্ষ্ম প্রদাহ সম্ভব ।

বায়ুশূল—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও তাহা আবদ্ধ থাকিয়া নানা যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে ।

অল্পশূল—আহারের ৩৪ ঘণ্টা পরে পেট, বুক ও গলা জলিতে থাকে ; পেট হয়ত ফুলে ; শরীর কঁমন করে ; অবশেষে ভুক্তদ্রব্য কিম্বা টক জল, অল্প বা অধিক পরিমাণে উঠিয়া সকল কষ্ট যায় । কিছু বা অধিক দিনের হইলে ওরূপ বমন না হইয়া, আহার জীর্ণ হওন সময়ে ভয়ানক বেদনা ধরে । ইহা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা বলা যায় না—অসহ্য যাতনার ধমকে রোগী সামলাইতে না পারিয়া হতজ্ঞান হইয়া কখন কখন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে । ইহাকেই অল্প বা প্রকৃত শূল কহে এবং ইহা মহাদেবেরও অসাধ্য রোগ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে ।

চিত্রকরের শূল—বাহারা সর্বদা ও দীর্ঘকাল সীসা নাড়াচাড়া করে, তাদেরই বিশেষ এক প্রকার পেটের বেদনা হয় । এই রোগ ক্রমশঃ প্রকাশ পায় । প্রথম প্রথম ক্ষুধা-মান্দ্য, আহারান্তে উদ্যার ও গা বমি বমি, কোষ্ঠ বদ্ধতা ও মধ্যে

মধ্যে পেটভার ও পেট সঁটে ধরা । অথবা থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত পেট কামড়ান ও মোচড়ান, কখন ব্যাথা উঠে বুক ও বাহুতে উঠা এবং অধঃ মলাশয় ও মূত্রস্থালিতে নামা, শোচ এবং প্রস্রাব ত্যাগে অক্ষমতা, পেট শক্ত হওয়া, আঁতে পড়া ও টিপিলে লাগা, গা বমি বমি ও হয়ত হড়্‌হড়ে পিত্ত বমন । ছম্‌ড়ে বসা বা নোড়া বা শক্ত পদার্থ পেটে দিয়া যাতনা কমাইতে রোগীর চেষ্টা । ঔষধে প্রতিকার না হইলে, বদন ও হাত পায়ে ঠাণ্ডা বাম হইতে থাকে ; জীবনী শক্তির শূন্যতা এবং শেষে মুচ্ছা হইয়া মৃত্যু হয় । গরম জলের টবে বসাইলে এবং পেটে ফোমেন্ট করিলে যাতনা লাঘবের সম্ভাবনা । পূর্বে লিখিত শূল ভিন্ন, উদরাময়, ক্রমি, ঠাণ্ডী লাগা, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি বিবিধ কারণে পেটে কষ্টকর বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শূলবেদনার কয়েকটা প্রধান প্রধান ভেদ্য এবং পেট ব্যথার সাধারণতঃ ব্যবহার্য ঔষধ নিম্নে পৃথায় ক্রমে লেখা হইল, মিলাইয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু ফল প্রাপ্তিবার সম্ভাবনা ।

অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ জন্ত কিছুই অধঃ হয় না, পেটে ভয়ানক বেদনা, এবং বিষ্ঠাদি বমন—ওপি, নক্স, প্লস্ম, ভেরাট ।

আহারের বিশৃঙ্খলা, যথা, অধিক বা অথবা খাদ্য উদরস্থ জন্ত পেট ব্যাথা—আর্স, আর্স, ইপি, কার্বো, নক্স, পল্‌স ।

আক্ষেপযুক্ত বা স্নায়বিক পেটবেদনা ; বিশেষ জড় কারণ লক্ষ্য হয় না, অথচ রাগ, ভয়, শোক ইত্যাদি মনের বিকৃত অবস্থা দেখা যায়, এ অবস্থায় ও হঠাৎ ব্যাথা ধরা পক্ষে—আর্স, ইগ্নে, ওপি, ককু, কামো, কুপ্রম, নক্স, পল্‌স, ফস, বেল ।

ক্রমি শূল—মার্ক, সাবাড, সিনা, স্পাইজি, সল্‌ফর, সিকুটা, হাইয়স ।

ঠাণ্ডী লাগা ও ভেজাতে, বিশেষতঃ বাতগ্রস্তের পেট বেদনাতে—কলসি, কামো, ডক্সা, নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস ।

পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়া ও ব্যাথা এবং বমন—পল্‌স ; ইপি, কলসি, নক্স ।

পেট মধ্যে অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্ত বায়ুশূল—চিন, নক্স, বেল, লাইক, সল্‌ফর ; ককু, কামো, কার্বো, কলসি, গ্রাফাইট, পল্‌স, ভেরাট ।



পেট মধ্যে অধিক খাল লাগা, বিশেষ অতিরিক্ত রাগের পর—কলসি,  
কামো, ষ্টাফিস ।

প্রাদাহিক শূল বেদনা—নক্স, মার্ক, বেল, ব্রাই ।

বলি বা অর্শ দ্রুণ পেটের নিম্ন প্রদেশের শূল—কলসি, কার্বো, নক্স,  
পল্‌স ।

স্ত্রীলোকের ঋতু সংক্রান্ত পেট বেদনা—ককু, কামো, পল্‌স, ইগ্নে, ককি,  
নক্স, সাবিনা ।

শিশুর পেট বেদনা—কামো ; ইপি, কলসি, কাক্স, বেল, রিয়ম ।

সীসা বা তামা সর্বদা নাড়া চাড়া করায় বা চিত্রকরের শূল—আলুমি, ওপি ;  
পড, প্লাটিনা, বেল, সল্‌ফ-আ ।

### শূল বেদনা সহ অপর উপসর্গ ।

পেট ব্যথা—অতিরিক্ত ঘাম—জেল্‌স । টক ঘাম—মার্ক ।

—অতিরিক্ত হইয়া স্বস্তি—আর্স । ঘামে স্বস্তি না হইলে—কামো, ডক্স ।

—সহ তাপ—আকন, আর্গিকা, বেল, ভেরাট-ভি ।

—সহ মাথাধরা—আকন, মোলিন, বেল ।

—সহ শীত—আকন, আর্স, জেল্‌স ।

—সহ হৃদরোগ—আকন, ক্যাক্তিস, ভেরাট-ভি, স্পাইজি ।

—বৃদ্ধি—ঠাণ্ডায়—আকন, ব্রাই ।

—নড়ায়—ব্রাই ।

—প্রাতে—মার্ক ।

—রাত্রে—চিন, জেল্‌স ।

### চিত্রকরের শূল ।

• ওপি—অল্প যেন টুকরা টুকরা কাটা হওয়া । বমি সহ দড়কা ও প্রচণ্ড শূল—ঝিমন, ঘুমাইবার বড় ইচ্ছা, কাল ভাঁটার স্থায় মল ।

কলসি—পাকাশয়ে আক্ষেপ ও গলা অবধি উহার বিস্তৃতি । নিয়ত বমনে উদ্যত ও সেই জন্ত মুখ যেন অবরুদ্ধ । নাভি প্রদেশ কামড়ান, কনকনানি ও দোমড়ানয় স্বস্তি । পেটের সমস্ত অল্প যেন পাথর দ্বারা চাপা । শক্ত পদার্থ দ্বারা পেট চাপায় স্বস্তি । অস্থিরতা, চীৎকার । কলসিয়ের ব্যথা অসহ্য, ছটফট করা, বাহ্যের বেগ এবং হয়ত নাম মাত্র মল ত্যাগ । কিন্তু ককি সেবনে তন্মূহূর্ত্তে আগুনে জল ঢালার স্থায় যাতনা নির্বাপন ।

কালী-আইড—নাভির চতুর্দিকে কামড়ান, জ্বালা ও তথায় যেন ছেঁড়া, ঐ সঙ্গেই পাকাশয়ে বেদনা ; শব্দে ঐ উভয় যন্ত্রণা যাওয়া, জাগ্রত হইলে উভয়ের পুনঃ প্রকাশ । ইহা সীসার বিষের গুণ নাশ করে এবং আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা ও নক্স পর পর বিধি ।

নক্স—থেকে থেকে পেট কামড়ান ও খাম্‌চান । অল্পে কনকনানি ও বমন ইচ্ছা । অল্প খাঁতলান ও টাটান, বাহ্যের বেগ, অত্যন্ত মল কঠিন ও লঘাকৃতি, বিশেষ অনিয়মিত ভোজী ও অধিক ঔষধ সেবীর পক্ষে ।

বেল—নাভির চতুর্দিকে সংকোচন, যেন তথায় একটা গোলা বাধিবেক । পেট খাম্‌চান ও তথায় যেন থাবা মারা ।

তরুণ রোগে কলসি ও নক্স ১৫ মিনিট অন্তর পর পর দিবা । ব্যথা সারিলে কালী-আ ব্যবহার্য্য এবং বলা বাহ্যে যে সীসার ব্যবসা এক কালে ত্যাগ কর্তব্য ।

### পিত্তশূল ।

আকন—জ্বর ও স্পর্শে পেট ব্যথা ।

ইপি—নিয়ত গা বাঁমি বমি, পিত্ত বমন, পাকাশয়ে ভয়ানক বেদনা, পেট কামড়ান ও খাম্‌চান ।

কলসি—মুখে তিক্ত তার (কামো, নক্স,) সবুজ পিত্ত বমন, ব্যথার দরুণ

ছম্ড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, অতিশয় অস্থিরতা, বিলাপ। প্রচণ্ড রাগ ও অধিক আফিম ব্যবহার দ্রুণ পীড়া।

চিন—বিশেষ পুঁতি প্রদেশের পীড়া (ও নক্স সদৃশ)

নক্স—পাকাশয়ে সংকোচ-কারক আক্ষেপ, কনকনানি, থিম্‌চুনি সহ টক শ্লেষ্মা বমন, অত্যন্ত পীঠ-ব্যথা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পুনঃ পুনঃ বেগ, চটা স্বভাব।

ব্রাই—কড়ার নিম্নে থিম্‌চুনি বা কনকনানি, পৈত্তিকের বমন, বিশেষ আহার বা পানের পর পাকাশয়ে চাপায় লাগা—মল শক্ত ও পোড়ার ছায়, বড় চটা।

মার্ক-আ—গ্রন্থি সব বড় ও তাহাদের কার্য্য শিথিল, প্রস্রাব অত্যন্ত এবং জীর্ণ শীর্ণের শূল বেদনা।

লাইক—স্বভাবত কোষ্ঠ বদ্ধের পেট বেদনা পক্ষে।

### বায়ুশূল।

কলসি—বদ্ধ বায়ু, নাভির গোড়ায় মোছড়ান, ব্যথা তীব্র ও বেঁদার ন্যায়।

কামো—রোগী অস্থির ও বাতিকে ধাতু, বিশেষ শিশু।

চিন—পেট ফাঁপা, ডাকা, অল্প থিম্‌চুনি, ছেঁড়া, শূল ব্যথা ও ভেদ।

নক্স—তলপেটে বা পাকাশয়ে খুব ব্যথা বিশেষ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে।

ভেরাট—ভেদকালীন অত্যন্ত পেট ব্যথা।

বেল—শিশুর পেট ব্যথা ও দড়কার উপক্রম।

অল্পশূল—ভুক্ত ভোগী হইয়া এই রোগে বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছি। লোকে কহে একবারকার রোগী আরবারকার রোগী। নিতান্ত নির্বোধ না হইলে পুরাতন ব্যাধিগ্রস্তরা নিজ পীড়া সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিতে সক্ষম। চিকিৎসার কত গোল, অনভিজ্ঞতা, মতের ভেদ, তাহা এই পীড়ায় বিলক্ষণ অনুভূত হয়। নূতন নূতন ও সামান্যতর বুক জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গে অল্পনাশক সোডা, বিস্মথ থাইলে, রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা তদন্তে ডেকুর উঠিয়া যন্ত্রণার সমতা হইতে দেখা যায়। রোগ অধিক দিনের হইলে ওরূপ চিকিৎসায় হিতে বিপরীত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তৎকালে ২৩ বার ১০০।১৫০ গ্রেন

(আন্টাসিড) অম্লনাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া বমি ত নিবারণ হইত না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল । • নিজে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, অম্লের প্রকৃত ঔষধ উদ্ভিজ্জের অম্ল রস । কি বৈদ্য, কি ডাক্তার, ইহারা সকল প্রকার অম্ল খাইতে নিষেধ করেন । একবার আহার কালীন ও তাহার অবাবহিত পূর্বে এবং পরে জলের পরিবর্তে কিছু অধিক পরিমাণে কয়েক দিন কাঁজি খাইয়া বমন থামিল । অল্প অনেককে ঐরূপ ব্যবস্থা করায় তাহাদের সকলেরই কম বেশী প্রতিকার হইয়াছে । অল্প এক সময়ে কেবল মাত্র লেবুর রসে ময়দা মাখিয়া লুচি করিয়া খাওয়ার বিশেষ উপকার পাই । ডাঃ বেরিনী সাহেব সর্বদাই লেবুর আরক ব্যবস্থা করিতেন । মার্কিন দেশের আলোপ্যাপ ডাক্তারগণও অম্ল রোগে অম্ল দেন । চাউল কুটাইলে মিষ্ট এবং ভাত ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলে টক হইয়া পড়ে—ইহা রাসায়নিক কার্য । অম্ল রোগে শ্বেতা সার খাদ্য (যথা আলু, কলা, ছোলা, অড়হর ডাউল) ও মিষ্ট নিষিদ্ধ । মর্ন্তমান বা চাঁপা কলা এবং ইক্ষু গুড় কড়ি ভোর খাইলে পেট অলিয়া উঠে, কিন্তু খুব মজস্ত চিনিকাঁঠালি, থেজুরে গুড় প্রত্যহ একপোয়া করিয়া খাইয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে । পুরাতন ও যান্ত্রিক পীড়া হইলে, তাহা এককালে নিরাময় হওয়া সুকঠিন ; কিন্তু স্থানিয়মে থাকিলে অনেকটা ভাল থাকা যায় । সুবিদ্র ডাক্তার-অনুমোদিত রাশি রাশি ঔষধ খাইয়া কিছু মাত্র প্রতিকার হয় নাই । কিছুমাত্র খাইবার ইচ্ছার অভাব, স্ততরাং খাদ্য সমুগ্ধ হইলেই কষ্ট হইত ; ডবল পয়সার গুণীয় ৪৫ খান্না লুচি চক্ষু মুগ্ধ বুজিয়া উদরস্থ করিতাম—দুই ঘণ্টা পরে ক্রমশঃ পেট কুলিতে থাকিত, অবশেষে ৩৪ ঘণ্টা পরে এক বা দেড়গের টক জল উঠিয়া সচ্ছন্দতা পাইতাম । রাত্রি একটা দুইটার সময় আবার ঐ রূপ বমন ; অনেক দিন এই রূপ ভুগি । এক বিশেষ আত্মীয়ের অনুরোধে এক সন্ধ্যায় এক বা আধ ধান আফিম খাইলাম । আর পেট ফাঁপা নাই, বমি নাই, যেন মস্তের চোটে সব গেল । অপরে ইহাতে অল্পই ফল পাইয়াছে । দেখিয়াছি আফিমখোরের মৌতাত অপেক্ষা বেশী খাইলে নেসা অধিক হয় ও টক জল মাত্র উঠে । ওপি, চিন, নক্স, পিলস, সল্ফর, প্রভৃতি আবশ্যকমতে ব্যবহার্য্য । প্রথম প্রথম অজীর্ণের ঔষধ খাইয়া তাহা সারিলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না ।

## শূল—পেট বেদনা ।

আইরিস—পেট ব্যথা, পূর্ণতা ও অন্ন হওয়া, তেলা টক জল ও অধিক উদ্গার, ভেদ, মলদ্বার জালা । বায়ু শূল ; কলসি, কামো, নক্সতে উপকার না হইলে ।

আকন—অসহ্য পেট কনকনানি ও ব্যথা জন্ম পাগল প্রায় হওয়া ; ছটফটানি, চীৎকার, শিশুর হাতের মুঠা কামড়ান, জ্বর অতিসার, পেট ছুঁইতে দেয় না ; অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ, হিকা, প্রাদাহিক শূল জন্ম হুন্ডে বসিতে বাধ্য ও সর্বদা অতি কষ্টে অন্ন অন্ন প্রস্রাব ত্যাগ ; অত্যন্ত ভয় ও উদ্বিগ্নতা, ঠাণ্ডা লাগা বা ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস জন্ম রোগ ।

আরম—বায়ু জন্ম বাম পাজরার নিম্ন প্রদেশে তীব্র বেদনা । সামান্য কারণে ও অন্ন আহারে পেটে শূল ব্যথা ।

আর্স । নিয়মিত সময়ে পেট বেদনা ; তৃষ্ণা ও বমন । স্তন পান বা আহার আরম্ভে যথেষ্ট কান্না, অস্থিরতা, যাহা ধায় রূপান্তর না হইয়া তাহাই ভেদ, সমস্ত পেট অতিশয় বেদনা ; আহার, পানে ও রাত্রে উহার বৃদ্ধি, গাপ সেকে সমতা, ছটফটানি, বমন, ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধতা । হাত পায়ের মুড়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, ভয়ানক পেট ব্যথা, ভেদ, মুচ্ছা ও ঠাণ্ডা ঘাম । পাকাশয়ে প্রচণ্ড জালা, খুব তৃষ্ণা কিন্তু অন্ন অন্ন পান এবং স্বক শুষ্ক ও গরম বা ঠাণ্ডা ঘাম-বিশিষ্ট । বরফ খাওয়া জন্ম পীড়া ।

আলুমি—ঠাণ্ডা জন্ম পেটে অত্যন্ত থিমুচুনি । সীসার বিষ শরীরস্থ হওন জন্ম ভয়ানক শূল বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা । মলাশয়ের শক্তি-হীনতা জন্ম কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেট ব্যথা ।

আলোস্—পেটে, স্পর্শে লাগা ও অতিরিক্ত কনকন করা ও তাহার মধ্যে টপটপানি শব্দ, জলপানে পাকাশয় ব্যথা ।

আসাকাটিডা—অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্ম পেট ফোঁপা, ডাকা এবং শ্বাস কষ্ট, রক্তনের গন্ধের বায়ু উদ্গার ও অধঃ নিঃসরণ—চাপায় পেট ব্যথা স্বস্তি—যেন গলা দিয়া কিছু উঠিতেছে । বায়ু শূল ও মুচ্ছা ।

ইয়ে—নিয়মিত সময়ে, বিশেষ, রাত্রে বায়ু জনিত পেটে ব্যথা ধরিয়া ঘুম

ভাঙ্গা এবং তথা হইতে বেদনা বৃদ্ধ ও পার্শ্বদেশে যাওয়া—পেট ডাকা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ; মাতার শোক জন্ত শুভ্রপায়ী পীড়া—অথবা লজ্জাশীলা হিষ্টি-রিয়্যা-গ্রস্তের শূল ।

• ইথুসা—পেট ব্যথা ও কান্না সহ প্রচণ্ড বমন ।

ইপি—শিশুর পেট কামড়ান ও পিত্ত বমনের পরই বিমন, পাকাশয়ের অত্যন্ত ভয়ানক যাতনা জন্ত চীৎকার ও ছট্‌ফটানি । বায়ু জনিত বেদনা, নাভির চতুষ্পার্শ্বে কনকনানি ও যেন মুঠা করিয়া ধরা, নড়ায় বৃদ্ধি, স্থিরে সমতা ; পেট টাটানি এবং ঐ সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন, কাঠ নেকার যত অধিক দেখিবা, ততই ইহা বিশেষ খাটে । বমনের পর ঘূমের ইচ্ছা ।

ইলাট—পেট ও বৃক্কে বদ্ধ বায়ু জন্ত আক্ষেপ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ।

ওপি—পেট—বিশেষ, নাইয়ের গোড়া ক্ষীত, পেট কনকনানি, চাপুনি ও মোহড়ান ; চিত্রকরের শূল—অন্নশূল । শৌচ প্রশ্রাব বন্ধ, উদগার ও বমন । কাল ও গুটলে গুটলে মল ।

ককু—বায়ু জনিত পেট ব্যথা, উপর পেট, নাভিস্থ ও বস্তি প্রদেশের ডান দিকে অধিক বেদনা, গা বমি বমি এবং বমন ও ঠাণ্ডা ঘাম ; পেট সংকোচন এবং অধঃ ও বাহির দিকে ঠেঁল মারা । পিত্তজরে পুরুষের তিক্ত বমন, নড়ায় পেট মধ্যে যেন ধারাল পদার্থের থাকা বোধ । দুই প্রহর রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি, উদগারে সমতা ।

• কফি—অসহ্য শূল বেদনা—পেট ছুইতে দেয় না, উহা যেন ফেটে পড়িবেক, অল্প যেন টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইতেছে, ভয়ানক কান্না ও দাঁত কিড়মিড়, যাতনা জন্ত মরিয়া হইয়া পড়া, দড়কা, অনিদ্রা ও খেঁতখেঁতে । পেটভার, খাললাগা, টুক উদগার ও বমন, নেতান । ডাক্তারি চিকিৎসায় অধিক কলসিহু ব্যবহারের পর ক্ষিপ্তকারী যাতনা পক্ষে ইহা ব্রহ্ম অস্ত্র স্বরূপ ও ব্যবহারে ক্ষণমাত্র প্রতিকার হয় ।

কলসিহু—সর্বপ্রকার পেটবেদনা, বিশেষ, নাভির পার্শ্বদেশের ; পা উপর দিকে তুলি, উপড় হইয়া শয়ন, কঠিন পদার্থ দ্বারা পেট ঠেসে ধরায় বা বোতলে গরম জল পুরিয়া ব্যথিত স্থানে লাগানয় স্বস্তি । পেট কামড়ান ও ব্যথা জন্ত শরীর ছমড়ান ও চীৎকার । বোধ হয় ছুইখানি পাখর দিয়া পেট যেন চাপা আছে ।

প্রচণ্ড রাগ, বিরক্তি, অপমান, ঠাণ্ডী লাগা, অনিদ্রা, অধিক আক্ৰিম ব্যবহার ও পৈত্তিকের অরে নাতিশূল ইহা বিশেষ খাটে। ইহাতে না সারিলে ডায়োকোরিয়া বা কষ্টিক ।

কোলিন সোনিয়া—কাঠবদ্ধতা ও অর্শগ্রস্তের উপর পেট বেদনা ।

কল্চিকম—উপর পেট সংস্পর্শে যাতনা—ব্যথার দরুণ পেট বরফবৎ ঠাণ্ডা ।  
বায়ু জনিত শূল ও পেট কাঁপা, আহায়ে বৃদ্ধি, বার্হে হওয়ায় কখন কখন সমতা ।

কাম্প—নাতিশূল ও আম ভেদ ।

কামো—বায়ু জনিত ব্যথা, পেট ঢোল হইয়া অতিশয় ডাকা, চক্ষুর পার্শ্বে কালশিরা পড়া ; এক লাগাড়ে পেট ব্যথা ও মরুৎ ক্রিয়ায় সমতা না হওয়া ; অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, আহারের পর যাতনা, ঘুমন্ত চক্ষু, রাত্রে শিশুর ভেদ ও ভগ্নানক শূলের স্থায় বেদনা জন্ম চেক্‌ডান । শিশু অস্থির, চটা, একগুঁয়ে, মাই মুখে দিলে আগ্রহ সহ ধরে, কিন্তু তখনই ছাড়িয়া দেয়, গাত্রে টক গন্ধ ও সজা ভেদ । কিন্তু সন্তানকে খাড়া বা দাঁড় করাইয়া স্তন দিলে বেশ খায় । পীড়া কিছু অধিক দিন থাকিলে আমরক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর মাই টানে না । মাতার আহারের দোষে অথবা দীর্ঘকাল মৃতো ( তিজ ) কাঁথায় শয়ন জন্ম সন্তানের পীড়া, বদন গরম, গাল লাল, উষ্ণ ঘান পেট বেদনার সঙ্গে থাকা । অস্ত্র ছেঁড়া ও যেন একত্র হইয়া একটা গোলা বাঁধিতেছে, টক ও হড়হড়ে বমন । ক্ষিপ্তকারী ব্যথা ।

কাম্ফর—পাকাশয়ের শূল । নাড়ি থিম্‌চুনি । পেট কনকনানি ।

কার্বো—গাড়ি চড়ার দরুণ পেট ব্যথা । পেট পূর্ণ ও ক্ষীত, যেন ফেটে পড়িবেক, উপর পেটের বাম দিকে যেন মুঠা করিয়া ধরা বা চাপুনি, মরুৎ বা শক্ত মল ত্যাগে সমতা, কিন্তু টক ও পচা ঝেঁগার ত্যাগে যাতনা কমে না, পেট ডাকা, বলক্ষয় ; বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা, অথবা সন্ধ্যা ও আহা-রের পর রোগের বেশী বৃদ্ধি ।

কাক্সা—অস্ত্রে কষ্টকর আক্ষেপ, বিশেষ সন্ধ্যা ও রাত্রে, তৎসহ উরু ঠাণ্ডা ; পেট বড় ও শক্ত এবং ক্রোমগ্রহি ক্ষীত হওয়া, বিশেষ দাঁত উঠা কালীন, এবং বাহাদের পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও মাথা যথেষ্ট ঘামে । ইহার সঙ্গে অস্ত্র-বৃদ্ধি রোগ থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

কষ্টিক—পেট ফাঁপা, কামড়ান, কনকনানি, ব্যথা, শয়নে বা ছম্ড়ে বসার স্বস্তি । পাকাশয়ে আরম্ভ হইয়া বুক, পেট ও পীঠে বেদনা উঠা নামা, জিতে শাদা লেপ সহ উদগার, পেট ডাকা ও ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ এবং মলদ্বার চুলকুনি । ক্রীলোকের কেবল দিবসে রজঃশূল, রাত্রে যাতনা থাকে না ।

কালী—বায়ু জন্ম প্রচণ্ড শূল বেদনা, পাকাশয় যেন টুকরা টুকরা করা হইতেছে, তৎসহ উদগার ও ছেপ উঠা এবং অস্ত্র যেন জলে পূর্ণ । হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের শূল ।

কুপ্রম—সময়ে সময়ে পেটে ও হাত পায়ে প্রচণ্ড আক্ষেপ, নাভি প্রদেশে যেন ছুরি দিয়া হানা এবং উহা পীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া । যাতনার ধমকে চীৎকার ও শয্যা হইতে মাটিতে গিয়া পড়া, দড়কা, পেট খুব শক্ত হওয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা, পান কালীন জল ( টপ্ টপ্ ) শব্দ করিয়া নামা ।

ক্রোটন—নাভির চতুষ্পার্শ্বে থিম্চুনি ও নড়ো ব্যথা—তথায় কনকনানি, ছেঁড়া, কিন্তু কয়েক বার ভেঁদে সমতা—আহারে বৃদ্ধি, কিন্তু দুধ পানে সমতা ।

চিন—ফল আহার, নূতন বিয়র সরাব পান, দুর্লভকারী রেংগ বা রস-রক্ত-কর জন্ম পীড়া । প্রত্যহ সকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পেট ফাঁপা, ডাকা ব্যথা, নাভিদেশের গোড়ায় থিম্চুনি, কনকনানি, দোমড়ানয় সমতা । বায়ু-শূল সহ তৃষ্ণা ।

জিঙ্ক—অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্ম পেট ডাকা, ব্যথা ও দুর্গন্ধ সহ গরম মরুৎ ত্যাগে সমতা না হওয়া, সীসা শূল । সূক্ষ্মায় ও স্থির থাকায় রোগের বৃদ্ধি ।

জেলস—পাকাশয়ে ভার ও পেট মধ্যে চিবন বোধ ।

জৌলাপ—দিনে ভাল থাকা, কিন্তু বেদনা জন্ম সারারাত চেকড়ান । ইহাতে না সারিলে সেনা ।

টার্ট-এ—প্রচণ্ড পেট ব্যথা, অস্ত্র যেন টুকরা টুকরা করা হইতেছে, এরূপ অনুভব হওয়া । অতিরিক্ত কনকনানি এবং উহা কুচ্চিক দিয়া যেন হাঁটুতে নামা, পেট ডাকা, গাবুনি বমি, মুখে জল উঠা, ভেদ ।

ডকা—সন্ধিগরম বা ঠাণ্ডী জন্ম শূল বেদনা, নাভিপ্রদেশে থিম্চুনি, কনকনানি, পেট কামড়ান, ভেদ, কোমর ঠাণ্ডা ।

ডায়োকোরিয়া—উপর পেট ও নাভির গোড়ায় নিয়ত অতিশয় ব্যথা ও



থেকে থেকে তথায় মোচড়ান, প্রাতে ও শয়নে বৃদ্ধি, উলঙ্গারে যাতনা কমা (মরুৎ নিঃসরণে নয়) । বাহ্যেকালীন ও অব্যবহিত পূর্বে অঙ্গে—বিশেষ, বস্তিতে ভয়ানক ব্যথা এবং তথা হইতে উহার সর্বত্র বিস্তার, পেটে আক্ষেপ ও অতিশয় বেগ—হঠাৎ ব্যথা ধরা সহ খাদ্য বমন ।

ডিজিট—পাকাশয় ভার এবং তথায় খাল লাগা, টক উলঙ্গার ও বমন ; অরুচি বা অত্যন্ত ক্ষুধা, নাভির চতুষ্পার্শ্বে ছেঁড়া, নিম্নত প্রচণ্ড শূল ব্যথা ।

ড্রোস—শয়নে অত্যন্ত পেট বেদনা, ঔষধে ও বেড়ানয় সমতা, বাহ্যেকালীন ও পূর্বে শূল ব্যথা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহা সর্ব শরীরে না ব্যাপিয়া পড়ে, সেই পর্য্যন্ত উপরে উঠে ও নীচে নামে ।

থুজা—অর্শের শূল ও তলপেটে তীব্র এবং প্রচণ্ড বেদনা, অধিক বায়ু নিঃসরণ, মল কঠিন বা অল্প ও পাতলা, এবং যেন গলান সীসা মলাশয় দিয়া নির্গত হইতেছে ।

নক্স—অত্যন্ত পেট ব্যথা, কোষ্ঠ কঠিন, পুনঃ পুনঃ বৃথা ও বাহ্যের বেগ, পা তুলিয়া ছোড়া এবং পেট চাপায় স্বস্তি । প্রসূতীর উগ্র ও অধিক মসলা ব্যবহার জন্ত স্তন্যপায়ীর পীড়ায় মাতা ও সন্তান উভয়কে ইহা দেওয়া বিধি । বায়ু উর্দ্ধে ঠেল দরুণ শ্বাসকষ্ট ও অধঃ দিকে প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ । সীসের বিষ জন্য শূল, সকালে যাতনা বৃদ্ধি । অযথা ও অজীর্ণকারী আহার জন্ত বায়ু-শূল । হাঁসকুটে ও চটা মেজাজ ।

পড—প্রত্যহ প্রাতে অত্যন্ত পেট ব্যথা ও সৈতে ধরা, অঙ্গে খাল লাগা, পেটের পেশী গাঁইট গাঁইট ও থানা থানা হওয়া, স্ফল সজ্জা, জর্দা, শাদা বা মেটে বর্ণের, পেট ও পীঠ ব্যথা, বিশেষ, মল ত্যাগকালীন এবং পরে থাকা । সীসা-শূল ।

পল্‌স—পেটব্যথা, বমি, ভেদ, বাতাজীর্ণতা, আহার ও পানের পর মুখে তিক্ত তার, নানা বর্ণের ভেদ, বিশেষ রাজে, ও সঙ্কায় যাতনা বৃদ্ধি হইয়া সারারাত থাকে, কাঁছনে স্বভাব এবং টাটকা ঠাণ্ডা বাতাস সেবনে ইচ্ছা । স্নাত, চর্বিযুক্ত দ্রব্য, তেলা মাছ খাওয়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভয়ানক পেট ব্যথা—বিশেষতঃ বাম কোঁকে, তৎকালে পিত্ত ও টক বমন এবং যাতনার ধমকে দোড়াদোড়ির সহিত চীৎকার, কিছুতেই সমতা না হওয়া । বদ্ধ বায়ু জন্ত

অতিশয় যাতনা । ব্যথা সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে, কখন এখানে, কখন ওঁখানে, কখনও ভয়ানক কষ্ট, আঁখির পরক্ষণেই খুব নরম হয় ; অথবা সামান্য হইতে অতিরিক্ত বেদনা ; বদ্ধ দুর্গন্ধ মরুৎ জন্ত অতিরিক্ত যাতনা । মূত্ররোধ দ্রুণ শূল বেদনা ।

শ্লেষ্ম—পাকাশয়ে চাপুনি ও খাল লাগা, শরীর দোমড়ান ও পা উপর দিকে তোলায় যাতনা কম হওয়া । ভয়ানক বেদনা, বিশেষ নাভির চতুষ্পার্শ্বে, অল্প সংকোচন জন্ত মলবার ও নাভি ভিতর দিকে সৈঁধন । মল ভেড়ার নাদের ভ্রায় ও কুপিত ; অথবা শোচ প্রস্রাব বদ্ধ । নিয়মিতরূপে প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে বা দ্বিতীয় মাসে রোগ প্রকাশ, বিশেষ ঐ সঙ্গে অধঃঅঙ্গের ও মূত্র-স্থানীর পক্ষাঘাত থাকিলে । বদ্ধ বায়ু জন্ত ভয়ানক শূল-বেদনা । শূল ও পেটে আঁত পড়া । ব্যথা ধরায় রক্ত-ক্ষরণ বদ্ধ হওয়া । পুরাতন রোগে অধিক খাটে ।

প্লাউটা—চিত্রকরের ও সীসা-ব্যবসায়ীর শূল-নাভি প্রদেশে আরম্ভ হইয়া বেদনা পীঠ অবধি বিস্তৃত হয় । তখন চীৎকার করে ও কিছুতেই স্বস্তি পায় না, সর্বদা এগোড় ওগোড় করিয়া থাকে ।

বাল্টিসা—পিত্ত-কোষ-প্রদেশে নিয়ত ব্যথা, সর্বদা অঙ্গ নাড়া, কিন্তু তাহাতে সমতা না হওয়া ।

বারাইটা—উদগার ও পেট কামড়ান, কিন্তু গরম সৈঁকে সমতা । কষ্টকর পেট ফাঁপা এবং নাভিপ্রদেশ আঁতে পড়া । ধর্ষাকৃতি ( বাউনে ) ও যে সকল শিশু অপরিচিতকে দেখিলে কাঁদে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে ।

বার্ব—পাণ্ডুরী মূলক বেদনা ।

বিস্মথ—পাকাশয়ে ভয়ানক শূল বেদনা ও বমন ।

বেল—ব্যথা হঠাৎ ধরা ও কান্না, আবার হঠাৎ ছাড়া এবং কোন অস্থখ না থাকা । নাভির নীচে যেন থাবা মেরে ধরা বা খামুচান ও অস্থির হওয়া, পেট মধ্যে যেন একটা গোলা সঞ্চয় হইতেছে, এমন বোধ হওয়া ; ব্যথা কালে পেটের এড়এড়ি দড়ির ভ্রায় ফুলা, চাপে সমতা, উপর পেটে আক্ষেপ যুক্ত বেদনা । পাতলা পুষ্টিবৎ মল । সর্বদা তামার সংস্রবে থাকায় শূল । দোমড়ানতে নয়, কিন্তু চিত ও নয়, ( চিত হইয়া বকের দিক উচু করায় ) যাতনার সমতা । ইহা বেলের লক্ষণ ।

বোভিষ্টা—অল্পে শূল বেদনা জন্ম হুন্ডে বসিতে বাধ্য হওয়া, তৎসহ লাল প্রস্রাব। আহার করিলে ঘন্ত্রণার লমতা। (কলসিহু খাইবার পর ব্যথা বৃদ্ধি)

বোরাক্স—শিশু কোলে থেকে নামিতে চাহে না, এমন কি ঘুমুলেও বুক হইতে নামাইতে গেলে জাগে ও কাঁদে। পেট ব্যথা ও খাদ্য পরিপাক না হওয়া—যেন কতকগুলি ধারাল পদার্থ পেটে ও কোঁকে সংঘর্ষণ করিতেছে, এরূপ ঘটনা। গাড়ি চড়ার দরুণ পেট ব্যথা। পেটে অগ্নি ও অজীর্ণতা জন্ম ব্যথা এবং আর মিশ্রিত সবুজ বা কখন জর্দা ভেদ, প্রায়ই মুখে বা থাকা।

ব্রাই—ঠাণ্ডী অথবা গরমাবস্থায় শীতল জল পানের দরুণ পেট ব্যথা—আহারের পর কদম্বা উদগার উঠা, বসিলে মুচ্ছা, গা বমি বমি, বমন, পেট মধ্যে ছেঁড়া, নড়াতে এবং ঠাণ্ডা পানীয় পানে বৃদ্ধি—গ্ৰীহা প্রদেশ হুঁড়ুনি—নাভির চতুর্দিকে ফুলা ও শক্ত হওয়া এবং তথায় হুঁড়ুনি। জ্বিত শাদা ও শুষ্ক হওয়া এবং এককালে অধিক পানেচ্ছা বা তৃষ্ণার অভাব।

ভেরাট—পেট ফুলা ও স্পর্শে লাগা, প্রচণ্ড থিম্‌চুনি এবং পেটে যেন ছুরি দিয়া কাটা, অতিশয় পিপাসা ও অধিক পান, বায়ু উর্দ্ধ বা অথঃ না হইয়া অন্ত্র মধ্যে যেন অবরুদ্ধ। গা বমি বমি, গিলিতে না পারা, অহিরতা, উদ্বিগ্নতা, ভয় ও নৈরাশ্র। ভয়ানক শূল এবং কপাল ও পায়ের পাতা বড় শীতল হইয়া তৎসহ অতিশয় গা বমি বমি এবং বমন, ঠাণ্ডা ঘাম, অত্যন্ত দুর্বলতা ও নাড়ীর ক্ষীণতা; শিশু ব্যথার ধমকে যেন লম্বা ও সুরু হইয়া পড়ে। বায়ু-শূল—বিশেষ, বাতে; সমস্ত পেট ডাকা ও তথায় খাল লাগা। অন্ত্র মধ্যে অন্ত্র প্রবেশ জন্ম শূল ব্যথা।

মাগ্নিসা—দিন রাত্রে অনেকবার পেট ব্যথা ও স্টেটে ধরা; হুন্ডে বসা ও সজা ভেদ হইয়া ঘটনা বাওয়া।

মার্ক—অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কামড়ান এবং কোঁত পাড়া, রক্ত ভেদে উহার সমতা। সন্ধ্যাকালীন ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় শূল; পুনঃ পুনঃ আম, পিত্ত ও আলকাতরার স্থায় মল ত্যাগ; উরু ও পা ঘামা, রাত্রে যোগ বৃদ্ধি—পেটের সাড়াধিক্য।

রস—রাত্রে উদরাময় ও প্রচণ্ড শূল-বেদনা—রক্ত-ভেদ ও পেট ব্যথা।

রাত্রিকালে, জলে ভেজায়, চিত হইয়া পা তুলিয়া শয়নে ও স্থির থাকায় রোগের বৃদ্ধি, দোম্‌ড়ানর ও নড়ায় যাতনার লীঘব । (এ সমস্ত ব্রাইয়ের বিপরীত )

রিয়ম—অত্যন্ত পেট ব্যথা এবং সজ্ঞাতে বা জর্দাতে টক ভেদ, টক বমন, টক নিশ্বাস, এবং সর্ব শরীরে টক গন্ধ, ধৌত করিলেও উহা যায় না । শূল বেদনা এবং হাত পায়ের আচ্ছাদন খুলিলেই উহার বৃদ্ধি ।

রোড—বায়ু-জনিত শূল বেদনা, বিশেষ ঝড় তুফান কালে উহার প্রকাশে বা বৃদ্ধিতে ।

লাইক—পেট ফেটে পড়া, মরুৎ ক্রিয়ায় স্বস্তি, কিন্তু উদগারে সমতা না হওয়া ; বন্ধ বায়ু জন্ত পেট থিম্‌চুনি, স্টেটেরা ও অত্যন্ত ডাকা এবং প্রস্রাবের যাতনা নিমিত্ত চীৎকার ও ত্যাগে স্বস্তি । মূত্রাধার হইতে মূত্রস্থানী পর্য্যন্ত ব্যাথা নাম্‌ক, বিশেষ ডান দিকে । বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত যাতনার বৃদ্ধি । বেশ ক্ষুধা, কিন্তু গ্রাস কতক মাত্র খাইতে পারা ।

লেপ্টাণ্ডা—বায়ু জন্ত পেটে অত্যন্ত বেদনা ।

ষ্টানম—অজীর্ণতার পেট বেদনা দরুণ কারা । ধাত্রী যদি শিশুর পেট নিজ কাঁধে রাখিয়া বেড়ায়, তবে শিশু স্থির থাকে, অথবা কিছু জ্বরে যদি তাহার পেট চাপা যায়, তবে স্বস্তি পায়, এরূপ অবস্থায় । রাঁধা খাদ্যে ঘৃণা, জন বমন । ব্যথা ক্রমে ধরা ও ক্রমে বাওয়া এবং নাভি অবধি বিস্তৃত হওয়া । অধিক বয়স্কদের নোড়া বা কঠিন পদার্থ দ্বারা পেট চাপায় স্বস্তি । কুমি-শূল ।

ষ্টাকিস—নেয়ো-পেটা ও যাহার মাথা চুলের ভিতর পাচড়ার স্থায় চাপ চাপ হইয়া সমস্ত মাথা জুড়িয়া লয়, এমত শিশুর শূল বেদনায় উপকারী । প্রতিবার আহার বা পানের পর পেট কনকনানি—বন্ধ-বায়ু জন্ত পেট মধ্যে টিবান, বেঁধা ও ফুলা । বিরক্তি বা মাতার পীড়া জন্ত সন্তানের রোগ ।

ট্রাম—হঠাৎ শূল বেদনা সহ নীত ও মুছাবৎ অবস্থা হওয়া ।

লক্ষণ—ধাতু বিকৃতি, জন্ত রোগে ও অজ্ঞ ঔষধে ফল না দর্শিলে, প্রথম প্রথম ইহা ২৪ মাত্রা দিন পরে সদৃশ লক্ষণক্রান্ত ভেদজ বিধি । সহজ বাহ্যে, কিন্তু কষ্টে ত্যাগ, সমস্ত পেট টাটান এবং উর্দ্ধে বুক ও নীচে কুচ্চিক অবধি ব্যথার বিস্তৃতি—বক্র হইয়া বসায় সমতা, যেন পেট হইতে কিছু ছেঁড়া হইতেছে, এমন বোধ হওয়া । মিষ্ট আহারের দরুণ পীড়া ।

সন্ধ্যা—নীল-বিষ শরীরস্থ হওন জন্ত শূল বেদনা ।

সাবাড—কুমি-শূল ; পেট মধ্যে যেন একটা স্থতার গোলা ঘুরিতেছে বোধ হওয়া ; অল্পে চমকান ।

সিনা—নাড়ীর কিঞ্চিৎ উপরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ব্যথা, মোচ্ড়ান, খনন করা, বৃথা ব্যাহের বেগ, অথচ কেবল বায়ু নিঃসরণ, ঘুমন্ত বা জাগ্রত সর্বদা অস্থিরতা, একপুঁয়ে ও দ্রুত স্বভাব, দোল না দিলে না ঘুমানো ।

সিলিসা—প্রচণ্ড পেট ব্যথা জন্ত দিবা রাত্রি কান্না । শূল ব্যথা ও সর্ব শরীর আড়ষ্ট, হাত হরিদ্রাবর্ণ ও নখ নীল, মল কঠিন হওয়া এবং খানিক বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভিতরে সৈঁধন । প্রত্যহ বৈকালে অত্যন্ত পেট থিম্‌চুনি । তলপেটে বেদনা ও গরম সৈঁধে সমতা ।

সেনা—শূল দ্রুণ ভয়ানক কান্না, কাঁদিতে কাঁদিতে শরীর নীল বর্ণ হওয়া । পেটে অধিক বায়ু-বদ্ধতা জন্ত ব্যথা এবং কখন পুনঃ পুনঃ রক্ত বাহ্যে ।

সেপি—নিম্নত সন্ধ্যায় পেট ব্যথা, পলাতু তাপে সমতা, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতু-গ্রস্তের ; পেট ফাঁপা, ডাকা, জ্বালা এবং রাত্রি কনকনানি ও থ্যাথলান । বায়ু জন্ত রোগ—বিশেষ জরায়ুর পীড়া থাকিলে ।

হাইয়স—পেট ফেটে পড়া, আক্ষেপ যুক্ত কনকনানি, ঢেকুর, হিঙ্কা, বমন ও চীৎকার—বিশেষ মস্তিষ্কের পীড়া থাকিলে ।

হিপার—পেটে সংকোচকারক ব্যথা ও আক্ষেপ । নাভিপ্রদেশ কামড়ান ও চিবন, গা বমি বমি, গাল গরম । হাহাদের শুক বা কাট (মীরস) চুলকুনি, এইরূপ লোকের কষ্টকর পেট বেদনায় ইহা বিশেষ খাটে ।

### আত্মান বা পেট ফাঁপা ।

যাহাদিগের পরিপাক শক্তি কম, অথবা ঠাণ্ডী লাগার অব্যবহিত পরে, কিংবা অধিক মাত্রায় ও সর্বদা প্রচুর পরিমাণে ফল এবং তরকারী উদরস্থ করাতে আহারের পরই অম্লধ (আত্মান) আরম্ভ । পাকাশয় বা অন্ত্রে খাদ্য পরিপাককালীন বায়ু উৎপাদিত হইতে থাকে । ষ্ঠেতসার পদার্থ হইতে চূর্ণক মরুৎ, তৈলাক্ত পদার্থ হইতে কটু, ঝাঁঝাল, গরম ও চোঁয়া ঢেকুর, এবং মিষ্ট

সামগ্রী হইতে টক উদ্ধার নির্গত হওয়া । পেট কোলা, নিশ্বাস কষ্ট ও হৃদয়ের স্পন্দন হওয়া । হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বামুর পেটের গোল ব্যতীতও অত্যন্ত পেট কোলা । এমত সকল ব্যক্তির ঠাণ্ডা বা জলো বাতাস লাগান অথবা বরফাদি ঠাণ্ডা দ্রব্য সেবন, অথবা আহারের ১২ ঘণ্টা পরে অধিক গরম গরম চা ব্যবহার বিধি । প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সকালে বিকালে কায়িক শ্রম এবং পরীক্ষিত জুপথ্য এবং নিয়মিতবিশেষে মুখে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কর্তব্য ।

আকন—পেট গরম হওয়া, ফাঁপা, স্পর্শে লাগা, জর ।

আগারিকস—পেট ঢাকুপানা হওয়া, অধিক ডাকা ও অনেক মরুৎ ত্যাগ ।

আর্স—পেট কোলা, পানে শীত ও গা শীড় শীড় করা, ঠাণ্ডা সামগ্রীতে বৃদ্ধি ।

ইয়ে—অতিরিক্ত পেট ফাঁপা জন্য শ্বাস-কষ্ট ।

ওপি—পেট ফাঁপা ও ভার, ঢেকুর উঠিয়া সমতান হওয়া ।

ককু—পেট ক্ষীত, তথায় বায়ুজনিত আক্ষেপ ও নড়িলে পেটটী যেন কাটি দ্বারা পূর্ণ । ছই প্রহর রাত্রের পর পেট ফাঁপা, মরুৎ ক্রিয়ায় সমতান হওয়া, কিন্তু উদ্ধার ও পাশ ফেরায় স্বস্তি ।

কল্টি—যেন কতই আহার করিয়াছে, এভাবে পেট ঢোল হওয়া ও ঢপ ঢপ শব্দ সহ গাত্রতাপ ও শ্বাস-কষ্ট । অধিক উদ্ভিজ্জ খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা বা স্নান আব-হাওয়া জন্ত পীড়া ।

কলসিহ—পেট ফাঁপা, কামড়ান ও কনকন করা এবং স্পর্শে লাগা, পায়ের ডিমে খাল লাগা, ব্যথা জন্ত এগোড় এগোড় করা, কোষ্ঠ বদ্ধতা বা ভেদ, পৈত্তিকের বমন—বিশেষ আহারের পর ।

কটিক—পেট ঢোলবৎ হওয়া, যেন ফেটে পড়ে, আহারে বৃদ্ধি ।

কাম্প—পেট দমদমে ফাঁপা, যেন ফাটিয়া পড়ে ।

কামো—উপর পেট কষ্টদায়ক ফাঁপা ও বুকের দিকে কষ্টকর বায়ুর ঠেল মারা—বিশেষ প্রাতে । অথবা আশ্বান সহ উদরাময় বা দড়কা থাকিলে । নল্ল ও পলসের পর কখন কখন ব্যবহার্য্য ।

কার্বো—বদ্ধ বায়ু জন্ত কষ্ট, বায়ু নির্গত হইলে স্বস্তি ; অত্যন্ত দুর্গন্ধ মরুৎ । পুরাতন রোগ এবং যৎসামান্য আহারেও পেট ফাঁপা ।

কাঙ্কা—উপর পেট ঠোস মারা ।

গ্রাফাইট—প্রায় সন্ধ্যার সময় পেটে অধিক বায়ু, সটান শয়নে সমতা ।

চিন—ভেদ ও অধিক পেট ফাঁপা । আহারের ১২ ঘণ্টার পর চা বা গরম দুধ পানে পরিপাক কার্যের ব্যঘাত, এবং রক্ত মৌক্ষণ বা অধিক জোলাপ ব্যবহার অথবা বায়ু উদ্দীপক খাদ্য ভোজন দরুন পেট ফোলা, পেঁটে ধরা ও পানীয় পানে গা শীড় শীড় করা ।

টার্ট—পেট ফাঁপা, চাপায় লাগা ও যেন ছোট ছোট হুড়ী পূর্ণ বোধ হওয়া ।

নক্স—আহারের পরই পেট ফোলা, কাহিল হওয়া ও স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ।

পড—দাঁত উঠাকালীন পেটফাঁপা, প্রাতে টক বমন ।

পল্‌স—অজীর্ণতা বশতঃ পেটে অধিক বায়ু ও উহা নড়িয়া বেড়ানর দরুন পেটে ডাক, থিমচুনি ও খঁয়াতলান ; রাত্রে আহার বা ঘুম ভাঙ্গার পর রোগ । শাহাদের সর্বদা চক্ষু পীড়া ও ভেদ হয়, এমত রোগীর পক্ষে ।

পিট্রোল—শাক সজী—বিশেষ করি খাওয়া জন্ত পেটে অধিক বায়ু-সঞ্চয় ও নিঃসরণ ।

ফস্—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়, পীজরার পার্শ্বে বদ্ধ-বায়ু এবং আহারের পর বহু উদগার ।

ফস-আ—পেট দম্‌দমে ফুলা ও ডাকা ।

মাগ্নিসা-কা—অত্যন্ত পেটফাঁপা, টক ঢেকুর ও সজা ভেদ ।

মার্ক—পেট ফাঁপা ও খুব ডাকা এবং দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়া ।

লাইক—পেট, পীঠ ও বুকে বায়ু-সঞ্চয় জন্ত পেটে ভূট ভাট শব্দ এবং উদগারে তাহার সমতা ।

সল্‌ফর—পেট অধিক ফাঁপা ও সন্ধ্যায় দুর্গন্ধ মরুৎ ত্যাগ । সামান্য কারণে ও সর্বদা আত্মান ।

সিনামন—পেটে অধিক বায়ু ও তজ্জন্ত শূল বেদনা ।

সিলিসা—অত্যন্ত পেটফাঁপা ও পেটে হুড় হুড় শব্দ ।

সেনা—অধিক পেটফাঁপার দরুন শিশুর কারা ।

সেপি—অত্যন্ত আহারের পরও খুব পেট ফাঁপা, শিশুর ন্যূনতা জন্ত রোগ ।

হাইয়স—স্নায়বিক বা বাতিকের জরে পেট ফাঁপা ।

### পাকাশয়ের আক্ষেপ—মুখ দিয়া জল উঠা ।

পাকাশয় প্রদেশে সংকোচকরক ও আক্ষেপযুক্ত, চিবনবৎ বেদনা, এবং তাহা বৃক গীঠ অবধি বিস্তৃত হওয়া, তৎসহ উষ্মগ, গা বমি বমি, উকার বা বমন ; মুচ্ছাবৎ দুর্বলতা, মুড়া ঠাণ্ডা, কখন বা শব্দময় মরুৎ ক্রিয়া, এবং কখন বা টক জল উঠিয়া তাহার সমতা, মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা ।

যক্ষ্ম, প্লীহা, ক্লোম, পাকাশয়, ক্ষুদ্র অন্ন বিশেষ (Gout) আস্থলে বাত রক্ত সঙ্গে অবস্থান করে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হইয়া থাকে—ঋতুর পর বা উহা বন্ধ হওয়ার দরুন এবং তৎকালে হিষ্টিরিয়া বা গুণ্ড-বায়ু ও মুচ্ছা এবং হস্ত রক্ত বমন হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে অর্থাৎ বাল্যকালে এই রোগ বিরল। দীর্ঘকাল অনাহার, খুব গ্রন্থ বা খুব ঠাণ্ডা পানীয় পান, স্নায়ু, অজীর্ণকারী খাদ্য এবং কখন কখন ঠাণ্ডী লাগা বা আর্দ্র বায়ু সেকনে রোগের উৎপত্তি হয়।

পাকাশয়ের আক্ষেপ বা খাল লাগা, কাওয়া পান জনিত রোগ পক্ষে—  
ইমে, ককু, কামো, নক্স ।

—রাগ বা শোক হইতে—ইমে, কলসিহ, কামো, নক্স, ষ্টাফিস ।

—সন্তানকে স্তন দেওনা, রক্ত ক্ষয়, অধিক জোলাপ ব্যবহার জন্ত  
আক্ষেপ—আলেটিস, ককু, কার্বো, চিন, নক্স, হেলোনিয়স ।

—অজীর্ণতা জন্ত—কার্বো, চিন, নক্স, পল্‌স, ব্রাই ।

—স্নায়ুপান ও অল্প অল্প অত্যাচার—কার্বো, কাক্স, নক্স, সল্‌ফর ।

—ফোটক বা গুটি আদি বাহির না হওয়া—সল্‌ফর ।

—রজঃ-কালীন—পল্‌স, সেপি, ককু, কামো, নক্স ।

—রজঃ অন্ত, বা রোগী দুর্বল হইলে—ককু, পল্‌স ।

—রজঃ প্রচুর হইলে—কাক্স, বেল, লাইক ।

—যক্ষ্ম ও অঙ্গের যথা-বিহিত কার্যের শিথিলতা জন্ত—কার্বো নক্স, সল্‌ফর ।

আর্জেন্ট-না—পাকাশয়ে প্রচণ্ড আক্ষেপ সহ কাটনেকার ও তিত্ত বমন—  
বিশেষ যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতু আশুড়ি ও প্রচুর ।



আর্গিকা—পড়া বা পাকাশয়ে চোট লাগার দরুণ আক্ষেপ। পাকাশয়ে ও বৃকের অগ্রভাগে পূর্ণতা ও সংকোচকারক বেদনা এবং কড়ার নিয়ম প্রদেশে পাথর দিয়া চাপুনির ন্যায় বোধ অথবা বুক সঁটে থাকা ও পীঠ অবধি ব্যথা, আহারে পানে বা চাপে বৃদ্ধি।

আর্স—পাকাশয় জ্বালা ; কটু ও টক উদগার ; ভুক্ত পদার্থ, শ্লেষ্মা, বা কখন রক্ত বমন ; জিভ লাল, কম্পাষিত, জীর্ণ-শীর্ণ।

ইয়ে—শোক, উদ্বিগ্নতা বা বলক্ষয় জন্ম এবং হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের পীড়া।

ইপি—উপবাস বা অধিক আহার দরুণ পাকাশয়ে খাল লাগা, গা বমি বমি, বমন ও অম্লত্ব।

ককু—বায়ু নিঃসরণে যাতনা কম পড়া। কামো ও নল্লের পর ব্যবহার্য্য।

কষ্টিক—পাকাশয়ে চাপুনি, আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও যেন থাথা মেরে ধরা, অথবা ব্যথার বৃদ্ধিকালীন কঁাপুনি, অন্ন হওয়া ও জল উঠা।

কামো—কড়ার নীচে যেন পাথর দিয়া চাপা, পেট কঁাপা, শ্বাস-কষ্ট, মাথা দপদপানি। কাওয়া পানে যাতনা কম পড়া। রাগ হইতে রোগ।

কার্বো—পাকাশয় জ্বালা, ব্যথা, চাপায় লাগা এবং যাতনার বৃদ্ধি।

কাঙ্কা—জ্বর রোগ বা খুব সুরাপায়ীর পীড়া, অথবা যে সকল জ্বালোকের নাক হইতে রক্ত পড়ে বা অধিক রক্তক্ষরণ হয়। ব্যথা রাতে বা আহারের পর ; বমন বা গা বমি বমি ও অন্ন হওয়া। কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা পুরাতন উদরাময় ও অর্শ থাকিলে অধিক খাটে।

চিন—অধিক রস-রক্তক্ষয়, পেট ক্ষীত ও ভার, আহারে পাকাশয়ে কষ্ট এবং অনাহারে ভাল থাকা।

নল্ল—পাকাশয়ের আক্ষেপের প্রধান ঔষধ। সুরা, চা, বা কাওয়া পান, অথবা অর্শগ্রস্তের রোগ, বিশেষ গুল্ম থাকিলে। কাপড় যেন খুব কসিয়া পরা, এমন বোধ ; আহারের পর অধিক সংকোচন। অথবা গা বমি বমি ও জল উঠা, গলা জ্বালা। ঠোঁঠ ও মাড়ি শাদা, লাল ও ফুলা, জিভ ফাটা ও কম্পাষিত, জর্দি বা শাদা লেপযুক্ত। চক্ষুর পাতা ফুলা, বমন, হৃৎকম্প, ইত্যাদি লক্ষণ-যুক্ত। কখন রাগ হইতে রোগ, বা প্রাতে বৃদ্ধি অথবা ঘুমন্ত ব্যথা ধরায় নিদ্রা ভঙ্গ।

পল্ল—পাকাশয়ে বেঁধা, নড়ায় এবং আহারে যাতনার বৃদ্ধি ও ভেদ হওয়া।  
রক্তবদ্ধ দরুণ রোগে বিশেষ ফলদায়ক।

প্লাটিনা—ঋতুকালীন পাকাশয়ের বেদনা, বিশেষ রক্ত: অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী হইলে।

বেল—কড়ার নীচে সঁটে ধরা, চিত হইয়া দম বন্ধ করিলে সমতা; মধ্যাহ্ন ভোজনকালীন পাকাশয়ের আক্ষেপ, অথবা ব্যথা জন্ত অজ্ঞান হওয়া। জিত চক্চকে লাল হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং পানকালে ও তৎপরে বেদনার বৃদ্ধি; রাত্রে অনিদ্রা, দিনে ঝিম।

ব্রাই—বিশেষ বাতগ্রস্তের, আহারান্তে পাকাশয়ের পূর্ণতা; মাঝে মাঝে কনকনানি; চাপায় ও উলগারে সমতা; অত্যন্ত মাথা ব্যথা এবং নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি।

ঝাকাসি—স্বরাপায়ীর পাকাশয়েই আক্ষেপ, আহারে সমতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বায়ু-সঞ্চয়, হাত পায়ের কম্প ও দুর্বলতা।

লাইকপ—পাকাশয় ফুলা ও উভয় মুড়া হইতে চাপুনি, কোষ্ঠবদ্ধতা, পীঠ এবং কোমর বেদনা। ঠোঁঠ ফাঁকশে; চক্ষের পাতা প্রদাহিত ও পুরু হওয়া। সকালে, আহারের পর বা বাহিরের বাতাসে উপসর্গ বৃদ্ধি, বিশেষ যে জ্বীলোকের অধিক রক্ত: ভাজে।

সল্ফর—কোন পুরাতন চর্মরোগ বদ্ধ দরুণ, বিশেষ জ্বীলোকের ঋতু-বিশৃঙ্খলতা জন্ত। বুক জালা, অশ্রু, কোষ্ঠবদ্ধতা; ও আহারের পর যাতনার বৃদ্ধি—জ্বর রোগে ব্যবহার্য।

### পাকাশয় প্রদাহ।

কপাল ব্যথা, জ্বর, নাড়ীমোটা, সর্বাঙ্গ গরম, মাথা ও হাতের চেটোয় অধিক তাপ, পরে ঘর্ম। কড়ার নিম্ন প্রদেশে জালা ও ব্যথা এবং চাপায় বৃদ্ধি, মুখ তিক্ত, জ্বালাকর উলগার, নিয়ত গা বমি-বমি বা কাট নেকার, এবং প্রথম প্রথম পৈত্তিকের সজ্জা, পরে রক্ত-বিশিষ্ট কালবর্ণের বমন, জিহবার গোড়া শাদা, আগা ও ধার লাল চক্চকে এবং আর্দ্র। অধিক পিপাসা, কিন্তু জলীয় দ্রব্য উদরস্থ করিলেই তাহা উঠিয়া পড়ে। হিকা, অরুচি, মন্দাশ্বিতা, শৌচ প্রস্রাব বদ্ধ, কিম্বা মল প্রায়ই কঠিন, রোগ অবসান কালে ঘন ঘন ভেদ;

কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় পর পর প্রকাশ ; অত্যন্ত বলক্ষয়, অস্থিরতা, চক্ষু ও মুখ বসা, শ্বাস-কষ্ট । হঠাৎ ব্যাধি বন্ধ কুলক্ষণ ।

অল্প কর্তৃক হত্যা বা স্বয়ং আত্মহত্যা উদ্দেশে অথবা ঔষধরূপে ঘোড়ার জোলাপ, রসকপূর বা সৈকো প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ করিলে পাকাশয় ও অস্ত্রে ভয়ানক বেদনা এবং জ্বালা, রক্তভেদ, বমন এবং বেগ, ত্রিহীনতা, এককালে নেতিয়া পড়া ; শরীর—বিশেষ হাত পা শীতল, চট্‌চটে ঘাম, নাড়ী ক্ষুদ্র সূতাৎ ও ক্ষণ-লুপ্ত ক্ষণ-প্রকাশিত এবং শেষে অঙ্গ খেঁচুনি হইয়া মৃত্যু ।

এককালে অধিক বা পুনঃ পুনঃ অনেকবার বা গুরুত্ব্য আহার ; অধিক দ্রুত অল্প উদরস্থ করা, গরমাবস্থায় অধিক বরফ ব্যবহার, হঠাৎ ভয়, বিরক্তি বা রাগ হওয়া এই রোগের উৎপত্তির কারণ ।

হাম আদি চর্মরোগ ও টাইফয়েড জ্বরের পূর্বলক্ষণ হইবার সূচক ।

প্রায়ই এই ব্যাধি অল্পদিবস স্থায়ী । তবে কারণেই হউক ইহাতে আহারের কোট্‌কেনা নিত্য আবশ্যক । মাই বন্ধ করিয়া ২।৪ দিন জলসাপ্ত বা আনারকট ছাঁকিয়া ২।৩ ঝিছুক বন্ধাদ্ধ সহ মিশাইয়া দিবা । বড়দের জৈব উষ্ণ গাঁদ ও চিনির জল, টুকরা টুকরা বরফ, নামমাত্র আহার এবং অল্প সুপথ্য নিরাময়ের একটি প্রধান উপায় ।

অধিক আহার বা ভ্রমবশতঃ বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ হইলে অনতিবিলম্বে লবণ-মিশ্রিত উষ্ণ জল পান বা গলায় আঙ্গুল বা পালক দিয়া বমন করা বিহিত ; পরে রাসায়নিক বিষন্ন পদার্থ প্রয়োগ—যথা অম্লঘটিত বিষে (Acid) ক্ষার-পদার্থ (Alkalies) এবং ক্ষার ঘটিত পদার্থে অম্ল দেওয়া বিধি । অম্ল ঘটিত বিষের ঔষধ, কাঙ্কা ; ক্ষারের, নাইট্রো-আ ; তৈল ঘটিত পক্ষে, আর্স, নক্স, এবং ধাতু সঞ্চকীয় পক্ষে, হিগর ।

আইরিস—মুখগহ্বর, গলনালী, পাকাশয় ও ক্রোম প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা, বমন, ভেদ ও অত্যন্ত বলক্ষয় ।

আকন—ঠাণ্ডীবশতঃ, বিশেষ ভয় হইতে উৎপাদিত রোগ, প্রাদাহিক জ্বর, উপর পেট টিপিলে লাগা, কড়ার নিম্নপ্রদেশ জ্বালা, তিক্ত বমন সহ মৃত্যু ভয়, জল ভিন্ন সব তিক্ত, অধিক তৃষ্ণা, মাথা ভারি, কপাল ব্যাধা, বদন অতিশয় শুষ্ক, নাড়ী দ্রুত ও মোটা, শ্বাস-ধ্বংসতা, অতিশয় অস্থিরতা ।

আগিকা—পাকাশয়ে কষ্টকর চাপ এবং থিম্‌চুনি ও ব্যথা, বিশেষ আহার-কালীন বা আহারের অব্যবহিত পরে চাটনিভিষের গন্ধের স্থায় উদগার, জমাট কাল রক্ত বমন ( আর্স, নক্স ), অরুচি ও অক্ষুধা, সর্বশরীর টাটান, শয্যা কঠিন বোধ জন্ত সর্বদা এপাশ ওপাশ করা, আঘাত লাগা ও পড়া জন্ত প্রদাহ, রক্ত বমন, মাথা গরম, কিন্তু অপর সকল অঙ্গ ঠাণ্ডা। অথবা অভক্ষ্য দ্রব্য বা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ-হওন জন্ত পীড়া।

আর্স—ঠাণ্ডা বশত: অথবা অপর ফল মূল, শাক সজ্জি বা বরফ বা শীতল খাদ্য ভোগে জন্ত রোগ। গাঁ বমি বমি, আহারকালীন বা আহারের ক্ষণ পরেই অথবা বসন্তের সময় পাকাশয়ে বা পেটে প্রচণ্ড বেদনা, উঠিয়া বসিলে অধিক বমি, অল্প পিপাসা ও পুনঃ পুনঃ অল্প পান; আহার মাত্র বা আহারের দুই ঘণ্টা পূর্বে ভুক্তদ্রব্য বমন হওয়া; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ও মৃত্যু ভয়; অথবা হঠাৎ ব্যথা বা পাকাশয়ে কেবল জ্বালা জ্বালা এবং নাড়ী দুর্বল ও অসম বা ক্ষণিক; পুনঃ পুনঃ পুষ্ট নির্গমন; কিম্বা সঙ্কটাবস্থায় হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ চক্ষু বসা, হিকা। সুরাপায়ীরা এবং ভয়াবহ রোগে ইহা ও ভেঁড়াট বা নক্স, পর পর—এমন কি কুড়ি ত্রিশ মিনিট অন্তর দেওয়া হয়।

আক্সলস্—পাকাশয়ে অসহ্য কষ্ট ও যাতনা জন্ত দুর্বল ও মুচ্ছাবৎ, গা ঠাণ্ডা এবং হাত ও পায়ের পাতায় আক্ষেপ।

ইউক্রেসিয়া—বরফ বা ফলাহার জন্ত পীড়া, হঠাৎ গা বমি বমি বা বমন, জলবৎ ভেদ, পাকাশয়ে অতিরিক্ত ও অনিবার্য যাতনা জন্ত মুচ্ছাবৎ হওয়া, গা ঠাণ্ডা হওয়া এবং হাত ও পায়ের পাতায় আক্ষেপ থাকা।

ইপি—নিয়ত গা বমি বমি, উদগার, মুখে অধিক থুথু উঠা, বমন, খাদ্যে বিদ্রোহ, পাকাশয়ে বেদনা, সঙ্কল্প আমভেদ। অপর টুক ফল, বা চাটনি ও আচার খাওয়া জন্ত পীড়া।

কষ্টিক—পাকাশয়ে অতিরিক্ত অল্প হওয়া ও জ্বালা, উপর পেট দৃঢ়তায় ফুলা, জ্বালাকর উদগার, বদন হরিদ্রা বর্ণ, কপাল ও হাত ঠাণ্ডা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গলা-গুড়ু-গুড়ুনি জন্ত উৎকানী।

কাহ্—পাকাশয়ে প্রচণ্ড ব্যথা, নিরাশ হইয়া এগোড় ওগোড় করা, পাকাশয়ে কখন কখন অল্প অবধি অত্যন্ত জ্বালা, তথায় হাত দিতে না দেওয়া; রক্ত ও

শ্লেষ্মা বমন, প্রচণ্ড কাটনেকার ও শূলবেদনা ; পাকাশয় হইতে অল্প বেদনা, সর্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা ও ফোটা ফোটা পড়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কাটনেকার । অধিক পেট ব্যথা ; বাহ্যে—অল্প-চাঁচা বা কেবল মাত্র রক্ত ভেদ ; অস্থিরতা ।

কামো—সুত্বপায়ী ও বালিকার পাকাশয় প্রদাহ, বদন গরম ও লাল ; মুখে তিক্ত তার, উদগার, পৈত্তিকের বমন, পেট শ্চাকা, সজ্জা ও শ্লেষ্মা বা আম ভেদ ; অস্থিরতা, চটা ভাব ; ক্রন্দনের সময় বেড়াইলে চূপকরা ; বিরক্তি বা রাগ জন্ম রোগ ।

কার্বো—পাকাশয় জ্বালা ও ফুলা, কটু ও টক উদগার, অল্প জ্বর্য স্পৃহা, মাংসে ঘৃণা, অতিরিক্ত ভোজন, পান বা স্নাতক এবং তৈলাক্ত ক্রান্ত উদরস্থ করা ও অগ্নিতাপজন্ম যে পীড়া, তাহাতে ইহা ব্যবহার্য্য ।

চিন—পাকাশয় ও অন্ত্রের পূর্ণতা এবং ক্ষীণতা ; ঢেকুর, টক জ্বালা ও বুকজ্বালা, বিলক্ষণ ক্ষুধা, কিন্তু আহারের নামে গা বমি বমি, পাকাশয়-স্পর্শে বেদনা ও উহার অভ্যন্তর ঠাণ্ডা বোধ হওয়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অল্প জলপান ।

নক্স—মাতা বা সন্তানের উগ্র, উত্তেজক ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার, যথা—সুরা, আফিম, কাওয়া বা মসলা খাওয়া, অথবা মানসিক শ্রম, রাত্রি জাগরণ বা রাগাদিকারণে রোগ । উপর পেটে অতিশয় সংকোচকারক ব্যথার জন্ম কাতরাণি ও কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অত্যন্ত ঘাম, বিশেষ বাতিকের ধাতুগ্রস্ত পক্ষে ; গালা জ্বালা, মুখে টক বা তিক্ত তার, টক ঢেকুর, টক শ্লেষ্মা বা রক্ত বমন, অগ্ননালী ও মুখ জ্বালা, পাকাশয়ের পূর্ণতা ও তার, মাথাধরা বা ঘোরা, একপুয়ে ও চটা, ভাব ; প্রাতে আহারের পর ও ঘরের বাহির হইলে অস্থির বৃদ্ধি ।

পল্স—উপর পেট ব্যথা ও চাপিলে লাগা, অক্ষুধা, অতৃষ্ণা, মুখের ও খাদ্যের তিক্ত তার, পুনঃ পুনঃ টক জল ও গাঁজলাটে শ্লেষ্মা উঠা, ভোজন ও পানে অকষ্টকর ভেদ, বিশেষ রাত্রে বমন ও ভেদ ; গা শীড় শীড় করা, উঠিলে মাতাঘোরা, সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি ।

ফস্—পাকাশয় কনকন করা ও জ্বালা, মুখ দিয়া গরম বায়ু নির্গত হওয়া, অত্যন্ত পিপাসা, হৃৎপ্রদেশে জ্বালা, মুখ থিঁচুনি, অত্যন্ত শীত বোধ । অথবা

হাত ও পা অতিশয় শীতল, গা গরম, চক্ষু সজল, ওষ্ঠ কোঁকশে, নাড়ী দুর্বল, দিন দিন বলহীন হওয়া । পানের পর জল পাকাশয় মধ্যে গরম হইলে উঠিয়া পড়া ।

বেল—পাকাশয়ের কনকনানি ও জ্বালা, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি, ভোজনকালে পাকাশয়ে আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠের দাঁড়া অবধি উহা বিস্তৃত হওয়া, হঠাৎ ব্যথা ধরা ও হঠাৎ ছাড়া, তৃষ্ণা, কিন্তু পানে বৃদ্ধি, হিক্কা, সর্বদা ঢোক গিলা এবং ঢোক না গিলিলে দম আটকান বোধ হওয়া, কষ্টে অত্যন্ত বমন, রক্ত উর্দ্ধগ জন্তু মাথার দপদপানি, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, সর্বদা নিদ্রালু কিন্তু নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চমকানি, লাফান, প্রলাপ ও শয্যা হইতে পলাইতে উদ্যত হওয়া ।

ব্রাই—পাকাশয় জ্বালা ও স্পর্শে ব্যথা, নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি, আহাৰ বা পান করার বমন আরম্ভ ( আর্স, নক্স ), কড়ার নিম্ন প্রদেশে যেন এক থানা পাথর থাকা বোধ এবং অনেক উদগার হইয়া তাহার সমতা; তৃষ্ণার অভাব বা অতিরিক্ত পিপাসা ও এককালে অধিক পান; মল কঠিন, কাল ও পোড়ার মত; বসিলে গা বমি বমি ও মুচ্ছা, প্রলাপ ও পলাইবার ইচ্ছা; গ্রীষ্ম কালের পীড়ায় এবং শাক সজ্জি ও বায়ু উদ্ভবকারী খাদ্য ভোজন অথবা খুব উষ্ণ অবস্থার ঠাণ্ডা জল পান দরুণ পীড়ায় ইহা ব্যবহার্য্য ।

ভেরাট—পাকাশয় জ্বালা ও ভার, গা বমি বমি, বমন, নেতিয়ে পড়া, চক্ষু বসা, ঠোঁট শুষ্ক ও কালচে হওয়া, পাকাশয় টাটান (জ্বালা ও ভার), অতিরিক্ত তৃষ্ণা, পেটে কিছুই না থাকিয়া বমন হওয়া, হাত পা ঠাণ্ডা; সর্ব শরীরে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ধাম; মূত্ৰ ভয়, নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, বলক্ষয়কারী ভেদ হওয়া । পীড়ার সঙ্কটাবস্থায় ইহা ও আর্স পর পর দিবা ।

ভেরাট-ভি—কড়ার নিম্ন প্রদেশে অতিরিক্ত বেদনা; গলা শুষ্ক, উত্তপ্ত ও সংকুচিত; অতিশয় গা বমি বমি ও বমন; আহাৰ্য্য উদরস্থ করিবা মাত্র তুলিয়া ফেলা; প্রথমে খাদ্য, পরে শ্লেষ্মা ও সেই সঙ্গে রক্ত বা রক্ত ও পিত্ত বমন, তৎসহ নাক এবং চক্ষু হইতে জল ঝরা; কষ্টকর কাটনেকার এবং হিক্কা ।

মার্ক—পাকাশয় জ্বালা, রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন, অল্প মাত্র জলীয় দ্রব্য পানে তুলিয়া ফেলা, কিছুতেই পিপাসার নিবারণ না হওয়া, শিশুর হঠাৎ বমন ।

সান্সুইনেরিয়া—তরুণ রোগে পাকাশয়ের ভয়ানক আলা, অনিবার্য তৃষ্ণা, পাকাশয়ের ব্যথা, বমন, নেতিয়ে পড়া।

হাইদ্রস—পাকাশয়ে প্রচণ্ড শূলবেদনা সহ বমন ও হিক্কা; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং পাকাশয় স্পর্শে লাগা।

### অন্ত্র-প্রদাহ।

পাকাশয়ের প্রদাহ অপেক্ষা শিশুদিগের অন্ত্র-প্রদাহ অধিক হইতে দেখা যায়। অনেক সময় প্রথমে ফল স্বরূপ শেযোক্ত রোগটি হইয়া থাকে।

সর্ব প্রথম পেট সামান্যতরু মাত্র নরম করে, ক্রমে বাহ্যে বারে অধিক ও রূপান্তর হয়। মলত্যাগের পূর্বে গেঙানি, মুখ বিকট করিয়া চিক্ড়ে উঠা এবং কচিং বা হস্ত পদাদির খিঁচুনি এবং বাহ্যেকালীন কাতরাপি ও কান্না; রক্ত, পুষ ও অন্ত্রের ছাল-মিশ্রিত পাটকিলে বর্ণের আম, কখন কখন থান থান সজাটে মল, কচিং বা ফিল্কি দিয়া বেগে জলবৎ মল-ত্যাগ এবং সর্বশেষে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য সহ কৃষ্ণ বর্ণের বাহ্যে, এই সমস্ত অন্ত্র-প্রদাহের প্রধান চিহ্ন। ইহার সঙ্গে মলদ্বার ফুলা ও হাজা, এবং অনেক সময়ে মলাশয়ে (মল-ত্যাগ-কালে) গোগোল বাহির হওয়াতে কষ্টের আধিক্য হয়। জ্বর, নাড়ীর দ্রুত-গতি, গাত্র-আলা; জিহ্বা প্রথম প্রথম স্বেত ও আর্দ্র, পরে শুষ্ক ও লাল, বা পাটকিলে বর্ণের হয়। অনিবার্য পিপাসা, নিয়মিত জল পান, বমন, পেট ফাঁপা; পেট অতিরিক্ত গরম হয় এবং টিপিলে তথায় ব্যথা লাগে; রোগী দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ হয় এবং প্রাচীনের ত্রায় তাহার স্বক (চেহারা) শুষ্ক এবং তোবড়া তোবড়া দেখায়। শিশু একরূপ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়ে যে, ক্রন্দন করিতেও অক্ষম হয়, স্ততরাং কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করে। এই সময় বাহ্যে বন্ধ হইয়া পেট ঢোলের ত্রায় ফুলে। সর্বশেষে তেজোহীন ও আক্ষেপাধীন (Convulsions) হইয়া শিশু পঞ্চদ পায়।

স্তম্ভপায়ীর পক্ষে এই রোগ বড়ই কঠিন। পঞ্চম বৎসর কাল মধ্যে শিশুর বয়স যতই অল্প, পীড়া ততই অধিক ভয়ঙ্কর হয়। এই কালের পর ব্যাধির ততদূর উৎকট উপসর্গ হয় না। তখন প্রথমতঃ সামান্যতর উদরাময় হয়, শিশু হাসিয়া

খেলিয়া বেড়ায়; ক্ষুধা হয়তো স্বাভাবিকরূপেই থাকে, নয়তো ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। এইরূপ ৮।১০ বা অধিক দিন থাকিয়া জ্বর, তলপেট ব্যথা, পিপাসা, অক্ষুধা ও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। কখন কখন ওরূপ না হইয়া, হঠাৎ মাথা ব্যথা, পিত্ত ও ভুক্তদ্রব্য বমন, উপর ও তলপেট ব্যথা, পিপাসা এবং অক্ষুধা হয়। চারি হইতে দশ দিন মধ্যে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়। যদিও মুখমণ্ডল এককালে রক্ত-শূন্য হয় না, কিন্তু চেহারা বিকৃত, স্বক উত্তপ্ত ও আর্দ্র, এক মিনিট কাল মধ্যে এক শত হইতে এক শত কুড়ি বার নাড়ীর স্পন্দন, এবং নাড়ী ও তৎপার্শ্বদেশ টিপিলে ব্যথা, তলপেট গরম ও ঢব্‌ঢবে ফাঁপা, বাহ্যে কখন অত্যন্ত পাতলা এবং বারে ও মাত্রায় অধিক, কখন বা অপেক্ষাকৃত ঘন এবং দিবা রাত্রি মধ্যে দুই দুইতে ছয় বার হইয়া থাকে। জর্দা বা পাটকিলে আম বিশিষ্ট পৈত্তিকের ভেদও হয়।

অুরন্তের দুই এক দিন পরেই বমি-রুদ্ধ হয়, কখন কখন বা গা বমি বমি মাত্র থাকে। জিহ্বা আর্দ্র, কচিং শুষ্ক, তাহার অগ্র ও পার্শ্বভাগ লাল, এবং গোড়ায় কম বেশী পুরু শাদা বা জর্দাটে ছেতলা, কখন কখন মুখ ও নিঃশ্বাস দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। এককালে নিজার অভাব, বা স্ননিজ্রা না হওয়া, প্রলাপ প্রায় থাকে না, তবে রক্ত-প্রাধাত্য-ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের সকল পীড়াতেই প্রলাপ দেখা যায়। এইরূপ কিছু দিন থাকিয়া জ্বরের লাঘব হয়, ভেদ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, পেট ব্যথা এককালে যায় এবং দুই বা তিন সপ্তাহ ভোগ করিয়া শিশু নির্কর্য্যাদি হয়।

এই রোগ ক্রোম যন্ত্র আক্রমণ করিলে উহাকে ক্রোম-প্রদাহ কহে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুর পূর্ব রোগ হইতে কখন কখন এই রোগ হয়, এবং তৎকালে পশ্চাত্তর উপসর্গগুলি দেখা যায়। শিশু ম্যাদামারা ও একগুঁয়ে হয়, যদিচ পরিপাকের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু আহার দিলেই টান্‌কু মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সেই সময় চক্ষু এককালে খোঁদলে পড়ে, এবং পাঞ্জরা ও ট্যাকের হাড় বাহির হইয়া পড়ে। পেট ছুঁইলে লাগে না, কিন্তু নড়িতে চড়িতে ব্যথা বোধ হয় এবং সেই জন্ত সর্বদা চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। রাত্রি কালে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত এবং গাত্র উত্তপ্ত হয়; বিশেষতঃ পেট, পা ও হাতের চেটো অধিক গরম, এবং শিশু দিন দিন শীর্ণ ও



ক্ষীণ হয় ; জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু ঘোরাল লাল ; ব্যাধি কিছু অধিক দিনের হইলে শরীর চনামারা হইয়া পড়ে ।

কখন প্রথমে শীত, পরে অতিরিক্ত তাপ ; পেটে, বিশেষ নাভি প্রদেশে জ্বালা, ছেঁড়া এবং তথায় স্পর্শে, বা বমনে, বা কাশিতে কিংবা শ্বাস প্রশ্বাস সময়ে যাতনার বৃদ্ধি । রোগী চিত হইয়া পা উর্দ্ধে তুলে এবং গৌঁ গৌঁ করিতে থাকে, নড়িতে সাহস করে না—তাহা হইলে যাতনার একশেষ হয় । জ্বিত শুষ্ক ও তাহার মাঝখানে লেপ এবং আগা ও ধার লাল ; অতিশয় দাহ এবং অনিবার্য তৃষ্ণা, পেট কুলা, গরম ও স্পর্শে লাগা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, গা বমি বমি, এবং প্রথম শ্লেষ্মা ও পিত্ত, পরে সবুজ বর্ণের মলের স্রাব বমন । ৭।৮ দিবসের অধিক রোগ অবস্থান করে না । হঠাৎ ব্যথা থামা, নাড়ী বসা, শ্রীহীন হওয়া, মুণ্ডা ঠাণ্ডা হওয়া, গাত্রে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম, হিকা, অন্ন অন্ন প্রলাপ ও মাঝে মাঝে দড়্‌কা, ইত্যাদি ঘটয়া মানবলীকার শেষ হয় ।

অধিক ও অপক্ক ফল, উগ্র জ্বোলাপ ও স্রাব ব্যবহার, আবাত লাগা, পেটে কঠিন মল সঞ্চয়, ইত্যাদি কারণে এই রোগ দেখা দেয় ।

নিদান । মাতার অনিয়মে জঠরস্থিত সন্তানেরও অন্ত্রের প্রদাহ কখন কখন হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওনের পর অল্প দিনের মধ্যে প্রায়ই মারা যায় । দস্ত উঠা ও মাই ছাড়ান কালীন সর্বদা এই রোগ হইয়া থাকে । স্ফোটক রোগ ( হাম, বসন্ত ইত্যাদি ), নিউমোনিয়া নামক কাশরোগ সহ ইহা অবস্থান করে । অধিক পরিমাণে রেচক ও ক্যালমেল (Calomel) ব্যবহার এবং লামাষ্ঠিতঃ হিম বা ঠাণ্ডী লাগা, এই রোগ উৎপত্তির কারণ । উদরাময় হইয়া চারি পাঁচ দিনে না সারিলে চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, রোগ সামান্য বলিয়া অবহেলা করা অবিধেয়, কারণ উহা হইতেই অস্ত্র-প্রদাহ হওন সম্ভব । সংপ্রতি মাই ছাড়ান বশতঃ পীড়া, এরূপ অসম্ভব হইলে, পুনরায় স্তন পান করিতে দেওয়া বিধি । আহারের বিলক্ষণ কটকিনা কর্তব্য । অল্প মাত্রায় সাণ্ড বা আরোরট সিদ্ধ এবং তাহার সঙ্গে আবশ্যকমতে দুই এক বিহুদু হুগ্ধ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিলেও কতি হয় না ।

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সর্ব প্রথম এক, দুই বা অধিক ঘণ্টা অন্তর কামোমিলা দিয়া কোন উপকার না হইলে, লাইকপোডিয়ম তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিবা ।

আইরিস—নাভি প্রদেশে ভয়ানক শূল ব্যথা, পরে বমন বা ভেদ ।  
রাত্রি ছুটা তিনটার পর জলবৎ ভেদ ও ভয়ানক মলদ্বার জালা ।

আকন—ঘাম বন্ধ দরুণ পীড়া, বিশেষ সমুদয় আমাশয়িক বিল্লীর প্রদাহ ।  
পেট দম্ভমে ফুলা, অত্যন্ত গরম হওয়া, জালা ও কনকনানি, অত্যন্ত স্পর্শে  
লাগা, পুনঃ পুনঃ অল্প পাতলা বাহে, কটু ও অল্প প্রস্রাব, প্রবল জ্বর ।  
রোগের প্রথম দুই দিনে অনেক সময় ইহাতেই নির্বাধি করে ।

আন্ট—পাকাশয়ের পীড়া ইহাতে অস্ত্র-প্রদাহে ইহা বিশেষ খাটে, জিভ হৃদে  
শাদা, জলবৎ ভেদ ।

আর্জেন্ট-না—জলবৎ হড়্‌হড়ে ভেদ, রাত্রে বৃদ্ধি, কিছু পান করিলে কুল কুল  
করিয়া উহার অস্ত্রে নামা, পেট জালা, জ্বর, শীর্ণতা । পুরাতন রোগে অধিক ব্যব-  
হার্য্য । অধিক মিষ্ট খাওয়ার দরুণ উদরাময় সহ অধিক শব্দ বিশিষ্ট মরুৎ ক্রিয়া ।

আর্নিকা—অধোর, অচেতন, নিঃশব্দ, জিভ শুষ্ক ও তাহার মাঝখান  
পাটল বর্ণ, পেট ফুলিয়া ঢোল ও তদভ্যন্তরে যাঁতা পেশার ঞ্চায় যাতনা,  
অনিচ্ছাধীন শৌচ এবং প্রস্রাব ।

আর্স—রোগের চরমাবস্থায় হঠাৎ বলহীনতা, ঘাম, অস্থিরতা, অতিশয় তৃষ্ণা,  
কিন্তু ফোটা কতকের অধিক গুলিতে না পারা, পেট জালা, হেঁড়া, কনকনানি,  
ভয়ানক গা বমি বমি ও অতিশয় দুর্বলতা জন্ম শয়নে বাধ্য—নিয়ত উদগার  
প্রচণ্ড হিকা, বিশেষ রাত্রে ; আহার বা পানে ভেদ বা বমন ; দুই প্রহর রাত্রে  
যাতনার বৃদ্ধি । জলীয়দ্রব্য পান করিলেই গা শীড় শীড় ; পাকাশয়ের অত্যন্ত  
সাড়াকিয়া ও জালা, এবং অস্ত্রে খাল লাগার দরুণ তথায় যেন গাঁইট কাঁধা বা  
বেঁধা । ভুক্তদ্রব্য, রক্ত এবং নানা বর্ণের হড়্‌হড়ে পদার্থ বমন । অথবা পুরা-  
তন রোগ, বড়ুটে চেহারা, একপুণ্ডে ভাব, শরীর জীর্ণ, শীর্ণ ; হতাশ, তৃষ্ণা,  
নাভি প্রদেশ জালা, এবং পচা চর্বির ঞ্চায় বিবিধ রক্তের থোলো থোলো বাহে,  
মলত্যাগের সময় জালা, সর্বদা স্থান পরিভ্রমের ইচ্ছা । ঠাণ্ডী লাগা, বরফ  
উদরস্থ করা ( কার্বো ) ও অঙ্গ পোড়া বা বল্‌সান জন্ম রোগ ।

ইপি—দাঁত উঠা ক্যালীন রোগ, অস্ত্র—বিশেষ নার্তিপ্রদেশ বেদনা, বদন  
পাকাশ, হাত পা ঠাণ্ডা ও উহাদিগের আক্ষেপ । মিষ্ট, স্বতাক্ত, টক ও শুষ্ক-  
পাক বা অধিক চাটনি ব্যবহার জন্ম রোগ ।

ওপি—বেল ও নক্স দিয়া ফল না দর্শিলে এবং অপর উপসর্গ সহ বিষ্ঠা-বমন থাকিলে (প্রথম)।

ককু—কেবল মাত্র দিবসে অকষ্টকর জর্দা পাতলা ভেদ, খুব পেট ডাকা, ক্ষয়-জ্বর ও শীর্ণতা।

কফি—যে রোগে স্নায়বিক উপসর্গের প্রাধান্য, তাহাতে বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্ণস-সি—পেট কামড়ান এবং কৌত পাড়িতে পাড়িতে কালবর্ণের পিত্ত ভেদ, দুর্বলতা, প্রথমে শীত পরে তাপ ও ঘাম।

কলসি—ছই কৌক বেদনা ও প্রাতে জলবৎ ভেদ। বৃহদন্ত্র ও মলাশয় প্রদাহ; পেট ফুলিয়া ঢোল, টাটান ও স্পর্শে লাগা, ভোজন ও পানে পুনঃ পুনঃ বাহের বেগ, গা বমি বমি ও পিত্ত বমন; প্রচুর মরুৎত্যাগ।

কল্চি—অস্ত্রের প্রদাহ; ধরিয়া বসাইলে শিশুর ঘাড় উন্টাইয়া পড়া, বেতর হা করা, পেট কনকনানি, -ছেঁড়া ফুঁড়ুনি—অথবা রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় পেট ফুলিয়া ঢাক, জলবৎ কদর্য গন্ধের সজাটে বা আঁটা আঁটা শাদা আম বা রক্ত মিশ্রিত বিলীর ছায় মলত্যাগ।

কলিনস্—শিশুর পেট ব্যথা, ভেদ ও অস্ত্রে বায়ু সঞ্চয় সহ আক্ষেপ।

কাহ—অস্ত্রে জ্বালা ও কনকনানি (আকন, আর্স,) জ্বালাকর তৃষ্ণা, কিন্তু সকল প্রকার পানীয় দ্রব্যে ঘেব। প্রস্রাবের বৃথা বেগ বা কষ্টে ফোটা ফোটা ত্যাগ; কেবল রক্ত বাহে। অথবা রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় কঠিন মলত্যাগ এবং তৎসঙ্গে কল্তানি ও নাড়ীচাঁচা পদার্থের নির্গমন।

কামো—তলপেট ফাঁপা ও ব্যথা, পা উপর দিকে তোলা, মুখ শুষ্ক, পেট ডাকা, ভেদ এবং উহা ত্যাগের সময় অধিক যাতনা। অস্ত্র মধ্যে ক্ষত থাকা, তথায় একটু চাপ পড়িলে লাগা; কদর্য ভেদ স্রাবের অধিক বাহে; মলদ্বার হাজা ও লাল; ঘুমন্ত চম্‌কান বা হঠাৎ চিক্‌ড়ে কাঁদিয়া উঠা; দড়্‌কার উপক্রম বুলিলে। পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্কদের আকনাইটের পর ইহা বিশেষ খাটে। কখন কখন ইহা ও আর্স পর পর ব্যবহারের সমধিক ফল হয়।

কার্বো—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় বশতঃ পেটফাঁপা, এবং হর্গন্ধ মরুৎ ত্যাগে ও সেই ফাঁপার সমতা না হওয়া। মল নরম হইলেও কষ্টে এবং বেগ দিয়া ত্যাগ করা।

কাঙ্ক্ষা—গওমালা ধাতুগ্রস্তের, বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় পীড়া। পেটের অভ্যন্তরে ও উরুদেশে নীতলতা অনুভব; শাদাটে ভেদ ও বমন; রোগীর শরীর দিন দিন গীর্ণ হওয়া। বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগের বৃদ্ধি।

কালী-বাই—জিভে পুরু লেপ, মুখে তিক্ত তার; ফাঁকশে বর্ণের মল (Deodenum); পাকাশয়ের অব্যবহিত নিম্ন প্রদেশে অন্ত্রের দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে প্রদাহ হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

গমিগটী—তলপেট বেদনা ও তাহা স্পর্শে লাগা, জলবৎ হড়হড়ে অঙ্গীর্ণের ভেদ, অধিক কঁোত পাড়া, মলদ্বার বাহির হওয়া এবং হাত ও পায়ে ঠাণ্ডা ঘাম।

গাছোজ—পেট ও নাভির গোড়া অত্যন্ত কনকনানি, মলত্যাগ সময়ে অতিশয় বেগ এবং হড়াৎ করিয়া মল বাহির হইয়া যাতনার সমতা।

দ্দিন—পেট ফাঁপা ও ডাকা, নাভির নীচে ব্যথা, গাঁজলাটে অকষ্টকর অঙ্গীর্ণের ভেদ, পিপাসা, অতিশয় দুর্বলতা, আহারের পর ও রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। টক বিয়র ব্যবহার জন্ত মাতার ও সন্তানের রোগ।

ডক্কা—ঠাণ্ডা লাগার দরুণ রোগ। নাভি প্রদেশে শূল বেদনা, গা বমি বমি, ঠাণ্ডা ঘাম, পরে সবুজ ভেদ ও কখন কখন বমন, প্রচণ্ড পিপাসা এবং মলাশয়ে ও মলদ্বারে লবণ লাগিলে ঘেরূপ চিড় চিড় করে তক্রূপ অনুভব।

নক্স—পেট ফাঁপা ও স্পর্শে লাগা; জিভ অপরিষ্কার, তাহার আগায় ও কিনারায় লাল; অন্ত্রে জ্বালা ও ব্যথা; আহারের পর বমন এবং পানে বেদনার বৃদ্ধি; প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অত্যন্ত পরিমাণে জলবৎ নাহে বা রক্ত-মিশ্রিত আম ভেদ। বিশেষ কোন প্রকার রক্তস্রাব বন্ধ বা অঙ্গীর্ণকারী খাদ্য ভোজন জন্ত রোগ। অস্ত্র ঔষধে প্রতিকার না হইলে, বা ত্রাই সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নাইটী-আ—হড়হড়ে পাটল বর্ণের মল, মল-ত্যাগকালে পেটে তীব্র বেদনা, প্রাতে যাতনার অধিক্য; পুরাতন পীড়া, পেট টেপায় লাগা ও অধিক কঁোত পাড়া। যে রোগীর শরীরে পারার অধিক সংশ্রব আছে, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলদায়ক।

নেট্রম—দিনের বেলায় অধিক পরিমাণে সন্ধ্যাতে, রক্ত বিশিষ্ট বা জলবৎ

ভেদ, বিশেষ রোগ পুরাতন হইলে। পীড়িতের গলা দিন দিন সঙ্ক হইতে থাকিলে।

পড—ক্ষুদ্র অল্প বা পাকাশয় প্রদাহ, ভেদের প্রকার ও বর্ণ সর্বদা পরিবর্তনশীল; প্রাতে রোগের বৃদ্ধি। রাত তিনটার সময় স্থলান্ত্রে (colon) ব্যথা ও সেই সঙ্গে ভেদ।

পল্‌স—পেট কামড়ান, কনকনানি ও থিম্‌চুনি; তৎসহ গাত্র-তাপ এবং মাঝে মাঝে শীত; অনিদ্রা বা শেষরাত্রে অল্প ঘুম; সর্বদা গেঙান; পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর আম-মিশ্রিত ভেদ ও সেই সঙ্গে বমন; রাত্রে বৃদ্ধি; মুখে তিক্ততার; অক্ষুধা।

পিটোল—অল্প থিম্‌চুনি, কনকনানি ও ব্যথা; হড়্‌হড়্‌ মল, পেটের তিতরে শীতলতা বোধ, টক বা তিক্ত উল্কার।

ফস্—প্রাতে অকষ্টকর জলবৎ জেদ, বিশেষ ক্ষয়-কাশপ্রস্তুত। শ্বীতুড়ে প্রস্‌তীর উদরাময়, হাতের চেটো জ্বালা, শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হওয়া।

ফস-আ—পুরাতন পীড়া, নাভির গোড়ায় হড়্‌ হড়্‌ শব্দ এবং সেই সঙ্গে হল্‌দে বা পাকের ছায় ভেদ; দুধ খাইলেই পেটে বায়ুর সঞ্চয় ও বমনের ইচ্ছা; সামান্য জ্বর; বর্ণ ক্রমশঃ পাক্‌শ হওয়া; দিন রাত কান্না। পেট অতিশয় ডাকিয়া জলবৎ অকষ্টকর ভেদ; রোগী যে পল্লীতে থাকে, তথায় ওলাউঠা দেখা দিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

ফেরম্-আ—পেটে হল্‌ ফুটানির মত যাতনা; বেড়াইবার সময় উদরস্থ যন্ত্র সকল অত্যন্ত ভার এবং তাহাদের অধঃপতন হইবে এইরূপ অনুভব হওয়া; অনেকবার অকষ্টকর জলবৎ অজীর্ণের ভেদ হয় বটে, কিন্তু বিলক্ষণ ক্ষুধা থাকে।

ফেরম্-ফস—বাম বক্ষ দক্ষিণ অল্প-প্রদাহ; জলবৎ রক্ত বিশিষ্ট ভেদ।

বাপ্টিসা—নাভির পার্শ্বে ও পেটের ডান দিকে ক্ষণে ক্ষণে অতিরিক্ত বেদনা ও তৎসহ পেট ডাকা এবং বাহ্যের ইচ্ছা। পেট ফুলা ও চাপায় লাগা; গা বমি বমি এবং পুনঃ পুনঃ উল্কার।

বেল—পেট গরম ও ফোলা, বিশেষ নাভির উপর টাটানি, তথায় হাত দিলে বিকট-মুখে চীৎকার, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ এবং কাহারও

কাহারও বা বমন । অন্ত্রে প্রচণ্ড সংকোচকারক ব্যথা বা খাম্‌চান—বেদনা হঠাৎ ধরা আবার হঠাৎ ছাড়া । মাথা গুরুম হওয়া, গলার শীরা উঠা । আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা ; ঘুমন্ত চক্ষু ; নিয়ত গেঁড়ান ; মাঝে মাঝে প্রলাপ । নাড়ী দ্রুত ; শুষ্ক শুষ্ক ও গরম ; তৃষ্ণা ; জিহ্বায় কাঁটা এবং উহার আগা ও পার্শ্ব ডগ্‌ডগে লাল হওয়া । সকল অঙ্গের আক্ষেপ ; অচেতনতা । ঠাণ্ডী লাগায় উদরাময় এবং অন্ত্র-প্রদাহ ; হৃৎ হৃদে রক্তবিশিষ্ট ভেদ এবং তৎকালে অতিশয় বাহ্যের বেগ ।

বোরাক্স—পেট ডাকিয় কি ব্যথা করিয়া বহুবার খস্‌খসে মল ও ঐ মলের সঙ্গে খানিকটা খানিকটা জল ত্যাগ—অত্যন্ত বেগ দেওয়া জন্ত হড়াং করিয়া মল নির্গত হওয়া । নাভির চতুষ্পার্শ্ব সংকুচিত বা মোচ্‌ডান, মাথা ও মুখ-গহ্বর উত্তপ্ত, জিহ্বা শুষ্ক, চেহারা ক্লিষ্ট । আহার করিলেই বাহ্যে ও বাতন্বা, শরীর দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, চর্ম্মলোল ও তোবড়াইতে আরম্ভ হওয়া, অত্যন্ত কান্না ও গেঁড়ান, রাত্রি তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ ও গাত্র উত্তপ্ত হওয়া । মুখে বা থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

ব্রাই—অন্ত্র-প্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা; নড়ায় বা সামান্য টেপায় পেটে খুব লাগা । মাথা ধরা অত্যন্ত, জ্বিত গাঢ় লাল, মুখ শুষ্ক, পিপাসা অতিরিক্ত, ভোজন ও পানে অন্ত্রে বেদনা ; কখনও বা ময়লা জলের ছায় ভেদ ও উহার মধ্যে ভুক্তদ্রব্যের টুকরা টুকরা বা গুঁড়া পদার্থ থাকা, গা বমি বমি ও মসন হওয়া । •

ভেরাট—গ্রীষ্মকালের রোগ, শাদা ভেদ, অধিক তৃষ্ণা এবং কখন কখন স্বাদে গা বমি বমি ও বমন ; পেট, বিশেষ নাভির গোড়ায় অন্ত্র সকল গাঁইট গাঁইট বা গির পাকানর ছায় হওয়া, ভয়ানক যাতনার জন্ত কপালে ঠাণ্ডা ঘাম এবং মুড়া শীতল হওয়া । ইহা ও আর্স, বিশেষতঃ সংকটাবস্থায় পর পর দেওয়া বিধি ।

ভেরাট-ভি—নিয়ত গা বমি বমি, পাকায় ও অন্ত্রে বেদনা এবং অম্লধ ; সবুজ জলীয় পদার্থ তেঁজে বমন, পানীয় দ্রব্য পান মাতেই তুলিয়া ফেলা ; কড়ার নিম্নে ও নাভি প্রদেশে সঁটে ধরা, তীব্র ব্যথা সহ পেট ডাকা ।

মার্ক—পেট শক্ত হওয়া, টনটনে ফুলা ও স্পর্শে লাগা, কখন প্রচুর জলবৎ

অত্যন্ত দুর্গন্ধের ভেদ ; অধিকাংশ সময় এক লাগাড়ে এবং অনেক কৌত পাড়ার পর শোণিত-মিশ্রিত আম অথবা প্রচুর পরিমাণে কেবল রক্ত ত্যাগ ; অস্ত্রে কনকনানি, হানার স্থায় যাতনা সহ শীত ও গা গুরু গুরু করা (আর্স), মুখে কদর্যা গন্ধ, তিক্ত প্লেগ্মা বমন ; মাড়ি-ফুলা, দাঁত ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়া ; মুখ ও মলদ্বারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা ; ঠাণ্ডা দ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই অস্ত্রে বেদনা ; ঘাম হইলে যাতনার সমতা না হওয়া ; সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি । ঠাণ্ডী লাগা বশতঃ রোগ ।

মেজর—উপর পেট অধিক ফাঁপা, বিশেষ রাত্রে ও তজ্জন্ত শ্বাস-কষ্ট ; পাশ ফিরিতে বা উপুড় হইয়া শয়নে অক্ষমতা । কখন পেট ব্যথা করিয়া খানিকটা হড় হড়ে বাছে হইয়া বেগ আরম্ভ হয়, কখন বা কেবল বায়ু নিঃসরণে যাতনার সমতা হয় । আন্ত প্রতিকার না হইলে প্রাদাহিক জ্বর দেখা দেয় ।

রস—অতিশয় পেট ব্যথা করিয়া সন্ধ্যাতে মলত্যাগ ; রাত্রে ও স্থির থাকিতে যাতনার বৃদ্ধি । অত্র-প্রদাহ ; পেট অত্যন্ত স্ফীত হওয়া ; অনিচ্ছাধীন মল-নির্গমন ।

রিয়ম—অতিশয় পেট ব্যথা হইয়া পরে গাঁজলাটে জলবৎ সবুজ বা শাদাটে বা মেটে বর্ণের টক ভেদ ও শিশুর কাশা ।

লাইকপ—অনেক বেগের পর একটু একটু থস্‌থসে মল, ঝেড়ে বা খোলসা বাছে না হওয়া, পেট ব্যথা ও গরম সেক দেওয়ায় উহার সমতা । পঞ্চ বৎসরের কম বয়স্ক স্তন্যপায়ীর কামো দ্বিয়া প্রতিকার না হইলে, ইহা বিধি ।

লাকামি—পেট টনটনে ফাঁপা, তথায় জ্বালা, ব্যথা, কনকনানি, শ্বাস-কষ্ট ও মলবদ্ধতা ; বেলের পর বিশেষ খাটে । অথবা কিছু দিন হইতে শিশুর খেলাতে অনিচ্ছা, কান্না, মাঝে মাঝে গাত্র-তাপ, দুধতোলা, চক্ষু-মুখ-বসা, মন্দাঘি, অরুচি, পেট-ফোলা ও স্থানে স্থানে ব্যথা, ক্রমশঃ মল রূপান্তরভাবে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া আমাশয়ের ভেদ এবং তৎকালে গাত্র-তাপ, জ্বালা, গেঁঙানি, হাঁপানি, প্রায়ই উত্তর না দেওয়া, ঘুমন্ত চমকান ।

লেপ্টাণ্ডা—নাভি প্রদেশে অত্যন্ত ব্যথা, ঠাণ্ডা কিছু পান করিলে উহার বৃদ্ধি ; বায়ুতে পেট ফুলা, ডাকা এবং প্রচুর কাল ভেদ ও স্রোতের স্থায় বেগে ত্যাগ । পুরাতন রোগে ।

সল্ফর—জর্দা, পাটল বা সজা রক্ত-পূয়-কল্তানি-মিশ্রিত ভরানক দুর্গন্ধ ভেদ—যথায় লাগে তথায় হাজে। মৃত্তক-ত্যাগকালে বাহে। পেট ছুঁইলে ব্যথা, বাহ্যিকালে কোমর ব্যথা, বুক ধড়ফড়ানি, রক্ত উর্জগ হওন, মলদ্বার বেরণে এবং উহাতে ও মলাশয়ে চুলকুনি, জালা ও চিড়্ চিড়্ করা। বাহ্যের পূর্বে ও পরে মলদ্বারে কনকনানি, ত্যাগের পর সারা দিন উহাতে দপ্পদানি।

সল্ফর-আ—পুরাতন রোগে এবং ক্রমশঃ দিন দিন বৃদ্ধি হইলে। নাভির গোড়ায় হড় হড়ে রবে ডাকিয়া হৃদে বোলাটে বা হড় হড়ে পাকের শব্দ হয় ভেদ। দুধ খেলেই পেটে বায়ু-সঞ্চাল ও বমন ইচ্ছা, সামান্য জ্বর, দিন রাত্রি কান্না ও শিশুর পাণ্ডাশ বর্ণ হইতে থাকে।

সিলিসা—হঠাৎ পায়ের পাতার ঘাম বন্ধ বা শরীরস্থ ক্ষত শীঘ্র শীঘ্র সারা জন্ত রোগ। পেট শক্ত ও ক্ষীণ হওয়া, স্পর্শে লাগা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা দুর্গন্ধ জলবৎ ভেদ। দিবসে এক শুক ও খসখসে; প্রাতে ঘাম।

হাইড্রাস্টিস—পেটের ডান দিকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অস্ত্র-ফুলা, যদিও তাহা সামান্য, তবু স্পর্শে বিলক্ষণ অনুভব করা যায়—তৎসহ নাভি প্রদেশে তীব্র বেদনা, গঁড়ানি, চীৎকার, অস্থিরতা, অনিদ্রা, পেট টেপায় লাগা এবং পিস্তলের শব্দ শ্রায় মৃত্তক-ত্যাগ। জিহ্বা ঠোঁঠ শুষ্ক; কিন্তু তৃষ্ণার প্রায় অভাব; খাদ্যে বিস্বেষ, হিকা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডাস বর্ণ ও কদর্য চেহারা, ক্ষয়কারী শীতল ঘাম।

হিপার-ওগ্রাফাইট—বিশেষ যথায় অস্ত্রমতের ঔষধ ব্যবহার হওয়ায় রোগ পুরাতন হইয়াছে।

সেপি—বলক্ষয়কারী ভেদ এবং দুর্গন্ধপানে রোগের বৃদ্ধি।

তরুণ রোগে অধিক ব্যবহার্য ঔষধ—আকন, আর্স, কামো, নক্স, পল্‌স বেল, ব্রাই, মার্ক।

জুরে—আকন। পেট ফুলা সহ প্রালাপে—বেল।

বমন থাকিলে—আর্স, নক্স, পল্‌স, ভেরাট, ভেরাট-ভি।

ভেদ থাকিলে—কল্‌চি, কাছ, কামো, নক্স, মার্ক।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—আর্স, বাপ্টিসা, লেপ্টোগ্রা, হাইড্রাস।

পুরাতন অস্ত্র-প্রদাহে পেটে অধিক বায়ু উদ্ভাবিত হইলে ককু, কার্বো, গ্রাফাইট, নাইট্র-আ, পল্‌স, ফস।



পুরাতন অল্প-প্রদাহে কতক দিন কোষ্ঠবদ্ধতা, কতক দিন ভেদ, এমন  
অবস্থায়—আর্স্‌ট্র, আর্জেন্ট-না, গ্রাফাইট, নেট্রম,  
ফস, ব্রাই, রস, ক্রটা, সেপি ।

—পীড়িতের সর্বদাই আপন রোগ চিন্তা এবং  
তাহা লইয়া কথোপকথন—আর্স, ককু, কাক্স,  
নাইট্রি-আ, ফস, মার্ক, সল্‌ফর, সেপি ।

—দিন দিন শীর্ণতা ও পেট আঁত-পড়া—আইড, আর্স,  
কাক্স, চিন, গ্রাফাইট, নক্স, নাইট্রি-আ, নেট্রম,  
পল্‌স, ফস, ফস-আ, ফেরম, ভেরাট, লাইক,  
লাকাসি, ষ্টাকিস, সল্‌ফর, সিলিসা ।

পেটের ব্যথা অতিরিক্ত হইলে গ্ল্যাম জলের সেক বা ফোমেন্ট কর।  
অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিয়ত কোষ্ঠ-কাঠিন্বে দুধ এবং জলের পিচ্কারী  
দিতে বলেন।

### অন্ত্রাবর্তন প্রদাহ । \* (Peritonitis)

শিশুদিগের এই রোগ স্বতন্ত্ররূপে হইতে দেখা যায় না, প্রায়ই অল্প-প্রদাহের  
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতে দেখা যায়। তাপ, ক্ষুধাহীনতা এবং কচিং বা  
বমন হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। ক্রমে রোগী সর্বদাই অস্থির, দুধ পান্যশ বর্জ,  
এবং তাহার মনোকষ্টের চেহারা দৃষ্ট হয়। সমস্ত পেট ফোলা বা নাজিকুণ্ড  
প্রদেশ মাত্র ঠোসমায়া। একটা স্থানে ব্যথা আরম্ভ হইয়া সমস্ত পেটে বিস্তৃত  
হয়। পেট ছুঁইতে দেয় না, এমন কি, জোরে কাঁদিলেও পেটে লাগে বলিয়া  
কেবল গোঁ গোঁ করে। প্রদাহ অধিক হইলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বিশেষতঃ  
কাশি বা হাঁচি হইলে কষ্টের একশেষ হয়। একজ্বর; গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত;

\* উদরস্থিত বস্ত্র সমূহ এক ধানি ঝিলি দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই আবরণ জন্ত উহার  
সকলে যেন একটা মুখ-বন্ধ স্থানী মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ স্থানীকে ইংরাজিতে  
(Peritoneum) অন্ত্রাবর্তন কহে।

শিপাসা অত্যন্ত ; নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ ; জিহ্বার ধার ও মধ্যস্থল লাল ; প্রস্রাব কটু ও অন্ন ; নিদ্রাহীনতা বা স্থির ভাবে বৃক্কের দিগে হাঁটু দিয়া চিত থাকা, একটু নড়িলে চড়িলে যন্ত্রণার আধিক্য ; কোষ্ঠবদ্ধতা । ক্রমে অস্ত্রাবর্তন মধ্যে জল-সঞ্চয় হইতে থাকে, কাজেই পেট ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । মুখশ্রী এককালে যায় ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং শেষে অপ্রাপ্য ; বলক্লয় জন্ত রোগী প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম ; তাহার সর্কাক ঠাণ্ডা হয় এবং উদরাময় বা বমন হইয়া মৃত্যু ঘটে । কখন বা সামান্যতর উদরাময় হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, পেট ঢাকের মত হয় ও টাটায়, অবশেষে অস্ত্রাবর্তন মধ্যে জল-সঞ্চয় হইয়া উঠে ।

তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর-কাল শিশুজন্মের এই রোগ হইয়া থাকে । রোগের প্রধান কারণ ঠাণ্ডি লাগা বা আহারের অনিয়ম ; উদরস্থিত অপত্র কোন যন্ত্রে আঘাত বা পীড়া ; কিম্বা উদগী, টাইফস জ্বর সঙ্গে বা (Scarlatina) নামক ফোটক বা আরক্ত জ্বর রোগের পর এই পীড়া হইতে দেখা যায় । জীলোকের প্রসবের পর অধিক হয় ।

পীড়ার সূত্রপাত হইলে বা প্রথম প্রথম ইপিকা, কামো, আনটিম, পলস ভেরাট প্রভৃতি সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগে ফল দর্শে, কিন্তু জ্বর ও পেট টাটান দ্রুণ ছুইতে দেয় না, এমন অবস্থায় ও ব্যথা, বাহ্যের বেগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আকন দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক ।

আকন—প্রবল জ্বর, এগোড় ওগোড় করা, বহুৎ প্রদেশে ব্যথা ও বেঁদা, দীর্ঘ প্রশ্বাস । জ্বর, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, তিক্ত তার, বমন-বেগ কিন্তু বাহ্যে না হওয়া ; গরম, লাল ও অন্ন অন্ন প্রশ্বাব ; পা ঠাণ্ডা, পেট ক্ষীত ও গরম, ছুইতে দেয় না । কনকনুনি ; ছেঁড়া ; নড়ায় চাপায় বা ডান পার্শ্বে শয়নে বেদনার বৃদ্ধি ; নিদ্রাহীনতা ; মৃত্যু ভয় । রোগের প্রথমাবস্থায়, (বিশেষতঃ ঠাণ্ডি লাগায় বা গরমাবস্থায়) ঠাণ্ডা পানীয় পান জন্ত পীড়ায় ব্যবহার্য্য ।

আপিস—পেট স্পর্শে ব্যথা, অল্পে জ্বালা, হলকুইনি ও জল-সঞ্চয় হইতে থাকিলে । অত্যন্ত প্রশ্বাব, পায়ের পাতা ফুল, ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালা, জরায়ু প্রদাহ ।

আর্ষিকা—আঘাত, পড়া, অস্ত্রকরা বা অতিরিক্ত শ্রম জন্ত অত্রাবর্তন প্রদাহে। জ্বর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর। এই সঙ্গে আদত আরকে দশ গুণ জল মিশাইয়া বাহিরে প্রয়োগ করিবা।

আর্স—সামান্যতর পীড়া হইয়া হঠাৎ পেট ব্যথা, জ্বালা, নিদ্রাহীনতা, গাত্রতাপ, বিশেষ ব্রাত্রে; পিপাসা, এককালে নির্বলী ও সংকটাবস্থায়িত হওয়া। যকৃৎ প্রদেশের একটা নির্দিষ্ট স্থানে অতিশয় ব্যথা, শয়নে অক্ষমতা, হুম্‌ড়িয়া বসিতে বাধ্য হওয়া, নিয়ত কাতরাণি, যাতনার জন্ত সর্বদা অঙ্গ নাড়া, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস, নাড়ীর দ্রুততা, গা বমি বমি, অতিরিক্ত ও এক লাগাড়ে বমন (আহার ও পানে বৃদ্ধি), অত্যন্ত জ্বর, জ্বিভে ছাতা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাল দুর্গন্ধ ভেদ ও অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প মাত্রায় পান। কখন বা যকৃৎ তের ব্যথা তত প্রবল নয়, অথচ হাত পায় খাল লাগে, এমন অবস্থায়। অত্যন্ত যাতনা হইয়া ঠাণ্ডা নাম। রোগের প্রাদাহিক অবস্থা অবসানে নিশ্চেষ্ট হওয়া, বা টাইফয়েড দশায় বিকারের খেয়ালে পোকা মাকড় বা ভয়াবহ দৃশ্য দেখা ও অমঙ্গলজনক ভবিষ্যত ঘটনা মনে উদ্ভিত হইতে থাকা। ডানকৌঁক ফুলা ও প্রচণ্ড জ্বালা, কাল ভেদ ও বমন, জ্বর এবং পাকায়ন বা অস্ত্র ফুটা হওয়া। দুই প্রহর রাত্রের পর যাতনার আধিক্য।

ইরিজিরিন—ভোরে বা বৈকাল ৪টার (লাইক) পেট দমদ্‌মে ফুলা, খাম্‌চান ও কাম্‌ড়ান। বড় চটা ও একগুঁয়ে ভাব, বিশেষ ঘুমভাঙ্গার পর।

ওপি—মাথার জড়তা, তন্দ্রা গা আড়ু মাড়ু, পেট ফুলা, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, অস্ত্রের নিয়দেশের অধোগতির কার্য্য এককালে রহিত হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠা, নিয়ত বমন ও উল্গার।

কলসি—প্রচণ্ড রাগের পর রোগ প্রকাশ্য; পেট ফুলা ও অস্ত্র হইতে রোগের বিস্তৃতি ও তৎপ্রদেশে খ্যাখলানি, কনকনানি, প্রচণ্ড ব্যথা জন্ত হুম্‌ড়ে বসিতে বাধ্য হওয়া, যৎসামান্য আহার বা পানে পুনর্বার ব্যথা ধরা, ভেদ এবং অস্ত্র ও মূত্র-স্থালীতে বেগ।

কাহ—পেট উত্তপ্ত হওয়া ও চাপায় লাগা; উহার উপর বা উর্দ্ধভাগ দমদ্‌মে ফুলা, নিয়ভাগে ঢপ্‌ ঢপ্‌ শব্দ; রক্ত মাথানো হাড় হড়ে মল ও মল-ত্যাগ কালে চিৎকার; মূত্র-স্থালীর ঝিল্লি প্রদাহ ও বেগ, জ্বালা, ফোটা ফোটা

মূত্র পড়া, চক্ষু মুখ বসা, হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, খুব তৃষ্ণা, কিন্তু সকল প্রকার পানীয়ের প্রতিই বিদ্বেষ ।

কামো—ঠাণ্ডা লাগা বা ক্রোধ জন্ত তরুণ রোগে ; পেট ব্যথা, কিন্তু টিপিলে ব্যথা বাড়ে না ; সবুজ বা জর্দাটে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ভেদ ; পেটে বায়ু-সঞ্চয় ; জিবে ছাতা পড়া ; মুখে তিক্ত তার ; যকৃৎ প্রদেশ ফুলা ও গরম হওয়া ; সন্ধ্যায় অর ; মাঝে মাঝে মন কেমন করা অথবা পেট ফুলা, পেটে ব্যথা ও স্পর্শে লাগা এবং অন্ন অন্ন জলবৎ ভেদ ও কাট নেকার, বিশেষতঃ রাত্রে । গাত্রতাপ ; আবরণ থাকিলে ঘাম এবং বস্ত্র খোলায় শীত ; কাতরাগি, কান্না ও কোলে লইয়া বেড়ানতে শাস্ত হওয়া ।

কার্বো—অস্ত্রাবর্তন-প্রদাহ সারিয়া যদি উদীর ক্ষীত, হাঁটু অবধি পেট পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা, নাড়ী স্তম্ভবৎ, নিশ্বাস ঠাণ্ডা এবং বাহ্যে বন্ধ হয় ; অথবা অনিচ্ছাধীন পচা গন্ধের পুষ্প-রক্ত-বিশিষ্ট তৈদ হইতে থাকে ।

কাল্কা—কফাংশ-ধাতু পক্ষে ; মাথায় অধিক ঘাম এবং চা খড়ির জ্বায় শাদা ভেদ ; সাত দিবস গায়ে লাল লাল স্ফোটক প্রকাশ ও বেদনা, ঠাণ্ডা জলে উহার সমতী হওয়া ।

চিন—যকৃৎ প্রদেশ ফুলা ও শক্ত হওয়া ; পেটে অধিক বায়ু ও অপাক-মল ; স্বকের নিম্নে যেন ক্ষত থাকা বোধ ও তৎস্থান স্পর্শে লাগা ; বদন এবং হস্তের শিরা ফুলা । কাপড় খুলিলেই শীত শীত করা ; গাত্র অতিশয় উত্তপ্ত হওয়া ; জিভে ছাতা পড়া ; গাল লাল, প্রলাপ এবং বলক্ষয় হওয়া ; অত্যন্ত পেট ফাঁপা ও বিস্ত্রী হওয়া । রোগ নিঃশেষ করা ও বল প্রদান নিমিত্ত ইহাকে অপর ঔষধের পর দেওয়া হয় । পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য্য ।

• ডিজিট—মল শাদা বা পান্নাধ বর্ণের ও আম মিশ্রিত, নাড়ী মৃদু ও অসম ।

নক্স—ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগার দরুণ রোগে ; তলপেট ফাঁপা ও ছুঁইতে না দেওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর, তৃষ্ণা, ঘুমন্ত কাশি । যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা, ফুঁড়ুনি, দগ্ধপানি । শরীর হরিদ্রা বর্ণ, অক্ষুধা, বমন, শেষ রাত্রে অনিদ্রা, শ্বাস-খর্ব্বতা ও প্রচণ্ড মাথা ধরা, প্রস্রাব বন্ধ । বিশেষতঃ ইতিপূর্বে যদি অন্ত্রমতের ঔষধ ব্যবহার করা হইরা থাকে ।

নেট্রম—এক লাগাড়ে ও অতিরিক্ত পিপাসা, পেট ফুঁড়ুনি, বিঁঘুনি ও কাষ্ঠের

শ্রায় শক্ত হওয়া এবং সাড় না থাকা । পা ঠাণ্ডা হওয়া, পুরাতন উদরাময়, এবং সকালে দশটায় রোগ বৃদ্ধি ; কখন ভেদ কখন বা কোষ্ঠকাঠিন্য ।

পল্স—গুরুপাক, বিশেষ তৈলাক্ত খাদ্য ব্যবহার দরুণ উদরাময় হইতে অন্ত্রাবর্তন-প্রদাহ রোগ ; জিভে জর্দা আটা-বিশিষ্ট ছাতা পড়া, অরুচি, মুখ তিত্ত বা বেতোর হওয়া, পেট ব্যথা, দিনে সর্বদা শীত শীত করা ও রাত্রে থেকে থেকে যন্ত্রণাধিক্য হওয়া, বিশেষ মন কেমন করা, সর্বদা গা বমি বমি, সবুজ হড় হড়ে মল । কখন ইহা ও চিন পর পর ।

বার্ব—অন্ত্রাবর্তন প্রদাহ সঙ্গে প্রস্রাবের পীড়া থাকিলে ; মূত্রস্থালীতে কনকনাশি ও মূত্রত্যাগের পর জ্বালা ।

বেল—পেট ফুলিয়া-এরূপ ঢোল যে, কোমরে কাপড় থাকাতোও কষ্ট ; পেট গরম, এমন কি, তথাকার জামা তুলিলে উষ্ণ ভাব উঠে । পেটে খাম্‌চানি ও খাবা মারা । ব্যথা হঠাৎ ধরা ও হঠাৎ যাওয়া । ঝিমুনি, অনিদ্রা, চম্‌কানি, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ আঁতুড়ে জ্বীলোকের ক্ষরণ (Lochia) বন্ধ বা কমা জ্ঞাত অন্ত্রাবর্তন প্রদাহ পক্ষে ।

ব্রাই—নড়ায় শীত ও যাতনা, বিশেষ তীব্র ফুঁড়ুনি ও জ্বালা বৃদ্ধি হওয়া ; এবং শ্বাস-কষ্ট ও মুখ-শুকতা ; বাহ্যে শুষ্ক ও শক্ত হওয়া বা বিলক্ষণ ভেদ, বুক ভার, ডান কাঁধ ব্যথা অথবা অতিরিক্ত তাপ ও তৃষ্ণা, কিন্তু পানের পরই উহা বমন হইয়া পড়া, ছট্‌কটানি, পেট ফুলা, গরম হওয়া ও টাটানি ; কোষ্ঠবদ্ধতা । ক্ষণেক শীত ও ক্ষণেক তাপ এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । জ্বীলোকের আঁতুড়ে ক্ষরণ বন্ধ ও অন্ত্রাবর্তন প্রদাহ পক্ষে অনেক সময় আকনের পর ইহা খাটে ।

ভেরাট—পানীয় পানে বা একটু নড়ায় বমন, পেট স্ফীত হওন ও স্পর্শ লাগা এবং উহার মধ্যে যেন জলন্ত অঙ্গার থাকা বোধ, বদন নীল বর্ণ হওয়া, চক্ষু বসা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া, অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন ভাব ।

ভেরাট-ভি—খুব জ্বর, পেট জ্বালা ও ফুলা এবং ছুঁইলে লাগা ; আকন দিয়া উপকার না হইলে ইহা বিধি ।

মার্ক—পেট স্ফীত ও শক্ত হওয়া, টাটানি, সর্বদা ডাকা এবং বেগ সহ আম্র ও শাদা বা সজাটে দ্রুগন্ধ মল ভেদ । মুখ এবং চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ ও বসা ।

কঠিন দ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা, অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ; জিত ফাটা ফাটা ও তাঁহাতে জর্জা লেপ ; মুখে অধিক লালু ও দুর্গন্ধ ; গা শীত শীত করা, অনিদ্রা ; রাত্রে এগোড় ওগোড় করা ; যকৃতের চাপুনি, ফুঁড়ুনি এবং কাশিলে বা হাঁচিলে বুক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত বেদনা ; রোগী ডান পার্শ্বে শয়নে অক্ষম ; কোড়া থাকিলে এবং সঞ্চিত রস পুখে পরিণত হইলে। এই রোগের সঙ্গে যদি অন্ত্র-প্রদাহ থাকে, তবে এই ঔষধ সেবনে অধিক ফল হয়। অনেক সময় ইহা ও বেল পর পর খাটে, বিশেষতঃ গণ্ডমালা ধাতুতে।

রস—অন্ন, প্রলাপ, শীত দিকে বা শয্যায় হাতড়ানো, অত্যন্ত দুর্বলতা, জিত লাল ও শুষ্ক হওয়া, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অক্ষুধা ; পেট—বিশেষ নাভি প্রদেশ অধিক ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা গিয়া জলবৎ পচা গন্ধের রক্ত-বিশিষ্ট অনিচ্ছাধীন ভেদ—কখন কখন ঘুমন্ত। উরু ছিঁড়ে পড়া। গরম প্রস্রাব। প্রোদাহিক অবস্থা (Typhoid) অবসানে, অথবা তাঁহার নিস্তেজ অবস্থায় ইহা প্রযুক্ত। অঙ্গ নাড়ায় শব্দ।

র্যানানকিসল-ব—পেট মধ্যে জল জমা, পেটে যেন হুনা বা ছোবল মারা, পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ, শ্বাস-কুচ্ছতা। পড়িয়া গিয়া মাংসপেশী মচ্‌কান অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

লাইকপ—বিশেষ এই রোগ সহ যকৃত বা (Diaphragm) শ্বাস-কষ্ট। প্রদাহ থাকিলে। বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যেন নাভিকুণ্ড প্রদেশ হইতে কোন কঠিন পদার্থ বাম দিকে গুড়াইতেছে, এমন বোধ হওয়া ; অথবা পীড়ার তৃতীয়, চতুর্থ দিবসে বদন হরিদ্রা বর্ণ, পেটে কষ্টকর বায়ু সঞ্চয় ও পেট ফুলা, পেট কামড়ান এবং পেটে থাবা মারা। বৈকাল চারিটা বা ভোরে বৃদ্ধি। কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মলদ্বার সংকুচিত হওন, জন্তু মল নির্গত হওয়া অসাধ্য প্রায় ; নিয়ত গা বমি বমি ; অনিদ্রা।

লাকাসি—বদ্ধ-বায়ু জন্তু পেট ফুলা ও গরম হওয়া, ছুঁইলে ব্যথা। কোমর হইতে উরু পর্য্যন্ত বেদনা ও শক্ত হওয়া। চিত হইয়া শুইয়া হাঁটু বকের দিগে তোলা, কোষ্ঠবদ্ধতা ; প্রস্রাব অল্প ও ঘোলাটে এবং তাহার তলানি লাল হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ। নিদ্রা ভঙ্গের পর যাতনার বৃদ্ধি।

সল্‌ফর—বহু দিনের পীড়া এবং জীবনী শক্তির দুর্বলতা।

বমি নিবারণার্থ টুকরা টুকরা বরফ বা মধ্যে মধ্যে এক এক চোক ঠাণ্ডা জল পান বিধি। পেটে গরম জলের সেক দিলে যাতনার লাঘব হয়। কখন কখন ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

### কোষ্ঠবদ্ধতা বা মল-কাঠিন্য।

চোকা হুগ্ধে প্রতিপালিত শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধ হইতে অধিক দেখা যায়। মাতার রোগ বশতঃ শিশুর পীড়া হইলে, বাহাতে শাতার সরল বাহ্যে হয়, এরূপ ঔষধ ও পুখ্য দিলে সন্তান নিরাময় হয়। চৌদ্দ ঘণ্টা বাহ্যে না হইলে মহিলাগণ মুক্তাবর্ষির পাতার রস বা বকুলের বীচি মল-দ্বারে লাগাইয়া দেন। পানের রৌটার বা নেকড়ার পলিতায় তৈল লাগাইয়া, অথবা সাল্লান স্ক্রু করিয়া কাটিয়া তাহার গাজে লবণ ও তৈল মাখাইয়া, মল-দ্বারের অভ্যন্তরে দিলেও ঐ ফল হয়। সাহেবেরা এ অবস্থায় জৈব উষ্ণ জল ও হুধের পিচ্কারী দিয়া \* থাকেন, এবং উহা দিয়া চক্ষিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ ফল না হইলে ইহার সঙ্গে অল্প গুড় বা চিনি দিয়া পিচ্কারী দেন। কোষ্ঠবদ্ধতা দ্রুণ বিশেষ কষ্ট হইলে উষ্মের বিষয় নহে। প্রত্যহ দুই তিন বার ক্ষণিক পেট ঘর্ষণ, এবং কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান, ও লক্ষণাভ্যাসী ঔষধ প্রয়োগ করিলে অল্প কৌশল প্রক্রিয়ার প্রয়োজনাত্মক।

কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পেট ফুলা, অস্থিরতা, কান্না, শ্বাস্তান, আহ্বারে অনিচ্ছা, এবং অবশেষে দড়কা প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধতার পর, নেবা ও অরুহইয়া থাকে। দস্তোদগম কালে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিশেষ সাবধান হইবা; এ সময় আরোগ্য না হইলে, শূল, অস্ত্র-বৃদ্ধি, অস্ত্র-প্রদাহ এবং অস্ত্র মধ্যে অস্ত্র প্রবেশ, এই প্রকার রোগ সকল উপস্থিত হইতে পারে। জোলাপু দিয়া বাহ্যে করণতে আশু ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রোগ পুরাতন ও পাকা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

\* সদ্য বা নব প্রসূতের পক্ষে দুই কাঁচা; এক হইতে ৫ বৎসরের পক্ষে দেড় ছটাক হইতে তিন ছটাক এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসরের পক্ষে এক পোয়া দেওয়া যাইতে পারে। পিচ্কারির মুখে তৈল দিয়া সাবধানে গুহ দ্বারে দিবা।

স্বস্থ্যকার শিশুর চক্ষিণ ঘণ্টার মধ্যে পাক-বস্তু সমূহের কার্য সূচাক্রমে নির্ণয় হয়, কাজেই ঐ সময় মধ্যে একবার মলত্যাগ হওয়া আবশ্যিক । কিন্তু কাহারও কাহারও তাহা হয় না । দুই চারি দিন অন্তর এবং শুনা আছে কচিং কাহারো বা (বয়স্ক লোকেরও) সপ্তাহ বা পক্ষান্তর বাহ্যে হয় । এক ব্যক্তির এইরূপ তিন দিনের পর মলত্যাগ হওয়ায়, তাহার ওলাউঠা হইয়াছিল এবং আসন্নকাল উপস্থিত বলিয়া নিজের উইলও করিয়াছিল । শারীরিক ব্যায়ামহীনতা, সমধিক মানসিক বৃত্তির চালনা, শোক ও হুঃখ, পাকায়ণ ও বন্ধুত্বের বিশৃঙ্খলা, অনেক প্রকার রেচক বা ধারক এবং অধিক কুইনাইনাদি ঔষধ ব্যবহারে কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে । ডাক্তারেরা এ অবস্থায় জোলাপ দেন । সোডা এবং চাখর্সি প্রকৃত অল্প পীড়ার পক্ষে যেমন অপকারী, ঔষধে রেচকও তজ্জপ ; ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, রোগ পাকাইয়া তুলে ও আরোগ্য হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে । অনেক সময় ইহা অল্প পীড়ার আনুষঙ্গিক উপসর্গ মাত্র । তখন মূল ব্যাধির সঙ্গে ইহা আরোগ্য হয় । অনেকে ইহাকে রোগের মধ্যেই গণ্য করেন না । কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বাহ্যে যাওয়া ও যম-যন্ত্রণা উভয়ই তুল্য । আমার জানিত কোন ব্যক্তির বেগ দিতে দিতে বদন আরক্তিম ও চক্ষু ঠেলিয়া বাহ্য হইত এবং অনেক কষ্টের পর তিনি মুটম্ হাত লম্বা একটা মোটা ন্যাড় ত্যাগ করিতেন । মল-দ্বারের ঝিল্লী ছেঁড়ায় প্রত্যহ শোণিতের ধারাগী পড়িত । তিন চারি ঘণ্টা পরে আকস্মিক গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লিখিতে বাধ্য হইতেন । তথাকার সাহেবের পরামর্শে হাত পিচ্কারী ব্যবহারে কথঞ্চিৎ সমতা হইয়াছিল । অবশেষে মহাত্মা ১৮৮৭-রাজ্যে দত্ত তিন চারি দিবস আলুমিনার দুই তিনটা অনুবটিকা দেওয়ার সহজ বাহ্যে হইতে লাগিল । একদিন একটু নরম বাহ্যে হওয়ায়, ইহা ওলাউঠার পূর্বে লক্ষণ ভাবিয়া, ভয়ে একটা পরম আত্মীয়কে সমস্ত দিন কাছে বসাইয়া রাখেন । আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল কোন পরিচিতের এরূপ হয় ; দোতলার পায়খানার দ্বারের নিকটই তাঁহার নিমিত্ত একটা মাছুর বিছান থাকিত, শৌচের পরই আলার ধমকে বাবু তথায় শয়ন করিয়া পোনের কুড়ি মিনিট কাটা ছাগলের খায় ছট্‌ফট্ করিতেন ; কতই বাতাস করি ও মলদ্বারে



মাখন প্রভৃতি লাগান হইত, কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিত না, অবশেষে আর্স দিয়া রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে এই জ্বর ঋণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। এইরূপ এবং ধবল প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করার, হোমিওপেথি কলিকাতা মহানগরীতে অল্প দিনের মধ্যেই জাঁকিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র দত্তের অধ্যবসায়, একাগ্রতা, কায়িক ও মানসিক শ্রম, যত্ন, অর্থব্যয় প্রভৃতি উপায়ে এই নব চিকিৎসা-প্রণালী দেশ মধ্যে প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরাও তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছি; এবং তাঁহার গুণকীর্তন ও পরকালে তাঁহার সদগতির জন্য অগৎকর্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্রিয়ৎপরিমাণে সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিলাম।

শরীরটি গৃহস্বরূপ, ইহা পরিষ্কার ও ষ্টেথটে রাখা সর্ব বিধায়ে বিহিত। ঘর দ্বার ধোয়ার জল কেহ কেহ প্রতি রবিবারে জোলাপু লইয়া থাকেন। ভাবেন যে ময়লা না জমিলে কেনই বা পীড়া হইবে। স্বীয় স্ত্রী-পায়ী শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে বা পেট কামড়ানর জন্য কাঁদিলে জননী এক কিছুক ভেরাণ্ডার তৈল দেন। ইহারা বুঝেন না যে, এরূপ করার রোগকে আরো ডাকিয়া আনা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার ছেলেদের কাঁচা দুধ দেওয়া যাইতে পারে। অন্নভোজিরা মৎস্য মাংস যতই কম খায়, ততই ভাল। পেঁপে, কলা, আত্র প্রভৃতি সুপক্ক ফল, অধিক পরিমাণে তরকারি, ও ডাউল, বিশেষ কাঁচা মাসকরাই, মধ্যাহ্নে আহারান্তে ডাবের জল, বন্ধা দুধ, রাত্রে শয়নকালীন ও খুব প্রত্যুষে এক গ্লাস করিয়া জল পান, পুরাতন তৈল ও মিছরির পানা খাওয়া, প্রাতে ব্যায়াম, প্রত্যহ স্নান এবং তৎকালে ও আহারের পর পেট ঘর্ষণ বা ডলা, অথবা মুখ-ভাঁড়ির স্বরূপ হরিতকী ব্যবহার করা, এই সকল উপায় অবলম্বন এবং মধ্যে মধ্যে সদৃশ লক্ষণযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে এককালে আরোগ্য না হইলেও যাতনা পাইতে হয় না।

আইরিস—প্রথম কঠিন মল, পরে জলবৎ ভেদ।

আইয়ড—গাওয়ালা-ধাতুপ্রস্তর কেবল বাহ্যের ইচ্ছা মাত্র, কিন্তু ঠাণ্ডা দুধ পানে সহজ বাহ্যে—কঠিন ও ডেলা ডেলা মল এবং উহার সকল বাহির না হইয়া কতক ভিতরে থাকে, এমন অবস্থায়।

আকন—কঠিন মল, কষ্টে ত্যাগ ও ঐ সঙ্গে অর—অথবা পৈত্তিকের ধাঁহু, পেট শক্ত হওয়া, ফুলা ও কুখন বা টাটানি। হৃগ্ন প্রস্রাব। বাহ্যে হয় না, যদি বা হয়, পোড়ার ছায় কাল বর্ণের। অর নাই, অথচ শীত। ধারক, বিশেষতঃ আকিম-ঘটিত ঔষধ সেবনের পর কোষ্ঠবদ্ধতার বিশেষ ফলদায়ক। মেটে বর্ণের মল, খুব শক্ত ও কষ্টে তাহার নির্গমন।

আগারিকস—অত্যন্ত কঠিন মল ও কষ্টে ত্যাগ—প্রথম ডেলা ডেলা, পরে নরম, শেষ ভেদ। পাকাশযের গোলযোগ সহ যত্নে প্রদেশে ছুঁড়ুনি। হাত ও পায়ের পাতা লাল হওয়া, জ্বালা ও চুলকুনি।

আণ্ট-কু—অধিক কৌত পাড়ার পর শাদা, শক্ত ও বৃহদাকৃতি কঠিন মল ও মরুৎ-ত্যাগ—বিশেষতঃ দুগ্ধ-পোষ্যে গ্রীষ্ম জন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা; জিত শাদা হওয়া ও পেটের গোল।

জানিয়ার্ড—বৃথা বেগ, মলাশয়ে যেন ছিপি আঁটা; কৌৎ পাড়িলে অল্প-মোঁচড়ানি। দুই পাঁচ দিন এককালে বাহ্যে না হওয়া; মল প্রথম পাতলা, শেষ কঠিন ও পান্নাশ বর্ণের।

আম-ম—মল বৃহদাকৃতি, কঠিন ও কষ্টে নির্গত এবং ভাঙ্গিয়া পড়া, পরে নরম। অধিক উল্কার ও মরুৎক্রিয়া এবং বাম কোঁক প্রদেশে ছুঁড়ুনি; খুঁত খুঁতে বন্ মেজাজ।

আরম-মে—লঘাকৃতি মল ও কষ্টে ত্যাগ। দুই তিন দিন বাহ্যে না হওয়া, (বিলম্ব জীলোকের শুকুকালা ও জরায়ু বাহির হওয়ায়) বিশেষতঃ বহুমূত্র রোগীপ্রস্তুত ও যাহার স্বভাবতঃ খেদাশিত ও আত্মহত্যা ইচ্ছুক।

আর্জেন্ট-নে—মল শুষ্ক ও বালির ছায়—কঠিন ও অল্প এবং বিলক্ষণ কৌতপাড়া সম্বলিত।

আলুমিনা—মল-ত্যাগের আবশ্যকীয় শক্তির অভাব বা ন্যূনতা, এমন কি নরম বাহ্যেতেও বেগ দিতে বাধ্য হওয়া (ব্যান বায়ু); বহু দিন বাহ্যের চেষ্টা নাই, পরে অধিক মল সংগৃহীত হইলে অতি কষ্টে উহা ত্যাগ। কোষ্ঠকাঠিন্য, ডেলা ডেলা (অল্প ও আম সংযুক্ত); পেট দম্‌দমে ফুলা; ভেড়ার নাদের ছায় মল ও মল-দ্বারে কনকনানি এবং দীর্ঘস্থায়ী বেদনা। মলের প্রথমটা পাতলা, শেষটা শক্ত ও পোড়ার ছায়। ক্রমের পর রক্ত

পড়া, অনেক সময় শ্রোতের শ্রায় ও তেজে, বিশেষতঃ টাইফস জ্বরে ; মলদ্বারে টাটানি। আলু খাইলেই অন্ন-ভোজীর রোগ বৃদ্ধি। সর্বদা সীসা, নাড়াচাড়ার দরুণ পীড়া। পেটের পীড়ায় আকিমাদি ধারক ব্যবহার জন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের ব্যথায় ইহা ব্যবহার্য্য।

আনুমেদ—দীর্ঘকাল অন্তর বাহে, শুষ্ক ও শক্ত কাল মল, কখন লম্বা কখন কখন ভেড়ার নাদের শ্রায় ক্ষুদ্রাকৃতি ও কঠে ত্যাগ।

আসটিরিয়াস-রু—ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, দশ পোনের দিন এককালে বাহে না হওয়া এবং হইলে কঠিন ও জলপাইয়ের আকৃতির মল ; মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ও তৎসহ কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহা উপকারী।

ইউপাট—সর্দি সহ কোষ্ঠবদ্ধতা।

ইয়ে—ঠাণ্ডী লাগা বা গাণ্ডী চড়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা ; মলাশয় ও মলদ্বার বাহির হওয়া।

ইথুসা—কোষ্ঠবদ্ধতা ও যেন অস্ত্রের মল-তাড়না-শক্তি এককালে রহিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায়।

এপিস—কোষ্ঠবদ্ধতা ও ঘুমন্ত চীৎকার, গাত্রে লাল লাল ফুস্ফুড়ি বাহির হওয়া ; অস্থিরতা। কয়েক দিন কোষ্ঠ এককালে না হওয়ায় পরে কঠে মল-ত্যাগ ও পেটে ছল ফুটুনির শ্রায় যাতনা এবং অধিক বেগ দিলে যেন উদরস্থ কোন পদার্থ ভাঙ্গিবে বা ছিড়িবে এরূপ বোধ হওয়া ; কপাল ও চক্ষুর গোলকে ব্যথা এবং পেট টিপিলে লাগা ; মনের চঞ্চলতা।

এসকুইলস-হি—সর্বদা বেগ ও বৃথা চেষ্টা ; জমাট কঠিন মল কঠে ত্যাগ, পরে মলদ্বারে জ্বালা ও তাহার সংকোচন। শক্ত বাহ্যের পর নাভির গোড়া ব্যথা ও কনকনানি। মলাশয় যেন ছোট এবং তাহা কীট পূর্ণ ; কোমর হইতে পাছা পর্য্যন্ত ব্যথা ও কামড়ান ; কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ অর্শে ইহা বিশেষ উপকারী ; বিশেষতঃ ভগেন্দ্র হইলে বাহ্যের পর মলদ্বারে ঘেরূপ বেদনা হয়, সেইরূপ বেদনা।

ওপি—ভয় বা মানসিক উত্তেজনার জন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা ; অস্থ ও সবলকায় শিশুর পেট শক্ত হওয়া ও ফুলা এবং টিপিলে তথায় গুল্লে গুল্লে পদার্থ থাকা বোধ হওয়া। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ কোন কঠ না থাকা এবং বাহ্যের চেষ্টাও

না থাকে। মল শুষ্ক, কাল ও ছোট ছোট ভাঁটার ছায় এবং অত্যন্ত পেট কামুড়ানি। শোচ প্রস্রাব বন্ধ, মৃথতা ধরা, মাথা ঘোরা, ও কিমুনি। মলাশয় তাড়না-শক্তি-বিহীন হওয়া। অন্ন মধ্যে অন্ন প্রবেশ জন্ত বিষ্ঠা অধোগামী হইতে না পারাতে উল্টে উঠা ও বমন ; জমাট মলে অন্ন পূর্ণ এবং উহার উপরে বায়ু সঞ্চিত হইয়া উল্টে ঠেল মারা। কাঠিগ্র জন্ত মল অবরুদ্ধ হওয়া। জ্বোলাপ দেওয়া বা আময়জ, উদরাময় বা অন্ন-প্রদাহের পর শক্ত গোলাব ছায় মল।

কফু—অন্ন ও মলাশয়ের শাড়া ও তাড়না-শক্তিহীনতা জন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা।

কাম্প—জলীয় দ্রব্য পানের পর বাহ্যের বেগ, কিন্তু কেবল আম ত্যাগ ; মলদ্বার আনা।

কামো—শিশুর পাঁচ ছয় দিন অন্তর কেটো ন্যাড়ি বাহ্যে, পেট অন্ন ফাঁপা ও রাতে অস্থিরতা। নূতন নূতন রোগে অনেক সময়ে ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়। দাঁত উঠাকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা।

কলিন্সোনিয়া—পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা ; ভাঁটার ছায় শুষ্ক মল এবং মলদ্বার গরম হওয়া ও তৎপ্রদেশে চুল্কুনি ; মলাশয় যেন ছোট ছোট কাটি ঘারা পূর্ণ, এমত বোধ ; পুরাতন রোগ ও ঐ সঙ্গে অর্শ থাকে।

কার্বো—অত্যন্ত পেট ফাঁপা, বেগ এবং অন্ন ও শক্ত মল খণ্ডে খণ্ডে পড়া, মলাশয়ে শুড়ু শুড়ুনি ও ত্যাগকালে ঘারে আনা।

কার্বো-আ—বহুমাত্র রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ( আরম ) ; মল অত্যন্ত ও বিলম্বে নির্গত হওয়া ও কোমর বাঁধা অথবা কেবল মরুৎ-ক্রিয়া।

কাষ্টিক—কোত পাড়িতে পাড়িতে বন্ধন আরম্ভ হওয়া ; অতি কষ্টে খণ্ডে খণ্ডে পেন্‌কলম-আকৃতি মল পতন ; খুব শক্ত ও উপরে ঘি মাখানর ছায় চক্‌চকে মল ও ত্যাগকালে মাথা ঘোরা, বিশেষ পুরাতন রোগে। যাহারা সরল ভাবে হাঁটিতে অশক্ত এবং যাহাদের বসন্ত অপেক্ষা দাঁড়ানয় সুবিধা, তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ খাটে।

কাকি—কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ পুরাতন ; মল কাল বা চক্‌খড়ির ছায় ও কঠিন এবং ভুক্ত পদার্থের অংশ পরিপাক না হইয়া উহাতে মিশ্রিত দেখা যায়। গণ্ডমালাধাতু এবং বাহ্যের পর মলাশয় হইতে রস টোয়ান ;

তিনটা রাত্রির পর ভাল নিদ্রা না হওয়া। পাথের পাতা আর্জ ও ঠাণ্ডা হওয়া ।

কোনাই—পুনঃ পুনঃ বৃথা বেগ বা পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় মল ত্যাগ ; একদিন অন্তর কঠিন মল এবং ত্যাগকালে শীত, পরে বুক ধড়ফড়ানি ; নব্বের পর খাটে, বিশেষ যথায় বাহের পর মুচ্ছাবৎ দুর্বলতা ।

কালী-কা—বৃহদাকৃতি মল ও উহা যেন নির্গত হইবে না বোধ হওয়া । মলাশয়ের তাড়না-শক্তির অভাব বা দুর্বলতা ; মলদ্বার কন্কনানি, বিছনি, ফুঁড়ুনি, কোমর ভেঙ্গে পড়া । একদিন অন্তর বাহে এবং উহার এক বা দুই ঘণ্টা পূর্বে পেট বেদনা ; বিরাম দিবসে পেট যেন ভিতর দিকে টানা ।

কালী-বাই—অল্প অল্প ও পাইট গাইট মল ; মলদ্বার যেন ভিতর দিগে লেঁদন বা ছিপি লাগান, এমন বোধ ; মাথা ধরা ; হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া ।

ক্রিমোস—দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায় ; বিশেষ মল শুষ্ক, কঠিন ও কষ্টে নির্গত ; পেট দম্ভমে ফুলা (পল্স)

গ্রাফাইট—মল লৃণা ও কঠিন এবং কখন কখন ডেলা ডেলা আম ও রক্ত মাখানো ; ত্বকে, বিশেষ খাঁজের স্থানে স্থানে সৰুল হুসকুড়ি ; পেটে অধিক বায়ু এবং নিশ্বাসে প্রস্রাবের গন্ধ ।

চিন—উদরাময় সারিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা—অনেক কৌতের পর শক্ত মল-ত্যাগ এবং মাথা গরম হওয়া ও ঘোরা ।

চেলি—ভেড়ার নাদের স্থায় মল—ডানু পাখুরার নিম্নে ব্যাধা ; ত্বক হরিদ্রাবর্ণ ।

জিক—শুক শক্ত মল ও কষ্টে ত্যাগ, অতিশয় বেগ ও পেট ঊঁকা । হাত কাঁপা ও মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া ; স্থির থাকিতে না পারা, সর্বদা নড়া চড়া ।

টাবাক—কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ডাকা, শ্বাস খর্ব্বতা ।

খুজা—কঠিন ও বড় ভাঁটার স্থায় রক্তমাখানো মল, মলাশয়ের দ্বারে প্রচণ্ড বেদনা, ক্রমশঃ কোষ্ঠত্যাগে বিরতি । দ্বার সংকোচন ও নড়ায় বৃদ্ধি ও তৎপরে অল্প যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে থাকে ; মলদ্বার জালা এবং তথায় ও বিটপে কদর্য ঘামের গন্ধ । কোষ্ঠবদ্ধতা, অর ও অস্ত্রের তাড়না-শক্তির ন্যূনতা বা রাহিত্য ।

নম্ন—কোষ্ঠবদ্ধতা ও পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁটার ভায়া মল অথবা স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ কেটোনম্বাড ও কষ্টে ত্যাগ ; পেট শক্ত হওয়া ও ফাঁপা, বায়ু উৰ্দ্ধ ও অধঃ নিঃসরণ ; দিনে ঝিমুনি, রাত্রে অনিদ্রা, অস্থিরতা, খ্যাতিথেতে । মাই ছাড়ার পর কোষ্ঠবদ্ধতা ; সর্বদা বেগ, মলত্যাগ না হইলে, বা অল্প অল্প হইলে যেন বাকি রহিল বোধ হওয়া । শেষ রাত্রে অনিদ্রা । মলাশয়ে যেন মল রহিয়াছে একরূপ বোধ হওয়া, কিন্তু নির্গত হয় না, অথবা অল্প ত্যাগ এবং বাকি যেন তথায় থাকা ।

দ্বায়বিক বা বাতিকের ও সকল প্রকার কোষ্ঠবদ্ধতার ও অতি ক্রুর রোগে, বিশেষ জিভে শাদা লেপ, অক্লিষ্ট, অস্ত্রের চর্কলতা, গোঙল বাহির হওয়া, এমনত সকল স্থলে ব্যবহার্য্য এবং ফল না দর্শিলে ইহার পর কখন কখন ট্রাই ও মার্ক পর পর দেওয়া হয় ।

নাইটি-আ—মল-কাঠিন্য ও ত্যাগকালে ও গত্রে যেন ঘার চিরা, মলাশয় জালা, পেটে অধিক বায়ু, টক বা তিক্ত তার ও টক উদগার । অতিরিক্ত পেট ফাঁপা ও ঘোড়ার চোনার ভায়া প্রভাব । পুনঃ পুনঃ ও অধিক পারা ব্যবহার বা জনক জননীর অধিক পারা ঘটিলে ঔষধ ব্যবহার থাকিলে ইহা প্রযোজ্য ।

নেট্রুম—কঠিন মল আগকালে ঘার চিরিয়া রক্ত পড়া ; বাহ্যের পর মলদ্বারের সংকোচন ও যাতনা ও মূত্র-নালায় কনকনানি । ভয়ানক কোষ্ঠ-বদ্ধতা—অদ্যুর যেন এককালেই শক্তিহীনতা । নাভিকুণ্ড হইতে অধঃ দিকে চাপ অথবা তলপেট ও মূত্রস্থলীতে এড়োএড়ি যেন শিসার ভার থাকা বোধ ।

• পড—যকৃতের কার্য্য স্ফুটাকরূপে না হওন জন্তু রোগ, বিশেষ অল্প ঔষধে প্রতিকার না হইলে ; শিশু রসের নূনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ; মল কঠিন ও জন্ম-আম-বিশিষ্ট হওয়া ; শুষ্ক মেটে বর্ণের মল এবং কষ্টে ত্যাগ ; গোঙল বাহির হওয়া ; নেবা ও পুনঃ পুনঃ প্রভাব ; জিভে শাদা লেপ, বৃদ্ধতার, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, প্রাতে বৃদ্ধি । কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ ।

পল্স—কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফাঁপা, জিভ অপরিষ্কার হওয়া ও অঙ্গীর্ণের অপ-রাপর লক্ষণ । পীঠ ব্যথা । পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু বাহ্যে না হওয়া বা মলের পরি-

বর্ষে জন্ম আগ, কখন বা রক্ত-মিশ্রিত (নয়) নির্গত হওয়া। অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, কষ্টে ত্যাগ। কুইনাইন দ্বারা অরু-বন্ধের পর শুষ্ক ও লঘুকৃতি মল। শাস্ত ও নয় প্রকৃতি, (এবং সে বিধায়) বালিকা পক্ষে অধিক উপযোগী। কখন ভেদ ও তাহার পর ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা। বাহিরের বাতাসে ভাদি থাকে। উপসর্গ সর্বদা পরিবর্তনীয়।

প্রশ্ন—কঠিন কুকুর বিষ্ঠার স্থায় ছোট ছোট চাপ চাপ মল ও মলাশয়ে ফুঁড়ুনির জন্ম চীৎকার।

প্রশ্ন—অস্ত্রের তাড়না-শক্তির দুর্বলতা জন্ম বাহ্যে না হওয়া ও পেট ব্যথা জন্ম চীৎকার। ভেড়ার নাদের স্থায় কঠিন ও কাল গোলার স্থায় মল এবং জমাট হইয়া চাপ বাধা মলদ্বার সংকোচন ও সঁটে ধরা এবং নাভির ঘোড়া বসিয়া যাওয়া; আট দশ দিন অস্ত্রের অত্যন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ মল, ও ত্যাগ-কালে বিলক্ষণ যাতনা। রক্তহীন, দুর্বল, ও পায়ে পুঙ্খাঘাত, এমত ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা।

প্রাটিনা—এন্টেল কাদার স্থায় মল ও দ্বারে লাগিয়া থাকে, সহজে পড়ে না, মুছাইয়া লইতে হয় এমত অবস্থা; অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্কপ্রায় মল—অনেক কোঁৎ পাড়াতে নির্গত হয়। পরে মলাশয়ে ফুঁড়ুনি। গাড়ি চড়া বা শিশু-বিষ শরীর হওয়ার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধতা।

ফস—সক, লঘু, শুষ্ক, কুকুর-বিষ্ঠার স্থায় মল কষ্টে ত্যাগ; বাহ্যের পর মলাশয়ে ভয়ানক আক্ষেপ (পুরাতন অজীর্ণ রোগে); কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ। আহ্বারের পর ঘুম ঘুম, বিশেষ একহারা ব্যক্তির পক্ষে।

ফাইটোলকা—স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা—রেচক না নিলে প্রায় বাহ্যে হয় না—মলাশয়ের তাড়না-শক্তির শিথিলতা জন্ম রোগ। মল ত্যাগের পূর্বে ও পরেও পেট-পূর্তা ও ভার থাকে। মলদ্বার হইতে পুং অঙ্গ পর্য্যন্ত তীব্র বিধুনি। ডান পায়ে বৃদ্ধা আঙ্গুলে স্নায়বিক বেদনা। আময়ুক্ত কঠিন মল ও বেগ—নিয়ত অতিশয় দুর্গন্ধ মলত্যাগ।

ফেরম-আ—রক্তাধিক্যবাহু ও অর্শগ্রস্ত ও বাহার মলত্যাগকালে কষ্টকর চাপুনি হয়, এমত ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা।

বাপ্টিসা—বহুতের যথা বিহিত কার্যের শিথিলতা জন্ম কোষ্ঠবদ্ধতা।

বার্বেরিস—ভেড়ার নাদের ছায় শক্ত মল ।

বেল—কোষ্ঠবদ্ধতা সহ রক্ত ঔর্জগ হওয়া—মাথা নত করিলেই ঘোরা ও কপাল দপ দপ করা ও ফুঁড়ুনি—বিশেষ ভীক-বৃদ্ধি শিশুর পক্ষে । কেহ কেহ কোষ্ঠবদ্ধতায় নিম্ন ক্রমের ঔষধে বিশেষ ফল পান ।

বোরাক্স—দুই প্রহর রাত্রে পর জর ও কোষ্ঠবদ্ধতা । ভেড়ার নাদের ছায় মল । শিশুর সবুজ বর্ণের মল ।

ব্রাই—মল শুষ্ক ও শক্ত এবং পোড়ার ছায় ; মুখ ও ঠোঁঠ শুষ্ক । শুভ্র-পায়ীর স্বাভাবিক অপেক্ষা গাঢ়তর মল, গাঙ্গ ঠাণ্ডা ও সর্বদা শীত শীত । হাঁটিতে পারে এমন অন্নভোজী শিশুর গ্রীষ্মকালীন কোষ্ঠবদ্ধতা, বৃহদাকৃতি মল ও কষ্টে তাগ হইলে নম্র অপেক্ষা ইহা অধিক ফলদায়ী । কখন কখন প্রাতে ব্রাই ও বৈকালে নম্র । ভেরাণ্ডা তেলের জ্বালাপের পর কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্রাই বিশেষ উপকারী । ব্রাই, নম্র, ওপি, সল্ফর—ইহারা কোষ্ঠবদ্ধতার উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ নূতন রোগে ।

ভেরাট—অগ্নির অপান বায়ু বা অধঃ-তাড়ন-শক্তির অভাব বা নুতন জন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহিরে ইচ্ছার অভাব, মল বৃহদাকৃতি, কঠিন বা একরূপ চাপ বাধা যে অঙ্গুলী বা নরুণ ব্যবহার করিয়া বাহির করিতে বাধ্য হইতে হয় । শিশুর পেট, পা ও পায়ের পাতায় খাল লাগা । বয়স্কদের অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া, কঠিন মল ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, মাঝে মাঝে গা বমি বমি, বুক জ্বালা, টক জল উঠা । পুরাতন রোগ; বড় ও মরু মল, তাগকালে অতিশয় দুর্বলতা, মাথা ব্যথা ও মাথা উত্তপ্ত হওয়া । প্রতিবার মলত্যাগের পর নেতিয়া পড়া ও মুচ্ছা । অধিক প্রস্রাব দ্রুণ কোষ্ঠবদ্ধতা ।

মক্কস—কাওয়া ব্যবহার জন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা ।

মাগ্নিসা-ম—মল কঠিন হওয়ার জন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা ; শক্ত মল, মলদ্বারের নিকটস্থ হইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া ।

মাল্গেনীম—নাভি প্রদেশ কনকনানি সহ পেট খুব স্বীত হওয়া, পিত্ত ও জল ভেদ এবং তৎসঙ্গে বালি বা পাথুরীর কুচি থাকা ।

মার্ক—কোষ্ঠবদ্ধতা, পুনঃ পুনঃ শৌচ চেষ্টা, পেট ব্যথা সহ মুখ দিয়া লাল ভাঙ্গা, গলা ব্যথা, বীচি আওরাণো এবং ঠাণ্ডীতে বৃদ্ধি । অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র



গুলির স্থায় কতকগুলি গুলি সংমিলিত হইয়া গন্ধহীন বৃহদাকৃতি মল ও উহার গায়ে আম থাকি; অত্যন্ত কোঁৎ পাড়া, শাদাটে মল, হরিণ্ডা বর্ণ চক্ষু ও মলাশয়ে চুল্কুনি। তিনবার কঠিন বাহ্যের পর একবার ভেদ। ডাক্তারী চিকিৎসার পর কোষ্ঠবদ্ধতায় ফলদায়ী।

রুটা—কুমির উপসর্গ-বিশিষ্ট আঘাতাদির পর কোষ্ঠবদ্ধতা; পুনঃ পুনঃ বেগ ও মলাশয় বাহির হইয়া পড়া। কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন গাঁজলাটে আম ভেদ।

লাকাসি—অত্যন্ত কঠিন গুলির সদৃশ বা ডেড়ার নাদের স্থায়, অথবা শাদাটে আধুপোড়া মেটে বর্ণের মল ও কষ্টে ত্যাগ, ও তৎসহ পেট ফাঁপা। দীর্ঘকালের ক্রুর রোগ, মলদ্বার-বেন অবরোধিত, তথা দিয়া কিছুই যেন বাহির হইবে না বোধ হওয়া। বা একটা মক্কে মাত্র ত্যাগ, শুবের স্থায় মলের গন্ধ।

লাইক—অস্ত্রের তাড়না-শক্তির ন্যূনতা, কোঁৎ পাড়িতে পাড়িতে মূপ লাল হওয়া ও অতি কষ্টে কঠিন মলত্যাগ; পেট ফাঁপা ও ডাকা এবং বাহ্যের অনেক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মলদ্বারে ও মলাশয়ে যাতনা; প্রস্রাবে লাল লাল বালুকা, বিশেষ ফুস ফুস ও মূত্রাশয়ের উপদাহ থাকিলে। কখন সর্ব শরীর ব্যথা। ভোরে একগুঁয়ে ও খিটখিটে। অধিক জ্বালাপ ব্যবহার দরুন কোষ্ঠবদ্ধতা। প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ উচ্চ ক্রমের লাইকপে ক্রুর রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা। অর্শ থাকায় অধিক খাটে।

সল্ফর—স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফুলা, মলদ্বার বাহির হওয়া ও চুল্কুনি; বুক ধড়ফড়ানি ও মুচ্ছা, স্নায়ের পাতা ঠাণ্ডা হওয়া। গণ্ডমালা ধাতু, বিশেষ চর্ম রোগ ও অর্শ থাকিলে, এবং ঐ সঙ্গে মলদ্বার ব্যথা ও মলত্যাগের পূর্বে চীৎকার। তিন চারি দিন অন্তর অত্যন্ত মল ত্যাগ এবং যেন অবশিষ্ট মল রহিল, এমন বোধ। শুষ্ক কঠিন মল এবং বেগ জ্বন্ত রক্ত নির্গত হওয়া। ওপি বা অজ্ঞ ওষধে উপকার হইয়া পরে রোগ নিঃশেষ করণোদ্দেশে ইহা প্রযোজ্য। শিশুর মল নির্গমনের প্রথমে খুব কষ্ট জন্ত বাহ্যে করিতে না চাওয়া।

সল্ফ-আ—কঠিন, কাল, ছোট চাপ চাপ রক্ত-মিশ্রিত মল সহ দ্বারে

প্রচণ্ড ফুটুনি জন্ম বাহ্যে করিতে করিতে উঠিতে বাধ্য হওয়া ও সর্ব শরীরে কঁাপুনি । ( জ্বীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালের কোষ্ঠবদ্ধতা ও সর্বদা শীত শীত ও মাঝে মাঝে তাপ হওয়া ) । অস্থির, চটা ও পরিবর্তনীয় স্বভাব ।  
• সাবান্ড—এক দুই তিন সপ্তাহ অন্তর নিয়মিত কোষ্ঠবদ্ধতা । বাহ্যের অত্যন্ত বেগ ও ব্যাঙ ডাকার স্থায় শব্দ । শোচে অনেক কণ বসার প্রচুর বায়ু নিঃসরণ, পরে যথেষ্ট পরিমাণে বাহ্যে ।

সার্সা—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিরিক্ত প্রস্রাব বেগ—যেন উহার দরুণ অল্প সব বাহির হইয়া পড়িলে বোধ হওয়া ; বাহ্যে কালে ও পরে মলাশয়ে কন্ধনানি এবং ফুঁড়ুনি । মল সহ বালি ও পাথুরী নির্গমন । অল্প সংকোচিত হওয়া ও উর্দ্ধ হইতে অধঃ দিকে প্রচণ্ড বেগ । আহ্বারের নাম সহ হয় না ।

সিলিসা—কণ্টে দ্বারের নিকট আসিয়া মল পুনর্বার ভিতরে সৈধ্য । বাহ্যের পুনঃ পুনঃ চেঁচা ও পেট শক্ত হওয়া, ফুলা ও সর্বদা ব্যথা এবং মুখ দিয়া টক জল উঠা । শুষ্ক, শক্ত ও চাপ চাপ মলত্যাগের পর মলদ্বার আঁলা । শিশুর আজন্ম কোষ্ঠবদ্ধতা—জ্বোলাপ পিচ্কারী ভিন্ন কোন মতে বাহ্যে না হওয়া । ঐক্যে পাঁচ সাত দিন অন্তর বাহ্যে করান, তৎকালে পেট শক্ত হওয়া ও ফুলা ; বেগ দিলে না নামিয়া মল উপর দিকে উঠে ( ইহার বিশেষ লক্ষণ ) । গুণমালা-ধাতু ও দাঁত উঠা কালীন কোষ্ঠবদ্ধতা ।

সেপি—মল কঠিন ডেলা ডেলা ও বাহ্যের পরেও যেন মলদ্বারে গোলা বা আলুর স্থায়ী কুলিতে থাকা বোধ । মলাশয়ের শেষ ভাগে আসিয়া বাহ্যে আটকাইয়া থাকে এবং অস্থূলি বা নরুণ ভিন্ন উহা বাহির হয় না, এমন স্থলে । বৃথা বেগ—কেবল বায়ু ও আম নিঃসরণ । নরম মল ও কণ্টে ত্যাগ । মলাশয় হইতে আম চৌগান ।

সোলেনম—মল অতিশয় শক্ত ও চাপ চাপ এবং অল্প বা নথ ভিন্ন বাহির হয় না—বিষ্ঠা মধ্যে গোছা গোছা চুল বা স্থতার স্থায় মল দেখা যায় ।

হাইড্রস্টিস—যথা শুষ্ক কোষ্ঠবদ্ধতা বা উহার আনুষঙ্গিক অল্প রোগ থাকিলে মল কঠিন ও ডেলা ডেলা ; জিত অপরিষ্কার ; অল্প ও মলাশয়ে বেদনা ; হৃগ্ন নিশ্বাস ; কখন কখন বাহ্যের অনেক পরে মলদ্বারে যাতনা, মাথা ধরা, মুচ্ছাবৎ হওয়া ।

\*হিপার—বিশেষতঃ মাতা পিতার অধিক পারা ব্যবহার জন্ত সন্তানের কোষ্ঠবদ্ধতা—বৃহদব্দের শক্তি-ন্যূনতা বশতঃ অধিক কোৎ পাড়াতেও খেয়ে মূল নিৰ্গত না হওয়া ।

অস্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—ওপি, নক্স, সেপি, আলুমি, ব্রাই, লাইক ।

আতুড়ে স্ত্রীর কোষ্ঠবদ্ধতা আণ্ট, নক্স, প্লাটিনী, ব্রাই ।

নিরুন্মার পক্ষে—ওপি, নক্স, প্লাটিনা, ব্রাই, লাইক, সল্ফর ।

প্রাচীরের পক্ষে—আণ্ট, ওপি, ফস ।

ভেদের'ধা রেচক ব্যবহারের পর কোষ্ঠবদ্ধতায়—ওপি, নক্স, আণ্ট, কুটা, লাকাসি ।

মাতালের কোষ্ঠবদ্ধতায়—ওপি, কাক্স, নক্স, লাকাসি, সল্ফর ।

স্তন্যপায়ীর পক্ষে—ওপি, নক্স, ব্রাই, আলুমি ভের্গাট, লাউক, সল্ফর ।

স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা—কাক্স, কাষ্টিক, কোনাই, গ্রাহাইট, ব্রাই, লাইক, লাকাসি, সল্ফর, সেপি ।

গোণ্ডল—মলাশয় বা মলদ্বার বাহির হওয়া ।

শিশুর ও বৃদ্ধের হালিস বাহির হয়—স্বাভাবিক গঠনের অপূর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমরক্ত, অত্যন্ত কৌতপাড়া অথবা অর্শের দরুণ এই পীড়া প্রকাশ পায় । বহির্গত হইলে ধৌত করিয়া উহা পুনর্বার স্বস্থানে প্রবেশ করাইবে । অধিক বাহির হইলে ও ফুলিলে বরফের জলে নেকড়া ভিজাইয়া প্রথমতঃ তথায় লাগাইবে, পরে প্রদাহ কমিলে সাঁধ করাইবে এবং হই এক দিন মাখন দিয়া রাখিবে । এককালে আরোগ্য জন্ত নিম্নস্থ ঔষধ সকল ব্যবহার্য্য ।

আর্দ—মলদ্বার হইতে রক্তস্রাবের পর মলাশয় বাহির হইয়া পড়া ও বেদনা । নূতন নূতন রোগ, বিশেষতঃ আমরক্ত বা উদরাময়ের পর এবং

ঐ সঙ্গে তৃষ্ণা বা গা বমি বমি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীরে বেদনা থাকিলে—বিশেষতঃ নূতন রোগে ।

ইহ্মে—বাহ্যের পর মলাশয়ে তীব্র বেদনা, হানা ও ঘারে প্রচণ্ড চুলকুনি ও ঊদ্বাহ সংকোচন ; বিশেষতঃ মল ত্যাগের পর টাড়াইলে বা বেড়াইলে বৃদ্ধি ও বসিলে ভাল থাকা—গোণ্ডল বাহির হওয়া । ইহা সৰ্ব্ব প্রথম প্রত্যাহ দুই তিন বার, পরে প্রত্যাহ প্রাতে একবার করিয়া দিবা ।

এস্কুলস—কোষ্ঠবদ্ধতা ও গোণ্ডল বেরণো ।

নয়—গোণ্ডল বাহির হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, পীঠ ব্যথা, দুৰ্বলতা । যাহারা অধিক আহার করে ও যাহারা সবলকার ও অশ্রান্ত, তাহাদের পীড়ার বিশেষ খাটে ।

নাইটি-আ—কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহ্যের ইচ্ছা, বিকল চেষ্টা ; অজীর্ণতা, অবসন্নতা, ও নেতিয়ে পড়া ।

পড—শিশুর দাঁত উঠা কালীন রোগ ; তৎসহ কদর্যা গন্ধের ভেদ । প্রতি শোচে গোণ্ডল বাহির হওয়া । বয়স্কদের দীর্ঘকালের পীড়া ও কাহারও কাহারও ঐ সঙ্গে ঊদ্বাহময় । অল্প বেগে মলাশয় বা হালিস বাহির হওয়া, পরে সহজ বা রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ । প্রাতেই নির্গমনটা অধিক হয় । অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

ব্রাই—মল শক্ত হওয়া, মলাশয় বেরণো ও দীর্ঘকাল জালা ।

মর-আ—প্রস্রাবের বেগ দিলে গোণ্ডল বাহির হওয়া ।

মার্ক—পেট শক্ত ও ক্ষীণ হওয়া, জর্দাতে আমভেদ, গোণ্ডল বাহির হওয়া ও অত্যন্ত চুলকুনি অথবা ক্রকবর্ণের মলাশয় নির্গমন ও তথা দিয়া রক্ত পড়া ।

মেজেরিয়ম—মলাশয় বাহির হইয়া তদবস্থায় থাকা, অর্থাৎ আর ভিতরে প্রবিষ্ট না হওন অল্প তথায় টাটানি, হাত দিতে না দেওয়া ও জালা ।

মাগিসা—মল কঠিন হওয়ার দরুন কোষ্ঠবদ্ধতা, ডেলা ডেলা মল ও তাগকালীন হালিস বাহির হওয়া ।

আকন—মলাশয় হঠাৎ বাহির ও রক্তে পূর্ণ হওয়া । রোগীকে উপুড় রাখা বিধি ।

রুটা—পুনঃ পুনঃ বেগ ও প্রতি শৌচের সময় মলাশয় ও গোণ্ডল বহির্গত হওন এবং ভিতরে সাঁধ করা ইয়া দিলেও তথুনি আবার বাহির হইয়া পড়া।

লাইক—মলাশয় সংকোচিত ; ও কঠিন মল ত্যাগকালে মলাশয় বাহির হওয়া। ক্রুর রোগে ও অপর ঔষধে কতকটা মাত্র উপকার হইয়াছে, এমনত অবস্থায়।

লাকাসি—বাহের পর গোণ্ডল বাহির হওয়া ও জ্বলা।

সল্ফর—শিশুর গোণ্ডল নির্গমন ও তথা চুল্কনা, পাঁচড়ার জ্বাৰ থাক। এবং দুৰ্ব্বলের অল্প পরিমাণে মলাশয় বাহির হওয়া। ধাতু-বিকৃতি ও দীর্ঘকালের পীড়া। কঠিন মল জন্ত মলাশয় বাহির হওয়া। ইহা ও কাস্তা পুরাতন রোগের বিশেষ উপযোজী।

সেপি—গোণ্ডল ও অর্শ বাহির হওয়া, কাল রক্ত ও রস ত্যাগ, দুৰ্ব্বলতা।

### প্লীহা।

পাকাশয়ের বাম পার্শ্বে প্লীহা নামক একটা যন্ত্র আছে। ইহার কার্য এখন পর্য্যন্ত বিশেষরূপে নির্ণীত হয় নাই। শোণিতাধার ও তৎপরিণোদন পক্ষে প্লীহা কোনোরূপ সাহায্য করে, এমনত সম্ভাবনা। ইহার প্রদাহ হইলে ঐ প্রদেশ টাটায়, চাপিলে বেদনা করে এবং উহার অভ্যন্তরে ফোড়ার জ্বাৰ ব্যথা হয়। উহা ঠেলিয়া ধরিলে উৎকাশি, গা বমি বমি, কখন কখন রক্ত বমন ঘটে। উহার আকার বৃদ্ধি হইলে ঐ স্থল ফুলিয়া উঠে ; সেট সঙ্গ্রে অর, দুৰ্ব্বলতা, পাঁদ্রাস বর্ণ, চক্ষুপাতা রক্তহীন, হাত পারের আগা ঠাণ্ডা হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

জলায় বাস, অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময় বায়ু সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, প্রভৃতি যন্ত্ররোগের যে সমস্ত কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে এবং অধিক কুইনাইন বা স্কোকা ব্যবহার ইত্যাদি এই ব্যাধির হেতু। কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গদেশে যে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা আক্রমণ করিতে না করিতেই সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা দেখা দেয়। এ সম্বন্ধে আনার “সবিরাম জ্বর” \* নামক পুস্তকে

\* সদৃশ চিকিৎসা বিধান—সর্বপ্রথম ও অপরাপর জ্বর ও আত্মবিক্রমিক জ্বর চিকিৎসা। এল, ভি, মিত্র তাহার প্রকাশক। ১নং অপর সারকুলার রোড।

বিশিষ্টরূপে লিখিত আছে । অধিক জানিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির তাহা পাঠ করিতে পারেন । এহলে এই মাত্র বক্তব্য যে, যথায় রোগ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তৎস্থান পরিবর্তন ; লঘু, জীর্ণ ও সবলকারী পথ্য গ্রহণ এবং সৰ্ব্ব প্রকার অনিয়ম পদবিবৰ্জন, উপসর্গ অস্থায়িক ঔষধ সেবন এবং রোগ নিঃশেষ নিনিহত সোরা-বিষনাশক ভৈষজ্য মধ্যে মধ্যে ব্যবহার বিধি । প্ৰীহা ও অগ্রনাসের পুরাতন প্রদাহে জলের পটি পেটে বাঁধিলে বিশেষ ফল লাভ হইতে দেখা গিয়াছে ।

জলপটি বাঁধার প্রণালী । সন্ধ্যা শাকা নেক্‌ড়া চারি পাঁচ পুরু করিয়া পরি-  
কার ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া নিঙ্‌ড়াইয়া পেটের বেদিকে পীড়া ( প্ৰীহায়া বান ও  
ফুঃ ডান ) সেই দিক ঘেঁসিয়া জলপটি বসাইয়া উহার উপর কলার পাত  
এবং তাহার উপর ছপুক কাপড় দিয়া পেট জড়াইবা, যেন উহার মধ্যে বাতাস  
না প্রবেশ করিতে পারে । কিছুকাল পরে ঐ স্থান গরম হয় ও রোগী নচ্ছলতা  
বোধ করে । এককালে পটি না শুকাই, এজন্ত আট ঘণ্টা অন্তর উহা পুন  
নিরমে বদলাইয়া উচিত । তবে আহ্বারের এক ঘণ্টা পূর্বে বা পরে বদলাইলে  
ঠাণ্ডা লাগার দরুণ পরিপাক কার্যের ব্যাঘাত সম্ভব । তরুণ রোগ ও প্রদাহ  
প্রবল হইলে, নেক্‌ড়া এক বাহুই পুরু মাত্র দিবে এবং উহা পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা  
জলে ভিজাইবে । কোনক্রমে নেক্‌ড়ায় গরম হাত দিবে না—গরমে পীড়া বৃদ্ধি  
হয় । ব্যাধি নাশ করার পক্ষে জল একটা উৎকৃষ্ট উপায়, কিন্তু উহা ব্যবহার  
করা নিতান্ত সহজ নহে । বাহ্যিক ইহার শুণাণ্ড ভাল করিয়া বৃদ্ধিকে চাহেন,  
তাহারা যেন Hydropathy “জল-চিকিৎসা” গ্রহণ পাঠ করেন ।

প্ৰীহায়া আকার বৃদ্ধিতে—আর্স, আর্স-আইড, আয়ুসা, চিন, পড, ফাই  
টোলাকা, সলফর ।

প্ৰীহায়া প্রদাহে—আর্স, চিন, নক্স, রস, ব্রাই, সলফর ।

প্ৰীহা শক্ত হইলে—আয়ুসা, আর্স, আইড, চিন ।

আইড—বাম কোঁক শক্ত হওয়া ও চাপিলে লাগা ; ফুঁড়ুনি । পান্য অগ্নের  
পর প্ৰীহা ও তজ্জন্ত উদরী ।

আকন—অত্যন্ত অর, প্ৰীহা-বাথা ও টাটানি, বিশেষ তরুণ রোগে ।

“আয়ুসা-কা”—সদিরাম অর এবং প্ৰীহা শক্ত হওয়া ও ফুলা ।

আগারিকস—প্লীহার আকার বৃদ্ধি, তথায় ব্যথা, শ্বাস গ্রহণে হলফুটুনি, বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে কষ্ট, ডান পার্শ্বে সচ্ছন্দতা লাভ ।

আরানিয়া—কুইনাইনে চাপা পুঁতিজ্বর, প্লীহা চাপপানা হওয়া, শরীর ভার, অনিদ্রা, হাতের পোঁছা বিবৃদ্ধি বোধ, প্লীহার আকার খুব বড়, রোগীর রক্তশ্রাব, বাদল হইলেই বা প্রতিদিন বা সপ্তাহ বা নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর—ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ।

আর্বিকা—বাম পাঁজরার নিম্নে বেদনা ও তজ্জন্ত শ্বাস-কষ্ট, অতিরিক্ত বমন, বিশেষ আবাত বা পতন জন্ত রোগ ও রক্ত উঠা; অথবা প্লীহা ফুলাও উৎসাহে খুঁচুনি এবং অব্যবহার অবস্থায় নিস্তক থাকে ।

আর্স—বাম কোঁক স্টেটে ধরা, তথায় ফুঁড়ুনি ও যেন ছিঁড়িতেছে বোধ হওয়া এবং বাম পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা; বিশেষ সবিরাম পুঁতিজ্বর কালে বা পরে । প্লীহার বৃদ্ধি, তাহা শক্ত হওয়া ও ফুলা, এবং তাহাতে দপ্পদপানি ও অত্যন্ত জ্বালা; তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পান; কড়ার নিম্নে সর্বদা দপ্পদপানি; অত্যন্ত দুর্বলতা; কখন কখন কাল রক্ত ভেদ ও বমন; মলদ্বার জ্বালা এবং পায়ের পাতা ফুলা । চাপড়া প্লীহা । প্লীহার বিগলন বা পচা ধরা অবস্থা । অধিক কুইনাইন ব্যবহার দরুন প্লীহা ফুলা ও উহাতে ব্যথা ।

ক্যাস্প—প্লীহার অধিক রক্ত সঞ্চয়, উহা ফুলা ও স্পর্শে লাগা, বিশেষ সবিরাম জ্বরের পর ।

কার্বো—পুরাতন সবিরাম ও কম্পজ্বর, পেট ক্ষীভ ও পূর্ণ হওয়া এবং প্লীহা-প্রদেশে চাপুনি, থিম্‌চুনি, হানা বা চিড়িক্‌মারা, অত্যন্ত দুর্বলতা ।

কাক্সা—বাম কোঁক প্রদেশে তীব্র থিম্‌চুনি, দপ্পদপানি ও চাপুনি । পুরাতন জ্বরে, প্লীহা রোগে এবং ধাতু প্রকৃতিস্থ করণ পক্ষে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ—কখন ইহা ও সল্‌ফর পর্যায়ক্রমে দেওয়াতে অধিক উপকার ।

চিন—আর্জেন্টানে বাসি জন্ত প্লীহার বৃদ্ধি ও কম্পজ্বর (আরানিয়া); প্লীহার অধিক রক্ত সঞ্চয়, উহা বড় শক্ত হওয়া ও উহাতে একলাগাড়ে ফুঁড়ুনি—বিশেষ ধীরে পদ সঞ্চালন কালে অথবা তথায় খোঁটা মারার শ্রায় ব্যতন্য হইলে ইহাতে বিশেষ ফল হয় । পুঁতি উদ্ভাবিত সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অধিক পরিমাণে ব্যবহার হওয়াতে রোগ দ্বন্দ্ব হয় এবং আরোগ্য করা

স্বকঠিন হইয়া উঠে। তৎকালে অর ও কুইনাইন রূপ বিষ, উভয়েরই চিকিৎসা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্ৰীহার ব্যাধি জন্ম রোগী বান পাৰ্শ্বে শুইতে অশক্ত। অরকালে উত্তাপ, তৃষ্ণা, আই চাই, এবং বিরাম কালে তিক্ত মুখ, গা বমি বমি, রক্ত বমন, অক্ষুধা, বা সৰ্ব্বদা খাই খাই এবং ভেদ, এমত স্থলে ইহা ব্যবহার্য্য।

নক্স—প্ৰীহা প্ৰদেশ ফুল, চলাফেরা, টেপায় ব্যাধি বৃদ্ধি, গা বমি বমি, রক্ত বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাঝে মাঝে মূৰ্ছা।

নেটমস—পুৰাতন প্ৰীহা ও যকৃতের পাড়া এবং পুতি অরের একটা উত্তম ঔষধ। প্ৰীহাপ্ৰদেশ ফুলা, জালা, চাপুনী ও কুঁড়ুনী (বিশেষ খান গ্রহণ কালীন) ও মাথা ধরা।

পল্‌স—নব প্রকৃতি পক্ষে; প্ৰীহাপ্ৰদেশ ফুলা, বেঁধা ও নড়ায় বৃদ্ধি; স্ট্রীলো-কের রক্তবদ্ধ বা স্বল্পতা দূরণ রোগে (মাক্রেটিন)

ফেরম—সবিরাম ও কম্পজরের পর প্ৰীহা ফুলা, স্পর্শে ব্যাধি, তথা খাল লাগা, কুঁড়ুনী। প্ৰীহার ফোটক, কখন কখন প্ৰীহার আকার ছোট হওয়ায় ইহা ব্যবহার্য্য।

বারাইটা—কম্পজরের পর প্ৰীহা শক্ত হওয়া ও আকার বৃদ্ধি, বিশেষ পুৰাতন রোগে।

বেল—প্ৰীহা-অরের সঙ্গে মাথাধরা, ভার ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপদর্গ থাকিলে। অর কমিলে প্ৰীহারও উপশম হয়।

ব্রাই—প্ৰীহা কামড়ানি, কুঁড়ুনী এবং ঐ প্ৰদেশ ফুলা, নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি, অর, গা হাত ব্যাধি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ ও রক্ত বমন। কখন কখন ইহা ও রস পর পর ব্যবহার্য্য।

বোরাক্স—বিশেষ অর্শগ্রস্তের প্ৰীহা ও যকৃতের পাড়া।

ব্রোমাইন—প্ৰমেহ পাড়ার কুচিকিৎসার জন্ম। প্ৰীহার আকার বৃদ্ধি ও শক্ত হওয়া। যেন বান কোঁকে একটা গোলা থাকা বোধ।

মার্ক-প্ৰ—ব্যাধি শোঁট প্রস্তাব ও ঘর্ষাদি স্ফোরকরূপে না হওয়া জন্ম প্ৰীহার রোগ।

রস—প্ৰীহা প্ৰদাহ, বিশেষ অতিরিক্ত শ্রম জন্ম রোগ এবং ইহার অনেক লক্ষণ আর্নিকা সদৃশ।



লাইকপ—পুরাতন রোগে, বিশেষ বামু কৌক সঁটে থাকতে।

লাকাদি—বিশেষ চাপড়া পীহা, তৎপ্রদেশে প্রচণ্ড ব্যথা ও সঁটে ধরা।

সন্ফর—পুরাতন রোগে বিশেষ উপকারী—পীহা ফুলা ও শক্ত হওয়া এবং দৌড়িলে তথার লাগা; জোরে শ্বাস গ্রহণে, বেড়াইতে, বা ভ্রমণে ও কাশিতে গেলে পীহার ফুঁড়ুনি।

সিওনিথস—পুরাতন রোগে পীহা ফুলা ও কঁকনানি এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগার বাতনা বৃদ্ধি। নার্কিন ডাক্তারেরা ইহার অধিক প্রাংশসা করেন এবং ইহার আদত আরক জল সহ মিশাইয়া জলপটি করিয়া পীহার উপর লাগান।

সেরিন—পীহা প্রদেশে ছল ফুটুনি, ফুঁড়ুনি, নড়ায় বৃদ্ধি, শ্বাস খর্ব্বতা ও উদরী। সোরা-বিষাক্ত-ধাতু জড় ক্রুর রোগে ব্যবহার্য্য।

### অগ্রমার্স ও নেবা।

উদরের দক্ষিণ পাশ্বস্থিত বৃহদাকৃতি গ্রন্থিরূপ বস্তুকে যকুৎ বা মেটুলি (মেটলে) কহে। উহার বহির্ভাগ বা উপর পীঠের (Conver) দিকের প্রদাহ হইলে (Pluris) অস্ত্রাবর্তন প্রদাহেইয়া উপসর্গ হয়। খুব অর, ডান্ দিকে উপত্যকার (fulserib) পাঞ্জরার নিম্নে তীব্র বেদনা বা জ্বালা, কখন কখন উহা বুক ও ডান্ কাঁধ ও বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং শ্বাস প্রস্থানে কাশি হইয়া, ডান্ পার্শ্বে শয়ন কালে উহা ত্রাড়িয়া থাকে। চক্রের অন্ত ভাগের ত্রায় (Concave) যকুতের যে খণ্ডের আকৃতি, তাহার পীড়ায় জিভে শাদা জর্দা লেপ, কাট খনকার, গা বমি বমি, বমন, তিক্ততার, প্রবল তৃষ্ণা, অত্যন্ত প্রস্রাব ও জর্দা বা কাল্চে বর্ণ, চক্ষু ও স্বক হরিদ্রাবর্ণ, পাঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনা। এতদ্বিন্ন যকুৎ প্রদাহে ডান্ গাল কখন কখন অধিক আরক্তিম হওয়া, পেটে অধিক বায়ুসঞ্চয় ও ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা দুর্গন্ধ, ধূসর বা সূজা বর্ণের অঙ্গীর্ণের ভেদ, শ্বাস কষ্ট ও বিরক্তি জনক উৎকাশি, হাতের চেটো গরম হওয়া ও জ্বালা, ঘর্ম্ম প্রায় না হওয়া, সন্ধ্যায় অরের প্রকোপ, স্ননিদ্রার অভাব, যকুৎ প্রদেশে গরম হওয়া, কখন কখন ফুলা ও ব্যথা, টেপায় লাগা, এবং অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করিলে বিকৃত শব্দ হওয়া, রোগীর সর্বদা

বিমর্ষ নতুবা একান্তে ও খ্যাতিপোষিত হইয়া পড়া । ক্রমশঃ বলক্ষণ, নাড়ীর দ্রুততা—ক্ষণবিলুপ্ত ও কম্পাঘ্নিত । দড়কা, দাঁতকপাটি লাগা, এ সমস্ত কুলক্ষণ । চক্ষু রোগ; অধিক নাত্রায় বোলাটে হলুদে প্রস্রাব; কখন কখন ভেদ হইয়াও রোগ সারে ।

অধিক গ্রীষ্ম বা ঠাণ্ডা লাগা বশতঃ দন্তোল্লসন ও মাই ছাড়ান কালে ; কুমি থাকা, বা আঘাত লাগা; অধিক বমনকারী ও রেচক, বিশেষ পারাবটিত ঔষধ ব্যবহার; গরম দেশে বাস; সর্সদা সুরাপান; অধিক পরিমাণে মাংস ও চর্বি পাওয়া; ( এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারদিগের মধ্য মাংস প্রতি এত ঘৃণা ) যথা আবশ্যকীয় শ্রম-রাহিত্য বা রোদ্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম; শোক রোগ হিংসা প্রভৃতি মনের শাস্তি নাশক কারণ, এই সকল হইতে রোগ প্রকাশ পায় । অষ্টাহ মধ্যে প্রদাহ উপশমিত না হইলে ইহা পুরাতন পীড়া বলিয়া গণ্য হয় এবং আরোগ্য হইতে অনেক সময় লাগে । পুরাতন রোগ সঙ্গে প্রায়ই অর্জাণতার লক্ষণ দেখা যায় । মল কৈকালে বা মেটে বণেত, সকালে গা বমি বমি, আহাৰ করিলেই পেটের পূর্ণতা, ভার ও ব্যথা; মাথা ধরা, উদ্যম রাহিত্য, সর্সদা গুম ঘুম, লজ্জা ও মনোগান্ধিতা ।

## নেবা, পাণ্ডু, কামাল ।

যকৃতের বিকৃত অবস্থা হইতেই এই রোগের উৎপত্তি, এই নিমিত্ত যত্ন না লিখিয়া উভয়ের চিকিৎসা এক স্থানে বর্ণিত হইল ।

বিকৃত-প্রদাহের যে সকল কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মিত্ত পাথুরী থাকা, অধিক নাত্রায় কুইনাইন বা স্ট্রিকা সেবনে এ ব্যাধি হওন সম্ভব । সর্বপ্রথম চক্ষু, পরে সর্স শরীর, পরে প্রস্রাব এবং কখন কখন ঘাম পর্যাস্ত হরিদ্রাবণ হয় । অনেক সময় ইহার সঙ্গে অতিরিক্ত ও কষ্টকর গা চুলকানি, মাথার জড়তা, জিবে শাদা লেপ, অরুচি, মুখতিক্ততা বা বেতার, বমন উদ্যম, এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন । কখন কখন যকৃতে ব্যথা । ৩৪ দিবসের নবপ্রস্থতের শরীর হরিদ্রা, কিন্তু চক্ষু ও প্রস্রাব স্বৈতবর্ণ থাকে । পরিষ্কার ও গরম রাধিলে এবং কেবল মাত্র স্তনদুগ্ধ পানে ৮।১০ দিনে আপনা হইতেই হলুদ রঙ্গের ভেদ হইয়া সারে ।

অধিক দিনের হইলে ২।৩ দিবস এক এক অম্লবটীকা মার্ক দিলেই আরোগ্য হয় । শেষ থাকিলে একমাত্রা সল্ফর বিধি ।

সচরাচর শিশুর নেবা পক্ষে কামো ও মার্ক । তবে অবস্থা বুঝিয়া অপর জুলিও ব্যবহার্য । যকৃতের প্রদাহ ও নেবা, উভয় রোগে মাংস এবং দ্বিত, চর্কিযুক্ত খাদ্য এককালে নিষিদ্ধ । টাটকা ছন্ধ, পাকা ফল, টাটকা তরকারী, অন্ন, মুগ, মুসুর ডাউল, বৈকালে বা সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে কুটী ছধ ব্যবহার্য । তরুণ পীড়ায় জরের পথ্য ।

অগ্রমাস—তরুণ রোগে—আকন, আর্স, নক্স, পড, পন্স, মার্ক, বেল, ব্রাই ।

—পুরাতনে—নক্স, সল্ফর, কাস্কা, চিন, পাইটি-আ, সিলিসা ।

নেবা—সুরাপান জন্তু—আর্স, নক্স, ফস ।

—পিত্ত জর হইতে—আকন, ক্রেটোল, ডেনস ।

—উত্তেজনার জন্তু—কামো, নক্স, ব্রাই ।

—পুরাতন রোগে—নাইটি-আ, লেপ্টাণ্ডা ।

—পিত্তাম্বরী (পাথুরী জন্তু)—আকন, কামো, নক্স, পড ।

### যকৃতের পীড়া ও নেবা ।

আইড—চোট লাগা অথবা অধিক পায় ব্যবহার দরুণ যকৃতের পীড়া ; মেটে প্রদেশে চাপুনি, ফুঁড়ুনি ও স্পর্শে বেদনা । নেবা, জর্দা, ত্বক, জ্বিত পুরু লেপ, অধিক তৃষ্ণা, গা বমি বমি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা শাদীটে ভেদ, সবুজ প্রস্রাব ও শীর্ণতা ।

আকন—যকৃত প্রদেশে অসহ্য ব্যথা, প্রবল জ্বর ; মাথা ফেটে পড়া, দীর্ঘ প্রস্রাব বা অস্থিরতা ; প্রস্রাব বন্ধ হইয়া মৃত্যু ভয় । বিশেষ যকৃতের উর্দ্ধ পীঠ প্রদাহ, উহা হেঁড়া, জালা—হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, অথবা রাগ বিরক্তি বা রক্তের গরমত্ব, হেতু রোগে উপযোগী । নেবা, জ্বর ; চক্ষু হলুদ, অনিদ্রা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ বা উভয় পর পর ।

আরম—যকৃত প্রদেশ ও উপর পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাক্কাল, সম্ভাটে বা পাটকেলে মল, অত্যন্ত প্রস্রাব এবং হাঁটু হইতে নিম্নস্থল ব্যথাময় ও শ্রান্ত ।

পুরাতন নেবা রোগ ।

• আর্স—যকৃতের একটি নির্দিষ্টস্থানে অতিশয় ব্যথা । রোগী ওইতে অশক্ত, হৃদয়ে বসিতে ব্যথা, বাতনার সর্বদা অঙ্গ নাড়ে । অর, নিয়ত কাতরাগি, গা বমি বমি, কাল বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাল দুর্গন্ধ ভেদ, খুব তৃষ্ণা, যকৃত শক্ত হওয়া, জ্বরে উহা ফুলা ও ব্যথা ; ডান কোঁক ক্ষীত হওয়া ও প্রচণ্ড জ্বালা ; কম্প ও পুঁতিজ্বর জন্ত যকৃতের পীড়া ; অঙ্গীণের ভেদ ও বিকারের উপসর্গ ; মনো-মালিন্য ও চটা ; যকৃতে সামান্য ব্যথা, হাতে খাল লাগা, অত্যন্ত কষ্ট, পরে ঠাণ্ডা বায় ।

পালাজরদরুণ নেবা এবং ঐ সঙ্গে মস্তকের চর্মরোগ ( যথা, এক মেড়ে ও শুষ্ক পড়া ) হইলে এবং স্বক হরিদ্রা ও শাদাটে এবং মল দুর্গন্ধ হইলে, ইহা ও পলস পর পর বিধি । গর্ভাবস্থায় নেবা অথবা যকৃতে আব বা ক্ষত থাকি জন্ত নেবা ।

কামো—তরুণ রোগ এবং ঠাণ্ডী বা ক্রোধবশতঃ রোগে বিশেষ উপকারী । যকৃত প্রদেশ গরম হওয়া, ফুলা ও ব্যথা, জ্বিতে ছাত্তা পড়া, পেটে বায়ু সঞ্চয়, মত্তা বা জর্দাটে ভেদ, মুখে তিক্ততার ও সন্ধ্যায় জ্বর । আহারের অভ্যাচার ও পেটের পীড়া, বড় চটা এবং কেবল কোলে নে বেড়ানয় হির থাকি, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পাকালয়ে চাপ ও মাঝে মাঝে মন কেমন করা, এমত স্থলে ব্যবহার্য্য । অধিক বাতাসলাগা জন্ত মেটে ক্ষীত ও শ্বাস ঠাণ্ডা হইলে ডাং লুজি এই ঔষধী ও মেসমেরিজম বা ঝড়ান ব্যবস্থা করেন । নবপ্রস্থতের নেবার এবং হিম লাগি বা বিরক্তি ও রাগ হইতে উৎপন্ন রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ী ।

• কার্বো—বেড়ানকালে যকৃতে চাপুনি ও ছেঁড়া জন্ত চীৎকার, প্যাথলানি, ফুঁড়ুনি ও যেন উহার অভ্যন্তর টুকরা টুকরা করিতেছে বোধ হওয়া ; তথায় রক্তসঞ্চয় এবং কখন ব্যথা, কখন বা মের্টে ধরা, এক্রপ পর পর হইলে । সোয়া-বিষ, শীত বা সবিরাম জ্বর জন্ত নেবা বা কামাল রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা বা শাদাটে ভেদ ও লাল-রক্ত-মিশ্রিত প্রস্রাব ; চর্বি বা দ্রুত আহার জন্ত রোগে ( পলস ) ; পেট ঢোল হওয়া ও শূল বেদনা, চটা ও রাগাশক্ত হওয়া ।

কাডুস-ম—যকৃতপ্রদেশ ভার, মাথা ধরা, মুখে তিক্ততার, জ্বিত শাদা ও

তাহার অগ্রভাগ এবং ধার লাল হওয়া, গা বমি বমি, সম্ভ্রাটে টুক বমন, প্রস্রাব ও মল হরিদ্রাবর্ণ। নেবা ও পাথুরী, সম্ভ্রাত্ত সর্দি, পাকাশয় বাধা, মুখে জলউঠা ও বমন, স্মরণশক্তির হ্রাস হওয়া।

কালী-কা—যকুৎ ফুলা, ব্যথা এবং বৃকের ডানদিকের বেদনা কাঁধে উঠা, কুঁড়ুনি, সঁটে ধরা ও ভার, খাল লাগা, স্পর্শে বেদনা ও তৎপ্রদেশ গরম হওয়া ও জ্বালা, কেবল ডানপার্শ্বে শুইতে পারা, প্রস্রাবে পুথের থাকরী, যকুতে ফোটক। নেবা, হরিদ্রাবর্ণ ও বলক্ষয়।

কালী-ব্রাই—যকুতের তরুণ-প্রদাহ ও পাক্ধরা। পুরাতন রোগ ও পিত্তের কম ক্ষরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা।

কোনাই—যকুতে ব্যথা, বেড়ানকালে ছেঁড়া, থেকে থেকে কুঁড়ুনিজন্ত খাস-রোধ, মেটে ফুলা ও শক্ত হওয়া। পুরাতন পীড়ায় ব্যবহার্য্য। নেবা, জর্দাবর্ণ, গহ্বি আওরাণো, প্রস্রাব ইষ্টকৎ বন্ধ, কিন্তু কিছু পরে মুত্রত্যাগ, শয়নে কাশি।

ক্রোটাল—চক্ষু বসা, নিস্তেজ ও জর্দাতে হওয়া; মুখ লীসার বর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, জ্বিত ফুলা, গলার শুষ্কতা, গা বমি বমি, ঠাণ্ডা স্বক, যকুত প্রদেশে জ্বালা, তৎসহ চাপুনি, সবুজ বা কাল বমন, পেট জ্বালা, খাসে কষ্ট, অত্যন্ত পিপাসা, বুক সঁটে ধরা।

চিন—যকুৎ ক্ষীত ও শক্ত হওয়া এবং তথায় অধিক রক্তসঞ্চয় ও যেন ক্ষত থাকা বোধ এবং স্পর্শে ব্যথা, পেটে অধিক বায়ু হওয়া ও অপাক মল, বদন ও হাতের শিথু ফুলা। অধিক রসরক্ত-ক্ষয়, অধিক শুষাপান বা কাম-চরিতার্থতা, অতিরিক্ত শ্রম, অধিক পারা ব্যবহার জন্ত নেবা, অথবা কিছু দিন ভাল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ, বা পীড়িতের অধিক ঘর্ম্ম হইলে কিম্বা পীড়ার কসুর থাকিলে এবং ইহার সঙ্গে যকুৎ প্রদেশে বেদনা, পেট কাঁপা ও অজীর্ণের ভেদে ইহা ব্যবহার্য্য। জ্বালা-প্রদেশের পুঁতি-উদ্ভাবিত জ্বর হইতে উৎপন্ন নেবা সহ পৈত্তিকের ভেদ।

চেলি—যকুতে বেদনা এবং উহা উজ্জ্বল ডান কাঁধে উঠা, হৃদয়ের অসম স্পন্দন। পুরাতন যকুৎ ও প্লীহার পীড়া, নেবা, পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়। নেবা; চক্ষু ও স্বক, বিশেষ হাতের চেটো হরিদ্রাবর্ণ; যকুতের বাম দিক ক্ষীত হওয়া ও ডানকাঁধ চাপায় লাগা।

জ্যালান্দ-সা—যকৃত-প্রদেশে কুঁড়ুনি, ডানপাখুরার নিম্নে ব্যাথা, প্রস্রাব ও মূল জর্দা, রাত্রি চারিটার সময় ঘুম ভাঙ্গা এবং আর নিদ্রা না হওয়া ও মাথার পিছন দিক ধরা ।

• জেল্‌স—নেবা, অবসন্নতা, নিশ্বেজ হওয়া, মাথাধরা, মেটে ও দুর্গন্ধ বাহ্যে, চক্ষুর পাতা ভার ও খুলিয়া রাখিতে না পারা, জ্বিতে জর্দা লেপ ।

ডিজিট—যকৃত ব্যাথায়ুক্ত ও শক্ত, নাড়ী মৃদু ও অসম, জ্বিত শাদা লেপ-যুক্ত, গা বমি বমি, মল চকু খড়ির স্থায় শাদা । নেবা, পিত্ত-কোষ-প্রদেশে ব্যাথা, ঘোলাটে ও কাল্‌চে প্রস্রাব—ছিড়িক ছিড়িক করিয়া ত্যাগ । পর পর শীত ও তাপ । শিশুর কাঁদনে-স্বভাব ।

নক্স—রাগজন্তু পীড়া, যকৃত প্রদেশ কুন্ম ও শক্ত হওয়া ( বিশেষ অধিক কুইনাইন ব্যবহার জন্ত ) এবং ঐ স্থলে যেন ফোঁটা হইয়াছে বোধ হওয়া, স্পর্শে লাগা, ডান দিকের ক্ষুদ্র পাঁজরার নিম্নে খুঁচুনি ও দপদপনি এবং ঐপার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা ; স্বক-হরিদ্রাবর্ণ, পৈত্তিকের বমন, অরুচি, অনিদ্রা ( বিশেষ তিনটা রাত্রির পর ) । মদ্যপায়ীর ও পুরাতন রোগে, বিশেষ ডাক্তারি চিকিৎসার ফেরৎ ঝোঁপীর পক্ষে বিশেষ খাটে এবং অগ্নি-উপসর্গ সহ টক বা তিক্ততার, গা বমি বমি, অত্যন্ত শিরঃ পীড়া ও শ্বাসথর্ব্বতা থাকিলে ইহার পর সল্‌ফর ।

নেবা—হরিদ্রাবর্ণ, খাদ্যে স্থগা, যকৃতে ব্যাথা, গা বমি বমি, তিক্ত বমন, সক্ষায গা চুল্কুনি, মধ্যে মধ্যে মুচ্ছা ও পরে দুর্বলতা, কোষ্ঠ-কাঠিখ, শ্রম-বিমুখতা ও নৈশ-খোয়ের পীড়া ।

মাইটি-আ—যকৃত-প্রদেশে চাপুনি ও সঁটে থাকা, চোঁচাইলে তথায় কুঁড়ুনি ; পুরাতন রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ এ রোগ সহ উদরী থাকিলে । নেবা, গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ ; পাতলা তেঁদ হইলেও বাহ্যের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত মলাশয় ছিঁড়ে পড়া ; ঘোড়ার চোনার স্থায় প্রস্রাব ।

পড—যকৃতের তরুণ রোগ, ডান কোঁকে ব্যাথা ও ভার এবং তৎস্থানে সর্বদা ঘর্ষণ ও নাড়া, তিক্ততা, তৃষ্ণা, বমন, শাদা ভেদ ও গোঙল বাহির হওয়া, পাকাশয় হইতে পিত্তকোষ পর্য্যন্ত ব্যাথা ও তৎসহ অত্যন্ত গা বমি বমি । নেবা ও শরীর হরিদ্রাবর্ণ ।

পলস—তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য আহার জন্ত ; উদরাময় হইতে যকৃত্তে প্রদাহ ; ঐ প্রদেশে সঁটে ধরা, বেদা, জিহ্বায় ক্লেদ, অরুচি, মুখে কটু তার বা বেতার, উপর পেট ফুলা, দিবসে সৰ্বদা শীত শীত এবং রাত্রে থেকে থেকে যাতনা বৃদ্ধি, গা বনি বনি, সবুজ হড়হড়ে ভেদ, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাববেগ ও মূত্রদ্বার কন্ধনানি, রাত্রে মাঝে মাঝে মন কেমন করা । নত্র-প্রকৃতির রোগ । নেবা, অধিক কুইনাইন ব্যবহারে স্নিগ্ধসঞ্চারের বিকৃতি ভাব ; উদরাময় ও জ্বর ।

প্লমস—নেবা, চক্ষু, বদন ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ রাত্রে বমন ।

ফস—যকৃত্তে পাক ধরা, ক্ষয়জ্বর, রাত্রে ঘাম ; ডান কোঁক ক্ষীত হওয়া, পাকাশয় হইতে পিত্তকোষ পর্য্যন্ত ব্যথা, যকৃত্ত-প্রদাহ ; জিভে লেপ, কদম্ব্য তার, পুনঃ পুনঃ শাদা বাহ্যে, তৎসহ তৃষ্ণা এবং যকৃত্ত ক্ষুদ্রাকার হওয়া । নেবা সহ কুক্ষুসের পীড়া বা মস্তিষ্কের রোগ থাকিলে । স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় নেবা, তৎসহ উৎকাশি ও অনিচ্ছাধীন কাল্টে প্রস্রাব ; শাদাটে, ধূসর, প্রচুর ভেদ । স্বক ও চক্ষু হৃৎ, রোগী হতাশ ও ম্লান ।

বার্ব—নেবা ও প্রচুর জলবৎ ভেদ, কদাচিৎ কঠিন মল ; প্রস্রাব খুব জর্দা বা ঘোলাটে ; ধরিলে তাহাতে অধিক তলানি পড়া ; কখন বায়সবৎ ক্ষুধা ; কখন বা খাদ্যে ঘৃণা ; অতিরিক্ত তৃষ্ণা বা জলে ঘেব ; নিয়ত পেটফুলা ও মাঝে মাঝে শব্দবিশিষ্ট মরুত্যাগ ও যকৃত্ত-প্রদেশে চাপ ।

বেল—যকৃত্তে তীব্র বেদনা, ও কাহুরানি—চাপিলে, কাশিলে, মিড়িলে, বা ডানপার্শ্ব শুইলে যাতনা-বৃদ্ধি এবং ডান কাঁধ ও বাড়ি পর্য্যন্ত ঐ ব্যথা বিস্তৃত হওয়া । বদন আরক্ত, চক্ষু লাল, মুখ ও গলা শুষ্ক । ঘুম ঘুম ভাব, অথচ ঘুম হয় না—আইটাই । সোণার বর্ণের প্রস্রাব, বুক-ব্যথা ও শ্বাস-কষ্ট । ইহা, মার্ক বা লাকাসি সহ পর পর দেওয়া হয় । অধিক কুইনাইন বা পারা ব্যবহার জন্ত নেবা, তৎসহ পাথুরী, মস্তিষ্কের উপসর্গ, মাথা ভুলায় ঘোরা, পেট গরম হওয়া ও স্পর্শে লাগা । অর্জীর খাদ্য, স্নেহা ও পিত্ত বমন এক্রপ হলে প্রযুক্ত্য ।

বাই—যকৃত্তে জ্বালা, হুঁড়ুনি ; ডান কাঁধ ব্যথা । মুখে জর্দারং ; জিভে জর্দা লেপ । মুখ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও এককালে অধিক পান, বুক

ভার, খাস কষ্ট, জ্বর, পেট বড় ও শক্ত হওয়া এবং টেপায় লাগা । পুরাতন প্রদাহ, বিশেষ বাত-গ্রস্তের । নেবা—চক্ষু জ্বলা, জ্বর, তৃষ্ণা, কপাল ও চেটো অধিক গরম, আহার বা পানের কিছু পরেই বমন ; গা, হাত ব্যথা, উঠে বসায় গা বমি বমি ও মূচ্ছাবৎ হওয়া, স্থির শয়নে ভাল থাকে । বিশেষ অধিক ক্যালামেল বা পারা ব্যবহার ঐকিলে ।

মাইরিকা—যকৃতে অস্ত্রীত বেদনা, পীঠ সঁটে ধরা ও অধিক যাতনা, জিভ হলুদ বা ময়লা যুক্ত, সর্সদা আহারে ঘৃণা, টকে স্পৃহা ।

মায়িসা-ন—যকৃত প্রদেশে সঁটে ধরা ও ব্যথা—বেড়ানয়, স্পর্শে, ডান পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, উহার বৃদ্ধি । ডান কোঁকে জ্বালা ও ফুঁড়ুনি, চাপিলে স্বস্তি । পুরাতন প্রদাহ, মেটের আকার বৃদ্ধি, অক্ষুধা, তিক্ত তার ও উল্কার । নেবা—মুখ ও জিভ জ্বদাটে, মল ধূসর, প্রস্রাব ঘোলাটে, খাস খুঁস, বুক ধড় ফড়, পায়ের পাতা থেকে ডিম পর্য্যন্ত ক্ষীত, দুর্বল, শীর্ণ ।

মার্ক—ডান পার্শ্বে শয়নে অকতা, যকৃত-প্রদেশে চাপুনি ও ফুঁড়ুনি, কাশি, হাঁচিকালে বুক হইতে পীঠের দিকে ফুঁড়ুনি ; যকৃত স্পর্শে লাগা, খাস প্রস্রাসে ও উল্কারে কষ্ট । তরুণ যকৃত প্রদাহ, উহা শক্ত হওয়া ও ফুলা, দুর্গন্ধ ভেদ, কটু প্রস্রাব, পুনঃ পুনঃ শীত, অধিক লাল ভাস্ক্রা, অধিক পারা ব্যবহার দরুণ যকৃতের পীড়ায় হিপার মার্ক উৎকৃষ্ট ওষধ । নেবার উৎকৃষ্ট ওষধ ; শরীর হরিদ্রাবর্ণ, স্থানে স্থানে ব্যথা, দুর্বলকারী ঘাম, পর পর আকান ভাগি খাটে ।

রিয়ম—অপকৃষ্ণল আহার দরুণ নেবা, শাদাটে ও টক ভেদ এবং শরীর হরিদ্রা বা মেটে বর্ণ ।

লাইক—যকৃতে প্রচণ্ড ব্যথা, খাস গ্রহণে সঁটে ধরা, চাপুনি, খাল লাগা, থিম্‌চুনি, ফুঁড়ুনি ও কাশি-কালীন চিড়িক মারা ও অভ্যস্তরে যেন চুল-কুনি, বিশেষ পুরাতন প্রদাহ ও ঐ সঙ্গে ফুস্‌ফুস রোগ থাকিলে বিশেষ খাটে । পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও শক্ত সহ উহা নিঃসরণ, এক পায়ের পাতা গরম, অপর পাতা ঠাণ্ডা এবং নাকের পাতা ক্রমাঘয়ে চোপসান ও ক্ষীত হওয়া, ইহার বিশেষ লক্ষণ । নেবা—জ্বদাটে মুখ, খুব ক্ষুধা কিন্তু অন্নাহারে তৃপ্তি, এক-ওয়ে ও চটা ভাব ; ভয় হইতে রোগ উৎপত্তি, নিদ্রার পর যন্ত্রণাধিক্য ।



লাকটুকা—যকুৎ ও মীহার তরুণ ও পুরাতন—উভয় রোগ ; বিশেষতঃ ডানকোঁকে ফুঁড়ুনি, যেটে খ্যাখলানি, ও সৈটে ধরা, চাপুনি, ভার ভুঁ ফুলা। মীহা-প্রদেশ ফুঁড়ুনি ।

লাকাসি—সুরাপায়ীর যকুৎ প্রদাহ, তৎপ্রদেশে ব্যাথা ও ফোটক হওয়া । .

লারো—তরুণ ও পুরাতন\*যকুৎ প্রদাহ এবং আকারের বৃদ্ধি হওয়া, যকুৎ দপদপানি, যেন তথাকার ফোড়া কাটিবেক বোধ হওয়া ও অভ্যস্তরে বা থাকার ভায় অনুভব। শ্বাস গ্রহণ কালে কাঁধ ব্যাথা। বহু বৎসরের শক্ত মেটে ইহা সেবনে আরোগ্য হয় ।

লেপ্টাপ্তা—যকুৎ প্রদেশে ব্যাথা ; নিয়ত গা বমি বমি ও বমন, জিতে জর্দা লেপ, কালবর্ণের শৌচ প্রস্রাব ।

নেবা—পিত্তকোষ ব্যাথা, মেটে বর্ণের ভেদ ।

সলফর—একহারা, কোলকুঁজো, বিশেষ যাহাদের ত্রুণতানু সর্বদা গরম থাকে বা ধাতু-বিকৃতি জন্ত কোন ঔষধ খাটিতেছে না কিম্বা পাণ্টে পাণ্টে পড়া, অথবা যথায় রোগের কক্ষর থাকা বা অধিক কুইনাইন ব্যবহার জন্ত রোগ, এমন স্থানে সমূহ ফলদায়ী, বিশেষ অনিদ্রা ও চর্মরোগ থাকিলে । যকুৎ-প্রদেশ সংকোচন, সৈটে ধরা ও জালা, ফুঁড়ুনি, ধিমচুনি, স্পন্দন ও স্পর্শে লাগা, ফুলা ও শ্বাস-রোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভোরে ভেদ, শ্বাসরোধ, ক্ষয় জ্বর, রাত্রে গা চুলকুনি । নেবা—বিশেষ অধিক বয়স্ক বালক পক্ষে, হলুদে ত্বক, কৃমি বমন ।

সিলিসা—ডান কোঁকে একলাগাড়ে চাপুনি, যকুৎ-প্রদেশ শক্ত হওয়া, ফুলা, তথায় গুপ্তগুপ্তুনি ও ক্ষত থাকা বোধ হওয়া, বেড়ানয় ও টেপায় বাতনা বৃদ্ধি, যকুতে ফোটক । নেবা, অনেক পূর্বে লক্ষণযুক্ত, বিশেষ মল বাহির হইয়া ভিতরে সৈঁধন ।

সিকেল—যকুৎ-প্রদাহ, শেষ উহার বিগলন বা পচা ধরা ।

সেপি—যকুৎ-প্রদেশ স্পন্দন, প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি, স্পর্শে ব্যাথা, টাটানি ও পূর্ণতা বোধ, প্রচণ্ড খাল লাগা ও বায়ু নিঃসরণে সমতা । নেবা—যকুৎ ব্যাথায়ুক্ত, চক্ষুর পাতা জর্দা, নাকের এড়িএড়ি জর্দা দাগযুক্ত ।

হাইড্রাস্টিস—ত্বক ও চক্ষু জর্দাটে, মল ফাঁকাসে, নেতান ।

## জাহাজ বানৌকারোহণ দরুণ গা বমি বমি ও বমন । ১৬৭

হিপার—যক্ৎ-প্রদেশে ফুঁড়ুনি, বেড়ানকালে উভয় কোঁকে যেন রক্ত  
সঞ্চয় ও প্রতি পদক্ষেপে যেন রক্তের গতিবিধি রোধ অনুভব হওয়া।  
মেটেতে পাক ধরিলে এবং অধিক পারা ব্যবহার দরুণ রোগে। নেবা, চক্ষু ও  
বর্ণ হলুদে, প্রস্রাব জর্দা, বাছে মেটে রক্তের।

### জাহাজ বা নৌকারোহণ দরুণ গা বমি বমি ও বমন ।

পূর্বকালে হিন্দু আর্যেরা বাণিজ্য নিমিত্ত সমুদ্র পথে গমন করিতেন।  
শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যে ইহা বহুদিন অপ্রচলিত ছিল,  
এক্ষণে পুনরায় চলিতেছে এবং ক্রমশই ইহার শ্রীবৃদ্ধি যে হইতেছে তৎপ্রতি  
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বিলাত যাওয়ার যদিও গোঁড়ারা গোল করেন,  
কিন্তু লক্ষা ও ব্রহ্মদেশে অনেক সুব্রাহ্মণ্যও কার্যোপলক্ষে গমন করিতেছেন  
এবং তৎপক্ষে কাহাকেও কোন আপত্তি করিতে দেখা যায় না। জাহাজে  
চড়িলে ধাতু বিশেষে অনেকের অত্যন্ত মাথা ঘোর, অতিরিক্ত গা বমি বমি ও  
বমন হয়, এমন কি, পেটে কিছুই থাকে না—খাদ্য, জল, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সবই  
উঠিয়া পড়ে, তাহাতে খুব দুর্বল করে। যত দিন না জাহাজের গতি  
সহিয়া যায়, তত দিন কম বেশী যাতনা থাকে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি  
ঔষধ জানা থাকিলে নিজের বা সঙ্গীদের উপকার হওয়া সম্ভব।

আর্স—অত্যন্ত গা বমি বমি, প্রচণ্ড কাটনেকার, এবং কিছু উদরস্থ  
হইলেই তাহা উঠিয়া পড়া, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, অন্ন অন্ন ও বহবার পান,  
বলক্ষয়, নৈরাশ্র ও মৃত্যু ভয়।

ইপি—নিয়ত ও এক-লাগাড়ে গা বমি বমি; প্রচুর খোলসা বমন, কিন্তু  
উহাতে বিশেষ দুর্বল না হওয়া (পূর্ব ঔষধের বিপরীত)।

ককু—শয্যা হইতে উঠা বা দাঁড়ানয় মাথাঘোচরা। অতিরিক্ত গা বমি  
বমি ও বমন এবং নৌকা বা জাহাজ টলমল করায় উহা বৃদ্ধি। আহার  
বা পানে যাতনার আধিক্য।

নক্স—জাহাজ চড়িবার পূর্বে ইহা সেবন করিলে রোগ প্রকাশ না  
পাইবার সম্ভাবনা; সে বিধানে দুই চারি মাত্রা পূর্বে খাওয়া বিধি।

রোগীর শয়নাবস্থায় থাকাই বিধি। যে স্থলে ঔষধ না পাওয়া যায়, তথায় মধ্যে মধ্যে টুকরা টুকরা বরফ থাইলে ভাল হয়।

### অন্ত্র বৃদ্ধি—গোঁড়।

পেটের মধ্যস্থিত নাড়ীভূঁড়ি বা অন্ত্র স্থানচ্যুত ও উচ্চ হইয়া আবেগ জ্বায় প্রকাশ পায়। সকল অবস্থার ও সকল বয়সের লোকেরই ইহা হইতে পারে। নাভি-প্রদেশে ওরূপ হইলে উহাকে গোঁড় কহে। নবপ্রসূতের ও অনেক সন্তান-প্রসবিনীরও এ রোগ হয়। বালিকার উরুতে এবং পুরুষের কুঁচকী ও কোষে, অন্ত্র কখন কখন নামে। এই সর্ব প্রকারকেই অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia) বলে। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে সহজে যথাস্থানে আবার সন্নিবেশিত করা যায় এবং কতকগুলি পুরু বা সংযোজিত হওয়ার দরুন ওরূপ করা যায় না; উহারাই উচ্চ হইয়া থাকে। কতক নাড়ী বাহির হইবার পর উহাদের পথ সংকোচিত হওয়ায় আর ভিতরে সৈধ্য না। সেই অন্ত্রের রসরসের গতিবিধি এককালে বন্ধ হয়। পেট সঁটে ধরে ও শূলের জ্বায় ব্যথা হয়। বাহ্যের ইচ্ছা, কিন্তু মলত্যাগে অক্ষমতা এবং ঐ সঙ্গে কমবেশী জ্বর। ইহার পর বমন। প্রথম পাকায় হইতে উৎপন্ন হয়। শেষ অন্ত্রস্থ পদার্থ সকল উঠিতে থাকে। কিছুপরে ঐ স্থান প্রদাহিত হয়। স্পর্শে লাগা, উদগার ও আক্ষেপযুক্ত হিষ্কা; কিয়ৎকাল এইরূপ ভয়ানক যন্ত্রণার পর ব্যথা ইঠাৎ বন্ধ হইয়া চক্ষু ঘোলাটে, মুড়া ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্বল ও ক্ষণলুপ্ত এবং প্রদাহিত-অন্ত্র কালবর্ণ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ঔষধ দ্বারা ব্যথা কমাইয়া অন্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে না পারিলে রোগীকে শস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কর্তব্য। রোগীকে চিত করিয়া শুয়াইয়া হাঁটু দুইটি পেটের দিকে তুলিয়া অতি নিকট-নিকট রাখিবা, পরে আপনার বাম হাত দিয়া, ক্ষীত-বহির্গত অন্ত্রটা ধরিয়া ডানহাতের আঙুল ঐ কুলার উপর দিয়া ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া উহাকে তেলিয়া উপর দিকে তুলিতে অর্দ্ধঘণ্টা কাল চেষ্টা করিবা। ফল না দর্শিলে, এবং তৎস্থানের প্রদাহ, ব্যথা, জ্বালা ও বমন হইতে থাকিলে, দশ কুড়ি মিনিট অন্তর আকন এবং তাহাতে উপকার না দর্শিলে, ইহার সহ নক্ষ

পর পর দিবে অথবা বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করিবে।  
 অস্ত্র যথা স্থানে সন্নিবেশ করিতে পারিলে, আর ওরূপ না হয়,  
 সেই নিমিত্ত কোনপ্রকারে ঐ প্রদেশ চাপিয়া রাখা আবশ্যক। ট্রস  
 নামক যন্ত্র বিশেষে এই কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হয়। রাত্রে ঐ ট্রস  
 খুলিয়া রাখিবে এবং প্রাতে উহা পুনরায় পরিবে। ইহা ব্যবহার দরুন  
 ঐ স্থান টাটাইলে গরম জল দিয়া তথায় কোমেন্ট অথবা প্রত্যহ আগিকার  
 আদত আরকের জল দিয়া একবার করিয়া ধৌত করিলে ব্যথা দূর  
 হইবে। গোড়পক্ষে পাঁচ ছয় পুরু সরু শক্ত নেকড়ার পটি করিয়া  
 তাহা নাভির উপর রাখিয়া হাত দিয়া চাপিয়া উহা এড়োএড়ি ঢেঁরার মতন  
 করিয়া বাধিবে। কাক (Cork) বা অস্ত্র-হাটাকাঠের ছোট চাকা লইয়া  
 গোড়ের উপর চাপিয়া রাখা বিহিত।

অতিরিক্ত শ্রম, বড় মোট তোলা, অথবা স্থানীয় দুর্বলতা জন্ত, কাশি,  
 হাঁচি, অধিক কৌতপাড়া ইত্যাদি উপলক্ষে এই রোগ হঠাৎ বা ক্রমশঃ  
 প্রকাশ পায়।

আকন—পীড়িত স্থানের প্রদাহ, পেট বেদনা, অগ্নিস্তম্ভিত হওয়া, জ্বর, কাশি,  
 খুব অর, অস্ত্র আবদ্ধ বা অবরুদ্ধ হওয়া, তিক্ত বমন, ঠাণ্ডা ঘাম, অস্থিরতা। •

আণ্ড—অত্যন্ত কাম্বাজন্ত রোগ, শাঙ্গা জ্বিত, বমন, ভেদ ও অল্পমাত্র কাশি।

আরম—শিশুর কাম্বাজন্ত অস্ত্রবৃদ্ধি, ডান কুঁচকীর ভিতর দিয়া অস্ত্রের  
 স্থানান্তরিত হওয়া ও আক্কেপ। ঠাণ্ডা দরুন অথবা পৈত্রিক বা পুরুষানুগত  
 (Hereditary) পীড়া।

ওপি—মুখ লাল, পেট শক্ত ও ক্ষীত ; কুঁচকী প্রদেশে অস্ত্র নামা ও তথায়  
 অবরুদ্ধ হওন জন্ত তৎস্থানে ব্যথা এবং পচা গন্ধের উল্কার ও বিষ্ঠা এবং  
 মূত্র বমন। ইহাতে আণ্ড ফল না পাইলে প্রথম ব্যবহার্য। ইহা নক্সের  
 পর খাটে।

ককু—অধিক কাম্বার দরুন গোড় বা নাভির অস্ত্র বৃদ্ধি। কুঁচকীর  
 অস্ত্র বৃদ্ধি, খুব ক্ষুধা, কাম্বা ও শীর্ণ হওয়া। কোষে অস্ত্র আবদ্ধ হওয়া ও ফুলা।  
 অত্যন্ত শীত, পেট জ্বালা, কনকনানি, বমন। বৃদন উত্তপ্ত লাগ ও ঘর্ম্মবৃত্ত।  
 বেদনা বৃদ্ধিতে এই ঔষধ উত্তম খাটে।

কামো—প্রচণ্ড চেক্‌ড়ানি জন্তু কুঁচকী প্রদেশে অল্প নামা ও তথায় চাপুনি। অনবরত ভেদ ও অত্যন্ত অস্থিরতা, কোলে লইয়া বেড়ান ভিন্ন কিছুতেই শান্ত না হওয়া।

কান্ধা—কফাংশ-ধাতু ও যাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বড়। শিশুর এককালে বহু অল্প বৃদ্ধি।

নক্স—পেট ব্যথা, পা তোলা ও ছোড়া। অক্ষুধা, রাত্রে অধিক কান্ধা, গোঁড় বা অল্প নীল কালুচে বর্ণ এবং অবরোধিত হওয়ার তিক্ত বমন ও শ্বাস-কষ্ট। আহ্বারে ব্যতিক্রম, ঠাণ্ডী লাগা বা অধিক গরম হওয়া কিম্বা প্রচণ্ড রাগ জন্ত রোগ, অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ইহা দিয়া প্রতিকার না হইলে ওপি বিধি। শিশু ও স্ত্রীলোকের গোঁড়ে অধিক ব্যবহার্য্য। শিশুর অধিক কান্ধার জন্ত গোঁড় দেখা দেওয়া।

প্রথম—সীসা-ঘটিত শুলের অকথ্য ও ভয়ানক যন্ত্রণাকালে নাতি ও কুঁচকীতে অল্প বৃদ্ধি হওয়া।

বেল—কুঁচকীর অল্প বৃদ্ধি, বিশেষ ঠাণ্ডী লাগায়।

বোরাক্স—অল্প বৃদ্ধি সহ দিন রাত্রি কান্ধা, উপরু হইতে নীচে নামিতে ভয়, এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায় কোল হইতে বিছানায় শোয়াইতে গেলে ভয়ে জাগিয়া উঠা।

ভেরাট—অল্প বৃদ্ধি সহ কাটেনেকার ও অনবরত বমন, নড়িলে বৃদ্ধি, নেতান, মুড়া ঠাণ্ডা, বদন তোড়ান ও কালুচেবর্ণ ও ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম। ইহাতে ফল না দর্শিলে বেবু।

লাইক—অতিরিক্ত চেক্‌ড়ানির জন্তু কুঁচকী প্রদেশস্থ অল্প বৃদ্ধি, বিশেষ ডান দিকের। তাহাতে ব্যথা, টাটানি, ছেঁড়ার স্থায় বোধ হওয়া, বিশেষ নাড়া চাড়া পেল। বায়ু জন্ত অত্যন্ত পেট ফুলা ও ডাকা এবং প্রস্রাবে লাল লাল বালি ও উহা ত্যাগকালে কান্ধা। ঋতুর পর অল্প বাহির হওয়া ও সে সঙ্গে ছেঁড়ার স্থায় যাতনা।

ষ্টাকিস—আঘাত বা চোট লাগার জন্তু কুঁচকীতে অল্প নামা।

সল্‌ফর—ষাট দশ দিনের শিশুর নাতি প্রদেশে ব্যথা ও টাটানি। আকন ব্যবহারে রোগের তিক্ত বমন টক হইলে ইহা প্রযুক্ত্য। অথবা রোগ

কুর—ধাতু বিকৃতি জন্ত সারিয়াও. সারে না—তথায় প্রথমতঃ ইহা ব্যবহার করিয়া আবশ্যক হইলে অল্প সঙ্গ ঔষধ দেওয়ায় নির্বাধির সম্ভাবনা ।

সল্ফর-আ—কোমরের ডান দিকে অল্প যেন ভিতর হইতে বাহিরে ঠেল মারা, কাশিতে বা জোরে শ্বাস লইতে অক্ষমতা, পরে থাকিয়া থাকিয়া অতিশয় বেদনা সহ অল্প কুঁচকীতে প্রবেশ, বিশেষতঃ কথা কহা কালীন । পীড়িতাবস্থা বা ধাতু পরিবর্তন, উভয় পক্ষেই ইহা উত্তম ঔষধ ।

সিনা—ঘুমন্ত অস্থির হয় ও পাঁচ মিনিট কাল থাকিলেই কাঁদে । দিন রাত্রি দোলায় বা কোলে লইয়া বেড়ানয় শাস্ত থাকে, এমত অবস্থায় । ইহার দুই শত ক্রমের ঔষধে অল্প বৃদ্ধি সারে এবং রোগীও স্থির হয় ।

সিলিসা—অল্প বৃদ্ধি ; ঐ স্থান টাটানি, এমন কি স্পর্শ করিতে দেয় না ; পেটে শূলবেদনা এবং দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়ায় উহার সমতা । দুধ খাইলেই তুলে ফেল । • সল্ফরের পর ব্যাহার্য্য ।

গোড় বা নাভিপ্রদেশের অল্পবৃদ্ধি—নক্স ; আরম, কামো, ভেরাট, সল্ফর, সিলিসা ।

অল্পবৃদ্ধি—অণ্ডকৌষে—নক্স ; ওপি, পিট্রোল, মায়িসম ।

—দ্বীপ উরু প্রদেশে ( Temonel ) নক্স ।

—কুঁচকী প্রদেশে ( Ingriental ) আরম, ভেরাট, লাইক, সল্ফ-অলু, অলুম, ককু, কামো, ক্রেমেটিস, নক্স, নাইট্রী-আ, রস, সিলিসা ।

—ও অবরোধিত বা আবদ্ধ হওয়া—নক্স ; আকন, ওপি, সল্ফর ।

—শিশু পক্ষে—আরম, ককু, নক্স, নাইট্রী-আ, ভেরাট ।

—ও শিশুর অত্যন্ত কান্না—আরম, ককু, কামো, নক্স, বেল, বোরাক্স ।

## আমরক্ত ।

বর্ষাকালে ও দস্ত উঠা সময়ে শিশুদিগের এই রোগ হয় । \*পুস্তকান্তরে অর্থাৎ “হোমিওপেথিক চিকিৎসা, আমরক্ত” নামা পুস্তকে এ বিষয় যদিও সবিস্তার লিখিত হইয়াছে, তথাপি এখানেও প্রয়োজনমত সংক্ষেপে লিখিলাম ।

পেটকাঁপা, কামড়ান, ব্যথা, অত্যন্ত বেগ, ও কঁট পাড়ার পর অল্প আম ও রক্ত নির্গমন, অতিশয় শূলুনি, বেগ, মলদ্বার-জ্বালা এবং কখন গোষ্ঠল বাহির হওয়া, কখন কখন সেই সঙ্গে কমবেশী জ্বর, গা বমি বমি ও বমন, অল্প প্রস্রাব, অনিদ্রা ও বাহ্যে কালীন কাল্মা ইত্যাদি এই রোগের উপসর্গ। মলাশয়ের প্রদাহে এই পীড়া হয়।

সামান্যতঃ ইপিকা, নক্স, মার্ক ও সল্‌ফর এই চারিটা ঔষধ এক একটা বা দুইটা পর পর দিলে অনেকে নির্কর্য্যাপি হয়। জ্বর থাকিলে দুই এক মাত্রা আকন দেওয়া বিধি। প্রাতে ইপিকা, বৈকালে নক্স, কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে প্রাতে সল্‌ফর ও বৈকালে নক্স, রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে মার্ক ইত্যাদি দেওয়া হয়।

ডাক্তর তেস্ত শিশুর এই রোগ পক্ষে প্রাতে দুই তিন মাত্রা ইপিকা ও বৈকালে ঐরূপে পিট্টোল দুই তিন দিবস দিতে কহেন।

### রক্তাতিসার বা অমরক্ত।

বৃহৎ অস্ত্রের আমাশয়িক বিল্লির প্রদাহ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। পীড়ার পূর্বে অনেক সময় অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধতা, গা বমি বমি ও বমন; জ্বর, তলপেট ব্যথা, ভেদ; কিছুকাল পরে কেবল খেতজ্বাতাগ এবং সর্বশেষে রক্তাতিসার দেখা যায়। কখনওবা সামান্য উদরাময়ে অত্যাচারের দরুণ ইহার উদ্ভব হয়। জরের পূর্বে, জরের সময়ে বা জরের আসানে এবং প্ৰীহা অগ্রমাস ও ক্রোমরোগের সঙ্গেও কখন ইহা অবস্থিতি করে।

পুনঃ পুনঃ বাহ্যের চেষ্টা, পেটের কামড় সহিত আম ও রক্ত এবং কেচিং বা ঐ সঙ্গে সঞ্চিত কঠিন মলত্যাগ, কমবেশী বেগ ও জ্বালা, পেটব্যথা, কনকনানি, প্রস্রাবের কষ্ট, উরুতে খাল লাগা, জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। পীড়ার ছয় দিবসের পরে বৃহদস্ত্রে ক্ষত হয়। এ ব্যবস্থায় আরোগ্য না হইলে ইহা পুরাতন রোগ মধ্যে গণ্য হইয়া দীর্ঘকাল ভুগিয়া। কাহারও অল্প, কাহারও বা অধিক মাত্রায় শুদ্ধ বা রক্ত মিশ্রিত, দুর্গন্ধ মল ও

কলুতানির ঞায় রস নির্গত হয়, এবং পূর্ল যন্ত্রণার আধিকা ও নূতন নূতন উপসর্গ দেখা দেয় ।

অজীর্ণকারী গরম দ্রব্য আহাৰ ও পান, বিশেষতঃ লবণাক্ত মাংস ও মৎস্য ও অপক্ক ফল ভক্ষণ, অতিরিক্ত শ্রম বা উহার এককালে অভাব ; অপরিষ্কৃত ও সৈঁতসৈঁতে গৃহে এবং বহুজাকীর্ণ সন্ধীর্ণ স্থানে বাস, জলে ভেজা, হিম লাগা, ঘর্ষ বন্ধ হওয়া, ইত্যাদি কারণে রোগ উৎপন্ন হয় । বর্ষা ও হেমস্তের প্রথম প্রথম অধিক হইয়া থাকে । পুঁতি বাষ্প হইতে কখন জ্বর, কখন আমরক্ত হয় । এবং উভয়ই প্রায় এক ঔষধে সারে । এই রোগ কখন বা সাংক্রামিকরূপে অবস্থান করে । ক্রমি, অর্শের রক্তপাত, হঠাৎ বন্ধ, শিশুর দাঁত উঠাকালিন আমরক্ত প্রকাশ পায় ।

স্চিহ্ন—মলের পীতবর্ণ ও বারে কম এবং যন্ত্রণার নানতা এবং বস্ত্রের বিশেষ হ্রাসতা না হওয়া এবং প্রস্রাবে খাঁকুরি থাকা, এ গুলি আরোগ্যের লক্ষণ ।

পেটে অতিশয় কষ্টকর ব্যথা, কামড়ানি, বেগ, হিচ্কা, বমি, মুখে ঘা, গিলিবার কষ্ট, দড়কা, হাত পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডা হওয়া, দেহের বিকার, স্থানে স্থানে শীতল ঘর্ষ ; জিহ্বা শুষ্ক, লাল এবং ঠাণ্ডা হওয়া ; হঠাৎ পেটের বেদনা এককালে বন্ধ হওয়া ; অতিরিক্ত বলক্ষয় ; মলে অত্যন্ত হর্গন্ধি ও অস্থির ভিতরের ছাল পচিয়া নির্গত হওয়া ; পেটে মসা কামড়ানর ঞায় দাগ, অসাড়ে বাহে, খাল লাগা, চক্ষু মুখ বসা, নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হওয়া, এসমস্ত কুলক্ষণ ।

আইড—আম ও রক্তবাহে, বিশেষ পুরাতন রোগে ; বলক্ষয়কারী অধিক ঘাম হওয়া এবং সঁকীলা স্থান পরিভ্রমের ইচ্ছা । (আর্স)

আইরিস্—পেট কামড়ানি, খুব ডাকা, আম ও রক্তভেদ, বমন, স্বক ঠাণ্ডা ও নীল হওয়া, বলক্ষয় ।

আকন—ঠাণ্ডী, ঘামবন্ধ এবং মলাশয়ের প্রদাহ জন্ত পীড়া । প্রথম প্রথম কষ্টকর উদরাময়, পরে রক্ত সহ ভেদ ; অথবা প্রথম হইতে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প রক্তবিশিষ্ট বাহে, পেট কনকনানি, জালা, ছেঁড়া, বেঁধা, জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, মাথা ঘাড় এবং কঁাধ ব্যথা, মৃত্যু ভয় । দিবসে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা, এমত কালের রোগ এবং রাত্রে মলদ্বারে অসহ শুড়্‌শুড়ুনী ও চুলকুনি । ইহার পর অনেক সময় মার্ক খাটে ।



আণিকা—ওক্ষ আম বা উহার সহ রক্ত, কিম্বা মল ও রক্ত ও অতিশয় বেগ; পচা ভিষের ত্রায় দুর্গন্ধ ত্রাণের ঢেকুর ও বায়ু উৰ্দ্ধ ও অধঃ নিঃসরণ, তৃষ্ণা, মূত্র-স্থালীর বেগ; আম, রক্ত ও কখন কখন পুষ মলাশয় হইতে নির্গত হওয়া; বিশেষ লক্ষণ—দীর্ঘকাল, অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা অন্তর বাহ্যে ও মলদ্বারে খ্যাখলানির ত্রায় ব্যথা। আঘাত পাওয়ার দক্ষণ রোগ।

আর্স—দুই প্রহর রাত্রে এবং আহার ও পানের পর অধিক কাল্চে বর্ণের জলবৎ রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ ( তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ ) ও মলাশয়ে জালা এবং তাহার পরেই নেতিয়া পড়া, মূত্ৰাভয়, কখন কখন মুচ্ছাবৎ হওয়া, অতিশয় গাত্রতাপ, অনিবার্য তৃষ্ণা ও অল্প অল্প পান বা উছাতে বিদ্রব। নাড়ী ক্ষীণ ও ক্ষণলুপ্ত হওয়া ও অল্প অল্প ভয়াবহ উপর্গ অথবা অসাড়ে বাহ্যে, দুর্গন্ধ প্রস্রাব, চক্ষু মুখ বসা, কদর্য ত্রাণের নিষ্যাস, গাত্রে ফটকা ফটকা লাল বা নীল দাগ থাকিলে। ইহাতে প্রতিকার না হইলে কার্বো, সঙ্কটাবস্থায়—কার্বো সদৃশ, কিন্তু উহার ত্রায় পেট ফাঁপা অধিক হয় না।

আলুমিনা—উদরাময় রা আমরক্ত, বিশেষ যথা শৌচকালে কৌত না দিলে প্রস্রাব হয় না ( অল্প সময়ে প্রস্রাব রহিত )। ° স্ত্রীলোকের মেটে পাণ্ডু সহ পুরাতন উদরাময়, এক দিন অন্তর বৃদ্ধি এবং পোড়া মাটি খাইতে ইচ্ছা থাকিলে উচ্চ ক্রমের ওষধ ঘন ঘন দিলে ফল সম্ভাবনা।

আলুমেন—পচা গন্ধের রক্তাতিসার। টাইফস জরে থানা থানা রক্ত ভেদ।

আলোস্—আমরক্ত ও অত্যন্ত পেট ব্যথা জন্তু চিংকার ও মুচ্ছাবৎ হওয়া; পুনঃ পুনঃ রক্তাতিসারের বাহ্যে ও মলাশয় জালা; পেটডাকা ও অধিক মরুৎ ত্যাগ। অর্শ, বিশেষতঃ অনেক বার ও অধিক মাত্রায় রক্ত পড়িলে এবং আন্তরের ত্রায় আকৃতি ও তাহা বাহির হইলে ভগেন্দ্রের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। বাহ্যের পূর্বে তলপেট কামড়ানি ( নল ), পরে থলো থলো আম ও রক্ত, তৃষ্ণা। অধিক পরিমাণে আম ত্যাগ।

আসক্লিপিয়স—সর্দি, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও আমরক্ত, পেটডাকা, অধিক ও দীর্ঘকাল কৌতপাড়া, মলত্যাগের কালে ও পরে মুচ্ছাবৎ হওয়া; খাবা খাবা আম পড়া এবং বিলগ ক্ষুধা থাকা। রক্তাতিসার সারিয়া অধিক বেগ দেওয়া থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ ফল হয়।

ইপি—বর্ষার জন্ত বা অপক্ক ফলাহার বা অজীর্ণতা দরুণ পীড়া। নাভি প্রদেশে প্রচণ্ড ব্যথা ও কোঁত পাড়ার উপর পিত্ত ও রক্তভেদ, সকল প্রকার আহারে ঘেব। প্রথম প্রথম আম বা হড়্‌হড়ে বাহের পর রক্ত মিশ্রিত মল, পরে বেগ, শীত, মাথাধরা ও সক্ষায় বৃদ্ধি। হৃদ্ধ আম ভেদ, নিয়ত গা বমি বমি এবং কখন কখন বমন, ইহার বিশেষ লক্ষণ।

ইরিজিরণ—রক্ত-বিশিষ্ট ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ডেলা ডেলা মল ও বেগ, অস্ত্রে ও মলাশয়ে জালা। প্রস্রাব কষ্টে ত্যাগ বা সঞ্চয় না হওয়া।

এপিস—বিশেষ কষ্ট ভিন্ন পুনঃ পুনঃ রক্তভেদ, কখন কখন ঐ সঙ্গে অল্প খ্যাখলানি, বেগ ও মলদ্বার হাজার স্থায় হওয়া।

কলসি—রক্তবিশিষ্ট কখন থলো থলো সবুজ আম ভেদ, জর্দা জলবৎ আম ও টাটকা রক্ত ভেদ হইয়া যন্ত্রণার সমতা। পেট কাঁপা, স্পর্শে লাগা, খাল ধরা ও ভয়াবহ অসহ্য বেদনা; বিশেষ নাভি প্রদেশে থেকে থেকে খাল ধরা, আহার ও পানে বৃদ্ধি; দৌমড়ান ও পেট খুব চাপায় সমতা।

কলিবসোনিয়া—আম বা আম ও রক্ত অথবা হৃদ্ধ শোণিত ভেদ তৎসহ কম বেশী বেগ। মিনিট কতক অন্তর তলপেট ব্যথা ও মূর্ছা; বাহের পূর্বে ও পরে অতিরিক্ত শূল বেদনা।

কাল্‌চিকম—আম ও রক্ত বাহে সহ প্রচণ্ড বেগ ও মলদ্বার-পেশীর আক্ষেপ। ক্রুর রোগ, অত্যন্ত দুর্গন্ধি ও পুনঃপুনঃ জলবৎ ও রক্ত-বিশিষ্ট (যেন অল্প চাঁচা) ভেদ। অত্যন্ত বলক্ষয় ও পেট খুব কাঁপা। তলপেটের বাম দিকে বেদনা; বিশেষ বর্ষার রোগে। বাহের পর প্রচণ্ড বেগ ও মলদ্বায় সংকোচন জন্ত বিলক্ষণ কষ্ট; অথবা কেবল দ্বারের আক্ষেপ মাত্র, বাহে হয় না। উদরী-রোগগ্রস্তের রক্তাতিসার সহ অল্প প্রস্রাব; পায়ের পাতা ফুলা।

কাক্টস—সমস্ত আমাশয়িক বিলী দিয়া রক্ত ভাঙা, পুরাতন রোগে।

কাহু—আমাশয়িক বিলীর টাঁচুনি সহ বাহে যেন রক্ত মিশ্রিত। অত্যন্ত জ্বালাকর প্রস্রাব বা ফোটা ফোটা মূত্র কষ্টে ত্যাগ। পেট কন্‌কনানি, ভয়ানক জ্বালা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয় মাত্রই ঘৃণা। পূর্ণ গর্ভবতীর রক্তাতিসার। খুব অল্প সহ মুখশোষ ও জ্বালা, তৃষ্ণা বা উহার অভাব।

কাপ্তান—পাকাশয় ঠাণ্ডা হওয়া, পেট ফাঁপা—যেন কেটে পড়িবে এরূপ বোধ হওয়া, আম ও রক্ত, আম সহ কাল রক্ত; বাহ্যিকালে ও পরে নাভির গোড়া ব্যথা, মূত্রস্থালী ও মলাশয়ে অতিরিক্ত জালা; বাহ্যের পরক্ষণেই বেগ ও তৃষ্ণা, জলপানে গা শীত শীত ও পীঠ সঁটে ধরা। অথবা পুনঃ পুনঃ কেবল অন্ন অন্ন আম বা রক্ত-মিশ্রিত আম ত্যাগ। কতক কাছ সদৃশ। দমকা বাতাসে বাতনার বৃদ্ধি। মুখের তার পচা জলের স্থায় বোধ হওয়া।

কামো—বর্ষ বন্ধ বা ক্রোধ জন্ত অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডী লাগার দরুণ পীড়া, বিশেষ দাঁত উঠা কালে। রোগের প্রথমে। শিশু একগুঁয়ে আবদারে। কেবল মাত্র শোণিত ভেদ। পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন সবুজ বা সজ্জা পচা ডিমের দুর্গন্ধময় আম ভেদ। একটা গাল লাল ও গরম, অপর গাল পান্নাশ বর্ণ ও শীতল।

কার্বো—রক্ত বিশিষ্ট আম ও পচা গন্ধময় মল, পেট অতিরিক্ত ফাঁপা, (পাকাশয় ফাঁপা—লাইক) মাথা গরম, মুড়া শীতল, নিখাস ঠাণ্ডা, জ্বালায় জন্ত বাতাস প্রিয়, অতিশয় দুর্বল, নাড়ী অপ্রাপ্য, নিদ্রান ও সঙ্কটাবস্থায়। অথবা অনিচ্ছাধীন বাহ্যে, তজ্জা, স্বকে লাল লাল বা সবুজ দাগ; অন্ন জালা, ইহাকে আর্সের পর অথবা উভয়কে পর পর দেওয়া যায়। মলের দুর্গন্ধ নিমিত্ত ইহা ও চিন পর পর বিধি। নাড়ী দুর্বল ও কণলুপ্ত, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ ও উল্গার। প্রচুর রক্ত ভেদ ও তাহার মধ্যে ডেলা ডেলা রক্ত।

কালী-বা—আমরক্ত, থস্থসে জিউলীর আটার স্থায় মল, নাভির গোড়া চিবুনি, অতিশয় বেগ, জিভ শুষ্ক, লাল ও ফাটা, তৃষ্ণা, টকে স্পৃহা, প্রাতে রোগ বৃদ্ধি। মল কাল্চে, আম অধিক, টাইকএড জ্বরের পর। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের আরম্ভে আমরক্ত ভেদ।

গমি—রক্তবিশিষ্ট আম বা সবুজ আম ত্যাগে জালা, অধিক কৌত পাড়া ও গোঙল বেরণো, বিশেষ পুরাতন রোগে। পেট ডাকা, ফাঁপা ও থিম্চুনি ও নাভির গোড়ায় চিবুনি।

চিন—শিশুর রাত্রে টক বা পচা গন্ধের ভেদ ও থানা থানা রক্ত-মিশ্রিত আম; অত্যন্ত কদর্যা গন্ধের আমরক্ত ভেদ, পেট দম্দ্মে, অধিক মরুৎ ক্রিয়া, অত্যন্ত বলক্ষয়, অথবা এক দিন অন্তর রাত্রে রোগ বৃদ্ধি, দিবসে

বাছে প্রায় না হওয়া, তবে কেবল আহারের পর হওয়া । রক্তাতিসারে অগ্নে (নাড়ী) পচা ধরিলে এবং আম ও কার্বোতে উপকার না হইলে ইহা দিবা । আহার বা পানে ভেদ । কার্বোর জ্বায় ইহার লক্ষণে অধিক পেট জ্বালা ও দুর্গন্ধ মকং নয় । রস রক্ত ক্ষয় দক্ষণ ও দুর্বলকারী রোগে ।

জেলস—দাঁত উঠা কালীন রোগে । (উদরাময় দেখ)

টার্ট-এ—মুখে তিক্ত তার, তৃষ্ণা, পেট খুঁচুনি, পিত্ত ও রক্ত ভেদ । অথবা রক্তাতিসারে অনেক যাতনার উপশম হইয়া পাটল বর্ণের রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ, অতিশয় দুর্বলতা, গা বমি বমি এবং কখনও বা বমন হওয়ার স্থলে । কিম্বা টাইফয়েড জরের ভেদ বমি সারিয়া অত্যন্ত দুর্বলতা, পুনঃ পুনঃ ঠাণ্ডা ঘাম, পেট ফুলা, ডাকা, ব্যথা, টেপায় লাগা, চোঁয়া ঢেকুর, ভেদ এবং নাড়ীর ক্ষীণাবস্থায় প্রযুক্ত ।

ডক্ক—হিম, ঠাণ্ডী, জ্বালা বাতাস জ্বন্ত রোগের উৎপত্তি, অথবা ঐ সকল কারণে পীড়ার বৃদ্ধি । শাদা বা সজ্জা ও হড়্‌হড়ে বা রক্তমিশ্রিত আম, টক, অন্ন অন্ন ও পুনঃ পুনঃ ত্যাগ, গাত্র তাপ ।

ডায়োফারিয়া—রক্তাতিসার ও অল্প মধ্যে ছেঁড়ার জ্বায় বেদনা । আমরক্ত বা উদরাময় সহ অল্পশূল ও তথায় আক্ষেপ ; বিশেষ সাংক্রামিক রূপে রোগ অবস্থান করিলে । নিয়ত পেটে শূলব্যথা জন্ত চীৎকার, পেট ফুলা, ও স্পর্শে লাগা, অন্ন জর ও অত্যন্ত কৌত পাড়া ।

নক্স—পাতলা, সবুজ, পাটকিলে রক্তবিশিষ্ট আম, \*অন্ন অন্ন মল, বা শুটলে শুটলে সঞ্চিত মল নির্গমন ও ঐ সঙ্গে তাপ, তৃষ্ণা ; শেষ রাত্রে অনিদ্রা ; বাছে কালে ও পূর্বে পেটবেদনা ; বাছে ত্যাগে বেদনার সমতা ; রোগী নড় চটা হয় ও একা থাকিতে ভালবাসে । পীঠ ভেঙ্গে পড়া ; রক্ত ও পাতলা আম, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁটার জ্বায় মল, প্রাতে যাতনার বৃদ্ধি । ঠাণ্ডী লাগা, রাত্রি জাগরণ, নেশা, গুরু ভোজন ও অনিয়মে থাকার দক্ষণ রোগ । ইহা ও মার্ক অনেক সময় পর পর ব্যবহার্য ।

নাইট্র-আ—পাটকিলে হড়্‌হড়ে বা সবুজ ও রক্তবিশিষ্ট দুর্গন্ধ আম ভেদ, দীর্ঘস্থায়ী পেট বেদনা, মলাশয়ে চাপ ও ভার কিম্বা মলত্যাগ না হওয়া, মুখে ঘা ও ক্রমশঃ উহার বিস্তার, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস । জনক জননীর পূর্বে গরমির

পীড়া অথবা পারা ঘটত ঔষধ অধিক ব্যবহার করা থাকিলে ইহা প্রযুক্ত্য । পেট ব্যথার পর প্রচুর রক্ত ত্যাগ ও তৎকালে মলদ্বারের আক্ষেপযুক্ত সংকোচন ও তথায় এবং মলাশয়ে কনকনানি এবং বেগ, বাহের পর কৌত পাড়া ও মলদ্বার জালা । ইহা ও বেল অনেক সময় পর পর দেওয়া হয় ।

পড—বাহে কালে অতিরিক্ত কৌত পাড়া ও পেট হড় হড় করা এবং যথেষ্ট মরুং ত্যাগ, আম নির্গমন ও তাহার গায়ে রক্তের দাগ, পেট ব্যথা (চাপে স্বস্তি) ও তৎপরে চট্‌চটে আমরক্ত ভেদ, পেট হড় হড় করা, গোগোল বাহির হওয়া, প্রাতে, বৈকালে এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি—দাঁত উঠা-কালে পীড়া । শিশু মাথা এগোড় ওগোড় করে ।

পলস—পুনঃ পুনঃ শোচে ইচ্ছা ও তাহার বেগ এবং কেবল মাত্র রক্ত মিশ্রিত জর্দা আম নির্গমন ; বিবিধ বর্ণের মল এবং রক্ত বিশিষ্ট আম নির্গমন ; মুখে তিক্ত বা বদতার ; পেট মধ্যে থ্যাথলানি, জ্বিভে শাদাটে বা জর্দাটে লেপ, স্বাসকষ্ট, মুর্ছাবৎ হুর্সলতা ; সন্ধ্যা ও রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি । পিপাসার অভাব হইলে (ইপি) ।

প্ৰথম—পুনঃ পুনঃ ও অধিক শোচের চেষ্টা, অধিক কৌত পাড়া ; পেট আঁতে পড়া, মলদ্বারের সংকোচন ও ভিতর দিকে সৈঁধন ; শূল ব্যথা ও রক্তাতিসার, যাতনা জন্ত কান্না ও চেক্‌ডান । আমরক্ত, অতিশয় ভয়ানক পেট কনকনানি, হিদ্ধা ও জ্বর ।

পিটোলিয়ম্—জর্দাটে জলবৎ, আম ও রক্তবিশিষ্ট ভেদ । গাড়ি চড়ায়, শাক সজ্জি খাওয়ায়, অন্তঃসত্ত্বার রোগে ; প্রাতে ও ঝড় তুফানে বৃদ্ধি । ইহা ইপির সহ পর পর ব্যবহার্য্য ।

ফস্—অকষ্টকর রক্তাতিসার, মলদ্বার সর্বদা হা করিয়া (ফাক) থাকা, মল সবুজ হড় হড়ে বা রক্ত মাথা এবং উহার সঙ্গে শাণ্ডদানার ত্রায় শাদা গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ থাকা ; সকালে ও বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি ।

ফাইটোলাকা—আমরক্ত ।

ফেরমফ—ঘাম বদ্ধ দ্রবণ রক্ত বিশিষ্ট ভেদ, অধিক বেগ থাকিলে মার্ক বিধি ।

বাণ্টিসা—পেট ব্যথা বিশেষ কোঁকে ; আম ও রক্ত বাহে, অথবা কেবল শোণিত ভেদ এবং তৎকালে ও পরে অধিক কোঁত পাড়া, সৰ্ব্ব শরীর টাটানি বা ব্যথা ; শৌচ, প্রস্রাব ও ঘামে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং কখন কখন ঐ সঙ্গে ভিদ্ভিঙ্গে জ্বর । টাইফয়েড জ্বরে রক্ত বাহে হইলে ইহা বিশেষ উপকারী । অত্যন্ত মাত্রায় আম ও রক্ত বাহে, অতিরিক্ত কোঁত পাড়া ও জ্বর ।

বারাইটা—পুরাতন রোগে ; পুনঃ পুনঃ আম ও রক্ত বাহে, অপর উপসর্গের অভাব ।

বেল—পেট টাটান ও গরম হওয়া, উহার অভ্যন্তরে হঠাৎ আঁকড়ে ধরা আবার হঠাৎ ছাড়া, নিশ্বাস বন্ধে কমা ; মল সজ্ঞাটে, হড় হড়ে বা ক্লান্ত বিশিষ্ট ; সৰ্ব্বদা বেগ এবং বৈকাল তিনটায় রোগের বৃদ্ধি ; শিশুর ঝিননি, ঘুমন্ত চমকানি, লাফানি ; খসখসে গাত্র ও তাহাতে উত্তাপ এবং পুনঃ পুনঃ পান্ন করা থাকিলে উপকার সম্ভব ।

ব্রাই—পাতলা রক্ত বিশিষ্ট মল বা কেবল রক্ত বাহে, তৎসহ পেট কনকন করা, উঠিয়া বসিলে গা বমি বমি ও বমন ; নড়া চড়ান, এমন কি সামান্য পাশ ফেরায় পেট ব্যথা ও বাহে ; এককালে কিন্তু দীর্ঘ সময় অন্তর অনেক পরিমাণে জল পান ; গ্রীষ্মকালের পীড়া ও খুব গরমাবস্থায় ঠাণ্ডা পানে (যথা বরফজল) (আর্স), প্রাতে ও নড়ায় বৃদ্ধি ।

ভেরাট—রক্তাতিসার বা শুষ্ক শোণিত ভেদ, পেট টেপায় লাগা, অনিবার্য তৃষ্ণা, গা বমি বমি, অস্ত্রে জ্বালা, নিশ্বাস ঠাণ্ডা, প্রতি শৌচের পর অতিরিক্ত বলক্ষয় ও কপালে ঠণ্ডা ঘাম । এক জনের সবিরাম জ্বরে নিম্ন ক্রমের (৫ম) আর্স তিন চারি মাত্রা ব্যবহার করায় জ্বর পরিবর্তে অতিরিক্ত রক্ত ভেদ হইতে লাগিল, তাহাকে ভেরাট দেওয়ায় আন্ত প্রতিকার দেখা গেল ।

মার্ক-আইড—দিন, রাত অসংখ্যবার শৌচ ক্রিয়া, রক্ত কম, সবুজ আমের ভাগ অধিক, অত্যন্ত বেগ ও পেট কামড়ান । দুই মাত্রা সেবনে আরোগ্য ।

মার্ক-ক—প্রবল রোগ ; আম ও টাটকা রক্ত এবং বাহে কালে ও পূর্বে অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কনকনানি, অত্যন্ত কোঁত পাড়া ও তাগের পর বেগ

থাকা, মুখ চক্ষু আরক্তিম, অত্যন্ত ও-গরম প্রস্রাব এবং মূত্রস্থালীর বেগ, জ্বর, বদন ও হাত ঠাণ্ডা। পুরুষের রোগে—মার্ক-ক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে মার্ক-স অধিক খাটে।

মার্ক-ভা—পেটে ভয়ানক খাল লাগা ও সবুজ বর্ণের অধিক আম ত্যাগে ইহা ব্যবহার্য্য।

মার্ক-স—সবুজ ও রক্তবিশিষ্ট আম এবং হুড়্-হুড়্ মল ভেদ (ও পুনঃ পুনঃ হওয়া) অত্যন্ত তৃষ্ণা, রাত্রে প্রচুর ঘাম, বিশেষ মাথায়, রাত্রে ও বৃষ্টিতে রোগের বৃদ্ধি; হালিস বা গোগোল বাহির হওয়া।

মগ্নিস-কা—বিশেষ দাঁত উঠিবার সময় রোগ—আমরক্ত বা সবুজ জলবৎ আম ও মল ভেদ, এবং জলে ফেলিলে উহা না ভাসিয়া গুরত্ব বশতঃ তলায় পড়া, জ্বিতে জর্দা ময়লা লেপ, টক বমন।

মেজেরম—তরুণ রোগ—আম ও রক্ত বাহ্যে এবং অতিরিক্ত বেগ—বাত-প্রস্তের আমরক্তে বিশেষ খাটে।

রস—বিশেষ ভেজা দরুণ রোগে, পাতলা জর্দা বা লাল আম ও ঐ সঙ্গে রক্ত থাকিলে; অল্প অল্প ঔষধে প্রতিকার না হইলে ও পীড়ার শেষাবস্থায় প্রযুক্ত্য; সর্বাঙ্গে বাধা। প্রতিবার শৌচের সময় বেদনা যেন উরু দিয়া নামিয়া বাহির হইতেছে এমন বোধ হওয়া; অসাড়ে বাহ্যে; মলত্যাগে ও নড়িলে চড়িলে যাতনার সমতা, কিন্তু স্থির হইলে বৃদ্ধি (ব্রাইওনিয়ার বিপরীত), রাত্রে রোগ বৃদ্ধি।

ষ্টাফিস—পুনঃ পুনঃ ঈষৎ জ্বরদা আম বাহ্যে, পেট টাটান ও দুর্বলতা। আমরক্ত ত্যাগকালে, তৎপূর্বে ও-পরে পেট কনকনানি এবং বেগ।

সল্ফর—সোরা বা গণ্ডমালাধাতু অথবা চর্মরোগ অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্ত রক্তাতিসার; অল্প ঔষধ খাটিতেছে না, অথবা তাহাতে কথঞ্চিৎ মাত্র প্রতিকার হওয়া; কিম্বা পুনঃ পুনঃ পীড়া হইলে ইহা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার বিধি। লাল্চে বা সবুজ বা রক্তবিশিষ্ট আম, বা শাদা আম ও সেই আমের গায়ে রক্তের ছিটা এবং মল ত্যাগকালে পেট জালা, থিম্চুনি, থ্যাথলানি, মলাশয় বাহির হওয়া, বুক ধড়্-ধড়্ করা, শ্বাস কষ্ট হওয়া।

সল্ফিউ-আ—রক্তমিশ্রিত অত্যন্ত দুর্বল পাতলা মল, প্রস্রাব লাল বা অল্প

কাল, গাত্রতাপ ও জ্বালা, মুখে ঘা, গায়ের ফোঁস বা মশা কামড়ানর মত দাগ, বমন—ইত্যাদি লক্ষণে প্রযুক্ত।

সিনা—রক্তাতিসার সহ ক্রমি রোগের অনেক লক্ষণ থাকিলে ।

• হামমেলিস—রক্তভাগ্যর স্থায় অধিক ও ক্রমবর্ধের শোণিত এবং ঘাম ও মধ্যে মধ্যে ডেলা ডেলা বা ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া মল । কেবল রক্তভেদ ।

হিপার—রক্তবিশিষ্ট আম ; পেটের পশ্চাদিগে ডাক, কিন্তু ব্যাথার অভাব । বর্ষার রোগ ; মলত্যাগের সময় কষ্টকর বেগ ।

অন্য মতের চিকিৎসার বাহে এককালে বন্ধ হইয়া অত্যন্ত পেট ফোলা, ব্যাথা, গা বমি বমি, হিকা, প্রস্রাব না হওয়া, শরীর ও নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, শরীরের স্থানে স্থানে খাল লাগা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, তৎকালে নিম্নলিখিত ঔষধ-গুলি অনেক স্থলে ব্যবহার্য্য ।

আকেন ও বেল—অস্ত্রের প্রদাহ জন্ম অত্যন্ত পেট বেদনা ।

কলসি—পেট ফোলা ও অত্যন্ত ব্যাথা ।

কার্বো—নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, অতিরিক্ত ঘাম ও নাড়ী দুপ্রাপ্য প্রায় ।

কিউপ্রম—অধিক খাল লাগা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘাম ।

ভেরাট—কাটনেকার ও হিমাঙ্গ ।

এই রোগ সাংক্রামিক রূপে অবস্থিতি করিলে, যাহাতে ইহা সুস্থ ব্যক্তি-দিগকে আক্রমণ না করে, তজ্জন্ম নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যাহা রোগ সদৃশ, তাহা প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন বিধি ।

আর্স—সাংক্রামিক রক্তাতিসার ।

কল্‌চিক—বর্ষার পীড়া ।

• চিন—পুতি উদ্ভাবিত, অথবা জলায় বাস জন্ম, কিম্বা স্থানীয় বা জাতীয় পীড়া পক্ষে । ধাতু প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত এক মাত্রা সল্‌ফর এক দিন সেবন বিধি ।

পেটে বেদনার আতিশয্য হইলে তথায় কোমেট ( অর্থাৎ গরম জলে ফ্যানেল বা কস্বল ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া পেটে দিবা, অথবা গরম জল বোতলে পুরিয়া তাহা খাল লাগা স্থানে বুলাইবা । ) মলদ্বারে শুলুনি জন্ম কেহ কেহ গঁড়ির সাঁসের পুঁটুলি করিয়া তাহার সেক দিয়া থাকেন ।



বাহ্যে কালে অভ্যন্ত বেগ থাকিলে—ওপি, মার্ক ।

পুনঃ পুনঃ বেগ ও বৃথা বাহ্যের চেষ্টা হইলে—নল্ল ও ওপি পর পর ।

রাত্রি অনিদ্রা ও শয্যায় সর্বদা পাশ ফেরা—কাকি দুই শত ও বেল দুই শত ক্রমের ।

নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন ও শঙ্কটাপন্ন অবস্থায়—আর্স, ও কার্বো পর পর ।

জ্বর থাকিলে—আকন, জেল্‌স । সাংক্রামিক রোগে—আর্স, ডাওক, বাপ্টিস ।

সবিরাম রক্তাতিসার—(মাঝে মাঝে দুই দশ দিন ভাল থাকা) আর্স, চিন ।

আমরকুসহ মলাশয় ( হালিস ) বাহির হওয়া—আলোস্, পড, মার্ক ।

বিকারের অবস্থা—প্রলাপ বা তন্দ্রা, হঠাৎ শৌচ প্রস্তাব বন্ধ বা নাড়ীর ক্ষুণ্ণ অবস্থায়—রস ও আবশ্যক হইলে তৎসহ আর্স পর পর ব্যবহার্য্য ।

চরমাবস্থায় নাড়ী অপ্রাপ্য ও অতিরিক্ত ঘাম হইলে—কার্বো এবং কখন কখন ইহা ও আর্স পর পর বিধি ।

রোগীর ঘর বিছানা ও পরিধেয় পরিষ্কার, পেট ও পা গরম রাখা উচিত এবং রোগী অসমর্থ হইলে শৌচার্থ্য সরা দিবা । ঠাণ্ডা জল পানে পেটের কনকনানি বাড়িতে পারে, সেই নিমিত্ত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান বিধি । প্রথম দুই এক দিন উপবাসই সুপথ্য, নিতান্ত খাই খাই করিলে যবের কাথ, সাণ্ড বা এরাকুট, তাহার অভাবে খৈয়ের মণ্ড সুসিদ্ধ করিয়া সরু বস্ত্রে ছাঁকিয়া লেবুর রসের সহিত ( আকন ব্যবহার কালে অগ্নি নিষেধ ) বা মিছরির গুঁড়া সহ খাইতে পারে । ক্রমশঃ গাঁদাল পাতার এবং মাগুর বা সিঙ্গি মাছের ঝোল, যব ( Barley ), পোরের ভাত, পানীফলের মণ্ড, মুসুরীর কাথ ; সুস্থ হইলে প্রাতে অন্ন এবং সন্ধ্যায় এরাকুট প্রভৃতি দুই চারি দিন দিবে । ঘরে পাতা সাজো, ঘোল, কলাইডালের ঝোল, পুরাতন তৈতুল এবং কাঁচা বেল রাত্রি সিদ্ধ করিয়া বা পোড়াইয়া প্রাতে পুরাতন খেজুরে গুড় বা তদভাবে অন্ন মিছরির গুঁড়া দিয়া অন্ন মাত্রায় খাইলে আহার ঔষধ দুইই হয় । হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষ সকলের পক্ষেই দুগ্ধ বিশেষ বলকারী পথ্য । দুর্বল্যাবস্থায় প্রথমে সমভাগে জল মিশাইয়া এবং দুই বেলা এক এক কাঁচা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে । বয়স্কদের ঐ সঙ্গে যব বা সাণ্ড মিশান আবশ্যক । পুরাতন রোগে কখন কখন

ছাগ দুধে উপকার হয়। মোট কথা খাদ্য জীর্ণ করিতে পারিলেই বল হয়। লঘু ও পেট খালি রাখিয়া আহার, পেট গরম রাখা ও উষ্ণ ঘর্ষণ করা, অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ, বিশেষ ভোজন কালে, উদরস্থ না করা, অল্প অল্প ব্যায়াম এবং সুবিধা হয় ত স্থান পরিবর্তন করায় আশু স বল হওয়া যায়।

### ক্লোম প্রদাহ ।

কুদ্র অন্ন বা পাকাশয় মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থি আছে, উহাদিগকে ক্লোম কহে। উভেজনা বশতঃ ইহাদের আকার বৃদ্ধি, পাকিয়া উঠা ইত্যাদি উপসর্গ হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী ও পুনঃ পুনঃ অর সহন্যাদি স্ফোটক পীড়া বা তৎসঙ্গে অল্পে ক্ষত থাকা নিমিত্ত ক্লোমপ্রদাহ হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অবিগুন্ধ বায়ু সেবন, কদর্য ও অপুষ্টিকর আহার বশতঃ, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের, এই ব্যাধি হইয়া থাকে।

কদর্য গন্ধের ও মেটে বর্ণের মল, অথবা অধিক জলবৎ, শাদা টক ভেদ, মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে ক্রিমি পড়া, ঘর্ষ ও নিঃস্রাসে টক গন্ধ, অতিরিক্ত ক্ষুধা, কিন্তু মাংসে ঘেষ ও অল্পে লাগসা, প্রস্রাব শাদা বোলাটে ও অমৃতা আটা, পেট ক্ষীত এবং প্রথম প্রথম নরম থাকা পরে মধ্য স্থলে পৃথক পৃথক বা এক সাংড়া শক্ত শক্ত অনেক গুলি ডিম্বের ছায় পদার্থ দেখা যায়। পেট দিন দিন বাড়িয়া প্রকাণ্ড হয়, হাত পা ফুলা হইতে থাকে, সর্বদা গা শীত শীত, নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা, বুদ্ধিব্রংশ ও খুৎখুতে মেজাজ হয়। সর্বশেষে ক্ষয় অর এবং রাত্রে তাহার বৃদ্ধি, অন্ত্যন্ত তৃষ্ণা, অনিদ্রা, মুখ আরক্ত এবং উদরাময় ও অধিক ঘর্ষ হইয়া মৃত্যু। শিশুরই এই পীড়া হইয়া থাকে।

ডাঃ তেস্ত এই রোগে সর্ব প্রথম এক সপ্তাহ সার্সা প্রত্যহ চারি বার করিয়া, পর সপ্তাহে আলোস ঐরূপে, সর্বশেষ কলুচিকম তিন মাত্রা করিয়া দশ দিবস থাইতে ব্যবস্থা করেন।

ক্লোমের প্রদাহিক অবস্থায়, পাকাশয় ও অস্ত্রের প্রদাহ ছায় চিকিৎসা করা উচিত। পেট ও বগলের বীচি (গ্রন্থি) আওরণ হইলে, বেল, মার্ক, সল্ফর, কাকা, নাইট্-আ ব্যবহার্য। উদরাময়, দিন দিন ক্রূশ ও দুর্বল হওয়া পক্ষে,

আর্স, চিন, সল্ফর। ফুস্ফুসের উপসর্গ থাকিলে, ফস্, কালী-কা, নাইট্রো-আ দেওয়া বিধি। এতদ্ভিন্ন আইড, বারাইটো, হিপার, সিনা, কামো, আবশ্যক মতে ব্যবহার্য।

তরুণ পীড়ায় ও জরের অবস্থায় সাণ্ড ও এরাটু; অল্প সময় অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য দেওয়া বিধি। মাংস আহারকারীর পক্ষে তিন চারি ঘণ্টা চিমে জ্বালে মাংস সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে কেবল অল্প হরিদ্রা ধনে ও লবণ মাত্র দিয়া, কাথ ছাঁকিয়া অল্প অল্প করিয়া অধিক বার থাইতে যেন ব্যবস্থা করেন।

### কুমি।

তিন হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। কুমি নির্গত হইলেই রোগ নিশ্চয় হয়, তদভাবে নিম্নলিখিত উপসর্গের কমবেশী উপস্থিত থাকিলে, কুমি অনুভব করা হয়। অল্প অল্প পীড়ায় ঐ সকল লক্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু হোমিওপেথিক চিকিৎসক ব্যাধির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উপসর্গ নিবারণার্থ সদৃশ গুণ বিশিষ্ট ভেষজ অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করেন এবং যে কোন রোগ হউক না কেন, অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন।

মুখ ফুলা, দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ; বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তন—কখন কখন লাল—কখন ফেঁকাসে, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া, চক্ষুর তেজের হীনতা বা অধিক উজ্জলতা, পুস্তলিকার বিস্তীর্ণতা, ক্ষণিক একদৃষ্টিপাত বা দৃষ্টির স্থিরতাভাব, নাক চুলকুনি, শ্বাসিকারদ্ধ দিয়া রক্ত পড়া, আহারান্তে শিরঃপীড়া, রাত্রে মুখ দিয়া লাল পড়া, জিহ্বা শুষ্ক এবং তাহার অগ্রভাগ ও পার্শ্বে লাল দাগ, টক বা হর্গন্ধ নিঃশ্বাস, নিদ্রাভঙ্গে পিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা বা এককালে আহারে অনিচ্ছা, উলবাসে কষ্টের আধিক্য, পেট ডাগরা, সময়ে সময়ে পেট থিম্চন বা মোচড়ান, সর্বদা পেট ডাকা, বায়ু উদগার, হিষ্টা, গা বমি বমি, শ্লেষ্মা বা টক বমন, কোন কারণ বিনা হঠাৎ বমন, প্রেস্তাব জর্দাতে বা ছুধের স্থায় শাদা, অল্প মাত্রায় ভেদ, সময়ে সময়ে অত্যন্ত হর্গন্ধ বাহ্যে, মল-দ্বার চুলকুনি, উৎকালী, বুক ধড়ফড়ানি, অভুপ্তিকর নিদ্রা, ঘুমিয়া বকা, বুক

চাপা, নিশিতে পাওয়া, দাঁত কিড়মিড়ানী, দড়কা, প্রলাপ, মুচ্ছা—কখন কখন বা এক দিন মধ্যে অনেক বার ঐরূপ মুচ্ছা, শ্রমকাতরতা, বিমর্ষতা, খামখেয়ালি মেজাজ, ইত্যাদি উপসর্গ এই রোগে দেখা যায়।

• নাভিপ্ৰদেশ কামড়ান, রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, দিন দিন ক্লশ হওয়া, বড় কুমির প্রধান লক্ষণ। ছোট কুমিতে পূর্বোন্নিখিত উপসর্গ ভিন্ন গা বমি বমি, পাকাশয়ে চিবনর ন্যায় ব্যথা, নাক ও ঞ্জল দ্বার চুলকুনি, প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট, বালিকাগণের অনেক সময় ধাতু ক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি বলাশয়ে আবাস জন্ত কখন কখন তথা হইতে নির্গত হইয়া শয্যায় বেড়ায়, এবং বালিকাগণের গুহ (স্ত্রী অঙ্গ) দেশে প্রবেশ বশতঃ তৎস্থানের অত্যন্ত চুলকুনি হয়। ফিতে কুমি শিশুদিগের প্রায়ই হয় না। ইহার বিশেষ লক্ষণ—যেন কণ্ঠনালা দিয়া কিছু উঠিতেছে বা নামিতেছে, অথবা পার্শ্বদেশে চেউ খেলান্ধ ছায়া কোন পদার্থ নড়িতেছে। ঐরূপ বোধ হওয়ায়

অর্জ, অপরিষ্কার, নিম্ন ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপুষ্টির আহাৰ প্রভৃতি এই রোগের মূল কারণ; কফজ ও গণ্ডমূলা ধাতুবিশিষ্টদিগের এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়।

হোমিওপেথিক চিকিৎসকেরা শিশুর ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যত্ন পান। কুমি নাশ করিয়া শরীর হইতে নির্গত করিলে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রোগ উৎপত্তির কারণ দূরীভূত হয় না; কিছু দিন পরে ডিথ সকল ফুটিয়া পুনরায় পূর্বমত পীড়া দেয়। অত্যন্ত উগ্র ও তীব্র না হউক, সাণ্টো-নাইন প্রভৃতি ঔষধ গুলি বিষ। ধাতু বিশেষে ইহা সেবন করিয়া মারা পড়িয়াছে। হোমিওপেথিক চিকিৎসকেরা শিশুর ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যে চেষ্টা করেন, তাহাতে কুমি সকলের আহারাভাবে অধঃপতন হয়, অথবা নির্জীবাবস্থায় অস্ত্রে অবস্থান করে, কিছু মাত্র অপকার করিতে পারে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমির নিমিস্ত ডাক্তার টেট—নাইকপ দুই দিন, ভেরাট চারি দিন এবং ইপি তিন দিন, প্রত্যেক ঔষধ তিনবার করিয়া খাইতে কহেন। ডাক্তার লারি—রাত্রে এক মাত্র সিনা ও প্রাতে এক মাত্র মার্ক, এইরূপ এক সপ্তাহ এই রোগে ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার হিউজেস সাহেব বলেন প্রাতে ও রাত্রে এক ফোটা করিয়া টিউক্রম দেওয়ায় অনেক কুমি পড়ে এবং উপসর্গও

ষায় । এতদ্বিন্ন লক্ষণানুযায়ী এই ঔষধ স্তলিও ব্যবহার্য্য ; যথা—আকন, চিন, কাক্কা, গ্রাফাইট, টিউক্রম, ফস, সল্ফর, স্লেপি ।

বড় কুমি পক্ষে টেটে ভাওলা-ও তিন বার, পরে ষ্টানম দিনান্তে একবার দিতে বলেন । অন্যে—সাগ্টোনাইন চূর্ণ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এক সপ্তাহ ; এক দুই দিন বিরাম দয়া সিনা, ঐ রূপ চারি দিন এবং সর্বশেষ সল্ফর এক দিবস দুই বার ব্যবস্থা করেন । আকন, ইগে, চিন, নক্স, ফেরম, বেল, ষ্ট্রাম, স্পাইজি, সিনা, সিকুটা, আবশ্যক মতেও দেওয়া হয় । বয়স্কদিগের পৈপের আটা ২।১০ ফোটা ছফ্লের সহিত ২।৩ দিন সেবনে এবং এক পক্ষ ছাগ দুগ্ধ পান করিলে বড় কুমি বাহির হইয়া পড়ে ।

৩. ফিতে কুমি পক্ষে—ফিলিক্স-মাস, প্রত্যহ তিন বার করিয়া—দিনকতক পরে মার্ক-ক, প্রাতে ও রাত্রে চারি দিবস । আর্জেন্ট-না, ইগে, কাক্কা, কাষ্টিক, কুপ্রম, কোস, পমগ্রানাইট, পলস, সল্ফর, সাবাড, কখন কখন বিধি । শুক্ল-পক্ষের দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি পক্ষে—সল্ফর ; কৃষ্ণপক্ষে দশমী হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত রোগবৃদ্ধি পক্ষে—সিলিসা । নিয়মিতরূপে একটা নির্দিষ্ট সীমায় উপসর্গ উপস্থিত হইলে—স্পাইজি । অত্যন্ত মলদ্বার চুলকুনি পক্ষে—ইগে, নক্স । কুমিজর পক্ষে—আকন, স্পাইজিলা, সিলিসা ; ও সেই সঙ্গে পেট ব্যথা থাকা পক্ষে—আকন, বেল, মার্ক, সিলিয়া, হাইয়স । পেট ব্যথা ও দড়্কা পক্ষে—বেল, সিনা, হাইয়স । পেট ব্যথা, উদরাময় ও অতিরিক্ত ক্ষুধা—নক্স-ম, স্পাইজি ।

আকন—জর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, মলদ্বার ও স্ত্রীলোকের গুহ দ্বার ভয়ানক চুলকুনি, অত্যন্ত ভয়—এমন কি একা গুহিতেও আশঙ্কা । পেট ফোলা, নাভির চতুস্পার্শ্ব শক্ত, যথা বাহ্যের বেগ বা হড় হড়ে মল, রাত্রে যাতনার বৃদ্ধি ।

আপোসাইনম—নাক চুলকুনি ও সড়্ সড়ানি, সকল দ্রব্যেরই মধুর স্বাদ ও তার ; পেটে শূল বেদনা এবং পার্শ্বদেশ ও পায়ের তলয় খাল লাগা ।

আর্জেন্ট—ক্ষুদ্র কুমির দরুণ মলদ্বার অতিরিক্ত চুলকুনি, গা বমি বমি, শ্লেষ্মাবমন, যকৃৎ ও নাভির চতুস্পার্শ্বে বেদনা । ফিতে কুমিতেও ইহা ব্যবহার্য্য ।

অটিকা-উবেল—অক্ষুধা, নাক ও মলদ্বার চুলকুনি, রাত্রে অস্থিরতা, অঙ্গ বিশেষের কুটুনি ও জ্বালা ।

আসাবম—খোলো খোলো আমের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমি থাকিলে ।

ইয়ে—রাত্রে শিশুর মলদ্বারের অতিশয় চুলকুনি ও মলাশয়ের সড়সড়ানি, পুনঃ পুনঃ বাহ্যের ইচ্ছা ও হালিস অস্থির হওয়া, মুখ দিয়া জল উঠা, প্রবল বমন, দড়কা, অচৈতন্য হওয়া এবং পরে খানিকক্ষণ কথা কহিতে না পারা ।

ইপি—অতিরিক্ত গা বমি বমি, কাট নেকার ও বমন, এবং পাকাশয়ের অভ্যন্তরে নিয়ত কেমন করা, (অমুখ) ।

কলসিহ—কুমি জন্ত মাথা ধরা ও দপ্ দপ্ করা, মাঝে মাঝে গ্যাবমি বমি ।

কার্বো—কুমিরোগ জন্ত সর্বদা রাগ ও বদ মেজাজ, পা ছোড়, কামড়ান, রাত্রে ভূতের ভয়, দিন দিন দুর্বল হওয়া ।

কাক্সা—সকল প্রকার কুমির পক্ষে, বিশেষ য়ে রোগীর ধাতু পরিবর্তন আশঙ্কক । কফাংশ প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং রং করসা শিশুর পক্ষে অধিক খাটে । বয়স্কের মলাশয়ে জ্বালা বিশিষ্ট গুরুতা এবং উহা হাফা বোধ ও উহার কুঁড়ুনি ।

কালী-কা—হিব খা ঠাণ্ডা লাগায় রোগের বৃদ্ধি ; দুই প্রহর রাত্রে বড় বড় কুমি পতন, পেট ব্যথা, ঝিমন, নিদ্রিত অবস্থায় সর্বদা চমকান, বাল্যভোজের পর বমন, গাত্র তাপ এবং মুখমণ্ডল পান্নাস বর্ণ ও তদবসানে দুর্বলতা । ফিতে কুমি ।

কোস—ফিতে ও অপূর কুমি পক্ষে, অজীর্ণ, অক্ষুধা, অনিদ্রা, দুর্বলতা, প্রচুর ও ঠাণ্ডা ঘাম, জীর্ণতা পেট ফুলা এবং ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা ।

গ্রাফাইট—শিশু চনামারা (জীর্ণ) ; রাত্রে চুলকুনি ও পাচড়া ; প্রাতে গায়র তোলা ; কখন কোষ্ঠকাঠিন্য, কখন বা ভেদ এবং উভয়াবস্থায় খোলো খোলো আমের নির্গমন ; পেট ডাগরা ও মধ্যে মধ্যে তথায় ব্যথা, ঘুমন্ত চমকান ইত্যাদি কিতা কুমির লক্ষণ থাকিলে । মলসহ বড় কুমি পতন ।

চিন—পেট ফোলা, বিশেষ আহাৰান্তে ও রাত্রে ; অঙ্গের ঝাঁপুনি ও দুর্বলতা, অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ ও ঐ সঙ্গে কুমি পতন, নাক খোঁটা, বাহাদের পুরাতন উদরাময় বা সর্বদা জ্বোলাপ লওয়া অভ্যাস এমন সকলের পীড়া ।

টিউক্রম—মলদ্বার প্রদেশ চুলকুনি ও সড়সড়ানি, রাত্রে অস্থিরতা এবং

এগোড় ওগোড় করা, এই রকম কিছুদিন হইয়া ভাল থাকা, পরে ২৩৪ পক্ষ অন্তর পুনর্বার উপসর্গের প্রকাশ।

টেরিবিহু—জলবৎ ভেদ সহ ক্ষুদ্রে ও ফিতে কুমি ত্যাগ। মলদ্বারের সড়-  
সড়ানি এবং যেন ক্ষুদ্রে কুমি নির্গত হইতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

নক্স-ভ—নাক খুঁটুনি, অক্ষুধা, গা বমি বমি, পেট ভার বা ব্যথা, শেষরাত্রে  
যাতনার বৃদ্ধি জন্ত অনিদ্রা।

নক্স-ম—শিশুর কুমি সহ পেট কনকনানি, অল্প অল্প ভেদ, বিশেষতঃ  
রাত্রে ; কিমন।

পল্‌স—নক্স সদৃশ লক্ষণ, কেবল কোষ্ঠবদ্ধ না হইয়া ভেদ এবং শেষ রাত্রে  
না হইয়া সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি। অথবা মুখে বঁদ গন্ধ, গগার বমন, মুখে জল  
উঠা, মলদ্বার দিয়া কলতানি ত্যাগ।

পুণিকা-প্রাণেটম—দাঁত কিড়মিড়ি, মুখে জল উঠা, বমন, পাকশায়ের  
মধ্যে যেন কিছু নড়িতেছে এরূপ অনুভব, অল্প ফুলা, পেট ব্যথা, বুক ধড়-  
কড়ানি, আক্ষেপ ; মুচ্ছা।

কস—মলদ্বার চুলকুনি, বেঁদা, ছেঁড়া, সড়সড়ানি এবং তথায় হাত দিয়া  
শিশুর কান্না ও চীৎকার ; সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি।

ফেরম-আ—মলদ্বার আঁতশয় চুলকুনি এবং হড়হড়ে মল সহ ক্ষুদ্রে কুমি  
ত্যাগ, মলাশয় চুলকুনি ও চিবনর জ্বায় যাতনা, মুখে জল উঠা ও খাদ্য বমন ;  
সানাত্ত কারণে বদন অত্যন্ত লাল হওয়া।

ফেলিঙ্গ-মাস—নাক চুলকান, চক্ষুর পার্শ্বে কালশিরা, জিভে কাঁটা,  
অক্ষুধা, অস্ত্রে চিবন ও খনন করায় তায় ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, একগুঁয়ে ও  
চটা স্বভাব।

বারাইটা-ম—নাভির চতুষ্পার্শ্বে অধিক বেদনা, বিশেষ সকালে ; উৎকাশি,  
জিভ শ্লেষ্মায় আবৃত, খাদ্যে অত্যন্ত লালসা, শীর্ণতা।

বেল—মলাশয় ও মলদ্বারের প্রচণ্ড চুলকুনি। জ্বর, তৃষ্ণা ও মস্তিষ্কের  
উত্তেজনা বশতঃ যুগন্ত চমকান, বদন ও চক্ষু লাল, দাঁত কিড়মিড় করা, চক্ষুর  
পুতলিকার বিস্তৃতি, পাগলের জ্বায় দৃষ্টি, গেগান, মাথা ব্যথা, রাত্রে প্রলাপ,  
অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব ত্যাগ।

ভাওলা-ও—বড় কৃমি পক্ষে সিনা সদৃশ লক্ষণ এবং তাহা সেবনে ফল না দর্শিলে ।

ভেরাট—ভেদ, বমন, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ও অল্প অল্প কৃমির লক্ষণের স্থায় ইহার লক্ষণ কিতে কৃমি পক্ষে উপকারী ।

ভেলিরিয়ান—সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, অনিদ্রা, অঙ্গ চিড়িক মারা ।

মাগ্নিসা-ম—নিদ্রাভঙ্গের পর গা বমি বমি ও দুর্বলতা, গলার নলিতে যেন ভাটার স্থার পদার্থ উঠা ও তজ্জন্ত দম আটকান ; পেট কনকনানি ; অনেক বার শোচক্রিয়া, প্রথম বার কঠিন, দ্বিতীয় বার খসখসে মল, পরে ভেদ ; অল্প আহারেই পেট ভায়, কিন্তু প্রবল ক্ষুধা থাকায় সদা টুকি টুকি খাওয়া । কিতা কৃমি ।

মাগ্নিসা-স—প্রতি শৌচে ক্ষুদ্র কৃমি ভাগ ।

মার্ক—মলদ্বার হইতে নির্গত হইয়া ক্ষুদ্র কৃমির শব্দায় বেড়ান, পেট ফুলা ও শক্ত, উদরাময়, মুখ দিয়া লাল পড়া । মলদ্বার চুলকুনি, আহারে লোভ, অধিক খাওয়া, কিন্তু ক্রমশঃ দুর্বল হওয়া, কদর্যা, দুর্গন্ধ নিঃস্রাব, অল্প ব্যথা, অধিক বায়ু নিঃসরণ, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, অনেক বার ঘুম ভেঙ্গে কাশা ।

কটী—মাথা ঘোরা, ডক ঠাণ্ডা, দুর্বলতা, বমন ও পেট ব্যথা, অধিক থুথু উঠা, জরে তৃষ্ণা ও প্রলাপ থাকিলে ।

লাইক—ক্ষুদ্র কৃমির দক্ষণ মলদ্বার চুলকুনি, চক্ষুর চতুর্পার্শ্বে কালশিরা পড়া, পেট বায়ু-ক্ষীত ও ডাকা এবং উদ্বার মধ্যে যেন কিছু সড় সড় করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে বোধ হওয়া, মল কঠিন ও প্রস্রাবে লাল বালুকা ।

লাকানি—প্রাতে বা নিদ্রাভঙ্গের পরই মলদ্বার চুলকুনি ।

ষ্টানম—থেকে থেকে পেট ব্যথা ও শক্ত পদার্থ দিয়া উহা চাপিলে ভাল থাকা । অথবা অত্যন্ত কাশি, হঠাৎ মুচ্ছা, দড়কা বা অঙ্গ বিশেষ শক্ত হওয়া ।

ষ্ট্রাম—পেটে খাল লাগা, পুনঃ পুনঃ শৌচের ইচ্ছা, আগিয়া কিছু দেখিলেই চীৎকার করা ।

সল্ফর—চর্মরোগ থাকিলে অথবা ধাতু পরিবর্তনে ব্যবহার্য্য । নাইয়ের গোড়ায় বা পেটের বাম দিকে একটা চাপের স্থায় থাকায় বিশেষ খাটে । মলদ্বার প্রদাহ, গাত্রে কষ্টদায়ক ও এক লাগাড়ে চুলকুনি এবং ফুসকুড়ি ;



অথবা জ্বর; মলাশয় সড়্‌সড়ানি ও কুঁটকুটুনি; বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা। সকল প্রকার কৃমি পক্ষে। কঠিন মল সহ বড় কৃমি পড়া।

স্পঞ্জিয়া—প্রত্যহ ক্ষুদে কৃমির নির্গমন।

সাবাড—নাক, কান ও মলদ্বার চুলকুনি; পেট ব্যথা, প্রতি চতুর্থ দিবশে রোগের বৃদ্ধি।

স্পাইজিলা—নাভির গোড়ায় অতিশয় ব্যথা এবং অঙ্গুলি দিয়া শিশুর তৎস্থান দেখান, বুক ধড়ফড়ানি, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, ক্ষুধা, সর্বদা শয়নের ইচ্ছা, মুখমণ্ডল ফেকাসে ও চক্ষুর পার্শ্বে হল্‌দে দাগ। অথবা খুব জ্বর, প্রস্রাব, মাথা ঘোরা, চক্ষুর পুস্তলির বিস্তৃতি, বদন আরক্তিম, কপাল ব্যথা, মুড়া ঠাণ্ডা। পেটে অধিক বায়ু, দুর্গন্ধ মল সহ ক্ষুদে কৃমি।

সিকুটা—পেট ব্যথা, জ্বর, সর্বদা শীত শীত, মুখ নত করিলে তিত্ত জল উঠা, পরে গলা জ্বালা ও তাহা নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ জল পান, পরে পুনরায় জল উঠা, হিকা ও কান্না, হা করিতে অসামর্থ্য, দড়কা, মৃগীর হ্রাস মূর্ছা এবং তদবসানে একটা হাত বা পা কাঠবৎ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা, থিঁচুনি বন্ধ হইলে সেই স্থান ক্রমাগত কাঁপিতে থাকে।

সিনা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বড় কৃমি পক্ষে। সর্বদা নাক খোঁটা, দিবা রাত্রি কান্না, কিছুতেই শাস্ত না হওয়া, খেলাইতে না চাওয়া, নানা দ্রব্যের জন্ত আব্দার, কিন্তু তাহা পাইলেই টেনে ফেলিয়া দেওয়া, উৎকাশি, পুনঃ পুনঃ ঢোক গেলা, হৃদয়ের হ্রাস সাদা প্রস্রাব, ঘুমন্ত এ গ্যাঁড় ও গোড় করা। অথবা নাভির গোড়ায় থিমচুনি, পেট শক্ত ও স্ফীত, অতৃপ্ত নিদ্রা ও চক্ষু ঘোরান; থকথকে কাশি, বিশেষ বর্ষায়; বদমেজাজি, একগুঁয়ে, কোলে লইয়া বেড়ান ভিন্ন কিছুতেই স্থির না থাকা।

সিলিসা—গণ্ডমালা ধাতু। পুরাতন ভিঁদুভিঁদে জ্বর, মাথা যথেষ্ট ঘামা, দশমীর পর রোগের বৃদ্ধি। পেট শক্ত, ফুলা, কামড়ান ও জ্বালা; কঠিন মল সহ বড় কৃমি পতন। পেট আড়ুমাড়ু করিয়া মুখে তিত্ত জল উঠা, বিশেষ প্রাতে, কিছু আহারে উহার সমতা। পেট ভাগুরা, ঘুমন্ত অঙ্গ চিড়িক মারা, অক্লি, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষুধা ইহার অপৰূপ লক্ষণ।

পরিষ্কার শ্বাকা পরিমিত শ্রম করা, অধিক শাক সব্‌জি, কাঁচা ফল, মিষ্টান্ন

ও গুরুপাক খাদ্য নিবেদ, জল সিদ্ধ বা ফিল্টার করিয়া পান করা বিধি । অর খাকিলে সাণ্ড, প্রবল ব্যথার সময় ঠাণ্ডা দুধ ও মিছরি আহারে তাহার সমতা হয় । কুমিরোগগ্রস্ত শিশুর নিকট সূস্থ কার ( সোঁদা ) শিশুকে শয়ন করান অপরামর্শ ।

### ১. অর্শ ও বলি ।

মলাশয়ের শিরার আকার বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুদ্র মটর কড়াই হইতে বাদামের আকৃতি হয় । কখন একক, কখন বা আঙ্গুরের ন্যায় থোলো থোলো হয় । কখন অন্তরে কখন বাহিরে, কখন উহা দিয়া রক্ত কখন বা কেবল আন্দের ভাষ আট আটা পদার্থ নির্গত হয়, আবার কখন বা কিছুই পড়ে না ; কিন্তু শেষের অবস্থার বাতনা অধিক হইয়া থাকে । যখন ইহা প্রকাশ পায়, তখন ইহা লাল বা বেগুণে বর্ণ ও প্রদাহিত হয় এবং স্ফুটস্ফুট, চুল্কুনি, হল্কুইনি, চিড়্‌চিড়িনি, বিহুনি বা জ্বালা ইহার সঙ্গে থাকে । মলত্যাগকালে এই সকল বস্তুণা অসহ্য হইয়া পড়ে, এমন কি বাতনার ভয়ে রোগী শৌচ ক্রিয়া করিতে অনিচ্ছুক হয় । রস বা রক্ত পড়িয়া কষ্টের সমতা হয় । হিম লাগা বা বাহিরে প্রলেপাদি প্রয়োগে ঐ শোণিত করণ বন্ধ হইলে ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দেয় ।

সর্বদা রেচক বা জ্বোলাপ ব্যবহার করা এই রোগের মূল কারণ । এত-  
দ্রিষ্ট গরম পানীয় ( দুধ, চা ) পান, অধিক ঘোড়া চড়া, বেশী পরিমাণে মসলা  
ব্যবহার, অর্জ স্থানে সর্বদা বাস, যকৃতে রক্ত সঞ্চয়, দীর্ঘকালের শ্রাব ( যথা,  
স্ত্রীলোকের রজঃ ) বন্ধ, এই সকল কারণেও এই রোগ দেখা দেয় ।

অর্শ ও তথা দিয়া কেবল আটা বা রস নির্গত—আণ্ট, কাম্প, কার্বো,  
কল্‌চি, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর

অর্শ সহ রক্ত পড়া—কালমিয়া, মর-আ; আকনু, আম-কা, কর্বো, নাইট্রা-  
আ, বেল, বোরাক্স, মিলিফো; আণ্ট, আর্স, কাম্প, কামো, নক্স, পল্‌স  
ফস, ফস-আ, ফেরম, সল্‌ফর, সেপি ।

—ও প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়া—আকোস ইপি, ডাওক, নাইট্রা-আ,  
মিলিফো, ফস-আ, স্বেণ্টাগ্রা, ইয়ে, কাক্স, বেল, সল্‌ফর, হামিমে ।

- ও বাহে কালিন মাত্র রক্ত পড়া—নাইট্র-আ, ফস, ফস-আ ।
- ও রক্ত পড়া বন্ধ—সল্ফর ; কাক্সা, নক্স, পল্ফ ।
- মলদ্বারে—কালমিয়া, গ্রাফাইট, পল্ফ, মর-আ ; আন্ট, আর্স, কার্বো,  
নাইট্র-আ, নেট্রম, ফস, বেল, বোরাক্স, মেলিকো, সল্ফর, সল্ফর-আ ।
- মলশয়ে—কাক্সা, ফস ; কলসি, নক্স, লাইক ।
- কাণা (Blind), রক্ত ও রস পড়াহীন—আর্স, কলসি, কামো, নক্স,  
পল্ফ, রস, সল্ফর ।
- পুরাতন রোগ—নক্স, সল্ফর ; কার্বো, লাইক ।
- বাহিরে বেরন—পল্ফ, ফস-আ, সল্ফর, সেপি ; লাইক, হিপব ।
- কোষ্ঠবদ্ধ দরুণ—এস্কুলস, কলিন্স, নক্স ।
- কষ্টকর—আর্স, ফস-আ ; কার্বো, কলসি, নক্স, সিমিসি ।
- ক্ষত বিশিষ্ট—কামো ; নাইট্র-আ, সিলিসা, হিপব ।
- ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেস্তারার জায় ফুস্কুড়ি—নক্স, পল্ফ ; আন্ট, কল্টি  
কাক্সা, সল্ফর ।
- জ্বালা কর—আর্স ; কার্বো ; আন্ট, মর-আ ।
- সহ কোমর ব্যথা—আকন, নক্স, বেল ।
- জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয় ও ঋতুর গোল—আলোস, কলিন্স ।
- যকৃততে রক্ত সঞ্চয় ও মেটেবর্ণের বাহে—পড, হিপব ।
- প্রদাহ—আকন ।
- পীঠ ব্যথা ( অধিক )—আলোস, এস্কুলস, নক্স ।
- ফাটা—আন্ট, কাস্টিক, গ্রাফাইট ।
- ফুলা—কার্বো, মর-কলসি, কাম্প, কাস্টিক ।
- বিহুনি—নাইট্র-আ ; কলসি, নক্স ।
- মাথাধরা—আলোস, এস্কুলস, নক্স, সল্ফর ।

আকন—রক্ত বা রস পড়া-অর্শ । মলদ্বারে হল্ফুটুনি, চাপুনি, জ্বালা ও তথায় যেন ফুটন্ত গরম জল ঢালা হইতেছে বোধ হওয়া, বক ওক, অত্যন্ত

অস্থিরতা, বিশেষ রক্তাধিক্য ধাতুর পীড়া। পেট টুন্টু করা ও অত্যন্ত ব্যথা কোমর ও নিম্নদেশ যেন ভেঙ্গে পড়া। চঠাৎ বলি হইতে শোণিত কব বহু জন্ত মাথাধরা, পীঠ ব্যথা, ঔদ্রে শূল, হৃৎকম্প ও শ্বাস কষ্ট।

আণ্ট—রাত্রে ঘুম না হওয়া পর্য্যন্ত বলি শুড়ু শুড়ু ও জ্বালা করা।

আম-কা—বাহ্যে কালে বলি বাহির হওয়া, উহা আর্দ্র হইয়াছে ও হাজির গিয়াছে, এরূপ বোধ হওয়া।

আর্শ—কাণা বা রক্ত পড়ে না, এমত অর্শ; অগ্নিদ্বয়ের ত্রায় জ্বালা, বিশেষতঃ রাত্রে, ও তজ্জন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত, দিবসে উহাতে হলুটুনি, বিশেষ বেড়াইবার সময়। খুব তৃষ্ণা, কিন্তু অন্ন অন্ন পান, অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা ও মৃত্যুভয়। রাত্রে, বিশেষ বারোটোর পর ব্যতনার বৃদ্ধি। অর্শে কুলা, ব্যথা, ফুঁড়ুনি, উকতা ও জলুনি এবং বেগ; হালিস বাহির হওয়া, মলদ্বার চুলকুনি, সমস্ত শিরা অন্তর্গত থাকে, রোগী জীর্ণ জীর্ণ হইয়া পড়া।

আনুমি—বলি বাহির হওয়া, উহা আর্দ্র থাকা ও উহাতে ছেঁড়ার ত্রায় বেদনা।

আলোস্—অর্শ হইতে উত্তপ্ত কাল কাল রক্ত পাত, অল্প ও যকুৎ উত্তপ্ত হওয়া এবং তথায় কষ্টকর চাপ; বাহ্যের বেগ, গরম পৈত্তিকের ভেদ; বদন ও মাংস ঝলকে ঝলকে তাপ।

ইগ্নে—অর্শে ও মলাশয়ের উর্দ্ধ দেশে প্রচণ্ড বিজনি। প্রতি বার শৌচের সময় বলি বাহির হয় এবং উহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় (রস, সল্কর, সেপি)। যেন ঐ স্থান হাজিয়াছে এমন বোধ হওয়া। মল নরম হইলেও রক্তপাত এবং ব্যথার আধিক্য; বস্তি প্রদেশে সঁটে ধরা, শুনো বা চাপা। (অপ্রকাশিত) শোক জন্ত পীড়া।

ইপি—অর্শ; প্রস্তাব ভ্যাগে কষ্ট, মনোমালিন্য, কুভাবনা, গা বনি বনি, অধিক রক্তপাত এবং বলিতে হল ফুটুনি, কনকনানি ও জ্বালা, মলদ্বার ফুঁড়ুনি এবং প্রায়ই ভেদ হওয়া।

একুলস—বেজ্ঞানে বর্ণের অত্যন্ত ব্যথাযুক্ত ও জ্বালাযুক্ত স্থপারির ত্রায় বলি, বাহ্যে কালে বা বেগ দিলে উহা বাহির হওয়া; বাহ্যের সহিত চুলকুনি, ফুটুনি ও মলদ্বারে অতিরিক্ত বেদনা—তরুণ এবং বহু বৎসরের পীড়া ইহাতে সারে।

কলিন্দো—ক্রুর রোগ, কষ্টকর বেদনা, কখন কোষ্ঠ বদ্ধতা, কখন বা ভেদ। প্রচুর নয় অথচ অর্শ হইতে এক লাগাড়ে শোণিত পতন। গর্ভাবস্থায় অথবা কষ্টকর রজঃ ও প্রদর বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পীড়া।

কার্বো—বড় ও কাল্চে বর্ণের বলি; উহা ক্ষীত ও বাহির হওয়া এবং সেই বলি হইতে অধিক রক্তস্রাব। মলাশয় হইতে কটু দুর্গন্ধ রস চোয়ান অথবা কাণা বলি এবং উহার শুড়শুড়নি, চুলকুনি, ব্যাথা ও জ্বালা; বিশেষ বেড়াইবার সময়। কোষ্ঠ বদ্ধতা বা কদর্যা রক্তবিশিষ্ট আমভেদ। অগ্নে অধিক বায়ু সঞ্চয় ও পচা টক ঢেকুর উঠা; রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া ও নাসিকা হইতে শোণিতপাত; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেঁড়া।

কাক্সা—বলি ফুলা, ব্যাথা ও বাহির হওয়া এবং তাহা হইতে অধিক রক্ত পলা। মলাশয় জ্বালা ও ফুটুনি, রোগীর শির থাকিতে না পারা। যে সকল স্ত্রীলোকের রজঃপ্রচুর ও ঘন ঘন প্রকাশ পায়, তাহাদের অর্শজন্ম মলাশয়ের কনকনানি, সঁটে ধরা ও ছেঁড়া এবং বাহ্যের পর মলাশয় বেদনা; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হওয়া এবং নিম্ন স্থান হইতে উপরে উঠিলে মাথা ঘোরা। অর্শের শোণিত হঠাৎ বন্ধ দক্ষণ নাথা ঘোরা ও অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া, ভয়ানক মাথা ভার ও টন টন করা, পায়ের পাতা অতিশয় ঘামা ও তলা টাটান। স্রবণশক্তির লোপ।

কালী-কা—বলি বাহির হওয়া সহ ভেদ, ফুটুনি ও জ্বালা। প্রদাহ। প্রস্রাব ত্যাগ কালে বলি বাহির হওয়া।

কাষ্টিক—বলির খুব ব্যাথা ও বড় আকার জন্ম বাহ্যে বন্ধ। অর্শে লে ফুটুনি ও জ্বালা এবং ইহা স্পর্শ করিলে বা বেড়াইলে সেই বাতনা অসহ্য হয়। পেটের পূর্ণতা ও যেন ফাটিয়া যাইবে, এক্রপ বোধ।

গ্রাফাইট—অর্শের সহিত হালিস বেয়ন—মলাশয় জ্বালা, চুলকুনি। গাত্রে লকনা ও তাহা হইতে চট্‌চটে রস নির্গত হওয়া।

জিঙ্ক—বলি বাহির হওয়া ও চিন্ চিন্ করা।

ডায়োস্ক—বলির আকার বড়, বর্ণ কাল্চে এবং হালিস বাহির হওয়া।

নয়—রক্তপড়া ও কাণা, উভয় প্রকারের অর্শ। মলাশয় চুলকুনি, জ্বালা, ও তাহাতে বলি। বাহ্যের পর ফিকে রক্ত পড়া, কোমর ও তলপেট

ভয়ানক ছেঁড়া, চাপুনি ও থ্যাঁতলানি, উঠিতে অকমতা; মলদ্বার অববোধ  
পুনঃ পুনঃ বুথা বেগ, মাথা ভার ও বোরা, প্রস্রাব বন্ধ ।

নাইট্র-আ—প্রতি শোচের পর বলি বাহির হওয়া ও তাহা হইতে রক্ত  
পড়া এবং সেই বলি ফুলা ও তাহাতে জ্বালা। মলাশয়ের কনকনানি, বিশেষ  
পাতলা বাহ্যের পর এবং অনেককণ পর্য্যন্ত থাকা। পুরাতন রোগে বলি  
হইতে অধিক রসনির্গমন হইয়া যেবার ফালা (স)।

পড়—কখন কাণা, কখন ডা'রক্ত পু'রুদর্শ : নব্বদা মাজা ব্যাণা, বাহে  
কালিন, বিশেষ পরে অধি:হুড হুড

পল্লব—কাণা অর্শ ১, ব্যাধি কষ্টকর চাপুনি। মলাশয়ে হ্রস্ব ফুটুনি ও  
চুলকুনি এবং মলদ্বার টক্ণই ব উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা; কোষ্ঠবন্ধতা  
ও প্রান্তে মুখের বদ ভ্রূর; সঙ্কায় যাতনার বৃদ্ধি। বলি হইতে রক্তপত্ন,  
তাহারত ব্যাধা ও জ্বালা; কোমর ব্যাধা, অর্শ বন্ধে বিবিধ যাতনা।

ফস্—বাহে কালিন বলি বেরন'ও জল শৌচের সময় তথায় হাত লাগায়  
জ্বালা। বসিতে বা শয়নে বলিতে ব্যাথা, উঠিবার মনয় তথায় ফুঁড়নি।

ফেরস—রক্তপঙ্ক্তি অর্শ, মলাশয়ে অধিক চাপুনি, হর্বলতা ; কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভেদ পত্ত পর হওয়া ।

বার্ব—অর্শ ও বাহের পর জালা ।

বেল—বুকেপড়া অর্শ ও স্পর্শে লাগা, পীঠ ভেঙ্গে পড়, কাজেই নড়িতে  
অশক্ত; হঠাৎ বাথা ধরা ও হঠাৎ ছাড়, বগ দণ্ দণ্ করা, নিদ্রালুতা কিম্ব  
নিদ্রা না হওয়া।

ভেরাট-ভি—অশ্বের সহিত মলাশয় ও মলদ্বা-প্ৰায়বিক বেদনা, উহার  
•বর্ণ কখন লাল, কখন গাঢ় নীল ; নিয়ত য

মর-আ—কাণা ও রক্তপড়। এক প্রকাভাবিক না হত জ্বালার টাটানি।

মাক—বলি হইবে যে পেট্রিক <sup>১</sup>/<sub>১০</sub> ইয়া, পিপাসা ও গলা।

রস—ব্যথায়ুক্ত কাণা অর্শ, প্রা. শী. . . . . হিহির হুইওয়া। পৃষ্ঠ-  
দেশের উপর হইতে নীচে . . . হইয়া, পুনরায় পীড়িত হয়ে চাপুনি। কোমরে  
থ্যাতলানি, ই দিতে অল্পরোধ করেন। . . . . . বা ভারি দ্রব্য ভোগার  
লক্ষণ : বিবে.

## উদরাময়—ভেদ।

স্বভাবতঃ শিশুরা সচরাচর প্রত্যহ ৪৫ বার বাহে গিয়া থাকে। উহা তরল, দ্বিষৎ টক গন্ধ বিশিষ্ট এবং হরিত্রা বর্ণের। বারে কেহ ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক, কেহ বা কিছু কম যায়। গন্ধ ও বর্ণের বিকৃতি, বারে অধিক ও ইহার সঙ্গে পেট বাথা, ফাঁপা, কখন কখন ঠোঁটমারা ও স্পর্শনে গরম বোধ, জিহ্বাতে ছাতা পড়া, পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ বিশিষ্ট হইলে রোগ বলিয়া গণ্য করা হয়। স্তন্যপায়ীদিগের মাতার স্তনদুগ্ধ অপুষ্টিকর থাকা বা তাঁহার মনের কষ্ট হওয়া, অথবা হিম লাগা, শিশুর অন্ত্রের উপদাহ, বা দস্ত উদ্গম প্রভৃতি কারণ বশতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। বয়োধিকদিগের অন্ত্র অন্ত্র হেতু বশতঃ এই রোগ হয়; সকলের পক্ষের ঔষধ এ স্থলে লেখা হইল।

মাতার দুগ্ধে পুষ্টিকর পদার্থের অসম্ভাবে রোগ হইলে কামো বা শ্মিলিসা।

মাতার (১) ভয়, (২) রাগ, (৩) শোক, (৪) অত্যন্ত আহ্লাদ বশতঃ হইলে, প্রথম নিমিত্ত ওপিয়ম, আকন; (২) নক্স, কামো; (৩) ইয়েসা, ফস্-আসিড (৪) কফি, পল্লস।

মাতাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন বার এবং সন্তানের অধিক কষ্ট হইলে উহাকেও উহার এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া বিধি। মাতাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্য দেওয়া পরামর্শ; ইহাতেও দুগ্ধ পুষ্টিকর না হইলে অগত্যা ওরূপ স্তন-দুগ্ধ পান করিতে না দেওয়া উচিত।

ঠাণ্ডী বশতঃ রোগে—পল্লস, ডক, মার্ক, কামো।

অন্ত্রের উপদাহ বশতঃ হইলে—মার্ক।

ভেদ, পেট কামড়ান ও মুখ লাল—কামো।

ভেদ, পেট কামড়ান ও মুখ ফেঁকাসে হইলে—বেলেডোনা।

ভেদ ও অতিরিক্ত পেট ফাঁপা হইলে—পল্লস বা নক্স।

গ্রীষ্মকালে ভেদ পক্ষে—ব্রাই।

ভেদ সহ-মলদ্বার টাটানি পক্ষে—মার্ক, সলফর, চাইনী আর্স।

ভেদ বশতঃ অত্যন্ত দুর্বল শু কুশা হওয়া পক্ষে—আর্স, কার্বো।

উদরাময় অবহেলা করিলে কখন কখন ইহা হইতে পুরাতন রোগ দাঁড়ায়,

কচিং বা ওলাউঠা, আমরক্ত, জ্বর প্রভৃতিও হইয়া থাকে। ইহাতে আহারের কটকেনা করা নিত্য আবশ্যিক। স্তম্ভপায়ীর ঢোকা দুধ নিষিদ্ধ, প্রস্থতীকে অল্প পরিমাণে সুপথ্য দিবা। প্রস্থতীর স্তনে অধিক দুধ থাকিলে, তাহার কিক্ষিং গালিয়া ফেলাও কখন কখন কর্তব্য। রোগের নূতন অবস্থায় বয়োধিকের জল সাগু ; পুরাতন হইলে পোরের অন্ন ; মাগুর, শিকী মংস্ত্র, বা গাঁদাল পাঠার ঝোল ; গুলবু, ঘোল দেওয়া যাইতে পারে।

বিশেষ বিশেষ পীড়া সম্বন্ধে।

অন্ত্রমতের চিকিৎসায় অধিক ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকিলে—উদরাময় পক্ষে—নয়।

অন্নরোগসহ উদরাময়—কামো, কার্বো, নয়, ব্রাই, সেপি।

আঘাত বা পতন জন্ত ভেদ—আর্গিকা।

ওলাউঠা হইবার ভয় জন্ত—কামো।

ঐ সারিয়া পরে ভেদ—সিকেল।

কুসি জন্ত ভেদ—স্পাইজি, সিনা ; নয়-ম।

কোষ্ঠবদ্ধের পর—আলুমিনা।

গর্ভাবস্থায় ভেদ—আণ্ট, কামো, পল্‌স, কস, সল্‌ফর, সেপি, হাইয়স।

গোবীজে টিকা দিবার পর উদরাময়—থুজা।

যক্ষ্মবদ্ধ নরপ উদরাময়—আকন, কামো, ভেরাট ভি, মার্ক।

চর্মরোগকালিন উদরাময়—আস, চিন, টার্ট, সিনা।

—অন্তর্হিত হওয়ার—ব্রাই।

জ্বর—ঔদরিক (Gastric) সহ উদরাময়—আর্গিকা।

—ক্ষয়জ্বর—আসারম।

—পিত্তরোগ (Typhoid) —ওপি, নয়-ম, মর-আ, ট্রাম, হাইয়স ; আস, বেল, ব্রাই, ভেরাট, রস, লাকাসি।

—সবিরাম জ্বরে শীতের পূর্বে ভেদ—কর্‌স,

রস ; আস—জলবৎ রক্ত মিশ্রিত ;

পল্‌স—জ্বরের বহু পূর্বে ও আমরক্ত।

—শীতে—আণ্ট আস, ইউপাট, ইলাট, পল্‌স, কস-আ, রস, সল্‌ফর স্পাইজি, হাইয়স।

—তাপে—আকন, আণ্ট, আস, ইপি, ইলাট, কক্ষি, কামো, পল্‌স, মার্ক, রস, লাকাসি, সল্‌ফর, সিলিসা।

—যক্ষ্ম কালিন—আকন (প্রাতে), সল্‌ফ (রাত্রে) ; কামো, কাঙ্কা, চিন, কস, মার্ক, রস।

—বিরামে—আইড, আণ্ট, কামো, পল্‌স (আম বাহে), কস, কস-আ, ফেরন, ভেবাট, রস, সিল।

দড়কা কালিন ভেদ—টাবাক।

দাঁত উঠা কালিন ভেদ—আকন, আস, কামো, কাঙ্কা, চিন ; আর্জেট না, আস, ইথুসা, ইপি, কলসিই, কাঙ্কা, ডঙ্কা, নয়, পড, বোরাজ, মার্ক, রিয়ম, সল্‌ফর, সিলিসা, সেপি।

পুঁতি (Malaria) জন্ত উদরাময়—আস, কার্বো, চিন, পল্‌স।

ফুস ফুস প্রবাহ কালিন—টার্ট

কোড়া—আরাম হইবার সময়—রস।



বসন্তরোগ কালিন—আর্স, চিন, টার্ট ।  
 বাতগ্রস্তের উদরাময়—কালী-বা ।  
 বুক ব্যথার পর—সাদুই ।  
 মুখ আসা কালিন—মার্ক ।  
 যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে—আর্স, কাক্স, চিন,  
 ফস, ফেরম, সিকুটা ।  
 রেচক ঔষধ ব্যবহার জন্ত—নক্স ।  
 রস রক্ত অধিক ক্ষয় জন্ত—চিন ; কার্বো,  
 ফস-আ ।  
 শিরঃপীড়ার পর—পড ।  
 সর্দি কালিন—সেপি ।  
 সর্দির পর—ক্যাফর, সাদুই ।  
 সাংক্রমিক ওলাউঠা কালিন ভেদ—  
 ক্যাফর ।  
 ফোটিক অন্তর্হিত বা বসে যাওয়ার—ব্রাই,  
 মেজের সল্ফর, হিপর ।  
 হাম কালিন ভেদ—পল্‌স ; ইপি, কামো ।  
 —মিলানের পর—ইপি, চিন, পল্‌স, মার্ক,  
 সল্ফর ; আর্স, ফস ।  
 অপর কোন মতের চিকিৎসায় বিশেষ  
 ঔষধ ব্যবহার জন্ত উদরাময় ।  
 অধিক আক্‌ম ব্যবহার জন্ত উদরাময়—  
 নক্স, বেল, মার্ক ।  
 —ঔষধ—নক্স ; কার্বো, পল্‌স, হিপর ।  
 —কুইনাইন—ফেরম, হিপর ।  
 —পারা—চিন, নাইট্রো-আ, হিপর ;  
 সল্ফর ।  
 —মার্সিনা—নক্স ।  
 —রেউচিনি ( রবার্ক )—কলসি, পল্‌স,  
 মার্ক ।  
 —রেচক ( জোলাপ )—নক্স ।

ধাতু বিশেষে উদরাময় ।  
 একহারি ব্যক্তির উদরাময় পক্ষে—ফস ।  
 গণমালা ধাতুর—কাক্স, মার্ক, সিলিসা ;  
 আর্স, চিন, ডক্স, বারাইটা, সল্ফর, সেপি ।  
 দুর্বলতা জন্ত—আসার, চিন, নক্স,  
 ফস-আ ।  
 বাতাক্ষিকের—আসার ।  
 মোটা মোটা শিশুর—কাক্স ।  
 বাহাদের ব্রহ্মরক্ত বিলম্বে বোড় লাগে—  
 কাক্স, মার্ক-স, সল্ফর, সিলিসা ।  
 —শীত শীত বাড়—ফস-আ ।  
 —অভাবতঃ অধিক শীত—আসারম ।  
 লম—শারীরিক জন্ত—ইক্ষ ।  
 —মানসিক—নক্স ।  
 —উভয়বিধ—কাক্স ; পল্‌স, সল্ফর ।  
 শীর্ণকায়দের—আইড, কামো, ফস ।  
 আহার-বিশেষে উদরাময় ।  
 কুপি খাওয়া জন্ত উদরাময়—পিট্রোল  
 ( বাদাকপি-ব্রাই ) ।  
 কাওয়া পানে—ইগ্রে, ইপি, কক্স, কাক্স,  
 কামো, চিন, হজা, নক্স, পল্‌স ।  
 কাকডা, গুঁড়ি, চিক্সিডমাচ জন্ত—কার্বো ।  
 কোন কিছু আহার করিলেই রোগ বৃদ্ধি—  
 কলসি, কার্বো, চিন, নক্স, ফেরম ।  
 খাদ্য না চিবাওয়া কৌত কৌত করিয়া  
 গেলাই জন্ত—ইপি, নক্স ।  
 চা পান জন্ত—চিন, জেলস, হাইমস ।  
 জলপানের পর—সেপি । অপরিষ্কার  
 জলপানে জিহ্বা অতিরিক্ত জলপানে—  
 গ্রাটিওলা ।  
 জলে চুনের ভাগ অধিক থাকিলে—  
 ক্যাফর । বরফজল পানে—আর্স, চিন, নক্স ।

টক দ্রব্য আহারে—আর্স, নক্স, পলস, লাকাসি, সল্ফর; আন্ট, আপিস, আংলো, কলসি, ফস, সেপি।

ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে—পলস; আন্ট, কলসি, লাইক।

তমাক ব্যবহারে—ইপি, কামো, পলস; ইয়ে, ককু, চিন, নক্স, হিপর। তমাক টানায়—ব্রোম।

তরদুহ, শসা খাওয়ায়—জিঙ্ক।

তৈল, ঘূহ, চকির, উলিস মৎস্ত প্রভৃতি আহারে—পলস; কাবো, থুজা; আন্ট, ইপি, চিন, সল্ফর।

দুধ পানে—কামো, কাবো, নক্স, ব্রাই, লাইক, সল্ফর; ফলস, কাবো, চিন। জ্বাল দেওয়া দুধ পানে—সেপি। ঠাণ্ডা দুধ—নক্স, পলস। নক্স, পলস, ব্রাই, মাক।

ফল আহারে—আর্স, চিন, পলস, ব্র লাকাসি; আকন, কলসি, নক্স। পিচ-কল-ভক্ষণে—সোনিম।

বরফ খাওয়ায়—আস, কাবো, নক্স, পলস।  
• মৎস্ত আহারে—কাবো, কালী বা। পচা মৎস্ত—কাবো, ফিয়ার্স, চিন, পলস।

মসলা দেওয়া খাদ্য আহারে—চিন, নক্স।

মাংস আহারে—চিন, সল্ফর; ফেরম, সেপি। গোমাংসে—কালী না। বাছুরের মাংসে—ইপি, নাইট্রম। টাটকা মাংসে—কাস্তিক। ধূম দেওয়া শুষ্ক মাংসে—কাফা। লবণাক্ত (লোণা) মাংসে—আস, কাবো। শূকরের মাংসে—পলস।

মিষ্ট ভোজনে—আর্জেট, ইয়ে, কামো। রহুনও পেঁয়াজ অধিক আহারে—থুজা। লবণ অধিক ব্যবহারে—আর্স, কাবো।

স্বৈতনার যুক্ত খাদ্য অধিক আহারে—নেট্রম স, মক্স।

শাক সজ্জি আহারে—আর্স।

নিকা ব্যবহারে—জল—আন্ট।

স্বরাপনে জল উদরাময়ে—লাইক। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে—আস, টাট, নক্স। বিয়র সরাপ পানে—কালী বা।

### অবস্থা বিশেষে ভেদ।

অধিক মানসিক শ্রম বা লেণা পড়া জন্ত উদরাময় পক্ষে—আলটিস, ইপি, ককু, নক্স, ফস-আ।

অধিক শব্দ শ্রবণ জন্ত উদরাময়ে—ককু, নক্স, নাইট্রী, ফা। হঠাৎ অধিক শব্দ জন্ত—বৌল, বোরাক্স।

অধিক স্নায়ুতাপ লাগান জন্ত—কাস্টস।

অন্ধকারে থাকার জন্ত—ষ্ট্রান

আগুনের উত্তাপ লাগান জন্ত উদরাময়—যথা আঁতুড়ে শিশুকে অধিক তাপ দেওয়া ও প্রসূর্তীকে এক প্রকার ভাজিয়া লওয়া; বহুশক্তিগের রক্ষন করা এবং কামার বা কল-চাকার অগ্নি সঙ্গে যুঝা দরুন উদরাময় পক্ষে—কাবো।

আহাতি সময়ের অনিয়ম জন্ত (যথা কখন সকালে, কখন দুপুরে, কখন বৈকালে) উদরাময় পক্ষে—ইপি, নক্স, মাক, হিপর।

আহার—বাল্য ভোগ বা হাজুরের পর ভেদ—আইরিস, আর্জেট না, থুজা, বোরাক্স। মধ্যাহ্ন ভোজ (ডিনরের) পর—আম স, আলমি, নক্স, নাইট্রী আ। রাত্রি ভোজ (সপর) পড়ে—আইরিস।

আহারের পর ভেদ—সামান্ত্রিক—আর্স,

আলোস, কলসি, কাষ্টিক, চিন, নেট্রম, পড,

ব্রাই, বোরাক্স, ভেরাট, লাকাসি।

একা থাকায় ভয় জন্তু উদরাময়ে—ষ্ট্রাম।

গরম (অধিক) হওয়া জন্তু—আকন,

পড; আট, আলোস, ব্রাই।

গরম থাড়া জন্তু—ফস।

গরম গৃহে বাস জন্তু—আপিস।

গাত্র আবরণ (অধিক) রাখা জন্তু—  
সিকেল।

ঘান বন্ধ জন্তু—আকন, কামো, চিন,  
ভেরাট, ভি, মার্ক।

ঘোড়া চড়া জন্তু—কক, নক্স ম, পিট্রোল।

চক্চকে পদার্থ দর্শন জন্তু—ষ্ট্রাম।

চিনি পাইবার পর—আর্জেন্ট না।

চুল ছাটা জন্তু—বেল

ঝড় তুফানে—পিট্রোল; বৃষ্টি বজ্রাঘাতে—  
নেট্রম, রড।

খুঁ খুঁ গেলা কালীন বাগে পাওয়ায়—কল্চি।

দাঁড়ান কালীন বাগে পাওয়ায়—আলোস।

চর্চলতার জন্তু উদরাময়ে—আর্স, আসারম,  
চিন, নুঙ্গ।

নিদ্রা কালীন ভেদ—আর্গিকা, পল্‌স, রস।

নিদ্রার পর—জিক্স, ব্রাই, বেল, লাকাসি।

নিম্ন হইতে উপরে উঠায়—আকন, ওপি,

আর্স।

প্রাচীরের উদরাময়ে—আর্ট, ফস, ব্রাই,  
সিকেল।

প্রস্রাব কালীন ভেদ—স্ক, ইলা।

বসিলে বাগে পাওয়ায়—ডাক্সাস্ত। (সোজা)  
বাগে পাওয়ায়—ব্রাই।

মলে দুর্গন্ধ।

গন্ধ কদম—ওপি, কল্চি, ফ্রিয়োস,  
বাপটিসা, মার্ক, লাকাসি, সল্‌ফর, সিকেল,  
সোরিন।

গন্ধ হীন—রস, হাইয়স।

—কাষ্টান—আসাফটিডা।

—টক—মাগিসা, কাঙ্কা, হিপার, রিয়ম,  
মার্ক, আর্গিকা, গ্রাফাইট, চিন, জোলাপ,  
সল্‌ফর, সেপি।

—টক ও পচা—কলসি।

—ভিষ পচার নায়—কামো, কাঙ্কা,  
সল্‌ফর।

—দুর্গন্ধ—আর্স, কলসি, কাঙ্কা, কাঙ্কা,  
নক্স, ফস আ, মার্ক, রিয়ম।

—পচা—আর্স, কলসি, কামো, কার্বো,  
চিন, নক্স, ব্রাই, মার্ক, সল্‌ফর  
সেপি।

—দুধ বা পনিরের স্তায়—ব্রাই, হিপার।

—মাংসের স্তায়—ফস।

—ভাবসা—কলসি।

—শবের • নায়—কার্বো, রস, ষ্ট্রাম,  
সিলিয়া; আস, পড, বিস্মথ।

সময়ান্তর্যয়ে ভেদ।

ভেদ—প্রাচে—আর্ট, আপিস, ইউপাট,  
কোপেবা, পড, ফস, ফেরম, ব্রাই, বোভিষ্টা।  
শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র—লাইক, সল্‌ফর।  
সকাল ১০টা ও রাতে—আলোস।  
দিবসে—আম ম, কক, কাষ্ট, কালী-না,  
গমি, নেট্রম, পিট্রোল, মাগিসা, কা,  
সিনা, সিল।

ভেদ বৈকালে—আর্স, আলোস, চিন,  
• তল্কা, বেল, বোরাক্স, লারো ।

—সৈঃ ৪ হইতে ৬টা—ভেদ—কর্ষো । ৪ টা  
হইতে ৮টা—লাইক । ৫ হইতে ৬টা—  
ডিজিট

—সন্ধ্যায়—আলো, ইপি কল্টি, কাস্ত,  
কাঙ্কা, কালী, কাস্টিক, জেল্জ, মর আ,  
মার্ক, মেডর, লাকাসি ।

রাত্রে—আসাকাটিডা, কাপ্স, কামো,  
এফাইট, চিন, পলস, ফেরম, ভেরাট,  
মাক, রস ।

—রাত্রি ১১টায়—কলসি । —১২টায় ড্রোস,

১২টার পর—আফেটু না, আর্স,  
অলোস, ফেরম, লাইক ।

—১টা হইতে ২টা—ফাইটোলাকা  
২টায়—সিকুটা : টবাক, ফস ।

—২টা হইতে ৩টা—আলোস, লাইক ।  
৩টায়—ফস, সিলিসা । ৬টায়—  
পিট্রোল, ফস ।

৬টায়—পিট্রোল, ফস ।

কেবল ব্যাং—মার্ক স ।

দিন বাত—কলসি, কালী, মার্ক, সল্ফর,  
সিলিসা ।

নিয়মিত এক সময়ে—খুজা ।

—বৎসরান্তে—কাল বাই ।

এক দিন অন্তর—আলুমি, চিন, নাই  
টু, আ, ফ্লোরিক আ । ও প্রত্যেক,  
পালায় এক ৯টা পেছন—  
ফ্লোরিক আ ।

উদরাময় বা ভেদ ।

বাতাস ( আর্জ ) লাগা জন্ত উদরাময়—

১৬। সন্ধার বাতাসে মার্ক ।

বাতাস ( আর্জ ) লাগা জন্ত গরম—

লাকাসি পড, ব্রাই ।

— ঠাণ্ডা—আকন, ডকা, সিলিসা ।

— দম্কা—আকন, কাপ্স, নয় ।

বাহিরের—আগার, আমস,

— শুক—আলুমি ।

স্ত্রীর ক্ষত কালীন উদরাময়—ওলিয়ম,  
কাঙ্কা, কাস্টিক, সিকেলি

—ঐ পরে—গ্রাকাইট ।

—পূর্বে—আলোস, হাইপারিকুম । ক্ষত  
কালীন ও পূর্বে—বোভিষ্টা ।

—শেষার্শেণি—রোমাইন ।

স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়—আন্ট, ডকা, নয়,  
পিট্রোল, ফস, লাইক, সল্ফ মপি  
হাইয়স ।

—আতুড়ে অবস্থায়—রিয়ম, সিকুটা, টাই  
য়স ; ডকা, পিট্রোল ।

—দীর্ঘকাল সম্ভ্রান্তকে স্তন দেওয়া জন্ত—  
ফ্রেটিন, কোটলিস, চিন, পলস ।

ব্যায়াম বা কার্যক্রম অত্যবে—অলে  
ট্রিস, নয়, ব্রাই ।

• বেড়ান কালীন ভেদ—আলুমি, আলোস ।

ভেজার পর—রস, আকন, রড ।

রাত্রি জাগরণ জন্ত উদরাময়—নবস,  
আলেট্রিস, আর্গিকা, ইপি, কক, কাবো,  
পলস, ভেরাট ।

শয়নে—ডায়োক, কুবব ; ওহির থাকায়—  
রস, রড ।

—চিত হইয়া—পড ।

—বাম পাখে—আর্গিকা, ফস ।

—স্নান করার উদরাময়ের বৃদ্ধি—আন্ট ।

মনের ভাবানুসারে উদরাময় ।

অপমান জন্ত ভেদ—ফস আ ।

আতঙ্ক জন্তু—কফি; কিছু দীর্ঘকালের  
ইইলে—আকন, আট, ইয়ে, ওপি, কামো,  
জেল্‌স, ভেরাট, ইইয়স ।

আহ্লাদ জন্তু—কফি: আকন, ওপি,  
পল্‌স ।

ইল্লিয় দোষ (কাম চরিতার্থ) জন্তু—  
ফস-আ ।

কলহ জন্তু—কলসি, কামো ।

কুসংবাদ প্রাপ্তি জন্তু—জেল্‌স ।

ভয় জন্তু—ওপি, ভেরাট; ইয়ে, কফি,  
নক্‌স, পল্‌স, প্রাটিনা ।

রাগ জন্তু—আকন, কামো ।

রাগ ও ভয় উভয় জন্তু—কলসি (ও বমন),  
কামো, নক্‌স, ব্রাই ।

বিরক্তি জন্তু—আলোস, কামো ।

শোক জন্তু—ইয়ে, কলসি, জেল্‌স, ফস ।

অসামাল বা অনিচ্ছাধীন বাহ্যে ।

অসামাল বা অনিচ্ছাধীন (বাহ্যে) ভেদ—

আর্গিকা, ওপি, চিন, রস, নিকেল ;

আর্স, ফস, ফস্‌আ, বেল, ব্রাই  
ভেরাট, মর-আ, সিনা, হাইয়স ।

—ভেদ—কর্ণাতে কর্ণাতে—ফস ।

—দুস্ত—আর্গিকা, পল্‌স, রস ।

—নড়া চড়ায়—আপিন ।

—প্রশব তাগ কলীন—মর-আ ।

—বায়ু নিঃসরণ কলীন—আলোস,  
ওলয়ঙার, ফস-আ ।

—রাঞ্জে—আর্গিকা ।

—হাঁচি কলীন—সিনা ।

অনাড়ে বাহ্যে—আস, ভেরাট নক্‌স,  
মাক-ন লাক, হাইয়স ।

বাহ্যের বর্ণ বা রং ।

বর্ণ—বাহ্যের আলকাত্তার—ইপি, নক্‌স,  
মাক, লাকাসি ।

—কাল—আকন, আস, ইপি, কাস্‌স,  
কাক্‌স, চিন, ফস, ভেরাট, মাক,  
লেপ্টাণ্ডা; ওপি, কাক্‌স, প্রথম, প্রোম,  
ষ্টাম ।

—কাল নীল—ইপিগো ।

—চকচকে—ফস ।

—জন্ডা—আগার, ইপি, কলসি, কাক্‌স,  
কোটন, চিন, ফস, বেল, মাক,  
আলোস, কামো, জিক, নেট্রিন, সেনা,  
হিপার ।

—জন্ডা ও কাল মিশ্রিত—আর্স ।

—জন্ডাটে-সজা—কলসি, প্রাটিনা, মল-  
ফর । জন্ডাটে শাদা—আরম, কলসি,  
নাইটী-আ, রস ।

—জলবৎ—আস, ভেরাট ।

—ধূসর—আর্গিকা, আস, কাক্‌স, ফস-আ,  
ভেরাট, মাক, রিয়ম । ধূসর সজা—  
কোটন ।

—পাটিল—আর্গিকা, কাক্‌স, ভেরাট, মাক,  
আলোস, চিন । পাটিল সজা—আস,  
ডকা ।

—পোড়ার নায়—প্রথম ও ভেড়ার নাদির  
নায় হইলে )

—ফেকাসে (পাছাস) —কামো, লাক্‌স,  
ফস, ফস্‌শু, বেল, রস, মল-ফর ।

—মেটে—কাক্‌স, রস, হিপার ।

—লাল—জোলাপ, লাল আম, মল-ফর ;  
লাল জন্ডা (মিশ্রিত) —রস, লাক্‌স ।

—সজা—আকন, আলোস, ইথুসা, ইপি,

ইলাট, ক্রোটন, চিন, ফস, মাথিসা কা,	- শাদা— আকন, আস', উপি, কাল্কা,
• মার্ক'স, সল্ফর, নেপি, হিপার । সজা	চিন, ভেরাট, হিপার । ঈষৎ শাদাটে—
বা শাদা—ক্রোটন, ডল্কা ।	আকন, কামো, চিন, পল্‌স ।
--সজা, ঈষৎ—আস', কামো, পল্‌স ।	—শাদা চক্‌ থড়ির নায়—কাল্কা, পড ।
--সজাটে জর্দা—টেরিবিশ্‌, ষ্টানম । সজা	ছুধের নায়—আধিকা, ডল্কা, নক্‌স,
আম—ক্রোটন ।	বেল, মার্ক, রিয়ম
--সজা জলপাইর নায়—ইলাট । গাঢ়	—শাদাটে জর্দা—তগ্নে ।
সজা—আস', ক্রোটন, মার্ক'ক ।	—সীসার রং—দ্রবম ।

অটিকা-উরেন্স—উদরাময়, অত্যন্ত গাত্র চুলকুনি ও জ্বালা করা এবং তথায় ফটকা ফটকা দাগ হওয়া । চর্মরোগগ্রস্তের ক্ষোটিক বন্ধ হইয়া ভেদ হওয়া ।

আইড—গণ্ডালা ধাতুগ্রস্তের পুরাতন উদরাময় বা বাতাজীর্ণ, প্রচুর ও ঘোলের মত শাদাটে ছর্গন্ধ ভেদ, প্রাতে বৃদ্ধি, আহারে ব্যথার সনতা, বাতের পর তুলধার জ্বালা ; অতিরিক্ত ও পুনঃ পুনঃ আহার শীঘ্র শীঘ্র হজম হয়, কিন্তু দিন দিন জীর্ণতা, শীর্ণতা, অত্যন্ত অস্থিরতা (আস') জন্ত সর্বদা স্থান পরিবর্তন ও নিদ্রার ব্যাঘাত (বিশেষ লক্ষণ), তিদু ভিঁদে জ্বর, কাশী । জলবৎ ভেদ বা শাদাটে আম নির্গমন । প্রীহার বৃদ্ধি ও কাঠিগ্র এবং তাহা স্পর্শ করিলে লাগা ; যকৃতের পীড়া থাকিলে ।

আইরিসিভ—গ্রীষ্মকালের ভেদ বমন । প্রথম দুই তিন দিন সামান্যতর ভেদ ও মরুৎ ক্রিয়া হইয়া পরে হঠাৎ বমি, হাত পা ও পেটে খাল লাগা, কিন্তু ছম্‌ড়ে বসায় স্থিতি বোধ ; অধিক মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ভেদ, অত্যন্ত পিপাসা, পিথন হওয়া, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, নাড়ীর ক্ষুণ্ণতা, শ্বাস-কষ্ট ও প্রশ্রাব বন্ধ হওয়া (এমত স্থলে দশ পনের মিনিট অন্তর দিব্য) অথবা নাভি-প্রদেশ কামড়াইয়া ও খুব সাড় করিয়া জন্ডা সজা বা অপরিষ্কার জলবৎ মল । অতিশয় ছললতা, দুগ্ধস্ত চর্মকানি ।

আকন—প্রাদাহিক উদরাময়, গা বমি বমি সহ ঘর্ম, বমন, শাকছেঁটানি ও গরম জলের স্থায় ভেদ, রসের ভেদ, শিশুর পৈত্তিকের ভেদ ও অদন্য পেট ব্যথা, জলবৎ শাদা হড়্‌হড়ে ও রক্ত-বিশিষ্ট বাহ্যে হওয়া, গরম অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয় পান, শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগানো যাম বন্ধ জন্ত পীড়া হওয়া । জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, কান্না ইত্যাদি উপদর্গ সম্মে থাকা ।

আগারিকস—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় ( কার্বো, লাইক ) ও পেয়াজের গন্ধের মরুক্রিয়া, জন্ম হড়্‌হড়ে বা জলবৎ ভেদ, বৃষ্টি হইলে পীড়ার বৃদ্ধি, ভেদ ক্রমিতে আরম্ভ হইলে জ্বালার বৃদ্ধি, গাত্রের চুলকণার দাগ সকল মিলাইতে থাকিলে ; গ্লীহা প্রদেশ ব্যাথা, উদরাময় ও মাথা ঘোরা, প্রথমে গাঁইট গাঁইট মল, পরে পনের মিনিট বাদে জলবৎ ভেদ, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড বেদনা ও গা বমি বমি । শিশুর বাসের বর্ণের হর্গন্ধ পৈত্তিকের ভেদ ।

আণ্ট-ক্রু—মাতার টক সুরাপান কিম্বা শিশুকে অধিক আহার বা স্নান করান জন্ম রোগ ; ক্রমিক আম বা জলবৎ ভেদ ও তৎসঙ্গে ছোট ছোট ডেলা ডেলা মূল থাকা । জ্বিভে ছধে-শাদা লেপ ( কখন কখন জন্ম ) গা বমি বমি, প্রচণ্ড অথচ তিক্ত শ্লেষ্মা বমন, আহার ও পানে ঐ বমনের বৃদ্ধি ( ইপিকা প্রয়োগে বমি বন্ধ না হইলে ইহা বিধি ) মুখ ও নোঁট শুষ্ক, কিন্তু প্রায় পিপাসা না থাকা । তাহার দিকে কেহ ভাকাইলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলে বিরক্তি প্রকাশ, স্নান করিতে বিরক্তি । বাহ্যে কালীন ও পূর্বে বেদনা, মলাশয় বাহির হওয়া ।

আণ্ট-টার্ট—কখন ভেদের, কখন বা বমনের আধিক্য, একের বৃদ্ধির কালে অপরের ন্যূনতা—পেট কামড়াইয়া ও ডাকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ জন্ম মল ও আম, ত্যাগে বাতনা, কিন্তু বেগ ও মলদ্বারে জ্বালা থাকা । বিশেষ গুরু আহার জন্ম ও মাথায় রক্ত সঞ্চার জন্ম উপসর্গে । মাথা ঘোরা, মাথা ভার, জড়তা ও নড়ায় বাতনা, অধিক তৃষ্ণা ও পুনঃ পুনঃ অল্প পান, প্রবল হিঁকা, গা বমি বমি, জলবৎ কখন কখন বা অজীর্ণ খাদ্য বমন, পরে নেতাইয়া পড়া, নাভির চতুর্পার্শ্বে শূল ব্যাথার স্থায় ব্যাথা । প্রচুর সজাটে ভেদ, অল্প প্রশ্রাব । বসন্ত, ফুস্‌ফুস প্রদাহ, গুটি বসার দরুণ উদরাময় ।

অনাথিরা-বাই—অত্যন্ত বলক্ষয়কারী ভেদ ।

আর্জেন্ট-না—অধিক মিষ্ট খাইবার পর, উপাদেয় ভোজের পর । কয়েক দিন ছুইটা রাত্তির পর হড়্‌হড়ে রক্ত-মিশ্রিত ভেদ । সবুজ হর্গন্ধ আম ভেদ ও তৎসঙ্গে বালি বা পাতর কুটির স্থায় থাকা । জলীয় পানের পর উহা হড়্‌হড় করিয়া নামিয়া বাহির হওয়া, গা বমি বমি ও শ্লেষ্মা বমন । বাহ্যে সহ হর্গন্ধ মরুক্রিয়া ও ঢেকুরউঠা । একুশ শীর্ণ, যেন চামড়ায়

হাড় ঢাকা, এমত সকলের ভেদ ও বমন। শিশু যাহা খায় তাহাই রূপান্তর না হইয়া নামা (ভেদ)।

আণিকা—হৃৎ হৃদে আম বা গাঁজলাটে ভেদ, দুর্গন্ধ মরুৎক্রিয়া, জ্বরে ঘুমন্ত অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব ত্যাগ। আঘাত বা পতন জন্ত রোগ, মুণের তিক্ত বা পচা তার। উদগারে পচা ডিম্বের গন্ধ। দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস। পুরাতন রোগ সহ কদর্যা গন্ধের মরুৎক্রিয়া।

আরেনিয়া—অত্যন্ত পেট ডাকা ও জলবৎ ভেদ হওয়া, অতৃপ্তিকর নিদ্রা এবং ঘুম ভাঙিলে অঙ্গ বিশেষ, যথা হাত পা খুব বড় হইয়াছে বোধ হওয়া। হাত পা অসাড়।

আরম—ঘন ঘন বা জলবৎ ভেদ, বিশেষ রাত্রিকালে, কিন্তু খোলসা না হওয়া, মলদ্বার আলা, বেগ, বিশেষতঃ যাহার ভিগেন্দ্র বা মলদ্বারের নিকট গাঁজু থাকে। যাহাদের গরমীর পীড়া ছিল ও যাহারা অধিক পান্না ব্যবহার করিয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের হাড়ে ঈত থাকে, তাহাদের নিজের, অথবা সন্তানের উদরাময় রোগে ইহা অধিক খাটে।

আর্স—বরফাদি পানে অথবা অঙ্গ অধিক পোড়া জন্ত রোগ। সবুজ বা পাটকেলে আম বা জন্দা জলবৎ অকষ্টকর, কখন কখন বা আলাজনক দুর্গন্ধ ভেদ, রাত্রি (বারটার পর) বা আহ্নার ও পানের পর বাহে ও বমন। অনেক সময় মল-ত্যাগের পূর্বে অস্থিরতা বা কান্না এবং পরে মুচ্ছাবৎ দুর্বলতা। অধিক বয়স্কের ঐ সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা, অনিদ্রা, বদন ফেকাসে, গাল ভৌবড়ান, চক্ষু-পার্শ্বে কালচে পড়া, বুড়ুটে চেহারা, মূত্ৰাভয় ও মনোকষ্ট থাকা, শরীর আইটাই করা।

অলোস—পুরাতন রোগ এবং মলদ্বার হাজা ও আলা। প্রাতে ভেদ, বিশেষ গরমিতে; অসামান্য প্রায়, যাইতে বিলম্ব হয় না। কাল বা জন্দা বর্ণের কদর্যা জলবৎ প্রচুর ভেদ ও ঐ সঙ্গে নাভি-প্রদেশে শূল, পেট গড় গড় করিয়া ডাকা, মলাশয় যেন জলপূর্ণ এবং বাহে কালে ও পরে মুচ্ছাবৎ দুর্বলতা। শাদা বা সজ্জা চট্টেটে জমাট আমের স্থায় মল।

আলুমিনা—গ্রীষ্মকালে সবুজ ভেদ; অল্প অল্প ভেদ ও অনেক সময় রক্ত-পাত জন্ত মলাশয় টাটানি। বাহে কালে বেগ দিলে মূত্র ত্যাগ না হওয়া।



আলুমেন—ভেদ ও তৎসঙ্গে কদর্যা ঘ্রাণের রক্ত ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া ; বাহ্যের পর মলাশয়ে অসহ্য যাতনা।

আনোকাটিডা—বাতাধিক্যের পীড়া, সজ্জা বা পাটকেলে জলবৎ তয়ানক কদর্যা গন্ধের ভেদ।

আস্কেনিয়স-টি—পেট-মধ্যস্থিত অগ্নি-স্রোত বহির্গত হইতেছে বোধ হওয়া। কাল বর্ণের ভেদ ও মধ্যে মধ্যে যেন ফোটা ফোটা চুর্কি থাকা ; পচা ডিগ্ধে গন্ধ, অতি কষ্টে মলত্যাগ ও যেন নাড়ী ভুঁড়ি সব বাহির হইবে বোধ হওয়া।

আপিস—সজ্জা, জর্দা, হড়্‌হড়ে আম বা হলুদে জলবৎ ভেদ। শরীর নাড়ায় ও প্রাতে অধিক, পেট টিপিলে ব্যথা, গাত্রে স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ। মলদ্বার ফাক বা হা করিয়া থাকা, অনিচ্ছাধীন বাহ্যে (আলোস, ফস) ; শিশুর ভেদ, প্রৈচও তিক্ত বমন এবং পান ও আহারে বৃদ্ধি, জিহ্বার শুষ্কতা, কিন্তু তৃষ্ণার অভাব (যথায় তৃষ্ণা থাকে তথায় হৃদয়ের উপসর্গের স্থায় অল্প অল্প ও পুনঃ পুনঃ পান) গা খসখসে, উত্তপ্ত, কখন কখন ইহার সঙ্গে পায়ের পাতা ও জননেন্দ্রিয়ার ফুল থাকা। রাত্রিকালে অনেক বার ঘুম ভাঙা ও কখন কখন চীৎকার করিয়া উঠা। প্রতি শৌচের পর মল-দ্বার যেন শক্তি-হীন হইয়াছে বোধ হওয়া। শোথ ও উদরগ্রাস্তের উদরাময়ে অধিক ব্যবহার্য। প্রাতে উপসর্গের বৃদ্ধি।

অফিস-ম্মা—প্রাতে ভেদ এবং মলদ্বারে বেগ ও জ্বালা। ক্রমশঃ পেটকামড়ানির বৃদ্ধি হইতে থাকা।

ইউপাঁট—পৈত্তিকের জলবৎ প্রচুর ভেদ এবং গা বমি বমি, অত্যন্ত পেট-ব্যথা, অল্প অল্প বাহ্যে ও কোঁত পাড়া ; বলক্ষয়।

ইউফেসিয়া—তেজে বমন ও জলবৎ ভেদ। শরীর ঠাণ্ডা ও উষ্ণত্ব, ঠাণ্ডা ঘাম ; উদ্বিগ্নতা, যেন মৃত্যু উপস্থিত ; হাত, পায়ে ও অঙ্গে আক্ষেপ, মূর্ছাবৎ দুর্বলতা, রোগের সন্মুখতা না হইলে বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকা।

ইথ্রে—শোক জন্ত বা পেট ডাকিয়া লাল কল্তানির স্থায় ভেদ। অকষ্টকর ভেদ, বিশেষ রাত্রে ও সশব্দ মরুৎ ক্রিয়া, বিশেষতঃ যে সকল শিশু সর্বদা চমকায়।

ইপি—দাঁড় উঠা কালে ঠাণ্ডী লাগা, কাঁচা ফল আহার এবং উত্তমরূপে

চর্ষণ না করিয়া কোঁৎকরে গেলী জন্ম রোগ। ভেদনহ চীৎকার ও ছট্‌কটানি, চক্ষু-পার্শ্ব কালশিরা ও হয় ত নাক দিয়া রক্ত পড়া, জিভে শাদা বা জুদা লেপ; মুখ দিয়া অধিক লাল ভাঙ্গা, নিয়ত গা বমি বমি; পিত্ত, টক বা কাল বর্ণের বমন এবং বমনের পরই প্রায় অতিশয় তৃষ্ণা, কড়ার নিম্নে কষ্টকর যাতনা, পেট ফোলা, ব্যথা ও কামড়ানি, নড়ায় উহার বৃদ্ধি। সজোরে সর্বজ বর্ণের হুড়্‌হুড় গাঁজলাটে জলবৎ ভেদ ত্যাগ; অধিক ও গুরু আহার জন্ম উদরাময়। আহার বা পানের পর ক্ষণেই তুলি ফেলা। কখন কেবল মাত্র বমন।

ইলাট—অল্প মধ্যে দশ পোনের মিনিট অন্তর অতিশয় কনকনানি বা হানার ছায়া যাতনা; সর্বজ বা শাদা আন, অথবা জলবৎ ভেদ ও বমন। শিশু বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ সঁসার বর্ণের ও গাঁজলাটে ভেদ জোরে নির্গমন। অধিক শ্রমের পর আর্দ্র পানে থাকা জন্ম পীড়া, ক্রুর রোগ। বায়ু জন্ম পেট ডাকা ও তলপেট অত্যন্ত বেদনা। সবিরাম জরে ভেদ বমি পক্ষে উত্তম ঔষধ। হৃদে জলবৎ কষ্টহীন ভেদ ও বমন।

ইথুসা—গ্রীষ্ম কালের পাতলা, জুদা বা সজ্জা ভেদ, বেগ ও অতিশয় কিছুনি। ভেদ ও তৎসহ অল্প খেঁটুনি। অনেক ভেদ বমির পর শিশুর ভোমা-মায়া হইয়া পড়া, ফেল ফেল দৃষ্টিতে চাতিয়া থাকা, চক্ষুর পুতলির বিস্তৃতি এবং চেতনা শূন্য হওয়া। ঘুমন্ত চমকানি, প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম, দড়কা, হাত মুঠা বাধা। ঠুঁত উঠা কান্টোন ও গ্রাফের রেগে; টাইফয়েড জরে দ্বিত কাল ও পৈত্তিকের ভেদ। জমাট ছব ভেদ ও বমন। তৃষ্ণা থাকা ও নেতাইয়া পড়া।

এসকুইলস-হি—পুরাতন উদরাময় ও পীঠ ব্যথা। অর্শের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ স্রীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালে (ঋতু বন্ধ হইবার বয়সে)।

ওপি—আতঙ্ক বা হঠাৎ ভয় জন্ম ভেদ ও কখন ঐ সঙ্গে দড়কা (কাল-বিলম্ব হইলে, ইহা ও আকন পর পর), অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দরুণ উদরাময়।

ওলিয়াগার—পেট ডাকা, বায়ু নিঃসরণ করিতে গিয়া মল দেখা দেওয়া।

পাতলা ও পূৰ্ণ দিনের খাদ্য জীর্ণ না হইয়া আদত পদার্থ ভেদ। বাতাজীর্ণ রোগে এবং আর্সে ফল না দর্শিলে। আহার করার সময় ভেদে ফেরম; আহারের পর ভেদে আর্সে চিন; আহারের ঘণ্টা কতক পরে বাতাজীর্ণের ভেদে ওলিয়াণ্ডার। বাতাজীর্ণ রোগে যাহার পূৰ্ণ দিনের খাদ্য জীর্ণ না হইয়া পর দিন আদত অবস্থায় নির্গত হয়, তাহার পক্ষে—আর্সে, চিন, ফেরম।

ককু—কেবল মাত্র দিবসে অকষ্টকর জর্দাটে ভেদ, খুব পেট ডাকা, ক্ষয়-জর, শীর্ণতা।

কর্ণস—চিন সদৃশ। গা বমি বমি, বমন, জলবৎ পৈত্তিকের ভেদ, অত্যন্ত পেট ব্যথা ও কাম্‌ড়ানি, বুকজালা; শীত ও তাপ, পরে ঘাম।

কফি—সংসারের ভাবনা চিন্তা জন্ত উদরাময়, যথা, বাটার গিল্লি বা কর্জীর।

কিলিনস্‌নিয়া-সি—শিশুর পেট ফাঁপা ও ডাকা, ব্যথা, খালী লাগা ও ভেদ।

কলসি—পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে ভেদ; পান ও আহারে বৃদ্ধি; ইহার ব্যথা বাহে কালীন, পূৰ্ণ ও পরে ধরে। বড় ভয়ানক চীৎকার করা, বাহে করায় ও ডম্‌ড়ে বসায় তাহার শমতা। প্রচণ্ড রাগ ও মনের অতিরিক্ত উত্তেজনার জন্ত ভেদ বমন ও পেট ব্যথা, কলসিষ্ট ব্যবহার দরুণ পেট ব্যথায় কফি দিবা মাত্র তাহার প্রতিকার হয়। পুরাতন পীড়া ও সকালে ভেদ।

কল্‌চিকম—অসাড়ে জলবৎ ভেদ এবং গা বমি বমি ও বমন।

কাষ্টস—প্রাতে খুব পেট ব্যথা ও পরে ভেদ, মলদ্বার ভার এবং তথায় যেন আলপিন ফোটানির ছায় যাতন, জ্বপিশু রোগ-গ্রস্তের উদরাময়।

কাস্ত—হৃৎ হৃড়ে ভেদ সহ কৌৎ পাড়া ও নলদ্বার জালা; রায়ে এবং আহার ও পানে সেই সকলের বৃদ্ধি। বাহের পব পীঠ বেদনা থাকা।

কামো—হঠাৎ ঠাণ্ডী লাগী, দাঁত উঠা কালীন এবং রাগ ও বিরক্তির জন্ত পীড়া। রাত্রিকালে বৃদ্ধি। প্রচুর জলবৎ সজাটে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ভেদ ও তাহাতে পচা ডিম্বের গন্ধ থাকা, গরম টক হৃৎ হৃড়ে বমন, পেট শক্ত হওয়া ও ফাঁপা। পেট ব্যথার দরুণ পা উপর দিকে তোলা ও থাকিয়া থাকিয়া উহার খেঁচুনি! চোখ মুখ তেড়া বাকা, জিভ লাল ও শুষ্ক ছাতা পড়া, তৃষ্ণা এবং মুখে

বা থাকা, অথবা অজীর্ণতা রোগে আহারের পরই যাতনা, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চক্ষু কান ও অঙ্গ চিড়িক মারা, পিত্ত মিশ্রিত গরম ভেদ জন্ত মলদ্বার হাজা ও টাটান ; একপুংয়েম করা ও আবদার লওয়া, কোলে লওয়ায় স্থির হওয়া । শিশুদের পক্ষে এই ঔষধটা উৎকৃষ্ট । অর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর দিবা । টক ভেদ ও সর্ব শরীরে টক গন্ধ থাকা ।

কাম্ফর—হঠাৎ ভেদ ও শীত ; ঠাণ্ডী জন্ত অসামান্য বা অনিচ্ছাধীন ভেদ ও শরীর শীতল হওয়া, অথচ গাত্র দাহ জন্ত অঙ্গে বস্ত্র রাখিতে না দেওয়া । কালচে জলবৎ অকষ্টকর ভেদ ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া । উদরাময় ও তৎসহ শূলের ভায় বেদনা থাকা ।

কার্বো—অগ্নি বা সূর্যাতাপ অধিক লাগা বা গ্রীষ্ম কালের পীড়া অথবা বর্ষাক্ত ঠাণ্ডী লাগার জন্ত রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক । পাকশর জ্বালা, চৌষাচেকুর উঠা, পেট ফাটিয়া পড়িবেক এইরূপ বোধ হওয়া, লঘু আহারেও অতিরিক্ত অমুখ হওয়া এবং কখন কখন পচা গন্ধের মরুৎক্রিয়া ত্যাগ এবং কখনও বা অনিচ্ছাধীন ভেদ হওয়া । অধিক কুইন্যুইন ব্যবহারের পর উদরাময় হইলে ইহা ও পলস পর পর প্রয়োগ করিলে অধিক ফল লাভ হয় । অধিক ভেষজ ব্যবহার জন্ত পীড়ায় ইহা বিলক্ষণ খাটে । প্রাচীনের কষ্টকর উদরাময় । প্রচুর লালচে ভেদ ও ওলাউঠার অল্প অল্প উপসর্গ এবং পীড়ার চরম অবস্থায় ইহা উপকারক । বৈকালে পাঁচটা ছয়টার সময় রোগের বৃদ্ধি ।

কার্বোলিক-আ • পাতলা রক্তবিশিষ্ট ভেদ, তৎসহ বেগ ।

কালী-কা—পেট খুব সাড় করিয়া অকষ্টকর ভেদ হওয়া, মল ত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা করা ; পুরাতন রোগে ও যে রোগীর চক্ষুর উপরের পাতায় ঠোস দিয়া ফুলা, থাকে তাহার পক্ষে খাটে ।

কালী-বাই—অতিরিক্ত বিয়র বা এল্ সরাপ পান জন্ত পীড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ ।

কালী-ত্রোম—শিশুর ভেদ বমন ও অত্যন্ত বলক্ষয়, গা শীতল হইতে থাকিলে ও মাথায় জল সঞ্চার রোগের উপসর্গ থাকিলে ।

কাক্স-কা—গণ্ডমালা ও কফাংশধাতু গ্রস্তের পক্ষে, যে সকল শিশুর ব্রঙ্করক্স বিলম্বে যোড়। লাগে ও বিলম্বে দাঁত উঠে, যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে এবং নিদ্রা

কালে বাহাদের মাথা অধিক বামে। অজীর্ণের সজ্জাটে বা চা খড়ির স্থায় শাদাটে ভেদে, দাঁত উঠা কালে প্রচুর জলবৎ টুক ও পচা গন্ধের এবং পুরাতন রোগে কাদাটে ভেদে, নাকের আগা লাল হওয়া, পেট ডাগর হওয়া ও ঠোস মারা, কষ্টে কটু ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব ত্যাগ এবং বেড়াইবারকালে অনামালে প্রস্রাব হইয়া পড়া, যথোচিত পিত্তরসক্ষরণ অভাবে শিশুর ভেদ ও শেষ বেলায় অধিক ঘাম, ঝিমন, গৈড়ান, বৈকাল বা সন্ধ্যায় যোগ বৃদ্ধি, ৬ম সহ না হওয়া—খাইলেই পীড়া বাড়িয়া উঠা, ডিম্বা খাইতে বিশেষ লালসা থাকা।

কাক্সা-ফস্—ভেদ ও পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয়।

ক্রিয়োস—শাদা বা ধূসর বর্ণের দুর্গন্ধ বাহে, নিয়ত বমন ও সর্ষদা তৃক্ষা, হিক্কা বিশেষ লইয়া বেড়াইলে, গৌ গৌ করা, ঝিমন, বদন ঠাণ্ডা, কালচে ও শীর্ণ হওয়া, নাড়ীর দ্রুতগতি, কখন বা অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়ী।

কুপ্রম—ভেদসহ পাকাশয় ও বৃকে লাগা; গড় পড় শব্দ করিয়া জল গলাধঃকরণ হওয়া।

ক্রোটন—মাই থুওয়া অথবা আহার ও পানের পরই পেট ডাকা, ব্যথা ধরা ও ভেদ, দাঁত উঠা কালে অতিরিক্ত গা বমি বমি করা, বমন এবং সন্তা বা জর্দাতে বর্ণের ভেদ হওয়া, অতিশয় নেতিয়া পড়া; জলবৎ প্রচুর ও পিচকারীর তেজে বাহে হওয়া এবং মলদ্বার জ্বালা করা ও হাজিয়া যাওয়া, গরমিকালে উহার বৃদ্ধি, আম বাহে ও ত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা। গা বমি বমি এবং জল, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন।

গনি—নাভীর গোড়ার কামড়ান ও পুনঃ পুনঃ প্রচুর জলবৎ দম্কা জর্দা বা সবুজ বর্ণের ভেদ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, তলপেট স্পর্শে ব্যথা, আহার ও পানের পর গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া, ক্ষুধা, কিন্তু অন্ন আধারেই তৃপ্ত।

গ্রাটিওলা—সবুজ গাঁজলাটে ভেদ ও তেজে তাহার নির্গমন; অসাড় হওয়া, মুখে পেচ পেচ করিয়া থুথু উঠা, অথচ অতিরিক্ত তৃক্ষা থাকা; গা বমি বমি করা ও তিক্ত বমন হওয়া, পাকাশয় যেন ঠাণ্ডা জলে পূর্ণ বোধ হওয়া। অতিরিক্ত জলপান হেতু রোগ।

গ্রাকাইট—পুনঃ পুনঃ অন্ন স্রাবের টক গন্ধের ভেদ ও টক বমন, মল-দ্বারের বাহির হাজা, গায়ে রসপূর্ণ চুলকনা ও দুম্‌কুড়ি। অজীর্ণের অত্যন্ত

দুর্গন্ধ ও আম মিশ্রিত মল, ত্যাগের পর কিছুক্ষণের জন্ত নেতিয়ে পড়া, বিশেষ পুরাতন রোগে ।

গাথোজ—নাড়ীর গোড়ায় কনকনানি, অত্যন্ত বেগ ও হড়াৎ করিয়া মল বাহির হইয়া যাতনার সমতা ।

চিন—পেট ফাঁপা ও টগবগানি এবং জর্দা ও শাদাটে বা কালচে জলবৎ অর্জাৰ্ণ ভুক্ত দ্রব্যসহ দম্কা অকষ্টকর ভেদ এবং কখন কখন অসামান্য হইয়া পড়া, অতিশয় দুর্বল ও রাত্রে অধিক ঘাম হওয়া, কখন পেটের আক্ষেপ-যুক্ত ব্যথা জন্ত চুন্ডে বসিতে বাধ্য হওয়া, অধিক তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প অল্প পান, অধিক বায়ু নিঃসরণ ; একদিন অন্তর, বিশেষ রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, পুরাতন রোগ, ভেদ সহ কিমন ও নির্জীব হওয়া পক্ষে ইহা ও আর্স পর পর বিধি । ফল ভোগন জন্ত ভেদ, অন্তরে শীত বাহিরে তাপ, পেট ডাকা ও অবচারের বাহ্যে, শিবসে প্রায় হয় না, তবে কিছু উদরস্থ করিলে ভেদ হয় । সময়ে সময়ে দিন রাত্রি বাহ্যে হইলে ইহা উপকারী । শিশুর পক্ষে চিন ও বয়স্কের পক্ষে কার্বো অধিক খাটে । রোগ একদিন অন্তর এবং লাভে ও আহারের পর বৃদ্ধি, দীর্ঘকাল উদরাময়ের পর কিমুনি পক্ষে আর্স, চিন ।

জাট্রোকা—হড় হড় করিয়া দুর্গন্ধ ভেদ ; অতিরিক্ত তৃষ্ণা এবং পানমাত্রেই সমুদয়টা তুলিয়া ফেলা, পিত্ত, জল বা শ্বেতসার পদার্থ বমন ।

জেল্‌স্—ভয় ও উদ্বিগ্নতা জন্ত রোগ ; পরীক্ষা দেওয়া বা অন্ত্র করানর ভয় জন্ত ভেদ হইলে ইহা ব্যবহার করিলে উদরাময়ও সারে এবং ভয়ও যায় । সন্ধার সময় পেট ব্যথা হইয়া জর্দা প্রচুর জলবৎ ভেদ, মলদ্বারের মুখ বন্ধ বোধ হওয়া, একা ও স্থির থাকিবার ইচ্ছা, জিত জর্দা বা শাদা হওয়া ।

জোলাপা—শিশুর জলবৎ টক গন্ধের ভেদ, বয়স্কদের জলের স্থায় ভেদ এবং নাড়ীর স্পন্দন ও তাপ কমিয়া যাওয়া ।

ডকা—ঠাণ্ডা বাতাস, বা হিম লাগা বা আর্দ্র স্থানে বাস, অধিক গরম অবস্থা হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওন প্রভৃতি জন্ত পীড়ায় ; দাঁত উঠা কালে উদরাময়, অথবা স্ফোটক বা গুটা বসার দরুণ পীড়ায় ; গাত্রতাপ ও অতিরিক্ত তৃষ্ণা, রাত্রে ভেদসহ পেট ব্যথা, গাত্র তাপ, বলক্ষয় হওয়া । পুরাতন রোগে প্রচুর জলবৎ সজাটে ভেদ । রোগের প্রথম প্রথম ইহা অমোঘ ঔষধ ।

ডায়োঙ্ক—প্রাতে ভেদ, পেটকামড়ান ও ব্যথা এবং সেই বেদনা পেট হইতে অত্র বিস্তার হওয়া, হর্গন্ধ ও কাঙ্চে ভেদ ।

খুজা—প্রাতে আহারের পরেই ভেদ । শিশুর সামান্যতর ভেদ ও বমি, অধিক জলবৎ ভেদ ও সজোরে তাহার নির্গমন, অধিক তৃষ্ণা থাকা । পুরাতনরোগে জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, প্রাতে রোগের বৃদ্ধি । গোবাজে টীকা ( Vaccination ) দেওয়ার পর উদরাময়ে ।

নক্স—টোকা দুধ খেগোর উদরাময়ে । শিশুর পটকান অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন বাহ্যে । আম ও হর্গন্ধ পৈত্তিকের ভেদ, অধিক বেগ জন্ম কখন কখন গোঁগোল বাহির হওয়া, প্রাতে বা আহারান্তে বাহ্যে, পেট ফাঁপা ও ব্যথা, মুখে জল উঠা, গা, বমি বমি ও মাথা ব্যথা করা, অধিক বাহ্যের বেগ, কিন্তু মলত্যাগে স্বস্তি বোধ ; অধিক রাত্রিজাগরণ, শ্রম, নেব, পেটে অন্ন সঞ্চয়, অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য আহার, সদা সর্বদা জোলাপ ব্যবহার ইত্যাদি কারণে রোগ হইলে । কিছু দিন কোষ্ঠবদ্ধতা পরে কিছু দিন ভেদ এমত অবস্থায় উপকারী, অথবা জলবৎ সজ্ঞাতে জন্ম বণের ভেদ এবং তৎসহ পেট ব্যথা, বাহ্যের বেগ, জ্বিভে পুরু জন্মাটে শাদী লেপ, মুখে পচা ঘা, বড় চটা ও একগুঁয়ে স্বভাব, গায়ে হাত দিলে বিরক্তি প্রকাশ, সর্বদা খিটখিটে, অল্পে রাগ, এমত স্থলে ইহা ও মার্ক পর পর বিধি । সকালে রোগের বৃদ্ধি ।

নক্স-ম—দাঁত উঠা কালে উদরাময় ও সর্বদা ঘুমের ইচ্ছা, জিভ অতিশয় শুষ্ক ও মুখে লেগে থাকা, পাতলা জন্ম বণের ছেক্কা ছেক্কা ও কদর্যা গন্ধের ভেদ, মুচ্ছা ; পেটে শূলের জ্বায় ব্যথা, গরম জলের সৈঁকে সেই ব্যথার সমতা, কিন্তু আহার ও পানে বৃদ্ধি । কিছু খাইলে পেট অতিশয় ক্ষাত, রাত্রে ও ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুতে ব্যতনার বৃদ্ধি । বালিকার অকুচি, ভেদ ও অবসন্নতা ।

নাইট্রী-আ—অজীর্ণের ভেদ, সজ্ঞা আন ও অধিক বেগ ( মার্ক ), সকালে অধিক ভেদের সহিত পেটে তীব্র বেদনা ; অথবা অত্যন্ত হর্গন্ধ ভেদ এবং শিশুর ঐ সঙ্কে থানা থানা দুধ নির্গত হওয়া, বিশেষতঃ অধিক পারা ব্যবহার বা পূর্বে জনক জননীর গরমির পীড়া থাকিলে ।

নাক্সলিয়ম—পেট ডাকা ও ব্যথা, জলবৎ ভেদ, রোগী একগুঁয়ে ও চটা ।

নেট্রম-কা—অসামান্য প্রায়, জন্ম পাতলা মল, জোরে ও শব্দসহ তাহা

ত্যাগ, টক উদগার, কাট নেকার, মুখ আসা, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় হওয়া এবং আহারের পর ক্ষণেই পেটকামড়ান ও বাহে হওয়া ।

নেট্রম-ম—সজ্জাটে বা রক্ত-বিশিষ্ট বা জলবৎ ভেদ । শীর্ণতা, বিশেষ ঘাড় খুব সরু হওয়া, নিয়ত তৃষ্ণা, খাদ্য ও পিত্ত বমন, পেট মধ্যে টগুবগানি, দিবসে এই সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি ।

নেট্রম-স—(ডায়োক্স, পড, ব্রাই, সলফর) কাট নেকার, বমনের পর পাকাশয় সংকোচন জন্ত শিশুর চীৎকার ও জলবৎ ভেদ, তেজে নির্গমন । বাহের পর বেগ । পুরাতন উদরাময় ; উত্তিবার পর বা নড়া চড়ায় ভেদ, ও অধিক মরুৎত্যাগ ; অধিক টক বা বেতার ঢেকুর উঠা ।

পড—অকষ্টকর ভেদ ও বমন, বিশেষ গ্রীষ্মকালে ; পেট হড় হড় করিয়া নানাবর্ণের প্রকুর জলবৎ শব-গন্ধের মল তেজে নির্গত হইয়া তখন খোলসা বোধ হওয়া, কিছু কিছু পরে পূর্ণবৎ পেটের পূর্ণতা ; কখন কখন উরুদেশে, পায়ের ডিমে ও পাতায় খাল লাগা । প্রাতে এবং বৈকালে রোগের বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বৈকালে । মলদ্বার হাজা ও টাটান, শিশুর পুনঃ পুনঃ খড়্গ-গোলার শব্দ বাহে ও অত্যন্ত তৃষ্ণা বা উহার এককালে অভাব, গা বমি বমি ও কাট নেকার, যুমস্ত গৌ গৌ করা ও নাথা চালা । প্রভূষে বা আহার ও পানে বৃদ্ধি, দস্তোদগম কালে দাঁত কিড়মিড়, কান্না ও কষ্টকর ভেদ ; প্রাতে সজ্জা বা জলবৎ ভেদ, পরে আবার অনেকবার সহজ মলত্যাগ ; কাল জলবৎ ভেদ ও মুচ্ছা । পুরাতন পীড়া, ডানকোক ব্যথা হইয়া পৈত্তিকের ভেদ ও ফিন্কা দিয়া নির্গমন । শীতকালে রোগের বৃদ্ধি । গোগোলের উৎকৃষ্ট ঔষধ । আহার বা পানের পর ভেদ ।

পলিপোরস-আ—সাংক্রামিক এবং পুঁতি-উদ্ভাবিত উদরাময় ও আমরক্ত, বিশেষ পুরাতন সবিরাম জর বন্ধ হইয়া পেটের পীড়া হইলে (আর্স, চিন, জেল্ড) । পিত্তসহ আম ও কাল মলের নির্গমন এবং তৎপূর্বে ও ভেদের পর উপর পেট, যকুৎ ও নাতিপ্রদেশে জ্বালা ; অজীর্ণের ভেদ, কেবল মাত্র আম ত্যাগ ।

পল্‌স—ঠাণ্ডীলাগায় ; তৈল ও স্বতাক্ত দ্রব্য আহারে ; বরফ সংশ্লিষ্ট খাদ্য, ষ্ট্রাবরি ফল, তামাক এবং ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহারে এবং হামের পর ও অধিক



কুইনাইন, পারা, মাগিসা, ক্বার্ব' সেবন এবং আতঙ্কজ্ঞ উদরাময়ে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। প্রতি শৌচে মলের বর্ণ ভিন্ন, দুইবার এক রকমের হয় না, জর্দা, সবুজ, শাদা বর্ণের জলবৎ ও হড়হড়ে ভেদ; পেট ফাঁপা, কাম্‌ডান, ডাকা ও দুর্গন্ধ মক্‌ৎ ক্রিয়া; মুখের দুর্গন্ধ ও তিক্ত তার, জ্বিতে লাগাড়ে শ্লেষ্মা থাকা, গা বমি বমি, নিয়ত ছেপ, অক্ষুধা, শীত শীত পরে গা গরম, অতিশয় খেঁতখেঁত ও কাঁছনে এবং রাত্রি বারটার পর রোগ বৃদ্ধি। পেটে শূলের স্থায় নড়া বেদনা ও নড়িলে চড়িলে তাহার বৃদ্ধি এবং পিণ্ডের স্থায় সবুজ ভেদ, মাথা ঘোরা, বিশেষ বসিলে এবং মাথা নত করিলে। স্রীলোকের ঋতুকালে উদরাময়, বিশেষ রাত্রে। অতৃষ্ণা, টাটকা ঠাণ্ডা বাতাসে ভাল থাকা।

পালিনিয়া—গন্ধহীন সবুজ বর্ণের প্রচুর ভেদ।

পিট্টোল—জলবৎ জর্দা বা হড়হড়ে ও অধিক আম ভেদ, বিশেষ পুরাতন রোগে, পেটের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা বোধ হওয়া এবং মাংস ও চর্বিতে ঘেঁষ। কপি খাওয়া, গাড়ী চড়া, গর্তাবস্থায় পীড়া, প্রাতে ও ঝড় তুফানে বৃদ্ধি। শাক সজ্জি আহ্বাবে পেটে অধিক বায়ু সঞ্চার ও নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গা এবং পার্শ্বে আর একজন শয়ন করিয়া আছেন বোধে তাহার সঙ্গে কথা কহা, এমত স্থলে ব্যবহারে বিশেষ উপকার সম্ভব।

ফস্—প্রাতে অকষ্টকর সবুজ ভেদ—হয়ত শুদ্ধ আম ও সেই ভেদ দুর্দল-কারী; প্রচুর জলবৎ ভেদের পর মলাশয় ও মলদ্বারের প্রচণ্ড জ্বালা ও রোগীর নেতাইয়া পড়া। কাশিতে কাশিতে বা ভিদ্‌ভিদ্‌ করে অনিচ্ছাধীন ভেদ; অগামাল গরম ভেদ ও তেজে ত্যাগ; গরম খাদ্যে ও প্রাতে বাম পার্শ্বে শয়নকালে রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা খাদ্য ও কুন্নি আহ্বারে এবং নিদ্রায় সমতা; জলবৎ ভেদ, মধ্যে থোলো থোলো সাগুদানার স্থায় আম, অত্যন্ত পিপাসা এবং জল উদরস্থ করিলে ও তঁথায় গরম হইলে উহা উত্তীর্ণ পড়া। পুরাতন বিশেষতঃ হৃদরোগগ্রস্তের পীড়া, সে অবস্থায় পূর্কালে এক-মাত্রা নক্স দিলে বিশেষ ফল হয়। পাকাশয়ে খাল ঝাঙ্গা, তথা হইতে যকুতে বাওয়া, নল দিয়া জল পড়ার স্থায় হড়হড় করিয়া ভেদ, প্রস্রাব ক্রমশঃ অল্প ও ঘোলাটে হওয়া। অধিক (কাম প্রবৃত্তি) ইঞ্জিয়স্থ তৃপ্তির জ্ঞান এক-কালে নিস্তেজ হইয়া পড়া, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, কানমধ্যে শব্দ, চক্ষু বসা ও

তৎপার্শ্বে কালশিরা, ঠোঁট, মুখ ও গলা শুক হওয়া, ভয়ানক পিপাসা কিন্তু পান্নে বৃদ্ধি, জাবর কাটা, নিয়ত গা বমি বমি করা ও মুখে টক জল উঠা, প্রচুর জলবৎ ভেদ, মলাশয় দিয়া ক্রমাগত মল সরা, মলদ্বার হা ( কাক ) হইয়া থাকা, হাতের চোটেতে আলা ।

কম-আ—ওলাউঠার প্রাভূর্ভাব কালে পেট দমদমে কাঁপা ও অতিশয় ডাকিয়া জলবৎ ভেদ ; জর্জর ও কদর্যা গন্ধের ভেদ ; এবং শিশুর সর্ব বিষয়ে উদাস্ত হওয়া, কিছুই না চাওয়া বা না লওয়া ; অকষ্টকর অর্জাণের ভেদ, চক্ষুপার্শ্বে কালশিরা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা । শাদা জলবৎ অকষ্টকর ভেদের উৎকৃষ্ট ঔষধ ; দীর্ঘকালের উদরাময় কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দুর্বল না হওয়া । মরুৎত্যাগ করিতে অসামান্য ভেদ, পুঃ পুনঃ জলবৎ প্রস্রাব ; রাত্রে অধিক ঘনু হওয়া ; বিশেষ দুর্বল পক্ষে ।

ফুইটোলকা-ডি—পৈত্তিকের ভেদ ।

ফেরম—অর্জাণের প্রচুর জলবৎ অকষ্টকর ভেদ । পুনঃ পুনঃ ভেদ, মলদ্বার হাজা, মুখ ডগ্‌ডগে লাল হওয়া ; অর্জাণের হুড়্‌হুড়ে মল, বলক্ষয়কারী ও বড় ক্রুর পুরাতন রোগ, শিশুর আহার বা পানকালে বা পরে অকষ্টকর ভেদ ( চিন ), মলসহ অর্জীর্ণ খাদ্য ভেদ বা বমন, রাত্রে তৃষ্ণা, পেট টগবগানি ও তথায় বায়ু সঞ্চয়, পীঠ ও মলদ্বারে বেদনা, জীর্ণ শীর্ণ ও পেট ডাগর হওয়া, কখন অতিরিক্ত ক্ষুধা ও রুচি, কখন বা এককালে উভয়ের অভাব ।

বাণ্টিসা—জলবৎ বলক্ষয়কারী উদরাময়, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প কাল কদর্যা ও রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ হওয়া ; বাহ্যে প্রস্রাব ও ঘামে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকা ।

বার্ব—নরম বাহ্যে সহ মলদ্বার জালা, অর্ধ থাকা ।

বিস্মথ—ভেদ ও বমন হওয়া এবং নেতিয়ে পড়া, গাত্রতাপ, পাকাশয়ে ভয়ানক ব্যথা, শিশুর অস্ত্রের নিকট থাকার অনিচ্ছা—মাকে না ছাড়া ।

বেঞ্জোইক-আ—দাঁত উঠা কালে অতি কদর্যা ও প্রস্রাবের গন্ধের ভায়ে গন্ধবিশিষ্ট জলবৎ প্রচুর শাদা ভেদ এবং চড়া দুর্গন্ধ প্রস্রাব, জিভে শাদা লেপ বা ক্ষত থাকা, কষ্টকর কাশি ।

বেল—জলবৎ বাহ্যে ও জোরে তাহা ত্যাগ এবং তৎকালে ও পূর্বে শিশুর বদন লাল জিভ লেপযুক্ত ও কিনারা লাল হওয়া ; মলদ্বারে পেশীর পক্ষাঘাত

জন্ম অনিচ্ছাধীন মল-ত্যাগ, ঘন ঘন সবুজ বা শাদা জলবৎ বা রক্ত-বিশিষ্ট আম বা জন্ম বাহ্যে হওয়া, উদরাময় থাকা, হঠাৎ চেকুড়াইয়া উঠা, এবং ব্যাণার জন্ম বৃক্ চিতান ( দুম্ভান—কলসিষ্ট ) ; ভেদের পর পুনঃ পুনঃ বেগ, অথচ কিছুই ত্যাগ না হওয়া, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চক্ষু, লাফান।

বোরাক্স—পেটে অল্পের দরুণ শিশুর অজীর্ণের ও সবুজবর্ণের ভেদ ও অতিরিক্ত শূল বেদনা ; প্রত্যহ জন্মটে বা জলবৎ ৩০ অধিক আম মিশ্রিত চারি পাঁচ বার দান্ত হওয়া ও পাকায় অল্প থাকা ; পাতলা হুড়ু হুড়ে মল সহ অতিরিক্ত দুর্বলতা, পেটখিম্‌চুনি ও ভেদ ; ভেদের পর মূত্রত্যাগ, নিয়ত বমন ও অকষ্টকর ভেদ। জিহ্বা ও মুখে ঘা। বাহ্যে অধিক সন্তান সন্ততি হইয়াছে, তাহাদের ও প্রদর-রোগগ্রস্তের এবং কেবল বামপার্শ্বে শয়নে সক্ষম, এমত রোগীর পক্ষে বিশেষ ঋণ্য।

বোভিষ্টা—প্রাতে বা সন্ধ্যায় ভেদ, পেটকনকন্মানি ও তাহা বায়ুপূর্ণ হওয়া ; ঋতুকালে ও পূর্বে উদরাময়।

ব্রাই—উদরাময়ে তত অধিক ব্যবহার হয় না, তবে লক্ষণাভূষায়ী হইলে খুব ঋণ্য। বাহ্যের পূর্বে কাম্মা ও বসিলে মুচ্ছাবৎ অবস্থা ; গ্রীষ্মকালের ভেদ, বিশেষ আহার ও পানের পরই পেট ব্যথা ও দান্ত ; একটু মাত্র নড়াচড়ায় অপরিষ্কার জলবৎ ভেদ ; অজীর্ণ খাদ্যের গুঁড়া ভেদের তলানিতে থাকা এবং রাত্রি বা ভোরে শব্দ হইতে উঠিয়াই পেট কনকন করিয়া ভেদ হওয়া ; গরমে ঠাণ্ডা পান জন্ম ভেদ ; ঘুমন্ত ভেদ ; অকষ্টকর ভেদ ও মলদ্বার আলা ; ফল ভোজন ঠাণ্ডা পান ও রাগের পর অকষ্টকর ভেদ ; সকালে বা রাত্রি নয়টায় ও নড়ায় বৃদ্ধি।

ভেরাট—পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ ও অতিরিক্ত শ্লেষ্মা বমন এবং কপাল ও গাত্র ঠাণ্ডা ঘাম, বাহ্যের পর নেতিয়া পড়া ও নড়ায় বৃদ্ধি। বর্ষায় রোগ, তেজে মল নির্গমন, শূলের দ্বারা বেদনা ও হিকা ও দম আটকান ; ভয়ের পর ভেদ, শরীর ঠাণ্ডা ও দুর্বল হওয়া, অসাড় ভেদ ও মুচ্ছা, চেহারা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা। নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, কপালে ঘন ও অতিশয় দুর্বল হওয়া।

ভেরাট-ভি—অতিশয় বর, মস্তিষ্কের উপসর্গ, প্রলাপ ও তন্দ্রা থাকা এবং জলবৎ প্রচুর, কদাচিত্ বা রক্তবিশিষ্ট ভেদ।

মল-আ—জলবৎ ভেদ, অনিচ্ছাধীন মলমূত্র ত্যাগ ; প্রচুর সজ্জা হড়্‌হড়ে, কোঁচং রক্তবিশিষ্ট ভেদ ও তৎসঙ্গে ক্ষয়কারী জ্বর ; অধিক বেগ, মলদ্বার জ্বালা ও অসহ্য চুল্কনি, অর্শ ; মলদ্বার অতিরিক্ত টাটান, তাহা স্পর্শ বা কাপড় লাগায় বাতনার একশেষ হওয়া ; পুরাতন উদরাময় ।

মঙ্গস—পেটফুলা ও থিম্‌চুনি ; হিষ্টিরিয়া বায়ুগ্রস্তের পেট ঢোলপানা হওয়া, তৎসহ মূর্চ্ছা, পেট কাঁপা ও রাত্রে জলবৎ প্রচুর ভেদ ।

মাগ্নিশা-কা—সবুজ জলবৎ ভেদ, তাহাতে থানা থানা চর্কিরিয়ায় পদার্থ ভাসিয়া-থাকা অথবা টক হড়্‌হড়ে আম অনেকবার ত্যাগ ও বর্জদিন থাকা ; দাঁত উঠাকালে পীড়া, তৃষ্ণা, বমন ; পুরাতন রোগে পায়ের প্ৰতা হইতে ডিম্ব পর্য্যন্ত ফুলা ।

মার্কু—দাঁত উঠা, পেটে অন্ন হওয়া বা ঠাণ্ডীলাগার দরুণ শিশুর উদরাময় । পেটকামড়াইয়া জর্দা ভেদ ; নানা বর্ণের—সজ্জা, জর্দা, শাদাটে, জলবৎ হড়্‌হড়ে, কখন কখন বা রক্তবিশিষ্ট ভেদ ; বাহ্যিকালে ও পূর্বে অতিরিক্ত কৌত-পাড়া, ত্যাগের পরও অনেকক্ষণ বেগ দিতে থাকা এবং উহার আতিশয়াবশতঃ কখন কখন গোপ্পেল নির্গত হওয়া, মল দ্বার জ্বালা করা ; পাকাশয়ে ব্যথা, অধিক বেগ ও ভেদ ; সর্বদা ছেপ উঠা, রাত্রে অধিক ঘাম । তৃষ্ণা, কাটনৈ-কার, বমন, পেটব্যথা ও স্পর্শ লাগা ; জ্বরাদি শাস্তির পর পেট ডাকিয়া পৈত্ত-কের ভেদ হইয়া শরীর খোলসা বোধ হওয়া, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার পূর্ণ-বৎ বাতনা । আমরক্ত সারিয়া ওলাউঠার ভায়ে নিয়ত ভেদ বমির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক । মল হড়্‌হড়ে ও আমবিশিষ্ট না হইলে ইহাতে ফল দশে না । রাত্রে ও গরম আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধে উপকার ।

মাস্‌জেনম—পেটে অধিক পিত্ত সঞ্চয়, নাভিপ্রদেশ কনকনানি ও ফুলা এবং পিত্ত ও জলবৎ ভেদ । পিত্তজনিত পাথুরিতে দিলে উপকার সম্ভব ।

নেজেরম—শিশুর গা বমি বমি, বমন ও জলবৎ ভেদ এবং দিন দিন শীর্ণ হওয়া । সোরাধাতুগ্রস্তের পুরাতন উদরাময়ের ইহা উত্তম ঔষধ । মুখে অতিরিক্ত থুথু উঠা, পেট কনকন করা, থিম্‌চুনি, স্টেপেরা, পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প টক গাঁজলাটে ভেদ, অথবা পেটকাঁপা, আম ও জলবৎ বাহ্যে হওয়া ও শূল বেদনা থাকা । স্ফোটক বন্ধ বা গুটি বসার পর উদরাময়ে ।

রস—ভেজার দরুণ ভেদ ও গা হাত ব্যথা ; জলবৎ ফিকে লাল ও আম-  
বিশিষ্ট জন্মভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন ভেদ ও প্রতি শৌচের পর পায়ের  
পেছন দিক ছিঁড়িয়া পড়ার ছায় অল্পভব ; অতিশয় পেট ব্যথা ও দুই  
প্রহর রাত্রের পর সজ্ঞাতে ভেদের আদিক্য। টাইফয়েড জ্বরে ভেদ ও বমন  
হওয়া ও স্থির থাকিতে না পারা।

রিমম—দাঁত উঠা কালে, ঠাণ্ডী লাগা, অযথা আহার জ্ঞাত শিশুর ( এবং  
প্রসবের পর বামার) উদরাময়। পেট ফাঁপা, বাগা, কানড়ান এবং টক  
গন্ধের ভেদ, ত্যাগ কালে ও পরে কৌতপাড়া ও কাম্মা এবং কখন কখন বমন  
হওয়া। মৃদুস্ত গাত্রের টক গন্ধ থাকা এবং ধুইয়া ফেলিলেও উহা না  
যাওয়া এবং অঙ্গের দরুণ পেটের ব্যতনা, কাম্মা, চাঁৎকাব, গোঁ গোঁ  
কব্বা, অঙ্গের আক্ষেপ, চর্মকান, পুনঃ পুনঃ গাঁজলাটে জলবৎ স্ফুজ ভেদ  
ও কটু প্রশ্রাব। নাতার পোড়ামাটি, পাতখোল ও মাখিসা খাওয়ার  
দরুণ উদরাময় এবং উহার স্তনপান সন্তানের ভেদে ইহা উপকারী।  
বেড়ানয় বাহ্যে পাওয়া।

রনেন্দ্র—প্রাতে জলবৎ পাটল বর্ণের অকণ্টকর ভেদ এবং ঐ সঙ্গে কাশি  
ও গলা বড় ফড়ানি থাকা।

রোড—বাদলা, ঝড় তুফান বা ফল ভোজন জ্ঞাত ভেদ।

লাইকপ—পুরাতন উদরাময়, পেট হড় হড় করা ও পাতলা দুর্গন্ধ ভেদ  
হওয়া ; বিলক্ষণ ক্ষুধা, কিন্তু অল্লাহারেই পেট ভার ও ফাঁত হওয়া, কাপড়ের  
খুঁটি ঢিলী দিলে তাহার সনতা। বৈকালে ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে রোগের  
বৃদ্ধি। শিশু অতিশয় এক গুঁয়ে ও ৮টা, বিশেষ সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর।

লাকাসি—অধিক পারা, কুইনাইন বা সূরা ব্যবহার জ্ঞাত উদরাময়।  
জীর্ণ-শক্তি এত দুর্বল যে, অতি সামান্য লঘু খাদ্য ও পরিপাক না হওয়া, খাইলেই  
পেট ভার থাকা। টক দ্রব্য কোনমতে সহ্য না হওয়া। গ্রীষ্মের ভেদ, টক  
পানীয় বা কাঁচা ফল উদরস্থ করা অথবা বায়ুর আর্দ্রতা জ্ঞাত রোগ, কিম্বা কখন  
কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন ভেদ, এমনত অবস্থার ইহা প্রযুক্ত। নিদ্রাভঙ্গে শাদা বা আল-  
কাতরার ছায় ভেদ ; অথ চিকিৎসায় ভেদ হঠাৎ বন্ধ হইয়া সনস্ত পেটে, বিশেষ  
পেটের একটী নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শে ব্যথা, এক্রপ হইলে ইহা সেবনে পুনঃ পুনঃ

ভেদ হইয়া বাতনা দূর হয় । টাইফয়েড অরে ভেদের মধ্যে বিচালি-পোড়ার শুঁড়ার ছায় দেখা যায় । কখনও বা রক্ত ভেদ হয় ।

লাচলাহ—বায়ুজন্তু পাকায় হুড়মুড় করা, পেট ডাকা ও অধিক মরুৎ-ক্রিয়া হওয়া, অনেক বেগের পর খানিকটা আনাশয়িক ঝিল্লির ছায় বাহে ।

লারো—পাতলা সবুজ আম ভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন ভেদ, ও হুংরোগ ; কষ্টে কোন দ্রব্য গলধঃকরণ করা এবং জলীয় পদার্থ সশব্দে উদরে নানা, দন আটকান, জিত শাদা ও শুষ্ক হওয়া, তৃষ্ণা, একদৃষ্টি চাহনি বা চক্ষু মুদ্রিত থাকা ।

লিলিয়ম—বানার প্রাতে ভেদ সহ জরায়ু বাহির হওয়া । সদাই বাহের বেগ, কোকোরা পাইলেই ভেদ ।

লেপ্টাণ্ডা—আলকাতরার ছায় বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ও অম্ল, প্রায়ই বৈকালে বা সন্ধ্যায় তাগ । ভেজা বা আর্দ্র বাতাস লাগার জন্ত বকুতের পীড়া বা আনাশয়িক ঝিল্লির উপদাহ বা হীর্ষলতা বশতঃ রোগ ; প্রচুর জলবৎ শব্দে ভেদ হইয়া পরে পেট কনকনানি, বাহ্যকালে নুতিপ্তদেশে আনা ও বাথা এবং কখন কখন পিত্ত বমন । পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য । পীড়িতের দিন দিন দুর্বল ও ক্লেশ হওয়া ।

লুটিয়ানা—উদরাময়—রাত্রে বৃদ্ধি, ৩৪ টার কমা ; জলশোচ করিয়া উঠিতে না উঠিতে পুনরায় বাহে ।

লুটান—শিশুর বমন, কদর্য গন্ধের অর্দা ভেদ, বদন পাশাশ বর্ণ এবং রাত্রে ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গা ।

লুটিসিগ্রিয়া—জিত ও মাড়ি শাদা ও স্পঞ্জের ছায় নরম । বাহের পূর্ক ও পরে পেট কনকনানি এবং ত্যাগকালে মলাশয়ের অত্যন্ত বেগ এবং গরম ও পচা ডিম্বের ছায় দুর্গন্ধের মরুৎ ত্যাগ । আহার ও পানে পুনঃ পুনঃ ভেদ ।

লুফর—অনেক প্রকার উদরাময়ে ব্যবহার্য । স্ফোটক বন্ধ বা গুটী বসিয়া যাওয়া ও সামান্য ঠাণ্ডী জন্ত পীড়া । ধাতু বিকৃতি জন্ত অথ কোল ঔষধে ফল না হইলে, ইহা দ্বারা ধাতু সংশোধন সর্বপ্রথমে আবশ্যক । গওমালাধাতু-গ্রস্তের প্রথম পেট ব্যথার পর জলবৎ বা নানা বর্ণের টক বা দুর্গন্ধ ভেদ ; খুব প্রাতে অসামান্য প্রায় বাহের বেগ ও মল কটু জন্ত দ্বার হাজা । রাত্রিকালে

শূলবেদনা, বেগ, জলবৎ শাদা আময়ুক্ত অনিচ্ছাধীন ভেদ ; ব্রহ্মতালু গরম, রোগী দুর্বল কৃশ ও পেটডাগ্রা এবং তাহার সর্কাসে কুম্ভুড়ি ও চুলকুনি। তিন দিবস পরে চারি দিবস ঔষধ বন্ধ এবং ফল না দর্শিলে কাক্কা।

সলফ-আ—বিশেষ দাঁত উঠা কালে, অকষ্টকর হৃদে বা সজ্জা জলবৎ বা ফোণাবিশিষ্ট আম ভেদের সহিত শরীর কাঁপিতেছে বোধ হওয়া বা তৎসহ দুর্বলতা, মুখে ঘা ও অধিক থুথু উঠা, বড় চটা স্বভাব।

সাস্থুইনেরিয়া—জর্দা, জলবৎ ও অজীর্ণের মল ও অধিক তুর্গন্ধ মরৎ তাগ।

সাবিনা—পুনঃ পুনঃ অনেক বেগের পর প্রথমে পাতলা ও পরে কঠিন মল ত্যাগ। ভেদসহ পীঠ হইতে অধঃকুন্তল-প্রদেশ পর্যাস্ত ব্যথা বিস্তৃত হওয়া।

সিনা—বিশেষ দাঁত উঠা কালে ও ক্রমি রোগগ্রস্তের পীড়া পক্ষে। শাদা থস্‌থসে বা সজ্জাটে হড় হড়ে মল। আহার বা জল পানের পরক্ষণেই বাহ্যে। পেট ফুলা, নাভীর গোড়া থিম্‌চুনি, মলের সহিত ক্ষুদে বা বড় ক্রমি নির্গত হওয়া, শাদা ঘোলাটে চট্‌চটে আটার প্রস্রাব, সর্কাদা পাশকেরা, দাঁত কিড্‌মিডি ও চাঁৎকার-কক্সিয়া শিশুর জাগিয়া উঠা। জাগ্রতাবস্থায় একপ্তয়েম ও তরুণ্তাব এবং সর্কাদা না দোলাইলে ঘুম না আসা।

সিলিসা—অজীর্ণের কদর্যা গন্ধের অকষ্টকর ভেদ ; শিশুর আহার তুলিয়া ফেলা। এই সঙ্গে চর্ম রোগ থাকিলে ইহা অধিক খাটে। পেট স্ফীত হওয়া ও ব্যথা করা, খুব ঘাম ও দুর্বলতা, শিশুর বড় মাথা, মাই খাইতে না চাওয়া, খাইলেই তুলিয়া ফেলা। দাঁত উঠাকাশীন রোগে।

সিনানন—ভেদ, পান করায় উহার বৃদ্ধি।

সিকেল—অনিচ্ছাধীন ভেদ ; পচা গন্ধের জলবৎ প্রচুর, কখন ও বা বিশেষ কষ্টকর, ভেদ। ভেদ ও বমন, তৃষ্ণা, বদন ফেকাসে, চক্ষু বসা ও তৎপার্শ্বে কালশিরা পড়া, গাত্রে তাপ, অস্থিরতা এবং অনিদ্রা। প্রাচীরের অকষ্টকর বলক্ষয়কারী ভেদ ; এবং ঐতুড়ে বামার কদর্যা গন্ধের পাতলা মল। তেজে ভেদ, বমন, অতিশয় তৃষ্ণা, নেতান, গায়ে কাপড় দিতে না দেওয়া। একহারা ও লোলহক-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

সেনেগা—পেট কামড়াইয়া অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ, ঐ সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন এবং পাকশয়ে খাল লাগা ও জ্বালা থাকা।

সেপি—শিশুর পটকান । দুর্বলকারী ভেদ, দুগ্ধ পানে বৃদ্ধি ; মলদ্বার দিয়া রস চৌয়ান, পেট মধ্যে হানা বা ছুরি দ্বারা কাটার শ্রায়, অরে একরূপ হওয়া ।

সোরিণ—ধাতুবিকৃতি জন্ত পীড়া । পচা ডিম্বের গন্ধ-বিশিষ্ট উপদার ও ভেদ ।

হাইয়স—রাত্রে ঘুমন্ত অসাড় ভেদ । অকষ্টকর জন্ম জলবৎ ভেদ । স্নায়-বিক অরে পেট ফাঁপা, অনিচ্ছাধীন ভেদ ও বিবজ্ঞ থাকার ইচ্ছা ।

হিপস—শিশুর ও নবপ্রসূতার শাদা, জন্ম বা সজ্জাতে হুড়ুহুড়ে, কখনও বা রক্তমিশ্রিত ভেদ । টক ও দুর্গন্ধ ভেদ । পুরাতন রোগ ; আম ও পূণ্য বাহ্যে, গারে টক গন্ধ । অধিক পারা ব্যবহার জন্ত পীড়া ।

হেল—পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ । শুদ্ধ শাদা আম বাহ্যে ও বেগ, দীর্ঘ উঠাকালে ক্লান্ত বা মস্তকে জল সঞ্চার রূপ (Hydrocephalus) কুটিল ভয়াবহ রোগে অঘোর থাকা এবং দক্ষিণ বাহ ও বাম শব্দের খিঁচুনি এবং উদরাময় থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য ।

## বিসুচিকা—ওলাউঠা ।

আর্য্যাবর্ত্ত সকল মঙ্গলের আকর । ইহার আদিম নিবাসীরা সর্বপ্রথম কৃষি-কার্য্য, গৃহাদি নির্মাণ, গ্রাম নগরাদি স্থাপন, বাণিজ্য ব্যবসায়, ধন উপার্জন, বিদ্যালোচনা এবং সত্যধর্ম্মের অনুশীলন করতঃ ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল খণ্ডে উহারই বিস্তার করেন । ইহার সকল প্রকার সভ্যতার মূলস্বরূপ এবং সেইজন্য বিজ্ঞ বুদ্ধিমান সুপণ্ডিতের নিকট চির আদরণীয় । কিন্তু এক সনাতন সচ্চিদানন্দ ভিন্ন বিকারবিশিষ্ট কোন পদার্থকেই কেবল স্বধ-সম্পাদনকারী হইতে দেখা যায় না । চন্দ্রে ও কলঙ্ক এবং গোলাপ ফুলেও কাঁটা আছে । সমুদ্রমহনে লক্ষ্মীদেবী ও অনৃতের পর হলাহল উদ্ভবের শ্রায় ভারতমাতা পুরাধীনাবস্থায় ও প্রাচীন বয়সে ওলাউঠা উৎপন্ন করিয়া ভূমণ্ডলের যথেষ্ট অহিত সাধিয়াছেন । এখন সত্যযুগ নহে, দেবানুকূল্যের কোন আশাই নাই—কলিতে বৃদ্ধি নীলকণ্ঠ নিদ্রিত । এখন নিজ বুদ্ধি বিদ্যার বলে আপদ বিপদে উত্তীর্ণ হইতে হইবে । ধ্বংসঘরী বা হিপোক্রেটিসের বংশধরেরাই মাত্র আনাদিগকে এ সঙ্কট হইতে



উদ্ধার করিতে সক্ষম—তঁাহারাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু ব্যাধি অত্যন্ত ক্রুর, অল্পকালস্থায়ী, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল ও ভয়াবহ। মুতাকে যেন অগ্রসর করিয়া ও নিজে পশ্চাদ্বর্তী হইয়া ওলাউঠা দেখা দেয়। প্রায় এক যুগ অন্তর এই মহারোগ সাংক্রামিকরূপে পৃথিবী পর্যটন করে। তৎকালে পল্লীর অবস্থা মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প হয়। বৈদ্য মহাশয়েরা পারতপক্ষে ইহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। দীর্ঘ-পরাদীনতা জন্ম ইঁহার। হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় শাস্ত্রের উন্নতির নিমিত্ত ইঁহাদের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। শ্রীযুক্তি বা নূতন আবিষ্কার দূরে থাকুক, সাবেক পুঁজি বজায় রাখিতে পুরিলেই আপনাদগকে কৃতকতার্থ ভাবেন। বৈদ্যবংশের অধিকাংশই পেটের দায়ে কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া রেলওয়ের কেরানীগিরি প্রায় একচেটে করিয়া লইয়াছেন! ১০।৫ জন মাত্র বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় সহর অঞ্চলে দেখা যায়—পাড়াগাঁয়ে স্থানে স্থানে বা ২।১ জন আছেন, তঁাহারা নামে গয়লা। তঁাহারা মূৰ্খ, কেবল দুই চারিটা শব্দ ওষধমাত্র ব্যবহার দ্বারা কষ্টে দিনপাত করেন। সাহেবেরা অ'জ্ ক'ল্ সর্পজয়ী। পৃথিবীর সকল খণ্ডেই ইঁহাদের আধিপত্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক চর্চা দ্বারা ইঁহারা দেবতাতুল্য শক্তিশালী হইয়া যেন ইঁহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, এমনি রব ও সংস্কার চলিতেছে। কিন্তু বস্তুকর্তৃক চিকিৎসা বিন্যাস ইঁহারা আজও অনভিজ্ঞ। কল্পনারূপ বাগ্ম্য রাশির ভিত্তির উপর স্থাপন পূর্বক তদুপরি শাস্ত্ররূপ অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্ত উহার স্বৈর্য্য দার্তা স্তম্ভকর ও অসম্ভব। এই ওলাউঠা রোগই ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ৫০ বৎসরের অধিক হইল মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এদেশে ভার্ভার চিকিৎসার সূত্রপাত। এ কাল নগ্ন ওলাউঠার কত রকম চিকিৎসা প্রণালী দেখা গেল—কখন আফিম, কখন গাঁঙ্গা, সিন্ধি, লবন-জল, হি, লক্ষা, ক্যান্থোমেল, টার্ট্রিনিটিক, কুইনাইন প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধের প্রয়োগ হইয়াছে। এক একটার দুই চারি বৎসর আদর পক্ষে, পরে আর তাহার নামও শুনা যায় না। একুপ চিকিৎসার উপকার কি অল্পপকার হয় বলা যায় না—অথবা বলা ভাল দেখায় না! কিন্তু কখন কখন আনাদিগের

সামান্য বিষয়-বুদ্ধিতে একরূপ চিকিৎসা বিলক্ষণ হানিজনক বোধ হয়। কয়েক বৎসর হইল পশ্চিম অঞ্চলে এক গোরা-সৈন্যদলে এই মহামারী রোগ হওয়াতে তৎকালকার প্রধান চিকিৎসক নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে পীড়িতদের কষ্ট খুলিতে লাগিলেন। একজন মরিল—বলিলেন যথেষ্ট রক্ত লওয়া হয় নাই। আর এক রোগীর বেলা অধিক শোণিত-মোক্ষণ করা হইল—সেও গেল! এইরূপে ক্রমশঃ ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জন কাল বা ডাক্তারি চিকিৎসাগ্রাসে পতিত হয়। বিনা চিকিৎসায় শুদ্ধ ফেলিয়া রাখিলে কি ইহা অপেক্ষা মন্দ ফল ফলিত? ৩৪ বার এই মহামারী পৃথিবী ব্যাপিয়া যখন পরিভ্রমণ করিয়াছে, তখন এলোপ্যাথিক বা বীর-চিকিৎসায় ইহাতে অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক মারা গিয়াছে। তবে কি আনাদিগের ঐ ব্যাধির হাত হইতে এড়াইবার বা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই নাই? ভগবানের সৃষ্টির নাশ হওয়া অসম্ভব। অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলের উদ্ভব—বিপদ হইতেই সম্পদ।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে হানিমান তাঁহার হোনিওপ্যাথি বা সদৃশ-চিকিৎসাপ্রণালী প্রথম প্রকাশ করেন। • দ্রব্য বিশেষে রোগ বিশেষ আরোগ্য করে, ইহা জন-সাধারণের বিশ্বাস। বাহাতে জ্বর নায়ে, সে সকল দ্রব্য জ্বরর; বাহাতে পিত্ত দমন করে, তাহা পিত্তর। ইহাতে যদিও বিশেষ কিছু জানা যায় না—কেবল ইতর ভাষার পরিবর্তে সাধু ভাষার ব্যবহার মাত্র, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ বলিতে সকলই অক্ষম। সত্যপ্রিয় ও মানবহিতাকাঙ্ক্ষী হানিমান বহুল ঔষধ নিজের শরীরে ও আত্মীয়গণ মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, যে দ্রব্যে যে রোগ নায়ে, স্বস্থ দেহে সেই ঔষধ ব্যবহার করিলে সেই ব্যাধির উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়। এত দিনের পর ঔষধ ও রোগের পরস্পর সম্বন্ধ অবধারণ করিলেন। এই গভীর ও অটল ভিত্তির উপর তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্র স্থাপিত। বাহা হউক এক্ষণে ওলাউঠা সম্বন্ধে ইহার কার্য দেখা যাউক। •

বিখ্যাত পারিস নগরে ওলাউঠা দেখা দিল। দিন দিন হাসপাতাল রোগীতে পূর্ণ হইতেছে; ডাক্তারেরা একরূপ অল্পকালস্থায়ী ও সাংঘাতিক রোগ কখন দেখেন নাই। রোগের কি মূল ধরিয়া চিকিৎসা করা উচিত স্থির

করিতে না পারিয়া, সকলেই নিজ নিজ কলনানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । সাধারণে প্রায় কোন রোগীকে সুস্থকায় ফিরিতে দেখেন না । বুঝিলেন যে, নেড়ার মাথা ক্ষত বিক্ষত করিয়া নাপিতের ক্ষৌরকার্য্য শিখার ন্যায়, ডাক্তারেরা গরিবের উপর পরীক্ষা করিয়া ( সহস্রমারী ) চিকিৎসক উপাধি-লাভে উদ্যত । এইরূপে কাকের পশ্চাৎ ফিঙ্গালাগার ন্যায় ডাক্তারবেশধারীরা ডেলা বা পাটকেল ছুড়িয়া রোগীদের দেখ মার করিতে লাগিল । পরোপকার-ব্রতী এবং জন সমাজের হিতার্থীদের কি লাঞ্ছনা, কি দুর্গতি ! এ দিকে জার্মেনি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কেইথেন নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতির নিকট মহামর্তি হানিমান তৎকালে বাস করিতেছিলেন । তিনি একটাও রোগী না দেখিয়া, কেবল মাত্র সংবাদপত্রে রোগের পরিচয় পাইয়া, এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির যে ব্যবস্থা-পত্র ( Prescription ) প্রকাশ করেন, আজিও তাহা হোমিওপ্যাথদের গ্রহণ ও আদরের যোগ্য ।

এই চিকিৎসায় মৃত্যু সংখ্যা আলোপাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অর্ধেকেরও কম । এই ওলাউঠার জন্মই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে এদেশে ইহার এত প্রচলন । ভেদ বমি হইলেই ডাক্তার না ডাকিয়া অনেকে হোমিওপ্যাথের ঔষধ সেবন করে । হানিমান ও তৎসঙ্গে আনাদিগের দেশে হোমিওপ্যাথি প্রচারক রাজেন্দ্র দত্তের গুণ গান করা ভারতবাসীর কর্তব্য ।

অন্য রোগ সম্বন্ধে বাহার যে মত হউক, ওলাউঠা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব অপর সাধারণ সকলেই স্বীকার করেন । একে দেশের লোক অধিকাংশই হুস্থ, আবার ডাক্তার বৈদ্য অনেক স্থলে পাওয়া যায় না ; এতদ্বিন্ন রোগের ভাবও ক্ষণেক্ষণে পরিবর্তনশীল ; ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ বদলান আবশ্যক, সুতরাং চিকিৎসক নিকটে থাকা ভিন্ন আরোগ্যের আশা অতি কম । এমত স্থলে বিষয়ী লোক ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে গরিবদের উপায় কি ? প্রতি গণ্ড গ্রামে সুবোধ, বিজ্ঞ, স্বাধীন, লেখাপড়া-জানা, পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ২।৪ জন লোক মহামারী উপস্থিত হইলে ২।৪ খানি পুস্তক ও ২০।২৫টা ঔষধ লইয়া পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করিতে থাকুন । রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বুঝিলে ও অচিকিৎসক পাইলে আবশ্যকমতে তাঁহার সাহায্য লইতে পারেন । সুপণ্ডিত চিকিৎসক নিঃসন্দেহে আহ্লাদ পূর্ব্বক

আলু কুলা করিবেন। ইহাতে যে কত হিত হইবে তাহা বলিয়া উঠা ভার। যদিও ঔষধ সম্বন্ধে এলোপ্যাথেরা উন্নতি লাভ করেন নাই, কিন্তু চিকিৎসার আনুষঙ্গিক ও সহকারী বিদ্যার বথেই শ্রীবৃদ্ধি সাধিয়াছেন। স্বাস্থ্যের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়ার মনুষ্যের পরমায়ু পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক বাড়িয়াছে। সভ্য দেশে মনুষ্য গড়পড়তার ইতিপূর্বে যদি ২৪ বৎসর বাঁচিত, এক্ষণে ৩৪ বৎসরের অধিক বাঁচে। এলোপ্যাথেরা ওলাউঠার ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রোগ মহামারী রূপে পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তারিত হইতে দেন না। রোগ প্রকাশ হইবার উপক্রমেই বিশেষ সাবধান হওয়ার অনেকটা হিতসাধনে সক্ষম হইয়াছেন। আমরাও সেই পথ অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য না হইব কেন? সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করা তত কঠিন নয়, অধিক ব্যয়সাধ্যও নহে—একটু বুঝা চাই, কতকটা বিশ্বাস চাই এবং সাধারণের মধ্যে পরস্পর ঐক্যটিও নিতান্ত আবশ্যক। রোগকে ডাক্তার বৈদ্যে অসাধ্য এবং মনুষ্যের চেষ্টার অতীত ভাবিয়া হতাশ হওয়া অনুচিত। আত্মা ও জাগতিক পদার্থের সম্বন্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই অসামান্যের অধিকাংশ কষ্টের মূল কারণ। বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা অধিক আলোচনা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম যতই অধিক আবিষ্কৃত হইবে, ততই অসামান্যের দুঃখের লাঘব হইবে। স্বভাবের নিয়ম না জানা এবং বুঝিয়াও উহা ভঙ্গ করার ফল—রোগের বস্ত্রণা ও অকাল-মৃত্যু। ইহা যথার্থ বটে যে, উহাদিগের হাত আমরা কখনই এড়াইতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রের উন্নতি হইলে মহামারীরূপ সাংক্রামিক বাধি অথবা এককালে বহু জনের প্রাণনাশ নিশ্চয়ই সংসার হইতে দূর হইবেক।

স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল সময় সকলেরই প্রতিপালন করা বিহিত; বিশেষ মহামারী বা সাংক্রামিক পীড়া পল্লীর নিকটস্থ হইলে, বিশেষ বয়স ও সাবধানতার সহিত সেই নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করিলে অনেক স্থলে উত্তম ফল লব্ধ হয়। এই সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

পরিষ্কার ও কদম্ব গন্ধশ্রুত গৃহে বাস, স্বাস্থ্য গাত্র মাজনা ও প্রত্যহ বস্ত্র কাটা নিতান্ত আবশ্যক। শুদ্ধ আশ্রয় নয়, পরিজন ও প্রতিবেশীর সকলেই

যাহাতে ঐরূপ নিয়মে চলে, তদ্বিবশয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিরোধ ও এক-  
 গুণে লোকেরা বলিতে পারে আমার দেহ ও আমার বাট আমি ক্রোধ পূর্ণ  
 রাখিব, অস্ত্রের তাতে কি? এ কথা কোনমতে খাটে না। তুমি সমাজভুক্ত  
 থাকিয়া হিংস্র বস্তুজন্তুর আয় যথেষ্টাচারী হইতে পার না। সমাজ তোমাকে  
 অনেক কষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছে, সেই খাতিরে সাধারণের হিতার্থে কি  
 কিশিৎ পরিমাণে নিজের স্বাধীনতার খর্ব্ব করা মুক্তি, আয় ও ধর্ম্মসম্বত  
 নয়? ইচ্ছা পূর্ব্বক না কর, রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি বলপূর্ব্বক তোমাকে  
 তাহা করিতে বাধ্য করিবেন। আমরা অতি পবিত্র জাতি বলিয়া অভিমান  
 করি এবং নাহেবদিগকে ইহার বিপরীত বলিয়া ভাবি। কিন্তু সর্ব্বত্রই  
 ইংরাজ ও বাঙ্গালী তোলার অবস্থা দেখিলেই আমাদের সেই সংস্কার  
 যে ভ্রম-পূর্ণ, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবেক। ইডেন গার্ডেন দেখিলেই চক্ষু  
 কর্ণের তৃপ্তি এবং মনের শান্তি লাভ করা যায়। অমরাবতীর উদ্যান যে  
 ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বড় বলা যায় নহে। অপরী কিন্নরীর পরিবর্তে গড়ের  
 বাজনা ও বিবিদিগের সমাগম, বাড়ার ভাগ ইলেক্ট্রিক আলোক। যদি বল  
 সাহেবদের আয় অনেক। 'সে কথা সত্য বটে, কিন্তু পরিষ্কার থাকার পক্ষে  
 অর্থের তত প্রয়োজন নাই। অনবধানতা, উদাস্ত, স্বাস্থ্যের নিয়মে অজ্ঞতা,  
 বিশেষতঃ পরস্পর অনৈক্য আনাদিগের কষ্ট ও ছুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র-  
 নির্দিষ্ট যথা-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অগ্রাহ্য করিব, আবার বিজ্ঞান  
 অনুযায়ী নিয়ম সকলও প্রতিপালন করিব না, সুতরাং আনাদিগের দুর্গতির  
 একশেষ হইবে না তো, আর কাহাদের হইবে? এখনও যদি না বুঝি তাহা  
 হইলে নিতান্তই নিরুপায়।

জলকে জীবন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেন। জলের দোষে স্থান-  
 বিশেষের লোকদের গলগণ্ড, গোদ ও বিবিধ চর্ম্মরোগ হয়, ইহা অনেকেই  
 জানেন। বিশুদ্ধ বারিপান, স্বাস্থ্য পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কলিকাতার  
 অবস্থা দেখ। ২৫১০ বৎসর পূর্ব্ব ইহা লোনা ও জবন্য বলিয়া সকলে ঘৃণা  
 করিত, এক্ষণে ময়লা-শূন্য ও বিশুদ্ধ জলের নিমিত্ত বস্ত্রের (Sanitarium)  
 বা স্বাস্থ্যাবাস হইয়াছে। বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, বারানস প্রভৃতি স্থানে  
 পূর্ব্ব ইংরাজের হাওয়া খাইতে দাইতেন, কিন্তু এখন তথাকার অনেকে

রোগের দৌরাণ্ডে এই মহানগরে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করে। পাড়া-গাঁয়ের জলাশয়ের কথা মনে পড়িলে কান্না আইসে। শীতাবসানে ভোবা সব শুক হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ছোট ছোট পুকুরগুলি পাক ও কাদায় পূর্ণ এবং জ্বালোকের কল্যাণে ঐ সকল পুকুরিগীর অবশিষ্ট জলটুকুও এককালে লবণাক্ত হইয়া পড়ে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক আবাদ হওয়ার গ্রামের নিকটে পতিত ভূমি প্রায় দেখা যায় না, সুতরাং বড় বড় পুকুরিগীর পাড়গুলি পল্লীর মল ও মূত্র ত্যাগের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। বৃষ্টি হইলে ঐ সমস্ত মল মূত্র দৌত হইয়া জলে পড়িয়া তাহাকে পবিত্র করে! আবার কোন কোন পুকুরের গর্ভে প্রতিবাসীরা সকল প্রকার আবর্জনা ফেলেন। এই সকল পুকুরের জলে বাসন মাজা, ছেলেদের মলমূত্রপূর্ণ কাঁথা নৈকড়া এবং বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি সাংক্রামিক রোগগ্রস্তের বস্ত্রাদি কাটা, ঘাটে বা পাচড়া, গরমির পীড়া ও মহা-ব্যাদি-গ্রস্তদের আপন আপন ক্ষত দৌত করা, আঘাতের ধোপাদের সিদ্ধ কাপড় পরিষ্কার করা এবং জমা দেওয়া থাকিলে মাঝে মাঝে জেলেদের ২।৪ ঘণ্টা মংসা ধরা; এই সকল কারণে উহার এককালে বিস্তারিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। আবার বেওয়ারিস জলাশয় হইলে ত কথাই নাই, মহাসমারোহে শত শত লোক তাহাতে নামিয়া জলটুকুকে একেবারে দখিৎ করিয়া তুলে। ১।২ ক্রোশ দূর হইতে কেহ কেহ বা উহাই পানার্থ লইয়া যায়। এইরূপ বিসুদ্ধ ও পবিত্র জলে ঠাকুরদের অন্ন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়—ভাল সেগুলি যেনু পাথর বা ধাতু-নির্মিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও জানিয়া শুনিয়া অন্নান মুখে ঐ অবিসুদ্ধ জল প্রত্যহ কতবারও উদরস্থ করিতেছেন। অভ্যাগে সকলই হয়। মেথরেরা এক হাতে ময়লা সাক করে, অগ্র হাতে পানীয় ও ভোজ্য মুখে তুলিয়া থাকে এবং কখন কখন গৌকেও তা দেয়। নিমতলার ঘাটে চিতার পার্শ্বে চুল্লি হইতে আদপোড়া কাষ্ঠ লইয়া মুদকরাসেরা আমোদ অহ্লাদ সহ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিতেছে। পরে সেখানেই হয়ত আহার করিবে। ভগবানকে ভাবিলাম! অমনি আমাদের সেই বিসুদ্ধ ও পবিত্র জলের কথা মনে পড়িল! অগ্র দেশীয় ও অপর জাতীন্দ্রো আমাদের এরূপ পানীরের ব্যবস্থা শুনিবা মাত্র বমি করিতে থাকিবে—তাহাদের অন্ন আদিবে, কিন্তু

আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরত একটুকুও বিকার হয় না ; কিন্তু বাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে, ইহা দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারিত্ব সম্বন্ধে বাঁহাদিগের কতক দূর জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা ই বিশেষ কষ্ট পান। ইহা নিবারণের কি কোন উপায়ই নাই ? কে বলে নাই ! পূর্বে শেঠ ও সেন মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ এক শত আট করিয়া বড় বড় দীঘি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এখনকার ধনাঢ্যেরা রাজপ্রসাদ লাভাকাজ্জার নিজ নিজ পল্লীতে “হল” বা সাধারণের ব্যবহারার্থ উচ্চ প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ এবং বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর বৃত্তি সংস্থাপনে প্রচুর অর্থ দিয়া থাকেন ! সময়ে রায় এবং রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ! এরূপ দেশভিত্তিকর কাৰ্য্য তাহাদের ভাল লাগিবে কেন ? তাহাতে তো রাজসম্মান নাই ! কিন্তু মান ও বশঃপ্রার্থী নয়, এমত লোকও আছে। চৌগাছা নিবাসী ঘোষবংশোদ্ভূত ইন্দ্ৰ-নারায়ণী নাম্নী একটা বিধবার মৃত্যুকালে বাহা কিছু অল্প নগদ টাকা ছিল, পরিচারক ও সেবা শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া পিতৃব্যদত্ত ৫০০ টাকার একখানি মাত্র কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহা একটা পুস্তকিণী খনন নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। একেই বলে দান ! এমন সকল ব্যক্তি-রাই ধর্ম্মের গৃহ মৰ্ম্ম বুঝিয়াছেন। ইহারা দেব-প্রসাদের প্রকৃত পাত্র। ইহারা কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া পরজন্মে উচ্চ ও সংকুলে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি এবং শেষে পরা জ্ঞান লাভ করিয়া পরমে লয় প্রাপ্ত হইবেন।

সামান্য কথায় বলে “একের বেটো দশের নড়ি”—বাহা এক জনের অসাম্য, দশ জনে তাহা নির্বাহ করিতে সহজে সক্ষম। লর্ড রিপন দেশ ন্যে স্বায়ত্তশাসন-বিধি সংস্থাপন করিয়া যে কি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। অনেকেই ইহার মৰ্ম্ম আজও ভাল বুঝেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহাই স্বাধীনতার মূল। ইহার সদ্যবহার করিতে পারিলে বহু মঙ্গলের সম্ভাবনা। এফণকার সভ্যগণ নূতন ত্রুটি, তাঁহাদিগের আদর্শ কলিকাতা, স্তত্রাং কাল, অবস্থা ও অর্থ, এই সমস্ত বিবেচনা না করিয়া ইহারা মহানগরীর মিউনিসিপালিটি সভার অনুকরণ করিতে চেষ্টা পান। কাছারির নিকটস্থ রাস্তার ধারের ঘাস চাচা ও গাছ থাকিলে তাহার পাতা কুড়ান, তথায় বৈকালে জল ও রাতে ৩৪টি আলোক দেওয়া এবং অধিক বেতনে আনগ্ৰকের

অতিরিক্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারী রাখা, ইত্যাদি অনেক অপব্যয় করিয়া দেশ-  
হিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন ! কিন্তু জলাশয় খনন এই গ্রীষ্মপ্রধান  
দেশের পক্ষে যে কি অধিকতর হিতকর কার্য্য, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিতে আসে  
না ! প্রতি গণ্ডগ্রামে এক একটা দীঘি কাটান বা যাহা আছে তহার পক্ষো-  
দ্ধার করা নিতান্ত আবশ্যক । উহা কেবল পানীয় জলের জন্ত ব্যবহৃত হইবে  
—উহার পাড় পরিষ্কার রাখা এবং সুবিধাক্রমে উহাতে পুষ্পোদ্যান করা  
উচিত । অন্ততঃ প্রতি পল্লীতে পশ্চিম অঞ্চলের স্থায় এক একটি বড় কূপ  
খনন করিলে ও তাহার পাড় প্রশস্ত করিয়া বাঁধাইলে, অল্প ব্যয়ে অনেকটা  
কার্য্য সাধিত হইতে পারে । হাজার ইল্লত ( ময়লা ) প্রায় হউক, হাজার  
অনাচারী হউক, দ্বীলোকেরা কখনই ইহার জল অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র করিতে  
সক্ষম হইবে না ।

ওলাউঠা মহামারী রূপে পল্লীর নিকটস্থ হইলে বাটীর দ্বার জানালা সক-  
লই খুলিয়া রাখা বিহিত—বায়ু যেন কাপাও আবদ্ধ না থাকে । চোর  
কুঠারীটা বহু দিন অবধি কাঠরার পূর্ণ আছে, উহা ধোলা অনাবশ্যক, ইহা  
নির্বোধের কথা । বায়ু আমাদিগের প্রাণ, উহা দূষিত হওয়া যত অনর্থের মূল ।

ওলাউঠার সময় আহার বিহ্বারে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । আউন  
বা নূতন চাউল, কাঁচা বা টেক ফল, বাজারের লুচি কচুরি, অধিক পরিমাণে  
তৈল সংযুক্ত ভাতে পোড়া, কাঁচা ঘি বা ঘৃতাক্ত দ্রব্য, ইলিস্ বা তেলাল,  
গলা, পচা বা গুঁটকি মৎস্য, পাকা সজন্ম ডাঁটা, শসা লাউকুমড়া ইঁচড় প্রভৃতি  
বাহ্য খাইলে উদরাময় হওন সম্ভব, তাহা বর্জন বিধি ; যদিও অভ্যাস  
থাকিলে তত অপকার হয় না, তথাপি সে সমস্ত পরিত্যাগই উচিত । নিতান্ত  
উপায়াস্তর না থাকিলে ঐ সকল সামগ্রী অল্প করিয়া খাইবা । অধিক বা  
গুরু আহার, রাত্রি জাগরণ, অধিক সুরাদ পান, অতিরিক্ত শারীরিক বা  
মানসিক শ্রম ও বারইয়ারি পূজাদি উপলক্ষে ২৪ দিন ক্রমাগত উন্নতের স্থায়  
ঘুরিয়া বেড়ান এবং সকল প্রকার অনিয়ম সর্বথা পরিহার্য্য । রোগা-  
ক্রমণের পূর্বাঙ্কে স্থানান্তর হওয়া মন্দ নয়, কিন্তু রোগের বিষ শরীরস্থ  
হইলে পলাইয়াও নিস্তার নাই । লাভের মধ্যে হয়ত ব্যাধির বীজ অন্তর্ভুক্ত  
হইয়া গিয়া বপন করা হয় ।



এই ব্যাধির প্রকৃত কারণ আজও অবধারিত হয় নাই—উদ্ভিজ্জাত বা অপর কীটানু শরীরভাস্তরে প্রবেশ পূর্বক অল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক হইয়া রক্তকে বিকৃত করাতে উষ্ণিয়া নামিয়া নির্গত হয়। ডাক্তার কচের পরীক্ষায় ইহা উদ্ভিজ্জাত, ইহার আকার (,) কমার তায়, রস পাইলে মধ্য ভাগে হৃদয় হইয়া প্রথমে ক্ষণ মধ্যে উহা দ্বিখণ্ড হয় এবং পূর্বের তায় অল্পক্ষণ মধ্যে আবার ঐ দুই ভাগ চারি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কীটানুতে পরিণত হয়; এইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ ঘণ্টায় অসংখ্য হইয়া পড়ে। এই সকল কীটানু ভেদেতেই অধিক থাকে, বমনে প্রায় নয়। পুকুরের জলে ঐ বিষ্ঠাসংযুক্ত বস্ত্র কাচিলে উহার সেখানে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং সেই জল যাহারা পান করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই “ব্যাধি হয়। পাকস্থলীর অন্তরসে উহার প্রায় জীর্ণ হয়, কিন্তু পেটরোগাদের তাহা না হওয়ায়, তাহাদের ক্ষত্রে উহা নামিলে অল্প কাল মধ্যে বহু হইয়া ওলাউঠা প্রকাশ পায়। এই হেতু ব্যাধি দেখা দিলে জল টগুবগু করিয়া ফুটাইয়া ও তাহা জুড়াইয়া পান করা বিধি। কেহ কেহ ভাবেন যে, ঐ বিবাক্ত পদার্থ নিঃশ্বাস দ্বারা দূরদূরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির সৃষ্টি করে। ওলাউঠার ভেদ বমির নেকড়া দি পোড়াইয়া ফেলাই শ্রেষ্ঠ উপায়, অন্ততঃ খুব গভীর গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলা কর্তব্য। পীড়িতের ঘরে ৫৭ দিন অগ্ৰ কাহার রাত্রিবাস অনুচিত। রোগ প্রকাশ হইলে সকল বাটিতেই ও পল্লীর স্থানে স্থানে গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্যক। ঠাকুর ঘরের তায় সকল কুঠারিতে ধূপ ধূনা জালাইবা। শরীর রক্ষার্থ সর্ব প্রকারেই সাবধান হও, কিন্তু কোনমতে ভাত হইওনা। ভীত ব্যক্তিদিগকে ব্যাধি যেন আগে আদিয়া ধরে। নিজের অমঙ্গল আশঙ্কায় অনেকে পীড়িত আত্মীয়গণকে দেখিতে যাইতে সাহস করেন না। কিন্তু আনাদিগের প্রতি দেবতার কৃপা আছে, এই সংস্কার বশতঃই হউক, অথবা দৃঢ়-সংকল্প মনের উল্লাস জগ্ৰহী হউক, সকল প্রকার মহানুরী এবং সাংক্রামক রোগের সময় ক্ষহারী পরের শুশ্রূষায় বদ্ধ থাকিয়া দিন রাত বাড়ী বাড়ী বাতায়ত করে, তাহাদিগকে প্রায়ই অক্ষত শরীরে এই মহা সঙ্কটে উদ্ধার হইতে দেখা যায়। অপিচ তাহা না হইলেই বা ক্ষতি কি? পরহিতার্থ নিজ প্রাণ অর্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম

জগতে আর নাই। ইহাতে দেশের কাছে মান, পরলোকে সন্মান এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল—কর্তব্য কৰ্ম্ম করা জন্ত যে আত্ম-প্রসাদ, তাহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। আত্ম-স্বথ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জন দিয়া পরহিতানুষ্ঠানে ত্রুটি হইয়াকেই নিষ্কাম ধৰ্ম্ম কহে। হিন্দু-শাস্ত্রমতে ইহাতেই চরমে পরম গতি; যে গতি হইতে আর শ্রেষ্ঠ গতি নাই। অধিক আর কি তোমার আকাঙ্ক্ষা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আর একটি বিশেষ গুণ এই দেখা যায় যে, তাহাতে সাংক্রমিক ও মহাব্যাপক ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধ আছে। গোবীজ বা বিলাতী টীকা তাহার উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিলাতে গোয়ালদেহ ইচ্ছা-বসন্ত প্রায়ই হইত না। ইহা জানিয়া এবং বহু পরীক্ষার পর বুদ্ধিমান মহান ডাক্তার জেনর দেখিলেন যে, গাভীর বসন্তের রস লইয়া টীকা দিলে বসন্ত আর মহামারী বা ঐ রোগ হইতে বিরূপ ও বিকলাঙ্গ হইবার ভয় থাকুক না। সেই নিমিত্তই সকল সভ্যজাতির মধ্যেই এই অভিনব ও অকষ্টকর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ প্রথা অনুসারে টীকা দিতে কেহ অনিচ্ছুক হইলেও, তাহাকে বল পূর্বক দেওয়া হয়। বিখ্যাত রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ডাক্তর ডুম! পারিস মহানগরের কয়েক বারের ওলাউঠার রিপোর্ট পাঠ ও অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তান্ত্রব্যবসায়ীদের প্রায় এ রোগ ধরে না এবং ধরিলেও তাহা অল্পগ্র ও চিকিৎসাসাধ্য। অর্ধ শতাব্দি পূর্বে সদৃশ লক্ষণ জন্ত ভেরাট ও কুপ্রমকে হানিমান ওলাউঠার প্রতিষেধক বলিয়া এক দিন একটি, পরদিন অপরটি ব্যংক্রমাত্মসারে এক হইতে গুটি বড়ি থাইতে বিধি দেন। কলিকাতা ও অনেক পল্লীগ্রামে কেহ কেহ এরূপ না করিয়া একটা তামার মাছলী বা একটা পয়সা ফুটা করিয়া ঘুলিতে লাগাইয়া রাখে; ইহাতে সুফল হইবার কথা। লুক্লাও নামক মহা প্রসিদ্ধ জার্মান ডাক্তর কহেন যে, হোমিওপ্যাথি যদি সত্য হয় তবে লক্ষণের সোসাদৃশ্য জন্ত আর্সেনিক (সৈকো) ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ। এই ভয়াবহ রোগ এক মাসের অধিক কোথাও থাকে না। ডাকাইত পড়ার স্তায় প্রথম প্রথম ইহার ভয়ঙ্কর মূর্তি, পরে আর তত উগ্রতা থাকে না। এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল কুপ্রম, ভেরাট ও আর্স পর পর পূর্ব নিয়মে ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। এইরূপ ঔষধ ব্যবহারে এবং সুনিয়মে থাকিয়াও

রোগ উপস্থিত হইলে তাহা সামান্যতর বস্ত্র ও চিকিৎসায় আরোগ্যের সম্ভাবনা । শেষরাত্রে অনানন্স, তেজে জলবৎ ভেদ ও অপর সদৃশ লক্ষণ থাকায়, ডাক্তার হেরিং পূর্বাঙ্কে গন্ধক সেবন করিতে বা পদতলে মাখিতে ব্যবস্থা দেন । কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার এক কুলিডিপোতে ওলাউঠা ধরিল এবং প্রত্যহ ৫।৭টা করিয়া মরিতে লাগিল । কিছুতেই কোন উপকার দেখিতে না পাইয়া, শেষে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আহারের ২।৪ মিনিট পূর্বে এক টিপনি করিয়া কপূরের গুঁড়া সকলকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিলেন ; ভগবানের রূপায় সেই দিন হইতেই রোগ বন্ধ হইয়া গেল ।

ওলাউঠার সময় পেটের পীড়াটা অধিক প্রবল হয় । উদরের সামান্যতর গোল অথবা নরম এবং একবারের অধিক বার বাছে হইলে অগ্রাহ্য করা কোনক্রমে উচিত নয় । আহারের খুব ধরাকাট আবশ্যক । রোগীগণ যত্না অপেক্ষা অনাহারের কষ্ট খুব লঘু । পূর্বলিখিত উদরাময়ের অধ্যায় পাঠ করিয়া কারণ ও লক্ষণানুযায়ী ভেজ প্রয়োগ করিলে অল্প কালে ও অল্প ব্যয়ে এবং অধিক না ভুগিয়া নিরাময় হইবে ।

আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ওলাউঠা চিনেন । ইহার রূপ বর্ণন সেই জন্ত অনাবশ্যক । এই রোগাক্রান্ত হইলে কোনমতে বাহিরে বাছে যাইতে দেওয়া উচিত নয় । এক ঢুই দাস্তুর পুর জেদ করিয়া কোন কোন রোগী নিকটস্থ পাটখানায় যাওয়ায় তাহাকে মুচ্ছিত ও নাড়ীধীন হইতে দেখা গিয়াছে, সুতরাং মল্লসা বা সরাস মল্লতাগই প্রশস্ত । উচ্চ বেখানে সেখানে নিক্ষেপ বা উহার নেকড়া ও কাপড় কোন জলাশয়ে দোত করা নিতান্ত গর্হিত । অগ্নিসং করাই শ্রেয়ঃ, তদভাবে গভীর গর্ভ করিয়া পুতিয়া ফেলাই উচিত । ঘর বিছানা পরিষ্কার রাখিবা এবং রোগীর নিকট ২।৩ জন সেবা ও শুশ্রূষাকারী ভিন্ন জনতা হইতে দিবা না । রোগীকে স্থিরভাবে রাখিবা । কপূর সর্বত্র ও অনারাস-প্রাপ্য-দ্রব্য—অনেকে ইহা সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন—ইহাতে বিশেষ উপকার হয় । হোমিওপ্যাথদের মতেও ইহার আরোক প্রস্তুত করার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন \* । ইটালি দেশস্থ ডাক্তার ক্রবীণী ২।৩

\* হানিনানের মতে এক ভাগ কপূর ও ১১ ভাগ সুরা ; ডাঃ কটনের মতে ১ ভাগ কপূর ও ৫ ভাগ স্পিরিট এবং ডাঃ ক্রবীণী উভয় সমভাগ ( অর্থাৎ এক কাচ্ছা ) প্রেরণ ওজনে কপূর

বৃৎসর যাবৎ ওলাউঠার সকল অবস্থাতেই প্রায় ৬০০ রোগীকে তাঁহার প্রস্তুতী-  
কৃত কপূরের আরোক প্রয়োগ করিয়া কোনটাতৈই বিকলমনোরণ হয়েন নাই ।  
প্রতিষেধক স্বরূপ বয়ঃক্রমাত্মসারে নিকি হইতে ৫ ফোটা প্রত্যহ ৩ বার  
করিয়া সপ্তাহিকাল দেওয়া যায় । ভেদ আরম্ভ হইলেই রোগীকে ফানেল,  
কম্বল বা অল্প গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, পূর্ণবয়স্ক হইলে ৫। ১০ মিনিট  
অন্তর ৪ ফোটা আরোক চিনিতে ফেলিয়া থাইতে দিবা । ব্যাধি অধিক  
উগ্র হইলে, সাধারণ রোগীকে ১০ হইতে ১৫ ফোটা এবং বদ্ধ-নেসাধোর, বিশেষ  
অপরিণিত স্ত্রীরাপায়াকে কখন প্রতিবার ৬০ ফোটা দেওয়ার ফল দর্শনাছে ।  
গাত্র আবৃত রাখিয়া ঘন ঘন ঠাণ্ডা জল অল্প অল্প মাত্রায় পান করিতে বা  
টুকরা টুকরা বরফ মুখে রাখিতে দিবা । ৩। ৪ ঘণ্টার মধ্যে ঔষধে উপকার  
দর্শনে এবং গাত্র তাপমূল্য, বদন সরস (টস্টনে) ও আরক্তিম এবং ঘন হইলে  
ঔষধ এককালে বন্ধ বা দীর্ঘকাল অন্তর ব্যবহা । ভেদ বমি বন্ধ হইলেও  
১০। ১২ ঘণ্টা উঠিতে দিবা না এবং গাত্র আবৃত রাখিবা । বাতাস লাগা  
বা অল্প কারণে ঘান বন্ধ হইলে পুনর্বার রোগ দেখা দেয় । রোগী কোন-  
মতে বিরক্ত বা হতাশাস না হয় এবং তাহার নিকট কেহ যেন হা হতাশ  
না করে, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবা । আহার বিবয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া  
উচিত ; ভেদ বন্ধ হইলেও অনেক সময় তৎকালে পেটে কিছু পড়িলে  
পুনরায় ভেদ দেখা দেয় । আরোগ্য হইয়াও কাহার কাহার উদরাময় থাকে  
—ইহার দুই ফোটা করিয়া এই আরোকে ২। ৪ মাত্রা দুই দিন খাইলে  
স্বাস্থ্য লাভ করে । আহারের ব্যতিক্রম বা অল্প কারণে রোগ পুনঃ প্রকাশ  
হইলে এই ঔষধই দেওয়া হয় ।

• অধিক কপূর ব্যবহার জন্ম কখন কখন শরীর অত্যন্ত গরম হয় ।  
তৎকালে কান কাওয়া প্রস্তুত করিয়া উহার এক পেয়লা অথবা  
৫। ১০ ফোটা ল্যাডেনম বা সিকি ধান আফিম ব্যবহার করিলে ঐ সমস্ত উপদ্রব

---

এবং এক কাছা ভলীয় মাপের, ব্রাণ্ডী অপেক্ষা কড়া, স্পিরিট 60 above proof । শেষোক্ত  
আরোক আর সকল গুলি অপেক্ষা কড়া, ঐ পরিমাণ স্ত্রীয়া আর কপূর খায় না এবং সেই  
জন্ম ইহাকে Saturated Spirit of Camphor কহে । ঠাণ্ডা লাগিলে কতকটা কপূরের  
গুড়া তলায় গিয়া চাপ দাখে --রোরো দিলে ও শিশি নাড়িয়া লইলে আবার পূর্ববৎ দ্রব হয় ।

যায়। বলা বাহুল্য যে, শিশু বা গর্ভবতীকে আফিম বা অধিক কপূর দেওয়া এককালেই অমুচিত। ডাক্তার রুবিণীর আয় অগ্রান্ত্র অনেকেই এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। রোগ সকলবারে এক প্রকারের হয় না। বোধ হয় ডাক্তার রুবিণীর সময়ের ওলাউঠা তাদৃশ ক্রুর বা ভয়াবহ ও সাংঘাতিক ধরণের না হওয়াতে তিনি অত দূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের মতে সর্ব প্রথম এক বা দুই ঘণ্টায় ১০।১২ বার কান্ধর আরোক সেবনে বিশেষ উপকার না দেখিলে ভেরাট বা অর্স লক্ষণানুযায়ী দিলে ভাল হয়।

ব্যাধির, বীজ শরীরস্থ হইয়াছে, ভেদ ও বমি নাই, কিন্তু চক্ষু মুখ বসিয়া গিয়াছে, এককালে বলহীন, স্মৃতিরূপ উঠিয়া বসিতে অশক্ত, শ্বাস-কষ্ট, কখন বা অচেতন, এমত অবস্থায় কপূরের আরোক বিশেষ উপকারী, এমন কি উহার ঘ্রাণেও রোগী পুনর্জীবিত হইয়া থাকে। এই মহৎ রোগের বিষয় সকল উপসর্গই যে এককালে প্রকাশ পায়, তাহা নহে। কোন কারণ নাই, অথচ শরীরে ঘ্রানি ও দুর্বলতা, এমত স্থলে ইহা প্রয়োগে রোগ ফুটিতে পায় না। ভেদ বমন নাই, নাঁড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাস অস্বাভাবিক হয় না, সর্বাঙ্গ নীল বর্ণ, এইরূপ উপসর্গে সর্ব শরীরে কপূরের আরোক মালিন করা ও উহার শিশির ছিপি খুলিয়া নাসারন্ধ্রে ধরা, এইরূপ ১০।১৫ মিনিট করিলে ২০ ঘণ্টার পর আরোগ্য লাভ হয়। যে রোগীকে কোন ঔষধ এককালে দেওয়া হয় নাই, অথবা প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইবার পরও তাহার হিমাক্ত, জিহ্বার বরফবৎ অবস্থা, শরীর শক্ত, হাতে পায়ে নীল ফটকা ফটকা দাগ, এবং হৃৎতে পায়ে ও পায়ের ভিত্তে অসহ্য খাল লাগা, নাড়ীর ক্ষুদ্র অবস্থা রহিয়াছে এমত স্থলেও ইহা প্রয়োগ বিধি।

আর্স—অধিক টক বা কাঁচা ফল আহার, বরফ বা ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহার, পচা শবের ভ্রাণ গ্রহণ, আর্দ্র স্থানে বাস, পুঁতি উদ্ভাবিত জ্বরের সঙ্গে এবং হৃর্তিক বা বহু দিনের অনাহারের পর ওলাউঠা এবং যেখানে এই ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিতেছে বা প্রথম হইতে সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিবে বা করিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, সেখানে সর্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করা উচিত। কুমড়া পচানি জ্বলের আয় ভেদ ও বমন, অত্যন্ত

পেটব্যথা ও জ্বালা—প্রথম প্রথম অল্প, পরে অসহ্য, অত্যন্ত তৃষ্ণা—কিছু অধিক পানে অশক্ত, জল উদরস্থ হইলেই উহা উঠা বা নামা, এবং অপর উপসর্গের বৃদ্ধি, সর্কাসে অতিশয় খাল লাগা, বিশেষতঃ পায়ের ডিবে ; স্বর-ভঙ্গ, কষ্টে দুই একটা কথা কহা, এককালে নেতিয়া পড়া, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হওয়া ; অথবা ভেদ বমি বন্ধ হইয়া সর্কাস্ হিম, নাড়ী অপ্রাপ্য, প্রস্রাব বন্ধ, এমন সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগে রোগীকে পুনর্জীবিত করে। আর্সের ভেদ মাত্রায় অধিক নয়, কিন্তু কষ্টকর বেগ ও কাটনেকার এবং মলাশয়ে ও মল-দ্বারে জ্বালা, অঙ্গুলি চোপ্তান ; এই লক্ষণ গুলি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্সিনেট-কুপ্রম—শিশুর ভেদ ও বমন, অস্ত্রে আক্ষেপ ও রায়নিক বেদনা জন্ত চীৎকার সহ আঙ্গুলে খিল লাগা, দুর্বলতা ও হিমাক্সের উপক্রম।

ভের্যুট্রিন—চাউল দোয়ানি জলের ছায় অতিরিক্ত ভেদ ও বমন, কাটনেকার, অত্যন্ত পিপাসা ও এককালে অধিক পান এবং কখন কখন উদরস্থ হইবা মাত্র উহা তুলিয়া ফেলা ; ভেদ ও বমনানুসারে ক্রমশঃ দুর্বলতা, (আর্সের ১ বা ২ দান্তে নাড়ী ছাড়া) বদন ঠাণ্ডা, নীল ও ফেকাসে ; স্বর ক্ষুণ্ণ ; আতঙ্কের চেহারা ; মুখাভ্যন্তর, জিহ্বা, ঠোঁঠ ও শরীর ঠাণ্ডা ; প্রস্রাব বন্ধ, চট্‌চটে ঘাম, হাত-পা ও পেটে আক্ষেপ, বুক ও উদরাভ্যন্তরে অতিশয় যাতনা। রোগ সাংক্রামিক ও ভয়াবহ না হইলে ইহাই সর্বাগ্রে দেওয়া বিধি।

কুপ্রম—প্রচুর জলবৎ ভেদ ও বমন, ভয়ানক পেটব্যথা, পেশী সব সঁটে ধরা, প্রথম অঙ্গুলিতে অল্প অল্প, পরে সর্কাসে ক্রমাগত ও প্রচণ্ড খাললাগা, (বিশেষ পায়ের ডিবের হইলে ইহা অব্যর্থ) বুক সঁটে ধরা জন্ত শ্বাস-কষ্ট এবং কঠিনাঙ্গীর সঙ্কোচন জন্ত কথা কহিতে অশক্ত ও দম আটকানবৎ হওয়া, জল গিলিবার সময় টপ্ টপ্ শব্দ হওয়া ; তৃষ্ণা, গরম জলে প্রয়াস, ঠাণ্ডা পানে বমন বন্ধ, ঠোঁঠ নীলবর্ণ, সর্কাস্ শীতল, প্রস্রাব অত্যল্প বা এককালে বন্ধ, ভাল গুনিহত না পাওয়া, চক্ষু নিস্তেজ ও তাহার চাব্বিদিকে কাল-শিরা পড়া, শরীর বরফবৎ ও রাত্রি ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া। আর্স ও ভেরাট দিয়াও অনবরত খাল লাগা, অথবা ভেদবমি বন্ধের পর থাকিয়া থাকিয়া হাত ও পায়ের আঙুলে খাল লাগা থাকিলে ইহা বিধি। অথবা বমির পরিবর্তে

তৎকালে পেটে অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে থাকিলে ইহা ও ভেরাট পর পর দেওয়া যাইতে পারে।

কার্বোভেজি—আস ও ভেরাটে ফল না দর্শিলে। কল-চালক (Engine Driver) কর্মকার, রাধুনি, এই সকল ব্যক্তির পীড়ায় অধিক উপযোগী। রোগের শেষাবস্থায়, উপসর্গ সকল বন্ধ হইয়া তেজোহীন ও অসাড় হওয়ায় রক্ত আসিয়া বক্ষঃস্থল ও মস্তকে সঞ্চার হইলে। অতিশয় শ্বাসের কষ্ট, নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা, নাড়ী অপ্রাপ্য, মুখমণ্ডলে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, অথবা প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া নাড়ী এককালে বসিয়া যাওয়া ও শব্দ প্রায় পড়িয়া যাওয়া; কাহারও বা মধ্যে মধ্যে অনিচ্ছাধীন বা অসামান্য ভয়ানক পচা গন্ধের গাঁজলাটে পাতলা আম-বিশিষ্ট এবং কখন বা পূর্ণ-সংযুক্ত ভেদ, অতিশয় পেটকাঁপা ও প্রস্রাব এককালে বন্ধ। অন্তিম কালে ইহা ও আস পর পর বিধি।

হাইড্রো-আ—অঙ্গে খাল লাগা ও ভেদ এককালে বন্ধ, অথবা অসাড় হায়ে ও বমন ক্রমশঃ কমা, হিমাক্ত হওয়া, আইচাই করা, হিক্কা, অতিশয় শ্বাস-কষ্ট, খাবি খাওয়া, ঠাণ্ডা চট্‌চটে ঘাম, চক্ষুর পুত্‌লি বিস্তৃত ও এক দৃষ্টে চাহনি। ৩৪ বার এই ঔষধ প্রয়োগের পর পুনশ্চ ভেদ দেখা দিলে এবং লক্ষণ বৃদ্ধি ভেরাট প্রভৃতি তৎকালে দ্রুত ঔষধ দিবা। পূর্বাবস্থাপন্ন রোগীকে ডাক্তার সরকার ৬ ক্রমের কোরার (কেউটের বিন) অনুবটিকা সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন একরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় লাকাসিসেও (মার্কিন সর্পবিষে) ফলদর্শন বিলক্ষণ সম্ভব; তবে বিভিন্নতা এই, অধিক মৃত্যুভয় থাকিলে কোরা, তদভাবে লাকাসি, চরম অবস্থায় খাবি খাওয়ার স্থায় শ্বাস হইলে নাজা; এবং ঐ সঙ্গে নাভির চতুষ্পার্শ্বে ভয়ানক কষ্টকর বেদনায় ক্রেটান্ট-ড দেওয়া হয়।

সিকেল—ইহাৎ চক্ষু মুখ বসিয়া যাওয়া ও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া; সর্পিদা, বিশেষ কিছু উদরত্ব করিলে, গা বমি বমি ও বমন; পুনঃ পুনঃ জলবৎ ভেদ; শুষ্ক ঠাণ্ডা ও তৌব্‌ডান, উপর পেট জালা, স্বরভঙ্গ, প্রস্রাব বন্ধ, বুক পেট হাত পা এবং পায়ের পাতা ও আঙ্গুলে খাল লাগা ও উহাদের খুব ফাট ও তেড়াবাঁকা হওয়া, মুখমণ্ডল বন্ধ ও বিশী, পুনঃ পুনঃ জিহ্বা কামড়ান, অনিবার্য পিপাসা, কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কখন বা বড় বড় ক্রমি বমন, মুখ নাক অতিশয় শুষ্ক এবং নাড়ী

অপ্রাপ্য প্রায়। কুপ্রম দিয়া ও খাল লাগা না গেলে; দেহ নীলবর্ণ, টংকার এবং অঙ্গুলি খুব কাক কাক ও তেড়াবাকা হইলে। শরীর অত্যন্ত শীতল, কিন্তু অন্তর্দাহ জন্ম গায়ে কাপড় রাখিতে না দিলে। বমি বন্ধ হইয়া কেবলমাত্র ভেদ পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক।

টার্ট-এ—সঙ্কটাপন্ন বা রোগের চরমাবস্থা, হৃদয়ের মন্দগতি—এমন কি মিনিটে ৬৭ বার মাত্র সশব্দ শ্বাস প্রস্থান হওয়া, হৃদয়ের পক্ষাঘাত আশঙ্কা; মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গী, অচেতন প্রায়—অনেক ডাকার সংজ্ঞা লাভ, কিন্তু উত্তরদানে অশক্ত। পল্লীতে বসন্ত রোগ উপস্থিত কালীন ওলাউঠায় ইহা বিশেষ খাটে।

আইরিস—কড়ার নিম্ন, নাভি প্রদেশ ও তলপেট অতিরিক্ত জ্বালার পর ভেদ বা বমন। উপর পেট মিনিট কতক অন্তর অসহ্য জ্বালা করা এবং তলপেট ব্যথার পদ্য বশন ও এক লাগাড়ে ভেদ, মাথা ধরা, গরম ঘাম ও হতাশাস হওয়া।

রিসিনস—ভেরাণ্ডার বীচি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কলিকাতার ডাক্তারেরাই ইহা ওলাউঠায় ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। সকল অবস্থায় ইহা প্রযুক্ত্য, বিশেষ উদরাময় হইতে রোগের উদ্ভব হইলে ইহা অধিক ফলদায়ক। ক্রুর উদরাময় হইতে ক্রমে ওলাউঠায় পরিণত হওয়ার অথবা হঠাৎ অনবরত ভেদ ও বমি, কিন্তু পেট ব্যথা প্রায় না থাকা, (বাণা থাকিলে ভেরাট)।

প্রচণ্ড ও অধিক জলবৎ ভেদ, কখন হরিদ্রা বর্ণের, কখন বা ছধবৎ, কচিং বা শেষে রক্তযুক্ত হইলে। পর পর একবার ভেদ একবার বমি। ক্রমাগত বমি, কখন বা পিত্ত-মিশ্রিত জলবৎ বমি, পুনঃ পুনঃ অধিক তৃষ্ণা এবং পান করিলেই তুলিয়া ফেলা। বদন বিকৃত, মলিন ও বসা; চক্ষু লাল ও অর্ধ নিম্নীলিত, শাকাশয়ের উপর আড়া আড়ি একটা লম্বা পদার্থ থাকা বোধ, নাক ছুঁচাল ও চোপ্‌মান, স্বরভঙ্গ, অঙ্গুলি তোড়ান, শরীর নীল ও বরফবৎ শীতল, অন্তর্দাহ, আইচাই করা, মৃত্যুভয় থাকা, কখন কখন অঙ্গ খেঁচুনি এবং নিশ্চয় মৃত্যু হইবে একরূপ বোধ, নাড়ী সূত্রবৎ এবং অতি মুছ বা অত্যন্ত দ্রুত বা অপ্রাপ্য-প্রায়, প্রস্রাব বন্ধ, ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে ঘাম, কখন কখন অত্যন্ত পেটব্যথা ও পেটে খাল লাগা এবং হয় ত দুই এক দাস্তের পরও যাতনা যাওয়া। কাহার কাহার এক পায়ের পাতায় পচাধরা এবং এককালে বলক্ষয় হওয়া।



আমন-কাষ্টিক—ভেদ বমন বন্ধ হইয়া বদন ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ও নাড়ীবসা অবস্থায়।

টাবাক—বমন, খাল লাগা, অচেতন, অসাড়ে ঘন ঘন এককালে ভেদ ও বমন, অতিরিক্ত তৃষ্ণা। শরীর ঠাণ্ডা, দুর্বল ও শ্রীহীন হওয়া। শাদাটে ভেদ-বমি ও মাঝে মাঝে মুচ্ছা হওয়া, নড়া বা উঠায় বমন, অল্পক্ষণ অন্তর ভেদ, মৃতবৎ রক্তহীন চেহারা হওয়া, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্বল। অথবা আর্সাদি দেওয়ায় ভেদ বন্ধ হওয়া, কিন্তু গা হাত ছেঁড়া, খাল লাগা, আইটাই করা, ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম ও নড়ায় বমন হওয়া, এমত স্থলে ইহা ব্যবহার্য্য।

ওলাউঠা রোগে ৩৬ ও ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা কখন কখন আদত (Mother Tincture) ঔষধও দেন। ঔষধগুলির মধ্যে কোন কোনটা তীব্র বিষ, চিকিৎসা বিদ্যা; অব্যবসারীর উহার নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা অপরাধমর্শ, কারণ তাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে। রোগের প্রচণ্ডাবস্থায় ৫।১২।১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ বিধি। উপশম বুদ্ধিলে ক্রমশঃ অধিক বিলম্বে দিবা। দাঁতকপাটি লাগিলে বা ঔষধ গিলিতে না পারিলে কপূর বা বেলেডোনা নাকের গোড়ায় কিয়ৎক্ষণ ধরায় গলাধঃকরণের শক্তি হয়। ঔষধ সেবনে ভেদের বর্ণের পরিবর্তন ও অল্প অল্প স্থলক্ষণ হইয়া পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা হইতে থাকিলে ভেরাট বিধি। নাড়ী ছাড়িয়া দীর্ঘকাল এক ভাবে থাকা অবস্থায় পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্তন বা উহা ঘন ঘন দেওয়া অবিহিত। তৎকালে গাত্রাবরণ সহ হয় না এবং তাহা রাখাও অনাবশ্যক। ওলাউঠার পাকাশয়ে একপ্রকার জ্বালা হয়, তাহা বৃদ্ধিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাবোধে রোগী আহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করে; সে সময়ে ঠাণ্ডা জল, লেবুর পানি বা ফটিক জলের গ্ৰায় কাঁজি ২।১ কিছুক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনমতে কঠিন দ্রব্য যেন উদরস্থ না হয়। ভেদ বমি বন্ধ হইয়া কখন কখন সামান্যতর জ্বর হইয়া থাকে। ২।৪ মাত্রা আকুন প্রয়োগ করিলে প্রায়ই উহা সারিয়া যায়। কিন্তু বলক্ষয়কারী জরবিকার ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রবিশেষে অধিক রক্ত সঞ্চয় বা উহার প্রদাহ হইলে রোগ কোন মতে অনায়াসসাধ্য নহে। সকল ঔষধের গুণ বিশেষরূপে জানা না থাকিলে এ অবস্থায় প্রকৃতরূপে চিকিৎসা করা সুকঠিন।

এ স্থলে কয়েকটা নাত্র সর্বদা ব্যবহৃত ঔষধের গুণ ও লক্ষণ উল্লেখ করা হইল \* ।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়া ( Re-action ) কালীন জরে—আকন ; তাহার সংহিত মাস্তিফের প্রদাহ থাকিলে—বেল ; ফুস্ফুসের হইলে—বাই বা ফস ; পাকশয়ের হইলে—আর্স, নক্স, রাই । বিকারের অবস্থায়—রাই, রস, আর্স, ইত্যাদি । ( জর ও টাইফয়েড জ্বর অব্যায় পাঠ কর )

আর্স—বিকার ও ক্রমশঃ সন্নিপাতের অবস্থার বৃদ্ধি—বদন লাল কখন বা পাশ্চাৎবর্ণ, অত্যন্ত মাথাধরা, ফুস্ফুসের প্রদাহ বৃদ্ধি, পার্শ্বদেশে ব্যাথা, কাশি ও পূর্বমিশ্রিত রক্ত উঠা, পেট-স্পর্শে ব্যাথা, জলবৎ কদর্যা ভেদ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, পান করিলেই তুলিয়া ফেলা, স্বকে চূর্ণক, আইচাই ও গা জালা করা, নাড়ী কখন ক্ষীণ কখন লম্বা ।

মক্স—নাড়ীর হীনতা, বদন ও চক্ষু-নিষ্প্রভতা, হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, দুর্বলতা, প্রস্রাব ঘাটা এবং কস ব্যবহারে কষ্ট না দিলে ।

বাণ্টিসা—চক্ষুদগ্ধতা, সর্বাঙ্গ ব্যাথা, দীর্ঘকাল এক পোশে শুইতে না পারা—কারণ যে পোশেই শৌর্য সেই দিকেই ক্ষতের ছায় বোধ ; গা গরম ; জিহ্বা শুষ্ক, লাল বা কটা ; কণ্ঠ শুষ্ক ; মাথা ধলা ও ভার ; অবোর অবস্থা, নিদ্রালুতা, অসং-

\* হিমাক্স, নাড়া ছাড়া ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাছাকে কাছাকে হাইড্রোপেথি বা জল চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । এই চিকিৎসার নিমিত্ত একখানি বড় চানর ও কথল (বিলার্ডা কথল হইলে পুরাতন) এক গাছি শাণিত স্ক্র, এবং কাগজ করিতে পারিলে, পানিকটা বরফ সঙ্গে থাকা আবশ্যক । চানর খানি ভিজাইয়া ও কতক নিংড়াইয়া রোগীর গলা অবধি পা পর্যন্ত উঠা দ্বারা আবৃত করিয়া তত্পরি কথল দ্বারা ঢাকিয়া দিবা : পরে মৃদু মৃদু করিয়া নেকড়া ছড়াইয়া নিয়ত শীতল বা বরফ জল দিতে থাকিবা । মিনিট কতক মধ্যে চন্ চন্ করিয়া তজ্জনীতে নাড়ী উপস্থিত, শরীর গরম এবং হয় ত শৌচ ও প্রস্রাব হয় । কিন্তু অবস্থা বুদ্ধিয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কখন বা ঠাণ্ডা করার দরুণ তন্দ্রাওই সত্তা হইতে পারে । হাইড্রোপেথি মতের নক্স বিশিষ্টরূপে অবগত না হইয়া অব্যবসায়ীর উচিত হস্তক্ষেপ করা অযৌক্তিক ; তবে "গোপাল বহুর নাস" প্রয়োগে অশ্রোগের ছায় ইহাও আরোগ্য হওনের একটা অসমসাহসিক উপায় বলিয়া জানা থাকায় হানি নাই । সুবিজ্ঞ ডাক্তর নিকটে থাকিলে তাহার সঙ্গে এ প্রকার চিকিৎসাযন্ত্রসম্বৃত হওয়া যাইতে পারে । বাত টায় কুতকা হইলে অনেকটা সাহস হয় ও শিখা যায় ।

লম্ব বাক্য, শরীরে কোন প্রকার গন্ধ, নিঃশ্বাস ও প্রস্রাব অতিশয় দুর্গন্ধময়, বাহ্যে কদর্যা গন্ধ-বিশিষ্ট ও কৃষ্ণ বর্ণের, মূত্র গাঢ় লাল, এবং সন্নিপাতের উপক্রম অবস্থা।

ককু—অধিক গাত্রতাপ, মাথা ভার হওয়া ও ঘোরা এবং তাহার জড়তা, শরীর ও মনের দৌর্বল্য, অতিরিক্ত গা বমি বমি—বিশেষ মস্তক উত্তোলনে—ও মুচ্ছিত প্রায় হওয়া।

ফস-আ—চক্ষু নিস্তেজ ও বস, নাক ঝাঁকিয়া যাওয়া, অনিদ্রিতাবস্থায় (জাগিয়া) প্রলাপ, অথবা চিত হইয়া নিব্বরুম থাকা, উত্তর না দেওয়া, বা অসংলগ্ন ব্যাক্য কহা ও কহিতে কহিতে নিদ্রা যাওয়া, বিবিধ প্রকারের খেয়াল দেখা ও নানাবিধ শব্দ শুনা (এ অবস্থায় ইহা ও রস পর পর); নিয়ত বিড় বিড় করা বা বকা, আকাশ ও শয্যা হাতড়ান, ভয়ের চেহারা হওয়া ও পলাইবার চেষ্টা করা, অসাড়ে জলবৎ ভেদ বা কখন রক্ত বাহ্যে হওয়া, নাড়ী দুর্বল কখন বা ক্ষণলুপ্ত হইয়া যাওয়া, ঝিকারাবস্থায় সদাই এক প্রকার ভাব মনে উদয় হওয়া।

বেল—মাথা ও কপাল ব্যথা করা এবং তজ্জন্ত তথার হাত দেওয়া, মুখ ও চক্ষু লাল হওয়া, ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখা ও পলাইতে উদ্যত হওয়া, তৃষ্ণা, কিস্ত ফোটা কতক জল মাত্র গিলিতে সক্ষম হওয়া, প্রচণ্ড প্রলাপ বকা, কোঁকে কোঁকে উঠা, অগ্নির গায়ে থুথু দেওয়া, তাহার চুল টানা ও বস্ত্র ছেঁড়া, বাহা পায় তাহাই কামড়ান, শয্যা হাতড়ান, অঘোর হইয়া থাকা, অনেক ডাকার চেষ্টনা হওয়া, দাঁত কিড়মিড় ও মুখ বিকৃত করা, গাঁজলা ভাঙ্গা, সর্কাসে ব্যথা থাকা, নাড়ী দ্রুত ও মোটা হওয়া, ঘুমন্ত চমকান।

ধ্রাম—মূহূর্ত্ত বিরাম ভিন্ন দিন রাত প্রবল প্রলাপ, প্রচণ্ড রাগ ও কোঁকে কোঁকে উঠা, অথকে মারি, দাঁত দিয়া আপনার অঙ্গ পর্য্যন্ত ছেঁড়া, কামড়ান, খল খল করিয়া হাসি, পবুক্ষণেই চীৎকার করিয়া কান্না, দেবতা ভূত ও নানা জন্তু দেখা এবং ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করা। অদৃত খেয়াল দেখা ও শব্দ শুনা, অথকে চিনিতে না পারা। জলে ভয় ও গিলিতে কষ্ট হওয়া, সদা আবল্য, নাকডাকা, ও মুখভঙ্গী করা। শ্বাস-কষ্ট ও তাহার খর্ব্বতা, প্রস্রাব এককালে স্ফার নষ্ট হওয়া, বা অনিচ্ছাধীন খানিকটা ত্যাগ করা।

হাইয়স—চক্ষু নিস্তেজ বা চক্চকে ও তাহার পার্শ্বে কালশিরা পড়া ও তাহার পুতলি কখন বিস্তৃত কখন বা সঙ্কুচিত, বধিরতা, বা কাণমধ্যে নানা প্রকার শব্দ হওয়া, জিভ বাহির করায় তাহা কাঁপা, মাথাব্যথা করা, ঘোরা ও তথায় শির উঠা, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, সর্বাঙ্গে ফুটুনি, পুনঃ পুনঃ বৃথা প্রস্রাবের বেগ, অথবা অসাড়ে শৌচ প্রসাব ভাগ, প্রবল প্রলাপ, রাগ ও বল প্রকাশ, দিবা রাত্রি উলঙ্গ থাকা, অনিদ্রা, চীৎকার, নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরা, পলাইবার ইচ্ছা; নাড়ী ক্ষুদ্র, হৃৎস্পন্দ ও অপ্রাপ্য প্রায়, আকাশ হাতড়ান, লোক চিনিতে না পারা, প্রলাপ বকা, অচৈতন্য হওয়া, কষ্টে হা করিতে পারা, বিড় বিড় করা, মুচ্কে মুচ্কে হাসি, মাঝে মাঝে চমকান ।

ওপি—হা করিয়া ও নাক ডাকাইয়া অঘোরে নিজা যাওয়া, অসাড়ে শৌচ ও প্রস্রাব ভাগ, বা শুষ্ক ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল ভাগ, শয্যা হাতড়ান, বিড় বিড় করা, অথবা নিয়ত অচেতন থাকা—কষ্টে জাঁগাইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্নাবস্থা পাওয়া । প্রচণ্ড প্রলাপ বকা ও নিয়ত আইটাই করা ।

লাকাসি—জিভ বার্ষিক করার মত চক্চকে লাল, তার ও কষ্টে বাহির করা, তৃষ্ণা, কিস্ত পানে অনিচ্ছা ; নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়া, বিড় বিড় করা ।

মিউরিয়াট-আ—নিদ্রাকালীন গৌ গৌ করা ও হৃৎস্পন্দ জন্ত বিছানার পান্তার দিকে গড়াইয়া পড়া, জিহবার সাড়ন্ত প্রায় নাশ এবং তজ্জন্ত কথা কহনে অক্ষমতা ।

নেটম—অতিশয় দ্বৌর্জল্য, জিভ শুষ্ক হওয়া, অনিবার্য পিপাসা এবং অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকা ।

লারো—ওলাউঠার মুর্ছা জন্ত শ্বাস-রোধ । বিকারাবস্থায় মস্তক ও বক্ষঃস্থলে অধিক রক্ত সঞ্চয় হওয়ায় নেসার থায় অঘোরে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকা, কষ্টে চেতনা করান যায় । অথবা কষ্টের চেহারা, মুখমণ্ডল বাকচূরা, গিলিতে কষ্ট, পা ছিঁড়িয়া পড়া ।

কানাবিস-ই—মৃচ্ প্রলাপ, সকল পদার্থ ঘুরিতেছে বোধ, এবং আকাশে উড়িতে থাকা বোধ হওয়া । মনের ভাব ক্ষণপরিবর্তনশীল এবং অসংলগ্ন । সর্বশরীর, বিশেষ জননেত্রিয় প্রদেশ অতিশয় চুলকান ।

সিকুটা—বিকারে শিব-নেত্র হইলে এবং ভেদ, বমন ও শ্বাস-কষ্ট থাকিলে ।

আণিকা—অচৈতন্য, বলক্ষয়কারী জ্বর, প্রলাপ, শয্যা হাতড়ান ।

সিকেল—গাত্রতাপ, অনিবার্য পিপাসা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, পীঠের দাঁড়াইতে উত্তর ইহা আক্ষেপ বৃত্ত বাথার সন্ধিক্ষেপ বিস্তার, মুখমণ্ডলের আক্ষেপ ক্ষণে থাকা ক্ষণে যাওয়া, কিন্তু হাত পায়ের খাল লাগা ক্রমান্বয়ে (একলাগাড়ে) হওয়া । ইহা দ্বারা আক্ষেপের সমতা ইহলে, অন্ত্যন্ত উপসর্গ নিবারণ জন্য তৎসাময়িক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত ।

মার্ক—ওলাউঠার বিকারবস্থা । মাথা ছিঁড়িয়া পড়া ও জ্বালা, বিশেষ রণে, জ্বিত পুরু ছাতা পড়া, গা বমি বমি করা, অতিশয় গাত্রতাপ, কম বেশী তৃষ্ণা, বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, পেট খিনচুনি বা কন্কনানর পর গাঢ় স্বেদ বা গন্ধকের বর্ণের গাঁজ্জ্বাটে, কখন বা রক্ত ও আম মিশ্রিত ভেদ হওয়া ।

কস্—গাত্রতাপ, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত, গলার শিরারসদৃশপানি, রাশি ঘাম, স্বপ্ন বিশিষ্ট নিদ্রা, ইষ্টাং চীৎকার, ও অস্থিরতা, ঘুমভাঙ্গার পর মুখ শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, অতিরিক্ত গাত্রতাপ ও সন্ধিক্ষেপ কামড়ান ও বাধা, মুখ হা করিয়া অনোর থাকা, জ্বিত এবং ঠোঁঠ শুষ্ক ও কৃষ্ণ বর্ণের, অতিশয় পেট-ডাকা ও অকষ্টকর ভেদ হওয়া ।

ব্রাই—মাথা টাটান, রণ ছিঁড়িয়া পড়া, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া, পুনঃ পুনঃ নাপায় হাত তোলা, নড়ায় সন্ধিক্ষেপ বেদনা ও পূর্ন বয়সের আদিকা, মনো ন্যায্য বা দিন রাত অতিশয় প্রলাপ, জ্বিত শুষ্ক, কাটা বা হরিজা লেপযুক্ত ও দ্রুতকৃড়ি বিশিষ্ট; মুখ শুষ্ক হওয়া ও তৃষ্ণা থাকা, উপর পেট ছুঁলেই চকড়া-ইয়া উঠা, গাত্রতাপ ও তৎসঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম, পেট ফালা, কোষ্ঠ বন্ধ, বা ভেদ হওয়া, অনিদ্রা ও অস্থিরতা, অথবা অনোর থাকা ও মাঝে মাঝে চন্কান, গলার ছিপি লাগান থাকা বোধ, পলাইবার ইচ্ছা, ভাল শুনিতে না পাওয়া, বুক পড়কড়ানি, কষ্টে প্রসার ত্যাগ, অতিশয় দুর্বল হওয়া, স্বপ্ন দেখা, নাড়ীর পুনঃ পুনঃ বা অসম স্পন্দন, ক্ষুদ্রতা বা ক্ষণলুপ্তাবস্থা ।

রস—ওলাউঠার পর বিকারাবস্থা চক্ষু লাল, জ্বিত লাল ও শুষ্ক হওয়া, অতিশয় তৃষ্ণা, উদরাময়, অস্থিরতা, বলক্ষয় ও রাশি ঝুল বকা । শিরঃপীড়া, ঘাড় পীঠ ব্যথা, পাকায়ন স্পর্শ করিলে অতিশয় ব্যথা, পেটকোলা, অসাড় হৃৎক শোচ প্রসার ত্যাগ, অংপ্রদেশ ভার, দুর্বল নিঃশ্বাস, গিলিতে কষ্ট, বদিরতা,

হাত পা অবশ্যপ্রায় হওয়া, স্থির থাকিবার পর অঙ্গ চালনায় তাহার ক্ষণিক সমতা, গায়তাপ, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাওয়া, বিড় বিড় করা, বা সন্দেহ হাত নাড়া বা অচেতন অবস্থায় অধিক বকা ও ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা ।

স্পিরিটু-নাইট-ডলসি—স্থিরভাবে পড়িয়া থাকা, কথা শুনিতে পাওয়া ও বুঝা, কিন্তু উত্তর না করা, এক-দৃষ্টিতে ও উন্মাদের ভ্রাম্য চাহনি । অতিশয় ছন্দলতা, কিছুই না চাওয়া এবং নিজের অভাব কি তাহা না জানা—সমাপি অবস্থার ভ্রাম্য ননের অভাব-শূন্যতা হওয়া ।

জিহ্বা—সংজ্ঞাশূন্যতা, পেশীর চিড়িকমার, এক দৃষ্টিতে দেয়া, প্রলাপ বকা, ঝাঁকিয়া উঠা, নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও বেগ, দ্রুততা ও তাহা অপ্রাপ্য প্রায় হওয়া, অল্প পরিমাণে অনিচ্ছাদান ভেদ ।

ওলাউঠায় শরীরস্থ বস্তু সমূহের কার্য এককালে রহিত হয়, এই নিমিত্ত মলের বর্ণদেয়া দিলে (পিত্তকোষের কার্য চালনার চিহ্ন) সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যায়, কিন্তু প্রস্রাব না হওন পর্য্যন্ত ভয় দূর হয় না । প্রস্রাব দিয়া শরীরস্থ দূষিত পদার্থ সকল নির্গত হয়, ইহা বন্ধ হইলে ঐ বিষ শোণিতে মিশ্রিত হইয়া প্রস্রাবাদি নানা উপসর্গ উপস্থিত করে । মুত্রাদারে মুত্র সঞ্চার না হওয়া পক্ষে আর্স উত্তম ঔষধ, কিন্তু তাহাতে ফল না দর্শিলে কাস্ত বিধি ।

কাস্ত—প্রস্রাব এককালে বন্ধ, মুত্রাদারে মুত্র সঞ্চারনা হওয়া, বা মুত্র স্থানীতে জমিয়া ইহা অধিক ক্ষীত হওয়ায় প্রস্রাব না হওয়া, কিস্বা ফোটা ফোটা, বা কখন আলাসহ, পড়িতে থাকা, অল্প টাটান জল ছুইতে না দেওয়া, নাভির চতুর্পার্শ্ব জ্বালা, এই সব অবস্থায় কেহ কেহ প্রথমে এক মাত্রা আকুন ও অল্প খটা পরে কাস্ত দিয়া আশু ও অধিক ফল লাভ করেন । প্রস্রাব বন্ধ দরুণ আবেগ অচেতন ও দড়কা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা ব্যবহারে প্রস্রাবও হয় এবং অপরাপর উপদ্রবও দূরে যায় । ইহাতে ফল না দর্শিলে টেরিবিস্ ব্যবস্থা করা কলব্য ।

পূর্ব ঔষধ ছইটীতে ফল না দর্শিলে কালী-বা—প্রস্রাব এককালে সঞ্চার না হওয়া ও মুত্রাশয় প্রদেশে বেদনা, বলক্ষয় । ইহার পর, বিশেষ পীড়িতের

প্রমেহ রোগ থাকিলে, অথবা মূত্রস্থালীর শক্তিহীনতা জন্ত কষ্টে ত্যাগ পক্ষে, কানাবিস-ই ।

ওপি—মূত্র সঞ্চার না হওয়া বা মূত্র দ্বারে অবরুদ্ধ থাকা বোধ । আকিম-থোরের পক্ষে বেল সেবন ও তাহার ভ্রাণ লওয়ায় উপকার হয় । প্রস্রাব বন্ধ ও বিকারের লক্ষণ দেখিলে—বেল, ষ্ট্রাম, ওপি, সিকুটা । ঐ অবস্থায় তলপেটে ঠাণ্ডা জলের পটী—( কেহ কেহ উহাতে স্নান সোরা মিশ্রিত করে ) ও তাহা নিয়ত আর্দ্র রাখা বিহিত । দেশী টোটকার মধ্যে পাথরকুটির পাতার প্রলেপ উপকারী ।

প্রস্রাব মূত্রস্থালীতে সঞ্চিত হইয়া তৎপ্রদেশ ক্ষীত থাকিলে—ক্যান্ফর, কাষ্ট, ওপি, লার্কাসি, ভেরাট । এই অবস্থায় বোতলে গরম জল পুরিয়া বুলাইলে আশু উপকার সম্ভব ।

ওলাউঠা সারিয়া দুর্বলতা পক্ষে চিন সর্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা সর্বপ্রথম দেওয়া বিধি । ঐ সঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ম থাকিলে কার্বো, চিন, সলফর ।

ফস-আ—বক্ষঃস্থলের দুর্বলতা, কথা কহিতে শ্বাসের ধ্বংসতা, রাত্রে অধিক ঘর্ম, স্বপ্ন-দোষ ।

রস—বিকার সারিয়া অতিশয় দুর্বলতা, নাড়ীতে অল্প অল্প জ্বর-বেগ, বুক ভার, ক্ষুধা-মান্দ্য ও উদরাময় ।

অনায়াস-জীর্ণ সুপথ্য ও এককালে অল্প পরিমাণে ও বহুবারে খাওয়া, শরীর, বস্ত্র, শয্যা, ঘরু প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা, সদা প্রফুল্ল থাকা, সাধ্যানুসারে কিছু কিছু ব্যায়াম করা এবং বিশ্বাস থাকিলে এই সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্ত জন্ত ইষ্টদেবের গুণ-কীর্তন করা কর্তব্য ।

রোগে দুর্বলতা ও দীর্ঘ কাল শয়নাবস্থায় থাকা নিমিত্ত কখন পৃষ্ঠ, পাছা প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয় । এক ভাগ সূরা ও দুই ভাগ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ আরোকে নেকড়া ভিজাইয়া সেই ক্ষত স্থানে দিবা এবং নিয়ত উহা দ্বারা ভিজাইয়া রাখিবা । ইহাতে প্রতিকার না হইলে আর্গিকার আদত আরোক ( Mother Tincture ) ২৬ ভাগ জলে নিশাইয়া পূর্বের স্থায় লাগাইবা । ক্ষত স্থানে পচা ধরিলে কার্বো ৫০ ক্রমের ৫০ ফোটা, অথবা ৬ ক্রমের আর্স ১০ ফোটা, অথবা চিনের আদত আরোক ৫০

ফোটা এক পোয়া জলে ফেলিয়া, ইহার যে কোন একটা পূর্বরূপে দিবা। শুঁড়া কয়লার পুলটিনও এ অবস্থায় ব্যবহার্য। যা ডগ্‌ডগে লাল হইলে বেল এবং গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পক্ষে বেল ও সল্‌ফর পর পর সেবন বিধি। পঁচাধরা অবস্থায় কার্বো, আর্স, সিকেল বা চিন, এবং যা হাড়ে গিয়া ঠেকিলে সিলিসা ; ক্ষত পূরিতে কালবিলম্ব হইলে সল্‌ফর বা সিলিসা।

ওলাউঠার পর চক্ষুর স্বচ্ছ আবরণীতে (Cornea) ক্ষত হওয়ার পূর্বাঙ্কে টের পাইলে সিকেল—নতুবা নিশ্চয়ই অন্ধ হয়। চক্ষুতে শিরা উঠা ও উহার ক্ষয় জন্ত পল্‌স, মুখে যা থাকা পক্ষে—নাইটি, আ, নেটম, মার্ক। গালের ও ঠোঁঠের ভিতর দিকে কদর্যা ভূর্গন্ধবিশিষ্ট যা থাকা পক্ষে—আর্স, সিকেল, সিলিসা। মাড়িতে যা ও তথা হইতে রক্ত পড়া—কার্বো, নাইটি, আ, মার্ক, ষ্টাকিস। রক্ত বন্ধ জন্ত আদত আর্গিকা আরোক ২০ গুণ জল সহ মিশাইয়া উহার কুলি •করিতে দেওয়া উচিত। বধিরতা পক্ষে ও ভাল না শুনিতে পাইলে কিম্বা বহু বসন্তের হইলে—সিকেল। পায়ের পাতাফুলায়—চিন, পল্‌স, ব্রাই, লাইক, সল্‌ফর।

হিক্কা অতিশয় •কষ্টকর, ইহা নিবারণার্থ বৈদ্যেরা মুড়ির জল দেন। কোথাও বা মাসকলাইয়ের ধূম ব্যবস্থা করেন। তুর্কলাবস্থায়, বিশেষ শিশু ও স্ত্রীলোকদের পক্ষে, উহা খাটে না। লবণের পুঁটলি গরম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে শেক বা তাপ লাগাইলে অল্পক্ষণ মধ্যে যন্ত্রণামুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। হোনিওপেথি মতে অনেকগুলি ঔষধ ব্যবহার হয় (“হিক্কা” প্রবন্ধ দেখ)।

আকন—হিক্কা দীর্ঘস্থায়ী। আর্স—হিক্কা আক্ষেপযুক্ত। কার্বো—নড়ায় হিক্কা। ইথের—জল বা ধূম পানের পর এবং নিত্রিত অবস্থায় ও •দম আটকান হিক্কা। ক্রপ্‌স, আ—উপর্যুপরি ৮।১০টা হিক্কা। ভেরাট—প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী হিক্কা। লাইক—খানিক খানিক অন্তর প্রচণ্ড হিক্কা। সিকুটা—সম্পদ হিক্কা এবং দূর হইতেও শুনা যায়, চক্ষু তেড়াবেঁকা, খাসকষ্ট ও দড়্‌কা। হিক্কা, গা বমি বমি ও মধ্যে মধ্যে বমন পক্ষে—আগ্‌স্।

ঔষধে উপসর্গ দমন না হইলে নেক্‌ড়া ভিজাইয়া ৪।৫ পুরু করিয়া পেটে দিবা, তাহার উপর ফ্লানেল বা গরম বস্ত্র দিয়া জড়াইবা। অল্প মতের চিকিৎসায় অধিক ঔষধ ব্যবহার দরুণ হিক্কা হইলে নক্স। অনেক সময় ক্রিমি জন্ত



এ উপসর্গ হয়, তৎকালে সিনা, বিশেষ ২০০ ক্রমের, দেওয়া বিধি। ইহাতে কুমি মারা যায়। মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা ছুধপানে যাতনার সমতার সম্ভব।

ওলাউঠা সারিয়া উপর পেট ফাঁপার পক্ষে নক্স এবং ঐ সঙ্গে মুখের কদর্যা দুর্গন্ধ থাকিলে মার্ক; ইহাতে কোন ফল না হইলে বা অল্প চিকিৎসায় অধিক কালোমেল বা পারা ব্যবহার থাকিলে সল্ফুর। ভেদ ও পেটফাঁপায় কার্বো; পেটফাঁপা ও কোষ্ঠবন্ধে ওপি; তলপেট ফোলা—জাইক. চিন; পেট দম্ভমে ফুলা—ক্যাপ্স। পেট ফাঁপিলে ঠাণ্ডা জলের পটী দেওয়া ও লেবুর পানা খাওয়ায় এবং কোষ্ঠবন্ধে অল্প ডাবের জলে ফল দর্শিতে পারে।

প্রকৃত রাধির হস্তে মুক্ত হইয়া উদরাময় বা ভেদ হইতে থাকিলে লক্ষণা-ল্যাবী ওষধের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অধিক খাটে।

চিন—অরুচি, ভেদ ও দুর্বলতা। ফস—অতিশয় দুর্বলকারী ভেদ। ফস-আ—ভেদে তত কাহিল করে না, এমন অবস্থায়। নক্স—পেটফাঁপা আম সংযুক্ত ভেদ, ঝেড়ে খোলসা না হওয়া। নাইটি-আ—অত্যন্ত ও বেগসহ আমবিশিষ্ট এবং পচাগন্ধের বাহ্যে, আহ্বারের পর মুখের তার তিক্ত এবং শবের শ্রায় মুখের গন্ধ, সেই সঙ্গে অল্প জরও থাকিতে পারে। পড—জলবৎ দুর্গন্ধ ও অকষ্টকর ভেদ বা মল আমে আবৃত, প্রাতে বৃদ্ধি। মার্ক—আম বা রক্ত ভেদ অথবা রক্তাতিসার। সল্ফ-আ—অকষ্টকর ও বড় দুর্বলকারী জর্দা বর্ণের ভেদ, টক উদ্গার।

নিয়ত গা বমি বমি থাকিলে—ইপি, টার্ট, টার্ট-এ, নক্স, পড। পান করার ১০।১৫ মিনিট পরে তুলিয়া ফেলা পক্ষে—ফস। গা বমি বমি, মুখে অধিক জল উঠা, বমন, নড়ায় বৃদ্ধি—লাকাসি। লেবুর পানা পানে ও ফ্লানেল বা কঞ্চল দিয়া পেট গরম রাখায় ফল দর্শিতে পারে। কফি—ওলাউঠা সারিয়া অনিদ্রা বা উত্তেজনা জন্ত অর্দ্ধ খোলা চক্ষে জাগিয়া থাকা পক্ষে। ক্যামো—পূর্বের শ্রায় লক্ষণ এবং অস্থির হওয়া বা ছটফট করা। বেল—চক্ষু মধ্যে লাল শিরা প্রকাশ ও তাহার পুত্তলি বিস্তৃত, সদা ঘুম ঘুম, কিস্ত হয় না। হাইবস—নিদ্রিত হইবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়া।

এই রোগকালীন বিবিধ-উপসর্গের মধ্যে কতকগুলি উপসর্গ ও তাহা-দিগের ওষধ এত্বে লেখা হইল।

অন্তর্জালা, আইটাই, গুড়াভয়—আর্স। পেট ও পাকশয় জালা, আর্টনাদ ও ছট্‌কটানি—আর্স, ক্যাম্ফর। প্রথমে অন্ন অন্ন ভেদ, পাক-স্থালী ও হাতপায়ে খাল লাগা, শরীর ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর। ভেদ বমি ও খাললাগা বন্ধ এবং রোগের পতন বা চরনাবস্থা—ক্যাম্ফর, কার্বো, ভেরাট, হাইড্রো-আ। অন্ন অন্ন ভেদ এবং পুনঃ পুনঃ ভয়ানক আক্ষেপ ও খাললাগা—আর্স, ইপি, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ভেরাট, সিকেল। ভেদ ও বমন অন্ন অন্ন বা উচ্চাদের অভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক খাললাগা—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, কস-আ, সিকেল। হাতপায়ে খাল লাগা এবং পাকশয় প্রদেশ স্পর্শে বেদনা—আর্স, ক্যাম্ফর, কস-আ, ভেরাট। রাত্রে আক্ষেপ ও খাললাগা—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, সিকেল, সিনা। রাত্রিকালে আক্ষেপ বৃদ্ধি পক্ষে—কুপ্রম, সিকেল, পতনাবস্থায় (ডায়া) শুষ্ক রক্ত ভেদ—কার্বো, মার্ক। রক্ত কলহানির ঝায়—রিসিনস ও রস। কুশল জল ভেদ—ইল্যাম্প। অরকালীন আনরক্ত—চিন, কস, মার্ক, ক্রোটন। পতনাবস্থায় স্বাস-কষ্ট—আর্জেন্ট-না, হাইড্রো-আ। পতনাবস্থায় ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয়—কস, টার্ট-এ। হিমাস্র, বদন নীল, স্বাস-থলতা, নাকীহীনাবস্থায়—কাক্স, আর্স। মলের স্বাভাবিক বর্ণ হইয়া ও অপর স্থলক্ষণ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা হওয়া পক্ষে—ভেরাট। পথ্য দেওয়ার পর পুনর্বার ভেদ ও বমন আরম্ভ হইলে—ভেরাট, আর্স, কুপ্রম, সিনা। বিকারে মস্তিষ্কের উপসর্গাদিক্য হইলে—বেল, রস। জ্বর এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ অভাব পক্ষে—ভেরাট।

ভেদ বমি আরম্ভ হওয়ার কিঞ্চিৎ পরে হস্ত পদাদিতে ঝিল লাগিলে, সর্ব প্রথমে হস্তদ্বারা তৎ তৎ স্থান ঘর্ষণ করিতে থাকিবা, অথবা রোগীর সহ হয় একরূপ গরম জল বোতলে পূরিয়া তথায় বুলাইবা। মদে নেকড়া ভিজা-ইয়া খিললাগা স্থলে লাগাইলে যন্ত্রণা সমতার সম্ভব। এ অবস্থায় কুপ্রম সেবন বিধি এবং লক্ষণ যুক্ত হইলে ইহার সহিত আর্স বা ভেরাট পর পর দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ফল না দর্শিলে সিকেল দেওয়া বিধি। জলে খানিকটা লবণ ও অন্ন সৌরা ফেলিয়া ফুটাইয়া সেই গরম জলে ফ্যামেল ভিজা-ইয়া ও উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া ইহার ভাব দেওয়া বা বাখার স্থানোপরি ঐ উষ্ণ বস্ত্র লাগাইয়া তাহা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে শীঘ্র সমতার সম্ভব।

পিপাসা হইলে অন্ন অন্ন ঠাণ্ডা জল ও টুকরা টুকরা বরফ দেওয়া বিধি । এ অবস্থায় উঠিয়া বসা, বা অধিক কথা কহা অবিহিত । নাড়ী ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্য অবস্থায় কার্বো, আর্স, হাইড্রো-আ ব্যবহার্য্য । শেষ বা স্বাসের অবস্থায়—কার্বো, আর্স, হাইড্রো-আ, কোত্রা, লাকাসি, নাজা, ক্রোটালস—এই অবস্থা রোগীর খাবি খাওয়া অবস্থা ।

ওলাউঠা সারিয়া উঠিলে—সামু, আরারুট, খই, জব ও ভাতের মণ্ড, গাদাল পাতার ও ( মংস্ত্র-আহারীদের ঐ সঙ্গে ) মাগুর বা সিদ্ধী মাছের ঝোল, লেবুর রস, ঘোল এবং এক-বন্ধা দুধ ও মিছরি পথ্য । তৎকালে জ্বর দেখা দিলে—আকন—৩৪ মাত্রায় না সারিলে এবং বিশেষ ঔষধের লক্ষণ অভাব ও একজরী অবস্থায় ব্রাই ও রস পর পর বিধি । জ্বা কুলেয় ত্রায় চক্ষুর রং মুখমণ্ডল আরক্তিম, রণের শির উঠা ও সেই স্থান দপদপানিতে—বেল ; হামড়াইতে ও পলাইতে উদ্যত হওয়া, অঙ্গ খেঁচুনি ও জ্বলে ঘেঁষ থাকিলে—বেল ও হাইয়স বা ষ্ট্রাম ; বিকারের অবস্থায় অঘোর ও অচেতন থাকা, বিড় বিড় করা, ডাকিলে উত্তর না দেওয়া, অসাড়ে মলত্যাগ, প্রভৃতি উপসর্গে—ফস-আ, ওপি, লাকাসি ; অত্যন্ত গাত্রতাপ, অতিশয় ভেদ বমন, শ্বাস-কষ্ট ও নাড়ীর ক্ষুণ্ণ অবস্থায়—আর্স ও লাকাসি পর পর ; বিকার সহ শিব-নেত্রে—সিকুটা ; কুন্কুন্-প্রদাহে—ব্রাই, ফস, লাইক ; পাকাশয়ের উপসর্গে—আর্স, নক্স, ব্রাই, পল্‌স, ফস ; অস্ত্রের উপসর্গে—ব্রাই, নক্স, মার্ক, ইপি ; মূত্রস্থানির উপসর্গে—কান্ত । ইহা ব্যবহারের পরও নাড়ীর ক্ষুণ্ণ ও অপ্রাপ্য অবস্থায় পুনঃ পুনঃ আর্স, ভেরাট, কার্বো বিধি । শরীরের যান্ত্রিক কার্য্য বন্ধ, নাড়ীহীন, বর্ণ নীল, এমন স্থলে কার্বো সহ ফস লারো প্রয়োগে অধিক উপকার সম্ভাবনা । বিকারের অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া, বদন কখন লাল কখন পাক্কাশ, আইচাই, পেট স্পর্শে ব্যথা, জলবৎ বাছে পক্ষে—আর্স ।

ওলাউঠাকালীন বর্ণ নীল পক্ষে—আকন, কাম্ফর, ভেরাট ; আর্স, কার্বো, সিকেল ; ইপি, ওপি ।

—ভেদ-আধিক্য—ভেরাট ; আর্স, ইপি, সেপি ; কুপ্রম, ফস-আ ।

—বমন-আধিক্য—ইপি, ভেরাট ; আর্স, জাট্রোফা ।

—খাললাগা—কাম্ফর, কুপ্রম, ভেরাট, সিকেল ; ইপি ।

ওলাউঠাকালীন—খাললাগা ও অসামান্য শোচ প্রস্রাবে—বেল, ষ্ট্রাম,  
হাইয়স ।

——খাললাগা—পায়ের ডিঙ্গে—কুপ্রম, কাম্ফর, ভেরাট ।

——শ্বাস-রোধ ও নাড়ীহীনতা—আস', ভেরাট ; কাম্ফর, কার্বো,  
হাইড্রো-আ ।

——শরীর বরফবৎ—ভেরাট ।

——অত্যন্ত বলক্ষর—আস', কার্বো, চিন, কেরম, ভেরাট, রস ।

### শিরঃপীড়া—মাথাব্যথা বা মাথাধরা ।

মস্তকের কোন অংশের বেদনাকে মাথাধরা কহে । অনেক সময় ইহা  
অল্প রোগের আনুষঙ্গিক, সুতরাং ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলে ইহাও মারে ।  
স্ফোটকাদি চর্মরোগ ইহাৎ বন্ধ, স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, সন্দি, অজীর্ণ,  
অনিদ্রা, দুর্বিত বায়ুসেবন, অধিক তাপ বা ঠাণ্ডা লাগা, কায়িক বা মানসিক  
অতিরিক্ত শ্রম, মারবীর ও মনের উত্তেজনা, অধিক (নেসা) মাদক দ্রব্য এবং  
চা প্রভৃতি গরম পদার্থ ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার অনিয়মে থাকা জন্ত, এই রোগ  
প্রকাশ পায় । এই রোগ অতিশয় ক্রুর । কোন কোন প্রকারের শিরঃ-  
পীড়া এককালে নিরাময় হয় না, তবে সাবধানে থাকিলে যাতনার লাভ হয় ।  
সময় সময় ইহাতে রোগীকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া ফেলে । জৌক ধরান শিঙ্গা  
বসান (Cupping) বা ফুস্তখোলায় আঁঠু প্রতিকার হয় দ্রুত, কিন্তু অধিক  
শোণিত নির্গত হইলে শেষে রোগীকে (বিশেষ দুর্বল বাঙ্গালীকে) কাবু  
করে । পুনঃ পুনঃ এইরূপ রক্তনোক্ষণে তাহাকে অকর্ম্মণ্য ও চিররোগী  
করিয়া ফেলে । রোগ আক্রমণ সময়ে ঠাণ্ডা জলে শুড়মুড়া পবাস্ত  
পায়ের পাতা ১৫।২০ মিনিট এবং মাথা, রগ ও কুহুই অবধি হাত ধৌত  
করায় পীড়ার প্রতিকার সম্ভাবনা । প্রাতে ব্যায়াম, প্রত্যাহ স্নান, গুরুপাক  
খাদ্য ও নেসা বর্জন, সকাল সকাল নিদ্রা যাওয়া এবং মনের ক্ষুভিত্তিতে থাকা,  
এই কষ্টদায়ক রোগ হইতে নিষ্কৃতির সহজ উপায় ।

এই ব্যাধি অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, তজ্জন্য ইহার চিকিৎসা প্রকরণ বাহ্যরূপে  
বিবৃত হইল ।

কারণাভ্যাসী শিরঃপীড়ার ঔষধ, যথা ;—

মাথাধরা—আবাত বা চোট লাগাজন্ম—

আণিকা, পিট্টোল, মার্ক, রস, সিকুটা ।

—আতঙ্গ বা ভয় জন্ম—আকন, ওপি  
কস আ ।

—আত্মমৈথুন জন্ম—চিন, জেলস, নঙ্গ,  
কস আ, ষ্টাকিস, সলফর ।

—আত্মদ জনা—ওপি, ককি, স্কুটেল ।

—(অতিরিক্ত) ইন্দ্রিয় (কামপ্রবৃত্তি)  
চরিতার্থতা জন্ম—আগ্রস, চিন, জেলস,  
থুজা, নঙ্গ, কস, কস আ, সলফর ।

—উপাদেয় ও গুরু আহার হেতু—নঙ্গ,  
পলস, ভেরাট ভি ।

—ঔষধ (অধিক পারিমাণে) সেবন হেতু—  
নঙ্গ ।

—আফিম খাওয়ার—আসাতিক আ, বেল ।

—কাওয়া পানে—কক, কামো, নঙ্গ, পলস,  
বেল, মার্ক, লাইক, হিপার ।

—কামোমিলা চা পান জন্ম—পলস ।

—কুইনাইন ব্যবহার জন্ম—আণিকা,  
আর্স, ইউপাট, ইগ্রে, ইপি, কার্বো, নঙ্গ,  
নেট্রম, পলস, লাকাসি, সলফর, সিনা ।

—গন্ধক ব্যবহার জন্ম—পলস ।

—চা ব্যবহার জন্ম—সেলেনম ।

—তামাক ব্যবহার জন্ম—আকন, আট,  
আসাতিক আ ।

—তামা ব্যবহার জন্ম—হিপার ।

—ধাতু ব্যবহার জন্ম—সলফর ।

—পাণা ব্যবহার জন্ম—আইড, আরম,  
কার্বো, চিন, নাইটি আ, পিড, পলস,  
সলফর, সার্স ।

মাথাধরা—বিষের পান জন্ম—কক, রস ।

—লেমনেড (লেবুর পান) ব্যবহার জন্ম—  
সেলেনম ।

—লৌহ ব্যবহার জন্ম—জিংক, পলস ।

—সুঁরা ব্যবহার জন্ম—আট, আর্স, টপি,  
ককি, কার্বো, নঙ্গ, নেট্রম, পলস,  
লাকাসি, সলফর, সিনা ।

—গরম (অধিক) জন্ম—কার্বো, বেল,  
ব্রাই, সিলিসা ।

—গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওন জন্ম—  
ডাক্সা ।

—গরমির গীড়া জন্ম—আরম, নাইটি আ,  
মার্ক, সার্স, হিপার ।

—গাড়ী বা নৌকা চড়া জন্ম—আইড,  
কক, কালী, আফাইট, নাইটি আ ।

—দর্দ বন্ধ জন্ম—আকন, আফেনি

—চুল ছাটা জন্ম—ফস, বেল ।

—তাপ জন্ম—আকন, আণিকা, ইগ্রে, টপি,  
কাম্প, বেল, ব্রাই, সিলিসা । বিশেষ  
অগ্নিতাপে—কার্বো, বারাইটা ।

—তাপ সৃষ্ণোর—গ্লোবো, নঙ্গ, নেট্রম, ট্রাম

—ব্রবাদি তোলা জন্ম—আণিকা, ব্রাই,  
রস ।

—পরিবর্তনশীল আবহাওয়া জন্ম—কার্বো,  
নঙ্গ, ব্রাই, রস, রোড ।

—পান (ঠাণ্ডা) জন্ম—আকন, আর্স,  
পলস, বেল ।

—প্রস্রাব বন্ধ জন্ম—আফেনি ।

—বাতাস ঠাণ্ডা জন্ম—কার্বো আ, নেট্রম,  
ফেরম, রোড ।

মাথাধরা—ঠাণ্ডা ও অর্ধ জ্বর—আন্টিয়া, ডক্কা,

—দন্কা জ্বর—আস', কলসি, নক্স, বেল।

—রক্ত জ্বর—আকন।

—বায়াম (বাহিরে) জ্বর—আম, কাঙ্কা  
পিট্রোল, সাবাড, হিপর।

—বিকম্পন (Concussion) জ্বর—  
আর্গিকা, ককু, ফস, পলস, বেল, হিপর।

—মানসিক উত্তেজনা জ্বর—ইগু, জেলস,  
ফস-আ।

—মানসিক শ্রম জ্বর—আর্গিকা, ইগু,  
কাঙ্কা, চিন, নক্স, পলস, সল্ফর, সেপি।

—ম্যালেরিয়া (পুঁতি বাষ্প) জ্বর—আণ্ট,  
আন্টিস, আঁকা, আস', ইউপাট, ইপি,  
ক্যাপ, কার্বো, কাঙ্কা, চিন, নক্স, নেট্রম,  
পলস, ভেরাট, রস, লাকাসি, সল্ফর,  
সিনা।

—রস-রক্ত ক্ষয় জ্বর—চিন, নেট্রম, ফস-আ।

—রাতি জাগরণ জ্বর—ককু, কলসি, চিন,  
নক্স, পলস, ব্রাই, সল্ফর।

—রাগে (কথার প্রতিবাদ জ্বর)—আকন,  
ওপি, কার্বো, কফি, কলসি, কামো,  
নক্স, নেট্রম, ফস, রস, লাইক।

—লজ্জা পাওয়া জ্বর—ওপি।

—সর্দি জ্বর—আকন, আণ্ট, কামো,  
চিন, ডক্কা, নক্স, পলস, বেল, ব্রাই।

—স্নান জ্বর—আণ্ট, কাঙ্কা, পলস, রস।

—ফোটক অন্তহিত জ্বর—আণ্ট, মেজের,  
সল্ফর, সোরিন।

সময়ানুসারে শিরঃপীড়া।

মাথাধরা—প্রতি বসন্তকালে—নেট্রম-স।

—বসন্তে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল  
থাকা—গ্লোনোইন

—প্রতি পূর্ণিমায়—নেট্রম-কা।

—প্রতি পক্ষে (১৫ দিন অন্তর)—সল্ফর।

মাথাধরা—২য় বা ৩য় সপ্তাহে এবং ৩৪ দিন  
পর্যন্ত থাকা—ফেরম-আ।

—সপ্তাহে (৭ম দিনে)—সল্ফর, সিলিসা।

—৩য় বা ৪র্থ দিবসে—আরম।

—নিয়মিত (এক) সময়ে ধরা—আরান।

—নির্দিষ্ট কালে—নেট্রম-কা।

—প্রত্যহ—আস', কাঙ্কা, কোনাই, নক্স,  
নেট্রম, বেল, লাকাসি, সল্ফর, সাবাড,  
সিলিসা, সেপি।

—প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে—আস', জেলস।

—কিন্তু রোজ রোজ—আণ্ডি ধরা-  
ফর্মিকা।

—এক দিন অন্তর—আস', আলুমি, চিন,  
ফস।

—একদিন অন্তর নিদ্রাভঙ্গের পর—ইউ-  
পাট, ওপি।

—সকালে—আম, নেট্রম, পলস।

—প্রত্যহ সকালে—সেপি, হিপর।

—ভোর হইতে আরম্ভ হইয়া (প্রাতে) ৮টা  
অবধি থাকা—নাইটি-আ।

—ভোরে ও মধ্যাহ্নে অসহ—টাবাক।

—সকাল হইতে ১০টা পর্যন্ত থাকা—  
নেট্রম। ১০ টায় বা ১০।০ টায় মাথা  
ধরা—হাইয়স।

—সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত—ইপি,  
নেট্রম, ফস, সেপি।

—সকালে, ১২টার অধিক হইয়া, পরে কমা  
ও সন্ধ্যা ৭টায় পুনঃ প্রকাশ—চেলি।

—সকাল হইতে দুই প্রহর অবধি বৃদ্ধি,  
পরে ক্রমশঃ কমা—সল্ফর।

—সকাল হইতে দুই প্রহর অবধি বৃদ্ধি,  
ও সন্ধ্যায় এককালে—গ্লাওয়া - কালী-  
বাই, নেট্রম, সান্‌হুই, স্পাইজি।

- মাধ্যাহ্ন—সকালে আরম্ভ হইয়া দিনে বৃদ্ধি ও  
সন্ধ্যায় নরম পড়া—নম্র।
- সকালে আরম্ভ এবং বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে  
কম পড়া—কাস্টিক।
- সকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত—চিন।
- মধ্যাহ্নে—আক্টিয়া, গ্রাফাইট, নেট্রম;  
ও প্রত্যহ ১২ টায়—আর্কেট-মে,  
কোনাই।
- মধ্যাহ্ন আহ্বারের পর ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি—  
জিংক। এবং পর দিন প্রাতঃকাল  
অবধি থাকা—লোবেলা।
- দুই প্রহর বেলা হইতে দ্রাতি ১০টা—  
ফর্মিকা।
- দুই প্রহর বেলায় আরম্ভ হইয়া সারা  
রাত্রি থাকা—কুপ্রম, ভেরাট।
- বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত  
থাকা—মাগ্নিসা।
- ২টা হইতে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত থাকা—  
বাডিয়গা।
- ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত থাকা—  
লাইক, হেল।
- ৫টা হইতে, রাত্রি ৩টা বা ভোর  
পর্য্যন্ত থাকা—বেল।
- সন্ধ্যায়—আইরিস; ও শয়নকালীন—  
পলস।
- সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত—  
লোবেলা; সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত—  
কলচিক।
- দুই প্রহর রাত্রি হইতে ভোর পর্য্যন্ত—  
হিপর।
- দুই প্রহর রাত্রি হইতে পরদিন বেলা  
১টা পর্য্যন্ত—নেট্রম।
- দুই প্রহর রাত্রির পর—ফস-আ।
- মাধ্যাহ্ন—রাত্রি ৩ টায়—বোভিষ্টা।
- রাত্রি ৫ টায়—কালি-আ।
- রাতে ঘুম ভাঙ্গায়—চেলি।
- সূর্য্য উদয় হইতে অন্তে যাওয়া পর্য্যন্ত—  
কালী বাই, নেট্রম। প্রত্যহ—গ্লোনো-  
ইন, স্পাইজি।
- সারাদিন পুনঃ পুনঃ ধরা—টেরিবিহু।
- এক দিবসে অনেক বার, বা বহুদিন  
অন্তর ধরা—আইরিস।
- এক লাগাড়ে—আর্জেট-মে, কানাবিস,  
কুপ্রম, ডকা, নেট্রম, ফস, রস বা;  
২১৩ দিন থাকা—ক্লোকস, এবং  
বহু মাস বা বৎসর পর্য্যন্ত থাকা—  
টেরিবিহু।
- সন্দির মাধ্যাহ্ন (Catarrhal)—আকন,  
আর্স, ইউফ্রে, ইগ্রে, কামো, কালী, চিন,  
জেলস, নম্র, নেট্রম, পলস, বেল, ব্রাই, মার্ক,  
মেজের, সল্ফর, সাসুই।
- পেটের পীড়া জন্ম (Gastric)—আইরিস,  
আকন, আট্রোফা, আট, আপিস, আর্স, ইউ  
পাট, ইগ্রে, ইপি, ওপি, ককু, কলসি, কামো,  
কামো, কার্বো, কাকা, কাস্টিক, জেলস, নম্র,  
পলস, প্লাটিনা, ভেরাট, লাইক, লাকাসি,  
সল্ফর, সিলিসা, সেপি।
- রক্তঃ সঞ্চালী (Menstrual)—আগ্নস,  
আপিস, আর্স, ইগ্রে, ককু, কফি, কামো,  
কাকা, ক্রোমিস, জিংক, জেলস, নম্র, নেট্রম,  
পলস, প্লাটিনা, বেল, ব্রাই, ভেরাট, লাইক,  
লাকাসি, ষ্টানম, সল্ফর, সিলিসা, সেপি,  
হাইরস, হেল।
- স্নায়বিক (Nervous)—আকন, আট্রোফা,  
আপিস, আর্গিকা, আর্স, ইগ্রে, ইপি, ওপি,  
কাক্টস, কামো, কাকা, কাস্টিক, গ্রাফাইট,

প্রোবো, চিন, জিংক, জেলস, নগ্ন, নেট্রম, পলস, ফস, ফস আ, বেল, ব্রাই, ভেরাট, রস, সল্ফর, সিলিসা, সেপি ।

• বাতের ( Rheumatic )—আকন, আম ম, আন্সেল্লি, ইগ্নে, কলসি, কামো, কালো, কাটক, চিন, নগ্ন, নাইট্রা, পড, ফস, ফাইটো, বেল, ব্রাই, মার্ক, রস, লাইক, লাকাসি, লেডম, ট্রাম, সল্ফর, সিলিসা, স্পাইজি ।

মাথাধরা—কাশিকালীন—কাপ্স, কার্বো, কালী-কা, সল্ফর ।

—কাশির পর—ইপি, ট্রাম ।

—মৃগী রোগ আক্রমণকালীন—কুপ্রম, ( পূর্বে—সিনা । )

—স্রীলোকের জীবনের শেষ সন্ধিকালে ( Critical )—কার্বো, লাকাসি । ( ঐ সময়ে রক্তক্ষরণের পরিবর্তে শিরঃপীড়া হওয়ায়—ক্রোকস ) ।

—তৎপূর্বে পেট কামড়ান—আলোস ।

—দৃষ্টি মালিন্ত—জেলস । কিন্তু খুব ধরার পর স্পষ্ট দৃষ্টি—কালী বাই ।

—সন্ধি হইবার উপক্রমে—কার্বো, পলস, লাকাসি ।

—নিদ্রাকালীন—কামো, মাগ্নি ।

—অনিদ্রার পর—হিপর ।

—সহ ক্ষুধা—সোরিন ।

—সহ চাৎকার—সিলিসা ।

—সহ প্রচুর প্রস্রাব—ইগ্নে, জেলস ।

—সহ মুচ্ছা—জেলস ।

—ঘাতনার ধমকে হতাশ—ভেরাট ।

—ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ক্রমশঃ কমা—ষ্টানম ।

—ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া হঠাৎ ছাড়া—ইগ্নে, আর্জেন্ট, সল্ফর ।

মাথাধরা—হঠাৎ—ইগ্নে, জেলস, বেল ।

—হঠাৎ, ও অল্পে অল্পে কমা—সাবিনা ।

—হঠাৎ, ও হঠাৎ ছাড়া—বেল ।

—প্রথমে সামান্য, ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও প্রচণ্ডতর, শেষে সামান্য হওয়া—প্লাটিনা ।

মাথাধরা বৃদ্ধি ।

মাথাধরা বৃদ্ধি—প্রাতে—আরম, আর্গিকা, আস' কাহ, কামো, কাকা, কোকা, কোনাই, নগ্ন, নেট্রম, পড, ফস, সেপি, স্পাইজি ; ( খুব ভোরে—ক্রোকস, চেলি ) ।

—সকাল ১০টার—নেট্রম

—দুই প্রহর বেলায়—আর্জেন্ট, কানা-মিস ই, কোনাই ; ( তৎপ্রাক্কালে—চেলি, টবাক, সল্ফর )

—দুই প্রহর হইতে বেলা ২টা পর্য্যন্ত—ডকা ।

—দুই প্রহর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—কালোফি ।

—বৈকাল ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—কাষ্টক

—বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত—লাইক ।

—বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত—পলস ।

—বৈকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত—মার্ক ।

—কেবল দিবসে—আম ম ।

—কেবল সন্ধ্যায়—মাগ্না, কা, সেপি ।

—রাতে ও অরাকালীন—হিপর ।

মাথাধরা—অবস্থা বিশেষে বৃদ্ধি ।

মাথাধরা বৃদ্ধি—আহারকালীন—আস', কক্ ।

—আহারের পর—আনাকার্ড, আম ক,



ককি, কার্বো, কাফাক, কোনাই, চিন, নক্স, ফস, সল্ফর।  
 মাথাধরা বৃদ্ধি—কথা কহায়—আইড।  
 কাওয়া পানে—ইগু, ককু, নক্স।  
 কাশিলে—আনাকার্ড, আর্গিকা, ইপি, কাপ্স, নক্স, ব্রাই, সল্ফর।  
 —কোলকুজা হইয়া বসায়—হামামে।  
 —গ্যাসের আলোকে—গ্লোনো।  
 —ঘুম ভাঙ্গায়—আর্গিকা, কোনাই, ফ্রোকস নেট্রম, লাকাসি।  
 —চা পানে—থুজা, সেলেন।  
 —চিন্তায় বা কান্নায়—ইগু, ককি, চিন, নক্স, ফস।  
 —চুল অঁচড়ানয়—রস ; (এ উন্টা দিকে নেট্রম ম)।  
 —চুল ছাটায়—ফস, দেল।  
 —টক দ্রব্য আহারে—লাকাসি।  
 —ঠাণ্ডা (শরীর নীতল) হইলে—হাইয়স।  
 —ঠাণ্ডা জল লাগায়—আর্স, কাফা, গ্লোনো।  
 —তমাক টানায়—ইগু, ককু।  
 —তাপে—আলোস, নেট্রম।  
 —দুখোর উত্তাপে—কাফা, গ্লোনো, নেট্রম কা।  
 —কুপানে—গ্লোমাই।  
 —নদ্রায়—ককু, মার্ক, লাকাসি।  
 —পানের পর—ককু, মার্ক।  
 —বাতাসে—স্পাইজি ; (এ গরম—আইড এ দমকা—চিন)।  
 —বাতাস ঠাণ্ডা—আইরিস, ককু, কান্সর, ডকা, সিলিসা।  
 —বাত্রে কান্নীন—কোনাই।  
 —শোক জন্ত—ইগু, ফস।

মাথাধরা বৃদ্ধি—শ্রম জন্ত—মেজের, হেল।  
 —সুরাপানে—গ্লোনো, জিংক, নক্স, লাকাসি।  
 —ফোটিক বন্ধে—নক্স, ম, সল্ফর।  
 —স্পার্শে—আকন, আরম, কোনাই, কুপ্রম, ফস, রস, সল্ফর, সিলিসা।  
 —হাঁচিকে—সল্ফর।

### মাথাধরা—সমতা।

মাথাধরার—সমতা প্রাপ্তে—বাডিয়াগা, বোভিরা  
 ও গাত্রোথানের পর—আলুমি, নক্স  
 —বেলা ১১টায়—আটোফা।  
 —মধ্যাহ্নকালীন—সিড্রন।  
 —মধ্যাহ্ন আহারকালীন—রেমিটস।  
 —সূর্য্য অস্তে—কোকা।  
 —সন্ধ্যায়—আটোফা, আর্গিকা, স্পাইজি।  
 —রাত্রি ৯টায়—কুপ্রম।  
 —রাত্রে—লারো।

### মাথাধরা—অবস্থা বিশেষে কমা বা সমতা।

মাথাধরার সমতা—অঙ্গকারে সাঙ্গুই, সেপি।  
 —আহারকালীন—লিথ।  
 —আহারের পীর—আইড, কোকা, চেলি, সোরিণ।  
 —একদৃষ্টি তাকানয়—আগুস।  
 —কপাল, চাপায়—বেল ; (খুব জোরে চাপায়—চিন, মাগি, স, সাঙ্গুই)।  
 —কথা কহায়—ইউপাট।  
 —কোলে লইয়া বেড়ানয়—বেল।  
 —যন্ত্র হইলে—নক্স, নেট্রম।  
 —চক্ষু খোলায়—চিন।  
 —চক্ষু মুদ্রিত করায়—কাফা, চেলি, সেপি।  
 —চুল অঁচড়ানয়—ফেরম।

মাথাধরা—ঠাণ্ডা জল পানে আকন, কালী ক

—ঠাণ্ডা জল মাথায় লাগনয় আলোস,  
কাকা।

—তমাক টানায়—আরান।

—তাপে—আস', কাপ্স, কালী, ট্রাম,  
সিলিসা, হাইয়স।

মাথাধরার সমতা নিদ্রায়—কল্কি, মনো,  
পড, সিলিসা, সেপি।

—পুস্তক পাঠে—কোনাই।

—বায়ু নিঃসরণে—সিকুটা।

—বায়ামে—রোড; (অল্প বায়ামে নেটম)

—বেড়াইলে—আরম, কাপ্স, কাহু, ড্রোস,  
হাইয়স।

মাথাধরা বৃদ্ধি—মাথা গোলায়—লাইক।

—মাথায় কিছু জড়ানয়—আর্জেন্ট-না,  
কাকা, পলস।

—মাথা নাড়ায়—কোনাই।

—মানসিক চিন্তায়—কাকা।

—শয়নে (অন্ধকার ঘরে—পড, সিলিসা,  
(চিত হইয়া, ইগুে,) (ধরা দিকে, আর্গিকা  
ইগুে, নল্ল, সেপি), (মাথা উচ্চ করিয়া,  
কাপ্স স্পাইজি।

—স্থির থাকায়—ককু, স্পাইজি।

—সোজা হইয়া বসায়—সিকুটা।

—স্পর্শ করায়—কলসি, কোনাই, সাইকো।

আইরিস—স্নায়বিক অথবা পাকাশয় ও বহুতের পীড়া জন্ত কপাল-ভার,  
গা বমি বমি, টক জল বমন, পেটব্যথা ও ভেদ এবং নেতিয়া পড়া, অথবা  
মাথায় হাতুড়ি পেটার জায় যাতনা অন্তত; কাশিলে বা ঠাণ্ডা বাতাসে  
নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি, কিন্তু দীর্ঘ গতিবিধিতে তাহার সমতা। প্রচণ্ড শিরঃপীড়া-  
সহ মুখমণ্ডলে, বিশেষ দক্ষিণ দিকে, স্নায়ু-শূল ও প্রচুর স্বচ্ছ প্রস্রাব হইলে।

আকন—রাগ, বিরক্তি, ঠাণ্ডা বাতাসে ঘাম বন্ধ এবং রক্ত উর্দ্ধগ জন্ত  
কপাল ও মাথাধরা, মস্তিষ্ক যেন ফাটিয়া বাহির হইবে বোধ হওয়া (বেল),  
দাঁড়াইলে মাথাঘোরা (পলস), আলোক, শব্দ ও অন্তঃস্পর্শ অসহ্য হওয়া,  
গা বমি বমি, তিক্ত বমন, জ্বর, অধৈর্য্য ও মরিয়া হওয়া।

আগ্নয়-কা—অধিক ইঞ্জিয় (কামপ্রবৃত্তি) চরিতার্থতা জন্ত, বাহাদিগের সর্বদা  
স্বপ্নদোষ হয় এবং জরায়ু, ডিম্বকোষ বা পুং-অঙ্গের পীড়া থাকে, এমত সকল  
বাক্তির শিরঃপীড়া থাকিলে, ঐরূপ সন্ধ্যায় ও নড়ায় বৃদ্ধি হইলে।

আণ্ট—অজীর্ণতা, হিম লাগা বা ফোটাকাদি বন্ধ জন্ত কপাল, রগ  
এবং ব্রহ্মতালু ব্যথা, মাথা ছেঁড়া ও ফাটিয়া পড়া বোধ, শীত শীত ও গা বমি  
বমি করা, বমনে উদ্যত, সিঁড়ি ভাঙ্গায় বৃদ্ধি, বাহিরের বাতাসে সমতা হওয়া।

আপিস—উদরের পীড়া ও পিত্তাধিক্য জন্ত মাথা জ্বালা, দপ্ দপ্ করা,  
নড়ায় ও নত হওয়ায় বৃদ্ধি। পুরাতন স্নায়বিক শিরঃপীড়া; মাথা ভার, ঘোরা  
ও ব্যথা, হাত দিয়া মাথা চাপায় কতকটা ও ক্ষণিক স্বস্তিবোধ করা।

আরম—হিষ্টিরিয়া বায়ু-রোগগ্রস্তের মাথা খঁয়াতুলান এবং উহার মধ্যে বুজ বুজ বা অভাবিধ শব্দ হওয়া, বিশেষ প্রাতে শয্যা হইতে উঠার পর বা চিন্তা কালীন ।

আরানিয়া—নিয়মিত সময়ে মাথাধরা, উঠিলে মাথাঘোরা এবং মস্তক ও হাত ক্ষীত হওয়া বোধ, অন্ন, কেবল মাত্র শীত, অথবা শীত ও পরে ঘামসহ তৃষ্ণা, ভয়ানক দন্তশূলুনি । তমাক টানায় যাতনার সমতা হওয়া ।

আর্জেন্ট-না—স্নায়ুপ্রধান ধাতু । মাথাঘোরা, পড়িবার সম্ভাবনা হওয়া, মাথাধরা, শরীর কাঁপা, গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া, মাথা খুব বড় হইয়াছে বোধ হওয়া, ওদাস্যভাব ও স্নানমনা, অস্থিরতা, সময় কাটে না একপ বোধ হওয়া ; গরমে, বাহিরের বাতাসে, রাজে, আলোকে ও মানসিক শ্রমে যাতনার বৃদ্ধি এবং মাথা হিসিয়া বাঁধায় সেই যাতনার সমতা । "

আণিকা—আবাত বা পড়া জন্ম পীড়া । নিয়মিত সময়ে মাথা ধরা, প্রাতে কপালে অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ রগ দিয়া মাথার পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত উহার বিস্তার এবং বৈকালে যাতনার একশেষ হওয়া । চক্ষুর উপর প্রদেশে বেদনা, কপাল ফুঁড়ুনি, শরীর ঠাণ্ডা, বদন গরম, পাকাশয় টাটান, চোয়াটেকুর উঠা, গা বমি বমি করা ও বমন হওয়া । দ্রুত চলিলে, সিঁড়িতে উঠিলে, নত হইলে, কথা কহিলে, চিন্তা করিলে ও আহ্বারের পর যাতনার বৃদ্ধি ; গরম ঘর অসহ বোধ, কিন্তু বাহিরের বাতাসে যাতনার সমতা হওয়া ।

আর্স—নির্দিষ্টকালে শিরঃপীড়া (বেল) । মাথা, বিশেষ কপাল, অতিশয় ভার হওয়া, কপালের স্পন্দন, প্রচণ্ড বমন, বিশেষ আহ্বার ও পানের পর । স্থির থাকায় বৃদ্ধি, নড়ায়, ত্প লাগানয়, গরম বস্ত্রে মস্তক আবৃত করায় যাতনার সমতা হওয়া । যকৃত-পীড়াগ্রস্তের "আদ কপালে" মাথাব্যথা । কখন পিত্তজনিত পেটব্যথা ও কখন বা ( বাতিকে ) স্নায়বিক শিরঃপীড়া, এইরূপ একের পর অপর পীড়া হওয়া ।

ইয়ে—মাথার এক পাশে ঘেন গজাল দিয়া বেঁধা, কপাল ফুটুনি, শয়নে ইহার সমতা, দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রদেশে অতিশয় বেদনা, মাথার এক দিকে বা পশ্চাতে ব্যথা—মস্তক কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপা হইতেছে বোধ হওয়া, চক্ষু আলা করা ও তাহা হইতে জল ঝরা এবং তাহার পাতা ফুলা,

আলোকে আতঙ্ক, তমাকের ধূমের গন্ধে রোগের বৃদ্ধি, ভয়তরাসে, নারী-কাঁঠুরে ও বদ্ধশোক জন্ত শিরঃপীড়া হইলে ।

ইথুসা—কপাল ফাটিয়া পড়া বোধ, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় হিকা, কাট-নেকার, বমন এবং শেষে ভেদ হইলে ।

ইপি—মাথা ও মাথার খুলি পঁয়াতুলান এবং জিভের গোড়া পর্য্যন্ত ব্যথার বিস্তার । গা বমি বমি করি ও বমন ( বিশেষ নত হওয়ায় বমন, ইহার প্রধান লক্ষণ—ভেরাট ) । তৈল এবং ঘৃতাক্ত বা চর্কিযুক্ত খাদ্য ও দিষ্টান আহারে শিরঃপীড়া ( আন্ট, নম্ম, পল্‌স ) ।

এস্কুলস-হি—পেটরোগা বা অর্শগ্রস্তের পীড়া হইলে ইহা বিশেষ খাটেন মাথা ভার, পূর্ণ ও তাহাতে চাপুনি ; মাথা ঘোরা ও উহার জড়তা ।

ওপি—ঐতিহাসিক আহ্লাদ, আতঙ্ক, রাগ বা লজ্জা জন্ত অস্থখ । তরুণ ব্যাধি, বিশেষ প্রাচীনের পীড়া হইলে, মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয় ও পেটের গোল জন্ত মাথা ধরা । স্নায়ু-প্রধান ধাতু, চটা স্বভাবের লোক ও যামান অধিক ক্লিময়, তাহাদের পক্ষে অধিক খাটে । মাথার দপদপানি, মাথা ভার ও ছেঁড়া, সকল পদার্থ ঘুরিতেছে বোধ হওয়া, চক্ষু নাড়ায় মাথার যাতনা, টক উদগার উঠা, বমনের ইচ্ছা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা ।

ককু—গাড়ী বা নৌকা চড়া জন্ত মাথা ধরা, ঘোরা ও গা বমি বমি, বমন (বেল), বিশেষ স্ত্রীলোকের ও ভয়তরাসে শিশুর পক্ষে । মাথা ছেঁড়া, দপদপানি ও ব্যথার ধমকে উঠিয়া রসা, কথা কহা, হাসা, শব্দ বা আলোক জন্ত বৃদ্ধি । কঠু কঠিন মল ভাগ, প্রথমে বাধক বেদনা পরে অর্শ-গ্রস্তার শিরঃপীড়া পক্ষে ।

কফি—মস্তিকে যেন গজাল মারা হইতেছে বোধ হওয়া । বেদনা জন্ত এককালে হতাশ হওয়া এবং ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা, বাহির হইলে এবং আলোক ও শব্দে যাতনায় বৃদ্ধি । মাথা যেন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে ছরকুটে পড়িবেক এবং মস্তিষ্ক খুব ছোট হইয়াছে বোধ হওয়া । এককালে অনিদ্রা, জ্বালাকর টক উদগার উঠা ।

কলসি—আদ-কপালে মাথা ব্যথা ও যাতনা জন্ত উঠিয়া বসা, ক্ষণ লুপ্ত বা থাকিয়া থাকিয়া শিরঃপীড়া, উদ্বিগ্নতা, বর্ষে প্রস্রাবের গন্ধ, মূত্র অত্যন্ত ও তাহাতে দুর্গন্ধ । বিরক্তি ও অজীর্ণের পর, বিশেষ বাতগ্রস্তের পীড়া ।

কাষ্টস—সূরা পান, রাত্রি জাগরণ, বিলম্বে আহার জন্ত শিরঃপীড়া ।  
প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ভয়ানক হওয়া এবং সেই সঙ্গে  
বমন । ঠাণ্ডী লাগায় স্নায়বিক মাথাধরা, যাতনায় মাথা ফাটিয়া পড়িবে বোধ  
ও মাথার দপ্‌দপানি এবং রাত্রি অসহ্য হওয়া । হৃৎরোগের দক্ষণ শিরঃপীড়া,  
রোগীর শরীর প্রায়ই ক্ষীর্ণ । উঠিয়া বসিলে, আলোকে, শব্দে বা শ্রমে কষ্টের  
একশেষ, স্ততরাং স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়া, মাথা টেপা বা  
চাপায় স্বস্তি বোধ । নাসারন্ধ্র নিয়ত শুষ্ক থাকা ।

কামো—সন্দি হওয়া বা কাওয়া পান জন্ত ; স্নায়ুপ্রধান শিশুর, বেতোধাতু-  
বিশিষ্ট যুবুর, দস্তশূলগ্রস্তের বা প্রসবকালীন স্ত্রীলোকের মাথা ধরায় ইহা  
বিশেষ খাটে । মাথার এক দিক স্টেটে ধরা এবং চোয়াল অবধি উহা বিস্তৃত  
হওয়া ও কপাল দপ্‌দপানি থাকিলে । ক্ষিপ্তকারী বেদনা হইলে । একপার্শ্বে ও  
অধৈর্য্য রোগীর পক্ষে । মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি, নড়ায় লম্বতা হইলে ।

ক্যাম্ফর—মাথার পশ্চাভাগে হাতুড়ি পেটার ত্রায় যাতনা অল্পভব,  
কপাল বা মস্তকের বাম দিক ব্যথা এবং তথা হইতে যেন হাতের আঙ্গুল  
অবধি তাহার বিস্তার ও তৎসহ কম্প, বিশেষ দম্পতিত্ব নিয়মিত সহবাস না  
হওন নিমিত্ত ও নড়ায় যাতনার বৃদ্ধি হইলে ।

কার্বো—ক্লেশের শিরঃপীড়া সহ শীত, কম্প ও পা ঠাণ্ডা থাকিলে । অথবা  
রগের নিকট কোন একটা সংকীর্ণ স্থানে প্রচণ্ড বেদনা, নাক হইতে রক্তপড়া,  
মাঝে মাঝে চমকান, রোগীর বড় চট্টা স্বভাব হওয়া ।

ক্যালোফি—কপাল স্টেটে থাকা ও তথায় আলপিন ফুটান এবং রগে  
চাপুনি বা পেশীর ত্রায় যাতনা, বাম চক্ষুর উর্দ্ধে ব্যথা, দৃষ্টিমালিন্য ও চক্ষু  
হইতে প্রচুর জল ঝরা থাকিলে । স্নায়বিক বা বেতো এবং জরায়ু ও মেরুদণ্ডের  
পীড়া-সংঘটিত মাথাধরা থাকিলে ।

কাক্সা—স্নায়বিক শিরঃপীড়া, ধাতু-বিকৃতি অথবা স্ফোটক বন্ধ দক্ষণ শিরঃ-  
পীড়া, পুরাতন রোগ । প্রাতে মাথা দপ্‌দপানি ও সন্ধ্যা দিন থাকা ; সিঁড়ি  
ভাঙ্গায় মাথা ঘোরা । সমস্ত মাথা বা উহার অংশ বিশেষে অভিনব প্রকার  
শীতলতা বোধ, হাত ও পায়ের পাতা ঘামা । সমস্ত মাথা বা কেবল কপাল, ডান  
দিক বা বক্ষতালু ব্যথা, দপ্‌দপ করা এবং তথায় হাতুড়ি পেটার ত্রায় অল্পভব,

মাথার খুলি বা তাহার অভ্যন্তরে শীতলতা বোধ, মাথার মধ্যে শব্দ হওয়া, মাথার খুলিতে দাদ ও তাহা স্পর্শ করিলে লাগা, চুল উঠিয়া যাওয়া, জ্বীলোকের রজঃ শীত্ৰ শীত্ৰ ও প্রচুর পরিমাণে আসা এবং দীর্ঘকাল থাকা পক্ষে ।

ক্রোকস—বামার শেষ সন্ধিকালে রজঃ বন্ধ হইয়া সেই সময়ে ২১৩ দিন প্রায় এক লাগাড়ে মাথাধরা ও অনিদ্রা । প্রচণ্ড মাথাধরা, গা বমি বমি, কখন কখন কেবল প্রাতে। অথবা ডান চক্ষুর পার্শ্বে বা মাথার পশ্চাভাগে ডান দিকের বেদনা, বিশেষ যে সকল জ্বীলোকের জরায়ু হইতে অধিক রক্ত ভাঙ্গে, তাহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী । চক্ষুর সম্মুখে জাল থাকা বোধ । নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

গ্লোনোইন—জ্বীলোকের এবং স্নায়বিক ও রক্তাধিক্য-ধার্ত্ত পক্ষে বিশেষ খাটে । অধিক আতপতাপ লাগায় পীড়া হওয়া । সূর্য্য উদয়ে আরম্ভ হইয়া রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং অস্তে যাওয়ার পর ক্রমশঃ কমা । মাথার পশ্চাভাগে অত্যন্ত ব্যথা ; খুলি ফাটিয়া মস্তিষ্ক বাহির হইবে, এক্রূপ বোধ হওয়া । মস্তিষ্ক সিকির (১০) আকারের একটা নির্দিষ্ট স্থানে প্রচণ্ড স্নায়বিক ব্যথা, গলার পূর্ণতা বোধ, দম অটকাইয়া যাওয়া । মাথায় রক্ত সঞ্চয় ও উহা অতিশয় ঘোরা । মাথা নাড়ায়, নত কুরায়, সিঁড়িতে উঠায়, সূর্য্যতাপে, গ্যাসের আলোকে লেথা পড়ায় ও সুরাপানে বৃদ্ধি ; মাথায় ঠাণ্ডা জল লাগানয় মাথার আক্ষেপ । মাথা চাপায় ও তাহাতে বাহিরের বাতাস লাগায় যাতনার সমতা ।

চিন—ফল্গুখোলা বশতঃ অধিক রক্তপাত ও বহু দিন অবধি সন্তানকে স্তনপান করিতে দেওয়া নিমিত্ত মাথা দপ্দ্দপানি । সর্দি জন্য কপাল ফেটে পড়া, মস্তিষ্ক টাটান, এক দ্বিগু অন্তর ব্রহ্মতালু বেদনা এবং নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে বেড়ানয় স্থিতি বোধ । মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি । কখন শয়নে অশক্ত, কখন উঠাতে আরাম বোধ (চিন-স) । স্নায়বিক শিরঃপীড়া এবং থাকিয়া থাকিয়া নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পাওয়া ।

জিঙ্ক—পুরাতন রোগ ; দৃষ্টি-মালিন্দ্ৰ, দক্ষিণ চক্ষুর ফুঁড়ুনি, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, যখন তখন বমন ।

জেল্‌স—পেটের গোল জন্য মাথা ধরা । বেদনা হঠাৎ বাড়ে আরম্ভ

হইয়া সমস্ত মস্তকে বিস্তীর্ণ হওয়া, অথবা কপাল হইতে ব্যাথার ঘাড়ে নামা এবং ঐ সঙ্গে দৃষ্টি-মালিণ্য বা দ্বিভ্র দেখা ; চেয়ে থাকা বা চক্ষু খোলায় নেমা হওয়ার ন্যায় কষ্ট অনুভব । মাথা বোরা ও অত্যন্ত ভার এবং উহা যেন খুব বড় ও হালকা হওয়া বোধ ।

খুজা—বাতগ্রস্তের এবং সাইকোসিস Sycosis চর্মরোগ অথবা গরম-পীড়া-গ্রস্তের পুরাতন স্নায়বিক শিরঃপীড়া । প্রায়ই মাথার বাম ভাগে, কেচিং বা সম্মুখে ব্যথা করা ও বদন অবধি উহার বিস্তার হওয়া । মাথায় গজাল বেঁধা, উহার মধ্যস্থলে ভিতর হইতে উর্দ্ধভাগে ঠেল মারার স্থায় বোধ । শব্দায় বা গরম বস্তু ও স্থির থাকায় বৃদ্ধি, উর্দ্ধ দৃষ্টি অথবা মস্তক পেছন দিগে হেলা-ইলে স্বস্তি বোধ করা ।

নক্স—হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের প্রচুর রজঃক্ষরণ নিমিত্ত, মানসিক শ্রম, অতিরিক্ত কাওয়া বা সুরাপায়ী এবং এবং আত্মমৈথুনকারীর শিরঃপীড়া । মাথা ফুঁড়ুনি ও কঁটে পড়া বোধ—অধিকাংশ সময় প্রাতে আরম্ভ হইয়া দিবসে বাড়িতে থাকা এবং সন্ধ্যায় কমিয়া যাওয়া, ঐ সঙ্গে দৃষ্টি-মালিণ্য, নাক বন্ধ, শব্দ ও আলোক অসহ্য হওয়া ; বুক ধড়ফড়ানি থাকিলে ।

নেট্রম—ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাধরা আরম্ভ হওয়া, লেখা পড়ার শ্রম ( বিশেষ বালিকার ) জন্ত রোগ, কথা কহায় বৃদ্ধি হইলে ।

পড—পিত্তাধিক্য জন্ত বা বাতগ্রস্তের কিম্বা অতিরিক্ত পারদ ব্যবহারকারীর শিরঃপীড়া । বস্তুতঃ জড়তা ও যথাবিহিত কার্য না হওয়া, প্রাতে ব্রহ্মতালু উত্তপ্ত ও তাহাতে ব্যথা ধরা, রগধরা ; উদরাময় ও শিরঃপীড়া পর্য্যায় ক্রমে হওয়া । প্রাতে বৃদ্ধি ; চাপায় নিদ্রায়, স্থিরভাবে ও অন্ধকারে শয়নে সমতা ।

পল্স—অধিক পড়া, কাওয়া বা কামোমিলা না পান, তৈল ও ঘৃতাক্ত বা চরবিষুক্ত খাদ্য ভোজন, অধিক কুইনাইন, গন্ধক, লৌহ বা পারা ব্যবহার, রাত্রি জাগরণ বা ঠাণ্ডালাগা জন্ত শিরঃপীড়া । বাহারা মোটা ও যাহাদের রজঃবন্ধ বা বিলম্বে বা অত্যন্ত ক্ষয়ে এবং যাহাদের মূত্র ও কাঁহনে স্বভাব, এমনত সকলের পক্ষে ইহা অধিক থাকে । মাথা ছেঁড়া, ফুঁড়ুনি এবং উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে বা নত হইলে মাথা বোরা, প্লা বমি বমি করিলে, বমন হইলে এবং জলের তার তিক্ত লাগিলে । বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বাতনায়,

ভেজায়, গরমে ও আবদ্ধ গৃহে রোগের বৃদ্ধি, মাথা চাপা ও বাঁধায় এবং বাহিরের শীতল বায়ুতে স্বস্তি বোধ হইলে ।

প্লাটিনা—হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের ও স্নায়বিক শিরঃপীড়ার । মাথার এক দিক ব্যথা, অল্প দিক শীতল, রণে যেন দ্রুত বেঁদার জায় অল্পভব ও নড়ায় বৃদ্ধি । বেড়াইবার সময় মস্তিষ্ক কাঁপিতে থাকা এবং কাণের ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া ; ঋতু কালে যাহাঙ্গের রজঃ প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী, তাহাদের পক্ষে বিশেষ খাটে । দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা, ও অচেতন হইবার উপক্রম হওয়া, পরে হংকম্প ও মাথা ধরা । রাগ বা বিরক্তি এবং জরায়ুর পীড়া হইতে রোগের উদ্ভব ।

ফস-আ—অতিরিক্ত বা পুনঃ পুনঃ মনের উত্তেজনা (শোঁক, বিরক্তি) জন্ম, অথবা ভয়াবহ এবং অতিশয় বলক্ষয়কারী তরুণ ব্যাধি আরোগ্যের পর শিরঃপীড়া ; ব্রহ্মতালুস্থিত মস্তিষ্ক পেষণের জায় অল্পভব । মাথা ভার, প্রচণ্ড মাথাধরা ও ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া । জ্বীলোকের আগুড়ি ও দীর্ঘ স্থায়ী রজ্জুকরণ সহ যকুতে ব্যথা । আহারের পর রোদ্ধ প্রকাশ ; শব্দে, বিশেষ গান বাদ্য শ্রবণে বৃদ্ধি—শয়নে সমতা ।

ফেরম—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় ও গুপ্তগুপ্তি শব্দ হওয়া, থাকিয়া থাকিয়া মাথায় হাতুড়ি পিটুনির জায় বোধ ; বদন কখন লাল, কখন বা পাঙ্গাশ বর্ণ, যাতনার ধমকে উঠিয়া বসা ।

বেল—উদরাময় জন্ম শিরঃপীড়া । মাথা ফাটিয়া পড়া বোধ, মাথার দক্ষিণ দিকে ফুটা করার জায় যাতনা ; মাথা গুপ্তগুপ্তি, দপ্দ্দপানি ও ঘোঁরা, নিয়মিত সময়ে বা নিয়ত ধরিয়া থাকা, নড়ায় এবং আলোক ও শব্দে তাহার বৃদ্ধি, যাতনা জন্ম জ্ঞান শূন্য হওয়া । গা বমি বমি ও বমন, অস্থিরতা, অনিদ্রা, প্রলাপ, চমকানি—বিকাল ৩ টায় বৃদ্ধি ।

ব্রাই—সকালে নিজা ভঙ্গে মাথা ধরা এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি, অথবা সকালে ব্যথা ও বিকালে যাওয়া, আবার সন্ধ্যায় তেজে ধরা । মাথা ফেটে পড়া ; নড়া, কাশা, হাঁচা বা নত হওয়ায় বৃদ্ধি, বসিতে গেলে মূর্ছিতপ্রায় হওয়া—টক বা তিক্ত বমন হইয়া কখন তাহার সমতা হওয়া ।

ভেরাট-আ—স্নায়বিক মাথাধরা, ভয়ানক ব্যথার ধমকে হতচেতন ও



নিরাশ হওয়া, দুর্বল ও সর্বদা ঠাণ্ডা ঘাম, ব্রহ্মতালু শীতল, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও গা বমি বমি এবং বলক্ষয়কারী ভেদ, কখন বা ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, খতু কালীন স্নায়বিক শিরঃপীড়া ।

ভেরাট-ডি—মাথা ফাটিয়া পড়া বোধ, ঘাড়ে আরম্ভ, অথবা কপালস্থিত ডান রগে চক্ষুর সন্নিহিত প্রদেশে স্নায়বিক শূল, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিমালিন্ত্র কখন কখন দ্বিধ দেখা, ধমনী দপ্ দপ্ করা, ঘাড় ব্যথা করা, হিক্কার পর পিত্ত বমন, নাভি প্রদেশে কনকন করা ।

মার্ক—মাথা ব্যথা, ছেঁড়া, জ্বালা, বেঁধা; অধিকাংশ সময় আদ্যকপালে এবং কখন কখন দাঁত ঘাড় ও কাণ অবধি যাতনা, রাত্রে বৃদ্ধি সহ প্রচুর ঘাম ও শীত হওয়া । মাথা কসিয়া বাঁধা বোধ হওয়া ।

লাকাসি—প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বা মধ্যাহ্নে আহ্বারের পূর্ব কিম্বা আবহাওয়া পরিবর্তনে মাথা ধরা সহ গা বমি বমি ও ঝিম্নন; রগ দপ্ দপানি; মাথার পশ্চাৎ ভাগে বা চক্ষুর উপরে বা উহার খোঁদলে অতিশয় ব্যথা ও ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া; মাথা ছিঁড়িয়া বা ফেটে পড়া ও ঘোরা; বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে ব্যথা, কোমরে কাপড় রাখিতে কষ্ট অনুভব করা ।

সল্কর—প্রত্যহ বা ৭৮ দিন অন্তর মাথা ধরা, প্রাতে ও রাত্রে বৃদ্ধি। সমস্ত মাথা ব্যথা করা—কেটে পড়া, অথবা একদিগের পীড়া মাত্র—নড়ায়, বাহিরের বাতাসে এবং চিন্তা করায় বৃদ্ধি; খুলি স্পর্শে লাগা, চুল উঠা। মাথায়, বিশেষ কপাল ও রগে, চাপুনি, ছেঁড়া, দপ্ দপানি; ব্রহ্মতালু সর্বদা গরম; ( ঠাণ্ডা—ভেরাট, সেপি ) ভোরে অসামান্য বাহে; রোগা, একহারা, কোলকুঁজা ও অর্শ-গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ উগবোণী। স্ফোটক বদ্ধ দরুণ শিরঃপীড়া ।

সাইপ্রিডিয়ম—অধিক শ্রমের পর বা অভিনব, দৃশ্য দেখায় কিম্বা দীর্ঘ অনাহার থাকা জন্ত শিরঃপীড়া ।

সান্সুইনেরিয়া—মাথাধরা সকালে আরম্ভ ও দিবাভাগের সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সন্ধ্যা অবধি থাকা; সপ্তাহ অন্তর হওয়া, ( সাবান্ সিলিসা ) । জীলোকের স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তন অবস্থায় শেষ সন্ধিকালের মাথাধরা । শব্দে, আলোকে, নড়ায়, অঙ্গস্পর্শে বৃদ্ধি; নিদ্রায়, অন্ধকার গৃহে, ও স্থির থাকায় এবং ব্যথিত স্থান সজোরে চাপায় যাতনার সমতা ।

সার্সা—মাথার ডান দিক ধরা, ( বাম দিক—সিলা ) । বেড়ানয় ও রাতে বৃদ্ধি হওয়া ।

স্পাইজি—সকালে বা রাতে নিয়মিত সময়ে মাথাধরা ; মাথা ভার, চাপুনি যেন ফাটিয়া পড়িবে, এইরূপ বোধ করা । মাথা ছেঁড়া ; খনন করিতেছে, অনুভব হওয়া ; প্রত্যেক পদক্ষেপে মাথা টলমল করা, চক্ষু জ্বালা করা ও তাহা হইতে জল ঝরা এবং চক্ষুর গোলক খুব বড় বোধ হওয়া ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে হরিদ্রা বর্ণের দাগ থাকা ; সকালে মুখ কুলা ।

সিনিসি—সমস্ত কপাল কিম্বা কখন ডান, কখন বা বাম চক্ষুর উপর দপ-দপানি, কখন বা চক্ষু অভ্যন্তরে ( খুব ভিতরে ) তীব্র বেদনা । প্রত্যহ মাথা ধরা, কিন্তু এক দিন অন্তর বৃদ্ধি । সিঁড়ি ভাঙ্গিলে যেন ব্রহ্মর্তালি উঠিয়া পড়িবে এরূপ ষ্ণেধ । মাথার খুলিতে মস্তিষ্ক ধরে না এমন অনুভব ; অস্থিরতা, হর্কলতা, চিন্তাশক্তির হ্রাসতা ; মাথা কসিয়া বাঁধার যাতনার সমতা হওয়া ।

সিলিসা—কপাল ও মাথার পশ্চাভাগের দপদপানি । রগে আরম্ভ—হইল নাক, চোয়ালের হাড় ও দাঁত অবধি ব্যাপ্ত বিস্তৃত হওয়া । মাথার এক দিক ছেঁড়া ও সেই দিগের চক্ষুতে ফুঁড়ুনির স্থায় যাতনা । কথা কহায়, মানসিক শ্রমে ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি—গরম ঘরে ও নিজ্রার পর সমতা । আহারকালীন বেদনা কমা, পরে আবার বৃদ্ধি । কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ মাথা ঘামা বা খুলির সাড়াধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ ।

সেনেসিও—কপাল ও চক্ষুদ্বয়ের উপর তীব্র এবং ছেঁড়ার স্থায় বেদনা, মাথা খুব হাল্কা বোধ, কপাল উত্তপ্ত, হঠাৎ ঘূর্ণি এবং পুনঃ পুনঃ জ্বলন ও কাঁপুনি হওয়া ।

সেপি—অজীর্ণতা বা জ্বনন-যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা জন্ত মাথাধরা । গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালীন এবং সন্তানকে দীর্ঘকাল স্তন দেওয়া জন্ত শিরঃপীড়া । নম্রপ্রকৃতির পক্ষে এই ঔষধ অধিক খাটে । স্নায়বিক, হিষ্টিরিক ও ওঁদরিকের বা বাত জন্ত পীড়া হইলে । মাথা ফেটে পড়া জন্ত চীৎকার করা, কপাল বা ব্রগের স্পন্দন ও ফুঁড়ুনি, বদন হরিদ্রা বর্ণ, গা বমি বমি, আহারে ঘৃণা, বমন, হর্গন্ধ প্রস্রাব হইলে ও সেই প্রস্রাবের মেটে তলানি পড়িলে । পুরাতন রোগ হইলে এবং উপর পাতার গুরুত্ব জন্ত চক্ষু খুলিতে না পারিলে ।

সেলেনম—বাহ্যের বেগ দিবার সময় ধাতুক্ষরণ ও তৎকালে মাথা ধরা ; অনিদ্রা, দুর্বলতা, স্বপ্নদোষ হইলে এবং পুংশক্তির হ্রাসতা পক্ষে ।

হিপার—অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে এবং দুর্বল ও গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে । সেপিয়াতে কতক মাত্র উপকার পাইলে তৎপরে ইহা বিশেষ উপযোগী । ডান রগে বা নাকের গোড়ায় ভোরের সময় বিহুনি । গাড়ীচড়ায় মাথাধোরা । রাত্রে, অরের সময়, যাতনায়ুক্ত পুংশ' চাপিয়া শয়ন করিলে এবং নড়ায় বৃদ্ধি হইলে । উঠার পর এবং পাইচারি করায় সমতা হইলে ।

### সর্দি-গর্শ্ম ।

সর্ব শরীরে, বিশেষ মস্তকে, অধিক সূর্যাতাপ লাগায় এই পীড়া হয় । শীত, তাপ, মাথা দপ্ দপ্ ও উহার ভিতরে টলটল করা, চেতনাশূন্য হইয়া নেতিয়া পড়া, মস্তিষ্ক-প্রদাহের কতকগুলি উপসর্গ । পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ও লু চলিতে আরম্ভ হইলে, ইহা অধিক হয় । তথাকার লোক কাঁচা আম্র পোড়াইয়া তাহার পান্য করিষ, খাইতে দেয় ও গায় মাথায় ।

আকন—মাথায় অধিক পরিমাণে সূর্যতেজ লাগা ত্রুণ অত্যন্ত মাথা দপ্‌দপানি, বদন লাল, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা হইলে ।

বেল—মাথা ফেটে পড়া, মাথা নত করায় উহার বৃদ্ধি । কপাল দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইবে এরূপ বোধ এবং উঠিতে গেলে ঘূর্ণি হওয়া, চক্ষু ব্যথা ও জ্বালা করা এবং আলোক অসহ্য হওয়া ।

ব্রাই—মাথা ফেটে পড়া ও নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, বসিতে গেলে গা বমি বমি করা ও মুচ্ছিতবৎ হওয়া ।

কার্বো—মাথাধরা, ভার, দপ্‌দপ করা, চক্ষু বেদনা ও উহার উপর চাপুনি, এক দৃষ্টিতে দেখায় যাতনার বৃদ্ধি । ক্যাম্ফর এবং ওপিয়মও ব্যবহার্য্য । প্রথম প্রথম ঘন ঘন—১৫।৩০ মিনিট পরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর—ঔষধ ব্যবহার বিধি । ঠাণ্ডা বা বরফ জল মাথায় প্রয়োগ এবং অল্প অল্প পান করিতে দিবা ।

গ্লেনোইন—মাথা ঘুরিয়া হঠাৎ অজ্ঞান ও অচেতন হইয়া পতন । সর্ব-শরীর, বিশেষ মস্তক ও বদন অধিক উত্তপ্ত ও লাল হওয়া, নাড়ী অতিশয় দ্রুত, দমআটকানপ্রায় নিঃশ্বাস, বমন ও ভেদ হওয়া ।

সন্ধি-গর্শ্বি সারিয়া কপাল ব্যথা এবং মাথার ঘূর্ণি ও জড়তায়—বেল ;  
বৃক্ ভায় এবং মাথার পশ্চাতে ও পীঠে বেদনায়—য়েনো ; নিকটস্থ ঠাণ্ডা  
ঘরের ভিতর লইয়া গাত্রের কাপড় খুলিয়া ঠাণ্ডা জলে অঙ্গ মার্জনা  
করিবা । সারিবার উপক্রম হইলে গরম চা চিনির সহিত পান করার উপ-  
কার হয় ।

### সংক্রাস ।

ঘাড়ে গর্দানে সমান, প্রশস্ত স্বন্ধ ও বক্ষঃস্থল, নেয়ো-পেট এবং রক্ত-প্রধান-  
ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিরই সংক্রাস অধিক হইয়া থাকে । যুবা অপেক্ষা প্রৌঢ় ও  
বৃদ্ধদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায় । এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে, কোন  
পীড়া নাই, অথচ হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়ে । বদন সরস ও নীল বর্ণ,  
কষ্টকর শ্বাস গ্রহণ, নাক ডাকা এবং শ্বাস ত্যাগকালীন শব্দ-বিশিষ্ট ফুৎকার  
করা, হাত পা শক্তিহীন হইয়া অঙ্গে ঝোলা, নাড়ী পূর্ণ, মূহ ও ক্ষণলুপ্ত এবং  
ক্রমশঃই জীবন শক্তির নাশ হইয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে । প্রথম দিকে  
সামলাইলে মস্তিষ্ক প্রদাহের উপসর্গ হয় ও বহু দিন পর্যন্ত থাকিয়া অবশেষে  
স্থানীয় পক্ষাঘাত, কিম্বা বাকরোধ বা বুদ্ধির মালিন্য, বিশেষতঃ স্মরণ শক্তির  
খর্বতা ঘটয়া থাকে । ব্যাধি সামান্যতর হইলে ক্রমশঃ সারে । অতিরিক্ত  
শারীরিক বা মানসিক শ্রম, মনের অধিক উত্তেজনা, এককালে ব্যায়াম-হীনতা,  
নস্তুকে আঘাত, গুরু ও অগরিমিত আহার, সমধিক নেত্র, বিশেষ সুরাপান,  
দীর্ঘকাল রোদ্রে থাকা, যথেষ্ট পরিমাণে রক্তক্ষয়, অর্শের শোণিত হঠাৎ বন্ধ  
হওয়া ইত্যাদি, ব্যাধি উৎপত্তির কারণ । ঋতু পরিবর্তন সন্দেশে এই পীড়া  
অধিক হইতে দেখা যায় ।

সংক্রাস—অত্যন্ত শোক হইতে হইলে—ইয়ে, ফস-আ, লাকাসি ।

——অত্যন্ত আফ্লাদ বা আনন্দ হইতে হইলে—কফি বা ওপি ।

——অত্যন্ত ঋগ হইতে হইলে—আকন, নক্স, ব্রাই ।

——অত্যন্ত ভয় বা আতঙ্ক হইতে হইলে—আকন, ওপি ।

——অধিক সূর্য্যতাপ লাগা বা গরম জলে স্নান জন্য—আকন,  
বেল । কখন বা উভয় পর পর ।

সংক্রাস—অধিক আহার ও পেটের গোল জন্য—নক্স, পল্‌স ; (তাড়াতাড়ি  
অন্নাদি চৰ্জন না করিয়া গেলাপক্ষে—ইপি ) ।

———রাত্রি জাগিয়া পড়া ও এককালে ব্যায়াম রাহিত্য জন্য—নক্স ।

———রস রক্তপড়া হঠাৎ বন্ধ (যথা—অর্শের শোণিত বন্ধে) নক্স, পল্‌স ।

আকন—হঠাৎ ভয়ের পর রোগ ; মাথা গরম, বদন আরক্তিম, চক্ষু চক্ষ-  
কে লাল, জিহবার পক্ষাঘাত ও কাঁপুনি, কথা কহিবার সময় ত্রোহ্না বাক্য  
নির্গত হওয়া ।

আর্গিকা—মাথা গরম, অথচ শরীর ঠাণ্ডা, বিশেষ বাম দিকের অঙ্গ প্রত্য-  
ঙ্গের পক্ষাঘাত, অচেতন অবস্থা ও নাক ডাকা, বিড় বিড় করা এবং অসামান্য  
শৌচ ত্যাগ ।

ওপি—অর্ধ নিম্নলিত কিন্তু পুতলি বিস্তৃত চক্ষে অচেতন থাকা, বদন লাল,  
ক্ষীত ও উত্তপ্ত ; নাকডাকা, ও অসম নিঃশ্বাস ত্যাগ, নাড়ীর মৃদু গতি, অধঃ-  
চোয়াল ঝুলিয়া পড়া, হাত পায়ের ঝিঁচুনি বা সমস্ত শরীর কাঠবৎ হওয়া,  
মাথায় গরম ঘাম হইতে থাকা, মূর্খ দিয়া গাঁজলা ভাঙ্গা । প্রাচীন, বিশেষ  
অপরিমিত সুরাপান জন্ত রোগে ।

ককু—বদন লাল ও গরম, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, চক্ষু মুদ্রিত কিন্তু উহার  
আক্ষেপ যুক্ত ঘূর্ণি, হাত পায়ের বিশেষ পায়ের পক্ষাঘাত ।

নক্স—অচেতন্য হইয়া নাক ডাকা, অধঃ-চোয়াল এবং অনেক সময় অধঃ-  
অঙ্গ শীতল ও সাড়শূন্য হইয়া পড়া ।

বারাইটা—মুখ বক্র হওয়া, বিশেষ ডান দিকে ; জিত বা হাতের পক্ষাঘাত,  
বিড় বিড় ও গোঁ গোঁ করা, কথা কহিতে অক্ষমতা, মনোভাবের বিশৃঙ্খলতা,  
ছেৎসামি । প্রাচীনের পক্ষে এই ঔষধটী অধিক ব্যবহার্য্য ।

বেল—বদন ক্ষীত, গাঢ়লাল ও উহার আক্ষেপ ; মাথা ও ঘাড়ের শিরা  
ক্ষীত, চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত, মস্তকের ধমনীর দপ্পদপানি, দৃষ্টি ও ঘ্রাণ হীনতা,  
বাক্রোধ, জিত পুরু, কষ্টে কোন দ্রব্য গেলা, ডান ঈঙ্গের পক্ষাঘাত, মুখ  
এক দিকে বক্র হওয়া ও তাহা হইতে গাঁজলা ভাঙ্গা ।

লাকাসি—সংক্রাস ও বার্ম অঙ্গের পক্ষাঘাত এবং হাত শবের জায় ঠাণ্ডা ।  
মুখ একদিকে বাঁকা, গলা ছুঁইতে না দেওয়া, গলধঃকরণে অক্ষমতা ।

লারো—বুক খড়্‌খড়ানি, নাড়ী অপ্রাপ্য প্রায়, স্বচ্ছ শীতল ও আর্দ্র, বদনের পেশীর ঝিঁচুনি ।

রোগীকে ঠাণ্ডা ও বায়ু-পরিচালিত স্থানে মাথা উচ্চ করাইয়া গলা বন্ধনাদি খুলিয়া হাত ও পায়ের তলা গরম ফ্লানেল দিয়া বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ করিতে থাকিবা । অথবা তদভাবে গরম জল বোতলে পুরিয়া তলায় লাগান এবং পা গরম জলে ফোমেন্ট করিতে থাকিবা । প্রথম ১৫।২০ মিনিট অন্তর ঔষধ, গিলিতে না পারিলে ঠোঁঠ মধ্যে ৩।৪ টা করিয়া বটিকা রাখিয়া দিবা ।

### মস্তিষ্ক প্রদাহ ।

মুখমণ্ডল আরক্ত ও উত্তপ্ত, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, শির দণ্ডদণ্ডানি, আলোক-অসহিষ্ণুতা, গুনঃ পুনঃ পৈত্তিকের বমন, অন্ধুধা, প্রাণই কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখত্রী পরিবর্তন, কখন আবল্য বা অঘোর, কখন ছট্‌কটানি বা প্রলাপ, ক্রমশঃই উপসর্গের প্রাবল্য ; কখন কখন জরের ধ্বংসতা হয়, কিন্তু নাড়ী অস্বাভাবিক, নিঃশ্বাস দ্রুত ও কখন বা মন্দ মন্দ, বদন প্লাবিত বা গওদেশ বেগুনে বর্ণ, পেট এককালে খোঁদলে পড়া, শয্যা অঁচড়ান ; ধড়, চোঁয়াল ও হাত পা শক্ত ; চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত ; সর্ব শেষে স্বকের সাড়স্বের নাশ, নাড়ী অধিক দ্রুত, পরে অপ্রাপ্য এবং সন্নিপাতের স্থায় অঘোর বা দড়কা হইয়া মূহূ হয় । ৩৬ ঘণ্টা হইতে ৯ দিন পর্য্যন্ত রোগের ভোগ । প্রথম দিন আকন ও বেল ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর পর পর, দ্বিতীয় দিবস পূর্বাহ্নে ২ মাত্রা বেল এবং অপরাহ্নে ২ মাত্রা ব্রাই ও রাত্রে এক মাত্রা বেল দিলে সামান্য প্রকারের মস্তিষ্কের প্রদাহ আরোগ্য হয় ।

• কান হইতে রস ও পুষ্ণ পড়া বন্ধ জন্ত মস্তিষ্ক প্রদাহ হইলে—সল্‌ফর, পল্‌স, পৃথক্ পৃথক্ বা কখনপর পর ব্যবহার্য্য ।

আঘাত বা পতন জন্ত প্রদাহে—আর্গিকা ; এবং তৎপরে বেল, মার্ক, সিকুটা ।

অধিক স্নায়ু পান জন্ত—ওপি, ভেরাট, লাকাসি ।

অতিরিক্ত মানসিক শ্রম নিমিত্ত প্রদাহে—বেল ।

হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা, গভীর ও দীর্ঘ চিন্তা, বালককে এঁঁছড়ে পাকান অর্থাৎ তরুণ রম্যসে পণ্ডিত করিবার চেষ্টা, স্ফোটক বা গুটী বন্ধ হওয়া, সংক্রা-

মক পীড়া, স্ফূরা ও আফিম অধিক পরিমাণে ব্যবহার জন্ত এই রোগ প্রকাশ পায় । ফুস্ফুস প্রদাহ, বিসর্প, শিশুর বিন্ধুচিকা রোগের সঙ্গে সঙ্গে কখন দেখা দেয় ।

আকন—রোগ আরম্ভে খুব অর, রক্ত উর্দ্ধগ, বদন আরক্তিম, মৃত্যু ভয়, কবে মৃত্যু হইবে পূর্কাক্বে বলা, অনিদ্রা, এগোড় ওগোড় করা, উঠিলে মাথা-ঘোরা বা মুচ্ছা ।

ওপি—অর্ধ মুদ্রিত চক্ষে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা । বদন বেগুনে বর্ণ ও ক্ষীত, প্রলাপের বকুনি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, ভয় ও চমকান, কাল ভাঁটার জায় মল । শোক, ভয় বা প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা জন্ত রোগে ।

বেল—মাথা অত্যন্ত গরম ও ফুঁড়ুনি এবং গলার ধমনীর প্রচণ্ড দপ্পদপানি, চক্ষু চক্চকে লাল, প্রচণ্ড প্রলাপ, পলাইবার চেষ্টা, নিকটস্থ ব্যক্তিদের আঁচ-ডান, শব্দ ও আলোক অসহিষ্ণুতা ।

হাই—রক্ত উর্দ্ধগ সহ মাথা গরম ও জ্বালা, রাত্রে প্রলাপ ও পলাইবার ইচ্ছা । ঠোঁঠ শুষ্ক ও অত্যন্ত তৃণী এবং এককালে অধিক পান, নড়ায় যাতনা, উঠিয়া বসায় গা বমি বমি করা ও মুচ্ছা হওয়া ; নিদ্রা হইতে ধড়-মড়িয়া উঠা ।

ষ্ট্রাম—প্রলাপ, বাচালতা, পলাইবার ইচ্ছা, দাঁত কিড়িমিড়ি করা, ভয়ের দৃষ্টি সহ নিদ্রাভঙ্গ, ঠোঁঠ টাটান ও ফাটা এবং দাঁতে ( Sordes ) কাল ময়লা পড়া ।

হাইয়স—ঝিমন ও অচেতন, বাক্যের অস্পষ্টতা, প্রলাপ, ফ্যান্ফেলে দৃষ্টি, গলার ধমনীর দপ্পদপানি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎক্ষেপণ, মুখে ফেনা, চক্ষু তেড়াবাকা, বিষ দেখা, হঠাৎ ঘুমন্ত চম্কে উঠা, অসামাল বা অসাদে শোচ প্রস্রাব ত্যাগ, বিড় বিড় করা ও শয্যা খোঁটা বা হাতড়ান ।

মাথায় ঠাণ্ডা বা বরফজলের পটি দেওয়া এবং সেই পটি গরম হইবার পূর্কেই পুনরায় বদলান উচিত । গা ঠাণ্ডা হইলে উহা ফ্লানেল বা অন্ত গরম বস্ত্র দিয়া আবৃত এবং আবৃত্তক হইলে গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই ঠাণ্ডা স্থানে বুলাইতে থাকিবা ।

জিহ্বা—এককালে চৈতন্যশূন্যতা, অর্ধমুদ্রিত চক্ষু ও প্রসারিত এবং

সাড়হীন পুস্তলি, হাত পা বা সর্বশরীর বরফবৎ, আবদ্ধ শ্বাস, হাত ও পায়ের পাতার বর্ণ নীল, নাড়ী দুর্বল ও অপ্রাপ্য-প্রায় হওয়া ।

ভেরাট-ভি—স্বর্ষাতাপ অধিক লাগা, অপরিসীম স্রাব পান জন্ত এবং শিশুর দন্তোদ্যম কালীন মস্তিষ্ক প্রদাহ, শ্রবণশক্তির আধিক্য, দৃষ্টির গোলযোগ, স্রবণ শক্তির হ্রাসতা, মাথায়া হাতুড়ি মারার ন্যায় অনুভব ।

জেলুস—মাথার পশ্চাত্তাগে কোন গুরু ভার দ্রব্য থাকা বোধ, মস্তিষ্কের চতুর্দিকে একটা লৌহচক্র পরিহিত রহিয়াছে বোধ, চক্ষু অত্যন্ত ভার, দৃষ্টি-মালিন্য ।

## মস্তিষ্কের উত্তেজনা ।

(IRRITATION OF BRAIN.)

গমনকালীন মাথাধোরা, ক্যাল্ফেলে দৃষ্টি, আলোক বা শব্দ অসহ্য হওয়া, অন্ধুধা, বমন, অঙ্গ চিড়িক মারা ও খিঁচুনি, দৃঢ়-মুষ্টি বাঁধা, হঠাৎ হাত পা উর্কে তোলা, অনিচ্ছা, খেঁৎখেঁতে হওয়া, অস্থিরতা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান উপসর্গ । নিতান্ত শিশুদিগের আতঙ্কের চেহারা হওয়া ও ভয় পাইয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরা ; কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্কের জ্বর, তাপ, কপাল ব্যথা, এবং খেলা-ইতে খেলাইতে তাহা ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া মার কোলে মাথা গোঁজড়ান এবং অত্যন্ত ভয় পাওয়া ও ক্রুমা ; আবার কিছু পরে পূর্বের মত খেলা করা, অথবা গা বমি বমি হইয়া বমন করা প্রভৃতিও এই রোগের উপসর্গ । দন্তোদ্যম, উগ্র ও উত্তেজক দ্রব্য আহাৰ বা পান, ভঙ্গ রাগ প্রভৃতি মনের শমতানাশক কারণ, শরীরস্থ রসের অধিক ক্ষয় এবং নিম্ন আর্দ্র ও অল্প বা অবিপ্লব বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস, ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয় । আরোগ্য না হইলে ইহা হইতে মস্তিষ্ক-প্রদাহ ও মস্তিষ্কে জল-সঞ্চার রোগ হওনের সম্ভাবনা ।

জরে লঘু পথ্য ; জর না থাকিলে অনায়াস-জীর্ণ, অনুত্তেজক, পুষ্টিকর আহাৰ বিধি । রোগী অধিক আলোক দেখিতে বা অধিক শব্দ শুনিতে না পায় এমনত ব্যবস্থা করিবা । স্থান নিম্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইলে তাহা পরিবর্তন



করিয়া দিবা। সেক ও ঘর্ষণ দ্বারা পায়ের পাতা গরম ও সর্বদা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখা কর্তব্য।

সামান্য রোগে অস্থিরতা, অনিদ্রা, শব্দের অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সামান্য মাত্র লক্ষণ থাকিলে ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার কফি এবং তাহাতে ফল না দর্শিলে আর্স বা লাকাসিস বিধি।

আকন—তাপ, দ্রুত নাড়ী, অনিদ্রা, অস্থিরতা।

বেল—মস্তক ও বদনমণ্ডল গরম, লাল, তাহাতে শির উঠা, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, চক্ষু অতিরিক্ত উজ্জ্বল, অনিদ্রা, ঘুমাইলে সামান্য শব্দ বা গাত্র-স্পর্শ মাত্রে চমকান, আক্ষেপ বশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা, মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চিড়িক মারা, মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, নিয়ত কান্না।

কামো—রাগ বা পেটের অন্ন বশতঃ রোগে; ইহার সঙ্গে উদরাময় ও পেট ব্যথা, অত্যন্ত আব্দার করা, কেবল কোলে লইয়া বেড়াইলে শান্ত থাকা।

বল্ল—সূরা প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার হেতু রোগে; গা চিড়িক মারা, আলোকে বিরক্তি, অপরিষ্কার জিহ্বা, স্পর্শ মাত্র গাত্র বেদনা, কোষ্ঠ-কাঠিগু।

ইথেসো—অল্প অল্প উপসর্গ সহিত অঙ্গ চিড়িক মারা বা পেশীর আক্ষেপ।

চায়না—দীর্ঘকালের উদরাময় অথবা নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস বশতঃ অস্থিরতা, অনিদ্রা, দিন দিন ক্লশ হওয়া ও সর্বাঙ্গ সমধিক সাড়বিশিষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্পর্শ মাত্রেই লাগা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে।

আর্স—গণ্ডমাধাতুগ্রস্তেরা পূর্কলক্ষণ-যুক্ত হইলে—কেবল অত অধিক সাড়ের অভাব।

ওপিয়ম—ভয় বশতঃ রোগে।

ইথেসো, বল্ল—৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ও চায়না ১২।২৪ ঘণ্টা অন্তর।

মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

(CONGESTION OF BRAIN.)

ব্রহ্মরক্ক কিঞ্চিং ক্ষীত হইয়া শিশু নিশ্বেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, মাথা অল্প গরম, নাড়ীর গতির অসমতা ও মান্দ্য, কোষ্ঠ-কাঠিগু, কখন বা ভেদ; মুখ-মণ্ডল সরস, কপাল ও ঘাড়ের শিরা উঠা, চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত, ফ্যাল্ফেলে

দৃষ্টি, নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, এবং নিদ্রা গাঢ় অথচ মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ । ইহা না সারিলে মস্তিষ্ক-প্রদাহ বা মাথার জলসঞ্চার ব্যাধি হইয়া থাকে ।

হুই কারণে এই রোগ হইতে দেখা যায় । এক কারণ—আঘাত লাগা, দস্তউঠা এবং হপেংকাশির দরুণ মাথার অধিক রক্তের গতি হওয়া ; অপর কারণ—শিরার অধিক চাপ লাগা বা দুর্বলতা জন্ত রক্তের তেজোহীনতা ঘটিয়া স্বল্পে সেই রক্ত সচল হইয়া থাকা ।

রোগ হয়ত হঠাৎ দেখা দেয়, অথবা প্রথম ষিট্‌বিটে ভাব ও অস্থিরতা, পরে মাথাধরা, বমন ইত্যাদি উপসর্গের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া মাথা গরম হওয়া, বদন আরক্তিম হওয়া, কষ্টের চেহারা, সকল বিষয়ে ঔদাস্য, অমোর হওয়া, এবং সর্বশেষে দড়কা বা আক্ষেপাবস্থা ঘটিয়া মৃত্যু ।

এই দুঃসংকে মাথা ঠাণ্ডা ও পায়ের পাতা গরম রাখা আবশ্যক ; রোগীকে স্থির রাখিবা, কোন মতে বিরক্ত হইতে দিবা না ; পথ্য লঘু ও বলকারী এবং বাহাতে ঘর অধিক গরম না হয়, এমনত ব্যবস্থা করিবা ।

আকন—বদন সরস ও লাল, গা গরম নাড়ী দ্রুত, পিপাসা, মাথা ঘোরা, অস্থিরতা, এগোড় এগোড় করা ।

আরম—মাথা গরম ও ত্বন্থে শৌ শৌ শব্দ হওয়া, চক্ষুর সম্মুখে আঁশের কিন্‌কিবৎ বাক্মক্ করা ।

আর্নিকা—আঘাত লাগা জন্ত রোগ । শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা গরম, উঠিলে মাথা ঘোরা, কণ্ঠ মধ্যে ভনভনানি শব্দ হওয়া । .

ওপি—অঘোর, বদন আরক্তিম, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত ও আক্ষেপযুক্ত বা চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত, আবল্য, ভয়-নিদ্রা, জাগিলে অস্থির দৃষ্টি, ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষতি, শ্বাস-কষ্ট ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা ।

কফি—মাথাভার, চক্ষু ঝাল ও চক্‌চকে, এবং তাহাতে অসহ বেদনা, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের এককালে অভাব বোধ হওয়া । .

কাকা—প্রাতে মাথা দপদপ্ করা, ঘুমাইলে প্রচুর ঘাম হওয়া, সদা প্রান্তি বোধ ও ঘুম পাওয়া, পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা হওয়া ।

মোনোইন—মস্তক বড় হওয়া বোধ, মাথা ঘোরা, মস্তিষ্কের স্পন্দন, বদন পালাশ বর্ণ, নাড়ীর দ্রুত গতি । অধিক রোজ বা অগ্নিতাপ লাগা জন্ত পীড়া ।

চিন—রস রক্ত ক্ষয় দরুণ দুর্বলতা জন্ম রোগ । বদনে রক্তহীনতা, মাথা ফেটেপড়া, স্পর্শ করা মাত্র মাথার বেদনা বৃদ্ধি, সামান্য বাতাসে কষ্ট ।

জেলস্—মাথা ভার, জড়তা, স্থির দেখা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাড়াধিক্য, অঘোর ঘুম, বড় চটা স্বভাব । দাঁত উঠাকালীন পীড়া ।

নক্স—অজীর্ণতা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও আবল্য থাকিলে ইহা ওপিয় পর খাটে ।

পল্‌স—বদন গরম ও জ্বাটে, মাথা খালি বোধ ও তাহার জড়তা, সদা শীত শীত করা, অথচ বায়ু সেবনে স্বচ্ছন্দতা বোধ, সন্ধ্যায় যাতনা বৃদ্ধি, অধিক আহার হেতু উদরাময় জন্ম মাথায় রক্তসঞ্চয় পক্ষে ।

ফেরম—বদন পাক্‌শ, কিন্তু অল্প শ্রম বা উদ্বিগ্ন হইলে উহার আরক্তিম ভাব, মাথা টিপ্‌টিপ করা ও মাথার খুলি স্পর্শে লাগা ।

ব্রাই—কপাল ফেটে যেন মস্তিষ্ক বাহির হইবে এমন বোধ ; বদন লাল হওয়া ; নাক হইতে রক্ত পড়া ; নড়ায় যাতনার আধিক্য, স্থির থাকায় যাতনার সমতা ; মল শুষ্ক ও কঠিন । শেযোক্ত তিনটা ঔষধ সামান্যতঃ ও উদর-সংশ্লিষ্ট পীড়ায় অধিক ব্যবহার্য্য ।

বেল—বদন লাল ও উত্তপ্ত, চক্ষু আরক্তিম ও চক্‌চকে, তাহার পুত্তি ; বিস্তৃত, চক্ষু মুদিলে চম্‌কান, ঘুম ঘুম অথচ নিদ্রা না হওয়া, দড়্‌কা, ত্রস্করক্ক, ক্ষীত হওয়া ও তাহাতে দপ্‌দপানি, নিয়ত গোঁঙান, ব্যথা হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছাড়া ।

ভেরাট—মাথায় জড়তা ও তাহার ঘোর, উহার অভ্যন্তরে কুলা বোধ, অথবা দৃষ্টি, শীত শীত করা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাড়ের হ্রাসতা, দড়্‌কা বা পক্ষাঘাত । দাঁত উঠাকালীন পীড়া ।

মার্ক—মস্তকের এত পূর্ণতা, যেন ফেটে পড়িবে বোধ হওয়া, রাত্রে বৃদ্ধি ।

রস—মাথা জ্বালা ও দপ্‌দপানি, তথায় হল ফুটুনির জ্বালা যাতনা, বদন চক্‌চকে লাল হওয়া, অস্থিরতা, সর্বদা পাশ পরিবর্তন, দুই প্রহর রাত্রে পূর্বে নিদ্রা না হওয়া ।

লাচনাস—শরীর এমন ঠাণ্ডা যে কিছুতেই গরম হয় না, অথচ অগ্নি-দেহের জ্বালা জ্বলিতে থাকা । মাথা খণ্ড ( Wedge ) দ্বারা দুই ভাগ করা হইয়াছে অনুভব হওয়া ।

ষ্ট্রাম—অচেতনতা, দৃষ্টিহীনতা, বমিরতা, প্রচণ্ড রাগ ও কামড়াইবার ইচ্ছা, বদন লাল হওয়া ও ফুলা, বালিশ হুইতে মাথা তুলিয়া ফেলা, জড়ের চেহারা, অতিরিক্ত পিপাসা ও জলে আতঙ্ক।

সল্ফর—থাকিয়া থাকিয়া মাথায় তাপ। মাথা পূর্ণ ও ভারি, এক প্রকার ভ্রমাত্মক দৃষ্টি, পেশীর আক্ৰেপ, চর্ম রোগ বন্ধ হওন জন্ত লীড়া।

দাঁতউঠা কালীন মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় সহ দড়কা এবং মস্তিষ্কের প্রদাহ, এই উভয় রোগে গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া মাথায় ক্রমাগত লাগাইতে থাকিলে আণ্ড প্রতিকারের সম্ভাবনা। এইরূপ অর্ধ ঘণ্টা বা অধিক কাল করিতে থাকিলে রোগী অনেক সময় সুস্থ হইয়া যুমানিয়া পড়ে।

### মস্তিষ্কে জলসঞ্চার।

#### (DROPSY OF THE BRAIN.)

মস্তিষ্কোপরি তিনটি ঝিল্লি বা আবর্তন আছে। ধাতুবিকৃতি থাকিলে, উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, মধ্যাবর্তন মধ্যে জলসঞ্চার হয়। প্রথম কয়েক দিন শরীর অবসন্ন, ক্রমে অল্প প্রমেই শ্রান্ত, নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা, চলিতে পা লটপট্ ও সামান্য কারণে বিশেষতঃ মাথা তুলিতে হইলে টলিয়া পড়া, বিরক্তি প্রকাশ এবং ঘাড়, হাত ও পা ব্যথা, মাথা গরম, তথায় বেদনা ও তাহা হঠাৎ নাড়িলে চক্ষে সরিষার ফুল দেখা, মুখমণ্ডলের বর্ণ কখন গাঢ় লাল, কখন ফেঁকাশে, পাকাশয়ের উত্তেজনা, সোজা হুইয়া বসিলে বা বসাইলে বমন, চক্ষু আরক্ত হওয়া বা পুত্তলিকার সংকীর্ণতা, আলোক অসহিষ্ণুতা, জ্বর, গাত্র-তাপ, অনিদ্রা বা অধিক নিদ্রা, নিদ্রিত অবস্থায় দস্ত কিড়িমিড়ি ও চমকান এবং জাগরিত করিলে মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার, উত্তর দেওয়া কালীন কথা বাধিয়া যাওয়া, প্রস্রাব অল্প ও ঘোলাটে বা এককালে বন্ধ, গা বমি বমি ও বমন এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা। শেবোক্ত হুইটী ইহার বিশেষ উপসর্গ, মস্তিষ্কের অপর রোগে ইহাদিগকে দেখা যায় না। বহু দিন রোগী এই অবস্থায় থাকে। রোগের যত বৃদ্ধি হয়, শরীরের ব্যথা ততই কমে; চিত করিয়া শোয়াইয়া রাখিলে চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু উচ্চ করিয়া তুলিলেই চীৎকার করে। অশ্বোর, চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত, তাহার পুত্তলী বিস্তৃত বা স্থির, অথবা

কৃষিক বিস্মৃত, কৃষিক সম্বন্ধিত, বস্ত্র অস্পষ্ট বা ঘিষ দেখা বা তেড়াচে দৃষ্টি, কাহারও এ সময় কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, কিন্তু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে, গৌঁ গৌঁ করিতে থাকে এবং দুর্বল ও কল্মিত হস্ত পুনঃ পুনঃ মাথার দিকে তোলে। এ অবস্থায় ৮ হইতে ১৪ দিন থাকিয়া, অধিক বা অল্প পরিমাণে দড়কা, নিম্নত গৌঁ গৌঁ করা বা প্রলাপ, কিন্তু এককালে চেতনা শূন্য, চক্ষু নিস্তেজ, ঘোলাটে ও উর্দ্ধ দৃষ্টি, প্রথম হইতেই সকল অবস্থায় নাড়ী ক্ষত, মধ্যে মুহ ও দুর্বল হইয়া এক্ষণে বেগবতী হইয়া এককালে লুপ্ত হয়, হাত পা শিথিল, পেট খোলে পড়া, নিঃশ্বাস অসমান। সর্বশেষে অঘোর ও নির্জীব বা দড়কা হইয়া প্রাণত্যাগ হওয়া।

দুই হইতে আট বৎসর বয়ঃক্রম কাল মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। যাহাদের গণ্ডমালা-খাতু ও যাহাদের বড় মাথা, চক্ষু বসা ও বিলম্বে ব্রহ্মরন্ধ্র জোড়া লাগে এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবিশিষ্টদিগের এই রোগ হয়। জনকের অতিরিক্ত সুরাপান অথবা জননীর গর্ভ বা স্তন দেওয়ার অবস্থায় হঠাৎ ভয় পাওয়া, শিশুর পড়িয়া যাওয়া কিম্বা আঘাত লাগা, ক্ষাখায় অতিরিক্ত হিম বা তাপ লাগা, হঠাৎ পুরাতন চর্মরোগ, বা বা হাঁমাদির গুটি অন্তর্হিত হওয়া, আশ্রয় বা পুরাতন উদরানয়, কাপের পুষ পড়া হঠাৎ বন্ধ হওয়া, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মস্তিষ্কের সন্নিহিত যন্ত্রের প্রদাহ, এই সমস্ত রোগের উদ্দীপক কারণ। কখন কখন রোগ অতি প্রবল হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই সাংঘাতিক হয়। সবলকায়দিগের জ্বর ও প্রবল দড়কা হইয়া তিন চারি দিবসে মৃত্যু হয় অথবা অত্যন্ত শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল লাল, মাথা গরম, তাহাতে শির উঠা ও দপ্পপানি, সামান্ত শব্দে চম্‌কান, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জল, আলোকাসহিষ্ণুতা, নাড়ী প্রথম প্রথম মোটা ও ক্ষত, নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, পাকাশয়ের উত্তেজনা, জিহ্বা শাদা ও কাঁটা-বিশিষ্ট এবং যেন আকারে একটুকু বড়, কোষ্ঠ বদ্ধ বা সবল বর্ণের মল, প্রস্রাব অত্যন্ত বা এক কালে বন্ধ, সর্কদা হাত মাথার দিকে তোলা, ভয় ও কষ্টের চেহারা, উন্মাদের ভাষ ভয়ঙ্কর চীৎকার এবং পূর্বলিখিত শেষ উপসর্গ হইয়া মৃত্যু হয়।

পূর্বোল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ না সারিয়া, অথবা ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ক্রীড়াকালে রোগ পুরাতন হইয়া পড়ে। মাথা ক্রমে ক্রমে বড় হয়, কিন্তু মুখ

স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে । নিত্যন্ত শিশুদিগের মাথার জোড় খুলিয়া যায় এবং সন্ধি স্থান উচ্চ ও স্বচ্ছ হইয়া দণ্ডপানি ও চাপিলে জল নড়া বিলক্ষণ অনুভূত হয় । বাহাদিগের স্বাভাবিক বড় মাথা, তাহাদিগের মস্তকাকৃতির বৃদ্ধি হয় না । সর্বপ্রথম অবসন্নতা, ক্রমশঃ হাত পা বাড় ও পীঠের মাংস ক্ষয় হয়, কিন্তু পেট সমান অবস্থায় বিস্তৃত থাকে, প্রস্রাব অল্প, মুখ দিয়া লালার বার, দিন দিন দুর্বলতা এবং কাহারও বা বুদ্ধি-ভ্রংশতা ঘটে, কিন্তু অধিকাংশের মনোবৃত্তি বিশৃঙ্খল হয় না । কখন কখন মাথাটা এত বড় হইয়া উঠে, যে উহা সোজা করিয়া উর্দ্ধ দিগে রাখিতে অশক্ত হয় । প্রবল ও প্রচণ্ড ঘিঁচুনি এবং অঙ্গ কাঠবৎ হওয়া, বসিলেই মাথা ঘোরা, অধো বা মাথা গুরু হওয়া ও বেদনা করা, রাত্রে অর, অস্থিরতা, মাথা এগোড় ওগোড় করা, বালিশে মাথা গোঁজাড়া, জিহ্বা ঠোঁঠ ও নীচের চোয়াল সদা নাড়া—যেন কিছু চিবাইতেছে—টেজা দৃষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় । কখন কখন মস্তকের আকার বৃদ্ধি না হইয়া চক্ষু ঘোলাটে ও তাহা হইতে জল ঝরে, তাহার কোণে পিচুড়ি পড়ে, নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক ও ভ্রাণ শক্তির এককালে নাশ হয়, কিন্তু শ্রবণশক্তির একরূপ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, কনকনে স্বরে দড়কা উপস্থিত হয় । স্মরণ শক্তি এককালে যায়, হা করা মুখ হইতে লাল গড়াইয়া পড়ে । বিলক্ষণ ক্ষুধা ও নিদ্রা হয়, কিন্তু দিন দিন রোগী শীর্ণ হইতে থাকে । মাথা দোলাইলেই ভোমা মারার (হতবুদ্ধি) জায় দেখায় । শেষোক্তটা পুরাতন রোগের বিশেষ লক্ষণ ।

অধিকাংশ স্থলে রোগের সূত্র গর্ভাবস্থাতেই বা ভূমিষ্ট হওনের অল্প দিন পরেই হইয়া থাকে ।

তরুণ রোগে নিদ্রাবস্থায় সর্কাজে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গরম ঘর্ম নির্গত হওয়া, নাসিকা ও কর্ণ রন্ধ্রস্বরস থাকা, মাথা ভারের লাঘব ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া স্থলক্ষণ । বমন হওয়া, অস্বোর থাকা, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুস্তলিকা স্থির থাকা ও দেখিতে না পাওয়া, আগ্রহের সহিত আহাৰ্য্য ও পানীয় গ্ৰহণকরণ করা, দড়কা, এক কপালে মাথা ব্যাথা, নাড়ীর অসমতা ও মন্দগতি হওয়া স্থলক্ষণ । ব্যাধি যতই নূতন ও প্রদাহ যতই প্রবল হয়, ততই অধিক আরোপ্যের সম্ভাবনা থাকে । অধিক ঘর্ম বা প্রস্রাব হইয়া কখন বা হঠাৎ নিরাম

হয় । কখন কখন অত্যন্ত সঙ্কট ও দুঃসাধ্য অবস্থা হইতে রোগী ফিরে । কখন কখন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে ।

অর, বিশেষ একঅর, হাম, বসন্ত, কাশি, উদরাময়, কাষ্টে দন্তোদগম প্রভৃতি ব্যাধি সকলের সহিত এই রোগ অবস্থিতি করে ; এবং সেই জন্ত বমন, আলোক ও শব্দাসহিষ্ণুতা, মাথা গরম ও খেঁৎখেঁতে মেজাজ দেখিলেই সাবধান হওয়া কর্তব্য । প্রথম প্রথম চিকিৎসা করিলে রোগ আরোগ্যের অনেক সম্ভাবনা ।

যে পরিবার মধ্যে এ রোগ দেখা দিয়াছে, তথায় সম্ভানকে মাতার স্তন দেওয়া পরামর্শ নহে । ধাত্রী-স্তন বা ঢোকা দুধ দেওয়া কর্তব্য । তথায় শিশুগণের মস্তক প্রথম প্রথম জ্বষৎ উষ্ণ ও পরে ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ ধোত করা উচিত ; মাথায় ফুস্ফুড়ি বাহির হইলে ঐ ধোত-প্রক্রিয়া বন্ধ করিবা । রোগের প্রথমাবস্থায় লঘু, পরে অনায়াস-জীর্ণ হাল্কা ও বলকারী পথ্য বিধি ।

আক্রম—চর্ম শুষ্ক ও গরম, নাড়ী দ্রুত, বিশেষ স্থলকায় পক্ষে । সর্ব প্রথমে উপদাহের অবস্থা, আলোক ও শব্দাসহিষ্ণুতা ; অনিদ্রা, অস্থিরতা, অতিরিক্ত কাশা, রোগীর নিজের হাত কামড়ান, জলবৎ সবুজ ভেদ ও অতিশয় ভয় পাওয়া । প্রাতে এক মাত্রা করিয়া সাত দ্বিবস, পরে দশ দিন বিরাম, আবশ্যক হইলে পুনর্বার প্রথম বারের ঠায় সেবন, প্রতিকার বুকিলে বন্ধ ।

আপিস—ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চীৎকার, অত্যন্ত অর ও প্রলাপ, বালিশে মাথা গোঁজড়ান, দাঁত কিড়মিড় করা, শরীরের এক ভাগে চিড়িকমারা ও অপর ভাগে পক্ষাঘাত, মাথায় প্রচুর ঘাম, পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন প্রস্রাব হওয়া ।

আর্গিকা—আঘাত বা পড়িয়া যাওয়ার নিমিত্ত রোগে । দীর্ঘকাল পূর্বে আঘাত হইলে কোনিয়ম উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

আর্দ—মুখমণ্ডল পাঙ্গাশ বর্ণ ; ষৎপরোনাস্তি ক্ষীণ ও দুর্বল ; অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু এককালে অল্পিক পানে অশক্ত ; নাড়ী দ্রুত, দুর্বল ও অসমান, বিশেষ যথায় রোগের মধ্যে মধ্যে বিরাম থাকে ।

ইগ্নেসা—পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ হইতে থাকিলে ।

ইপিকা—অনবরত গা বমি বমি করা এবং এক মুহূর্তও তাহার বিরাম থাকা । ইহার উচ্চ ক্রমে বিশেষ ফল লাভ হয় । (পূর্বোক্ত বিশেষ

উপসর্গ উহার সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধে দমন হইলে রোগেরও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার হয় । যথায় দুই একটা মাত্র উপসর্গের উল্লেখ আছে, তথায় এই ভাবে বুঝিয়া লইবা । )

ওপিয়ম—অতিরিক্ত অগ্নি বা সূর্য্যের তাপ লাগা প্রযুক্ত রোগে ; অথবা অল্প কোন উপসর্গ না হইয়া হঠাৎ বলক্ষয়, হতবুদ্ধিতা, খুব নিম্ন, অঘোরভাবে ও অন্ধ মুদ্রিত ও ঘূর্ণিত চক্ষে নিদ্রা, নিদ্রিত অবস্থায় নাক ডাকা, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাথা ঘোরা, এককালে যন্ত্রণা-শূন্যতা এবং ইহার সঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধতা ; বদন-মণ্ডল ক্ষীত ও তাহার বর্ণ কালচে হওয়া, চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হওয়া, আক্ষেপ কালে বা তাহার পূর্বে চীৎকার ।

ক্যাম্ফর—গা পাথরের স্থায় ঠাণ্ডা, কিন্তু অন্তর্গাহ বশতঃ গাত্রের বস্ত্র সহ না হওয়া ।

কাকা—কফাংশ ও গুণমালাগ্রস্ত ধাতু ; স্বভাবতঃ বিস্তৃত ব্রহ্মরন্ধ্র ও বৃহৎ মস্তক, সমস্ত শিশুর সকল সময় মাথায় অধিক ঘর্ষ হয়, তাহাদের ক্ষেপে ; অজানতঃ হাত মাথার দিকে তোলা ; চক্ষুর পুতলী বিস্তৃত, নাড়ী দ্রুত, কিন্তু জ্বরের তাদৃশ প্রাবল্য নয়, বাধ-বাধ-বাক্য, শ্রবণ ভিন্ন অপর ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, জিহ্বা ও ওষ্ঠ কাটাফাটা শুষ্ক, বিলক্ষণ ক্ষুধা, দিন দিন শীর্ণ হওয়া, কষ্টে কটু ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব তাগ এবং সলফরের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হইলে ইহা সেই ঔষধের পর ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

কোনিয়ম—হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া শুইয়া থাকা, মাথা ভার, মস্তিষ্কের ডান ভাগে কোন বৃহৎ পদার্থ অবস্থান করিতেছে বোধ হওয়া, মাথা নাড়িলে, বকিলে, বা সামান্য শব্দে মগজু ঢুলিতে থাকা, চক্ষে আলোকের ছটা পড়িলেই কষ্ট হওয়া, এ সমস্ত উপসর্গে এই ঔষধে উপকার সম্ভাবনা ।

জিঙ্ক—রোগের প্রারম্ভে দিয়লিখিত উপসর্গ থাকিলে ; অপরাহ্নে বা সাং-কালে একগুঁয়ে হওয়া, ঘুমন্ত প্রলাপ, এইরূপ কিছু দিন থাকিয়া কোষ্ঠ-কঠিন, পরে অত্যন্ত কপাল ব্যথা, শুইলে তাহার সমতা, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে না পারা, আলোক অসহিষ্ণুতা, নাসিকারন্ধ্রে শুষ্কতা, কাটনেকার, বমন ও অতিরিক্ত ক্ষুধা, ঘোলাটে প্রস্রাব, সন্ধ্যায় জ্বর, অল্প চিড়িক মারা ; অথবা পীড়ার বৃদ্ধি ও শেষাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত হওনের আশঙ্কা হইলে ; চেতনানশ্ন্য



অঘোরাবস্থা, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুতলীর বিস্তীর্ণতা ও সাড়-শূন্যতা, হাত পা বা সর্বাঙ্গ বরফবৎ ঠাণ্ডা হওয়া ; হাত বা পা নীলবর্ণ ; শ্বাসকষ্ট ; নাড়ী ক্ষুদ্র, অতিশয় দুর্বল ও অপ্রাণ্য-প্রায় । যাহাতে নাড়ী স বল করে, চক্ষের সাড় হয়, গা গরম থাকে ও শ্বাস-কষ্ট যায়, এমনত ঔষধ প্রয়োগ করিবা ।

ডিজিটেলিস—নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অসমান, শাদা বাহে ও পিত্তবমন ।

পল্স—হঠাৎ স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া দুঃখিত, উদ্বিগ্ন ও কাঁচনে হওয়া ; নিয়ত শীত, অক্ষুধা, শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা, আহারের অনিয়ম না হইয়াও নানা বর্ণের ভেদ ও বমন, ঘোলাটে ও প্লেয়া সংযুক্ত প্রস্রাব, বা অসাড়ে মূত্র-ত্যাগ, চলিতে পা লটপট করা, মাথা ঘোরা, সদা গৌঁ গৌঁ করা, ভয়ঙ্কর খেয়াল দেখা । গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ খাটে ।

বেল—মাথা অত্যন্ত গরম, ছিঁড়ে পড়ার ন্যায় ব্যথা এবং হউ নাড়িলে রা স্পর্শ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ; মাথা তুলিলেই ঘোরা ও গা বমি বমি করা, কিন্তু শয়ন করিলেই সে ভাব যাওয়া, মুখমণ্ডল রসাল ( ফুলা ও লাল ), গলার ধমনীর দপ্পদপানি, সকল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ আলোক ও শব্দের অস-হিষ্ণুতা, চক্ষু লাল, চক্চকে, বা বাহির হইয়া পড়ার শ্রায়, পুতলিকা বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত, চক্ষু ঘুরান, দৃষ্টি বক্র, বমন, জ্বর, নাড়ী বেগবতী, অত্যন্ত পিপাসা, প্রলাপ, উন্মাদের শ্রায় চীৎকার, প্রস্রাব ঘোলা—কখন কখন সজাটে বা অসা-মাল, বিকট চেহারা ; অথবা মাথা এদিক ওদিক করা ও বালিশে গৌঁজধান, মাথার দপ্পদপানি ও জ্বালা, নিয়ত গৌঁধান, আবল্য, বিড়বিড় করিয়া বকা, মাঝে মাঝে চমকান, অঘোর ও চেতনা-শূন্য, দন্ত কিড়মিড়ি, দড়কা, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব । যুমন্ত লাফান, পলাইবার চেষ্টা করা ।

ব্রাই—মাথা গরম, ঘোরা ; মাথা নাড়িলে বা তুলিলে হত-বুদ্ধির শ্রায় চেহারা ; কণিক গাত্র-তাপ, কণিক শীত ; হৃৎ ও জিহ্বা শুষ্ক ; হৃৎ গরম ; অত্যন্ত পিপাসা ; চক্ষুর কাক্ষেপ বা কখন মুদ্রিত, কখন খোলা ও দৃষ্টি স্থির, প্রলাপ, অহুস্তিকর নিদ্রা, ও তৎকালে গৌঁধান, চমকান, ঘাড় হাত পা ব্যথা ; অথবা নিয়ত নিদ্রাবেশ, সদা চিবানর শ্রায় চোয়াল নাড়া, পেট ফোলা ও অতিশয় কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা মল পোড়ার শ্রায় ; প্রস্রাব ঘোলাটে, লাল ও ত্যাগে কষ্ট, বা এককালে বক্র, অথবা অত্যন্ত গরম ও লাল ; বালিশে মাথা গৌঁজ-

ডান, নিঃশ্বাস কষ্টকর ও ঘন ঘন, বদনমণ্ডল গাঢ় লাল, বসিলেই গা বমি বমি করা ও মুচ্ছিতবৎ হওয়া, হঠাৎ চমকানি সহ চীৎকার করা। মস্তিষ্কে জলসঞ্চার হইয়াছে স্পষ্ট বুঝিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

• মার্ক-সল—মাড়ি ফুলা ও তথা হইতে রক্তপাত, লাল পড়া, বীচি আও-রান, হড়হড়ে বা মেটে বর্ণের ভেদ হওয়া।

রস—সন্নিপাতের অবস্থায়, অতিরিক্ত মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ও ভার বশতঃ উহা কাঁদে ফেলা বা বৃকে বুলা; মস্তকের পশ্চাৎভাগ কামড়ান ও চাপের ন্যায় ব্যথা, বা তথায় যেন কিছু সড়সড় করিয়া বেড়াইতেছে বোধ হওয়া, আবল্য, মূত্ৰ বা দ্রুত ও দুর্বল নাড়ী, অক্ষিচুনি, মাথায় অতিরিক্ত বেদনা, যন্ত্রণার বিরামকালে অঘোরাবস্থায় থাকা প্রভৃতি উপসর্গে। শোথের সঙ্গে এই রোগ থাকিলে ইহা সেবনে বিশেষ ফল দর্শায়।

লাকুসিস—রোগের শৈবাবস্থায়, বিশেষ স্বভাবতঃ ক্লম্ব বা দুর্বল শিশুর পক্ষে, অথবা যথায় পূর্বে অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে, ক্রিয়া কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অত্যন্ত বলক্ষয়, গৌণান, আবল্য বা অঘোর থাকা, নাড়ী কম্প-যুক্ত ক্ষণ বিলুপ্ত বা অপ্রাপ্য।

ট্রাম—প্রলাপ, বাচালতা, পন্থায়নের ইচ্ছা; গাত্র-তাপ; মাথা হাকা হওয়া ও মধ্যে মধ্যে উহার ঝিঁচুনি; চক্চকে পদার্থ দর্শনে ও স্পর্শে পুনর্বার আক্ষেপযুক্ত হওয়া।

ষ্টাক্সিগ্রিয়া—পুরাতন রোগে, বিশেষকৈ যথায় অধিক পারা ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় ইহা ফলদায়ী।

সল্ফর—মাথা ভার ও উহাতে মৃগনাভির ছায়া গন্ধযুক্ত ঘর্ষ, মুখে টক গন্ধ, দিবাভাগে কিমন ও রাত্রিকালে অনিদ্রা; ফোটক বন্ধ জন্তু এবং গণ্ড-মালা ধাতুগ্রস্তের রোগে; রেণুগ নিঃশেষ জন্তু অথবা অর্ন্ত ঔষধে কতক দূর মাত্র প্রতিকার হইয়া ধাতু-বিকৃতি বশতঃ আর উপকার হইতেছে না, এমন স্থলে এই ঔষধ ফলদায়ী।

সল্ফর সেবনে নিম্নোক্ত উপসর্গ গুলি হয়, এবং সেই নিমিত্ত ইহা এই রোগের একটা উপযুক্ত ঔষধ; পা লটপট, মাথা, ব্যথা ও ভার, মস্তিষ্কের ভিতর দপ্‌দপানি, ছিঁড়ে ফেলার ছায়া কষ্ট হওয়ায় বাঁলিশে মাথা ঘসা বা

গোঁজড়ান, ঘুমন্ত চমকান, কান্না, বিড়ি বিড়ি করা, গোঁড়ান, নাক ডাকা, প্রলাপ, কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রভৃতি । রোগের সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগে কম বেশী ফল লাভ হয় ।

সিনা—গাত্র স্পর্শ করিলে কান্না ও গোঁড়ান, হাত পা ভার, মাথা ব্যথা, চক্ষের সম্মুখে আগুনের ফিল্কি ছোটা, কখন মস্তিষ্কের কখন উদরের পীড়ার আধিক্য, এবং এক উপস্থিত হইলে অপরের অন্তর্ধান, তাড়াতাড়ি পানে গা বমি বমি, এবং কখন বা ভেদ, আহায়ে অনিচ্ছা বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, শরীরের লটপটানি, হ্রস্বলতা, চক্ষে সরিষাফুল দেখা, নাক খুঁটুনি এবং ঘোলাটে ও শাদা প্রস্রাব । আব্দাটা ও রাগী ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইলে । ক্রমি ও মস্তিষ্কে জলসঞ্চার, উভয় পক্ষে পূর্বোক্ত উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার সম্ভব ।

হাইয়স—প্রচণ্ড প্রলাপ ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ।

হেল—জ্বর, নাড়ীর হ্রস্বলতা, কোমলতা ও অসমান অবস্থা, শ্বাস-কষ্ট, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, পড়িয়া থাকা, মাথা তুলিতে না পারা, অঘোরে থাকা, সদা নাক ঘন্ড়ান, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, পুত্তলী বিস্তীর্ণ, তেড়া বা উর্দ্ধ দৃষ্টি ও চক্ষুর পাতার আক্ষেপ, কপাল তোবড়ান ও উহাতে ঠাণ্ডা ঘর্ষ । পিপাসা, অক্ষুধা, চিবনর ত্রায় সদা চোয়াল নাড়া, অল্পে রাগ এবং সাহসনা করিতে গেলে অধিক ক্রোধ ও নিকটস্থ লোককে মারা, এক হাত বা এক পা ছোড়া বা ঘুরাণ, মুখমণ্ডল ফেঁকশে হওয়া ও ফুলা, প্রায়ই অঘোর—কেচিং জাগরিত ও চেতনা-বিশিষ্ট থাকা, কান্না, চীৎকার, নাক শুষ্ক ও পিঁচুটী-যুক্ত, নিম্নচোয়াল বুলিয়া পড়া, অল্প অল্প কাল ও কাওয়ার ত্রায় খাঁকরিবিশিষ্ট প্রস্রাব । ব্রহ্মরন্ধ্র উচ্চ হইলে ও মস্তিষ্কে জলসঞ্চারের স্পষ্ট প্রমাণ পাইলে ও পুরাতন রোগে ইহা প্রয়োগ বিধি ও সর্বদা পদদ্বয় গরম এবং মস্তক বতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা রাখা বিহিত ।

সঙ্কটাবস্থায় যদিও ঔষধে আরোগ্যের প্রত্যাশা না থাকে, কিন্তু উহাতে যত্নগার লাঘব করে এবং তাহা করিয়া তুলিতে পারিলেও মনের কতক তৃপ্তি লাভ হয় ।

নিঃশ্বাস-কষ্ট, নাক ডাকা, চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও অঘোরাবস্থা পক্ষে এপিঘম ; আক্ষেপ নিমিত্ত কামো, ইগ্নেসা, ইপিকা ; বৃকের আক্ষেপ ও শ্বাস-কষ্ট জন্ম

ট্রান্নিয়ম ও মসকস ; দড়কা ও টঙ্কার নিবারণার্থ কাম্ফরের আদত আরক নাকের গোড়ায় ধরা, এবং বলক্ষয়কুরী ভেদ বমন দমনার্থ আস', রস, লাকা-সিস, ব্যবহার বিধি । ( বিশেষ বিশেষ উপসর্গ সম্বন্ধে সেই সেই রোগ দেখ ) ।

পুরাতন রোগে, পূর্বলিখিত ঔষধ মধ্যে ব্রাই, জিঙ্ক, হেলিবোর, আস', সল্ফর, কাল্কা অধিক ব্যবহার্য্য ।

তরুণরোগে সামান্যতঃ ৪১৬ ঘণ্টা, নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে কখন কখন ছই ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া বিধি । পুরাতন রোগে এক সপ্তাহ প্রত্যহ একবার, পরে দশ দিন বিরাম । যে সকল শিশুর এই রোগ হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাদিগকে অনারাস-জীর্ণ অথচ বলকারী-আহার দেওয়া, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান, সর্বদা পরিষ্কার রাখা, পরিমিত ব্যায়াম করিতে দেওয়া, ক্রমে সহ্য করাইয়া প্রত্যহ স্নিগ্ধ জলে স্নান করান ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে ধাতু পরিবর্তন হইতে পারে । যে শিশুদের বড় মাথা, দীর্ঘকালে ব্রহ্মরন্ধ্র প্রিয়া আসে, তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল অন্তর কাল্কা সিলিসা এবং কখন বা পল্‌স প্রয়োগ বিধি ।

পুরাতন উদরাময়, অধিক রক্ত বা রসক্ষয় বশতঃ হাইড্রোকেফেলস সদৃশ ( মস্তিষ্কে জলসঞ্চার ) উপসর্গ হয়, যথা অত্যন্ত অস্থিরতা, জ্বর, মুগমণ্ডল লাল, নাড়ী দ্রুত, স্বক উষ্ণ, গাত্র স্পর্শ করিলে বা শব্দ শুনিলে চমকান, ঘুমন্ত গৌঁ গৌঁ করা ও কান্না, পেট ফাঁপা, হড়্‌হড়ে ভেদ ও মধ্যে মধ্যে বমন হওয়া । এ অবস্থায় রোগ দমন না হইলে, বদনমণ্ডল পান্ডাশবর্ণ ও ঠাণ্ডা, চক্ষু অন্ধ মুদ্রিত ও তাহার পুতুলী আলোক গ্রহণে অশক্ত, নিশ্বাস অসমান, স্বর ভঙ্গ, মাঝে মাঝে কাশি, পরে ঘড়ঘড়ানি-শ্বাস, সজ্ঞাটে ন্নাছে, পায়ের পাতা শীতল, নাড়ী দ্রুত ও দ্রুত এবং সর্বশেষে অঘোরাবস্থায় মৃত্যু । রোগদ্বয়ের বিশেষ এই, মস্তিষ্কের পীড়ায় মুখ লাল ও কোষ্ঠ কঠিন, এই রোগে ফেঁকাশে বর্ণ ও উদরাময় হয় ।

এই রোগের ঔষধ—ফস, জিঙ্ক, কাল্কা, ফস-আসিড ও ভেরাটু, সল্ফর-আসিড, হিপার । এই সম্বন্ধে “উদরাময়” দেখ । আহ্বারের বিশেষ যত্ন করিবা, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ অপূষ্টিজনক অথবা অস্বাস্থ্যকর হইলে তাহা বন্ধ করিয়া উত্তম ধাত্রী বা তদভাবে গর্দভ বা গ্যাভি-দুগ্ধ দেওয়া পরামর্শ ।

### চক্ষুর পাতার প্রদাহ।

কখন চক্ষুর পাতার ধার ফুলে এবং লাল ও ব্যথায়ুক্ত হয়, এবং আঁজনির ত্রায় ছোট ছোট ফুস্ফুড়ি হইয়া উহারা কখন বা পাকে। পুরাতন হইলে তথায় ম্যাডমেডে পড়ে এবং পাতার লোম গুলি উঠিয়া যায় বা খসিয়া পড়ে।

আকন—চক্ষুর পাতা শক্ত, লাল ও ক্ষীত, উত্তপ্ত, জ্বালা-বিশিষ্ট ও শুষ্ক। আলোকে দ্বেষ।

বেল—পাতা জ্বালা, চুলকুনি, ফুলা, লাল হওয়া, জোড়ালগা ও খোলায় রক্ত পড়া, পাতার কিনারা উন্টান, ( ভিতর পীঠ বাহির হওয়া ) ও ভার।

নক্স—পাতার কিনারা জ্বালা ও চুলকুনি, স্পর্শে খুব ব্যথা ও প্রাতে জোড়া লাগা।

মার্ক—পাতা ফুলা, কিনারা ক্ষত-বিশিষ্ট হওয়া, ফুটুনি, জ্বালা, চুলকুনি বা যাতনার অভাব। চক্ষু খুলিলে সম্মুখে কাল দাগ নৃত্য করিতেছে বোধ হওয়া।

রস—পাতার ভিতর দিকের প্রদাহ। পাতায় লাল শক্ত আঁজনির ত্রায় ফুলা, প্রাতে পাতা জোড়া লাগা।

সল্ফর—পাতার কিনারায় ক্ষত, পাতা জ্বালা করা, বিশেষ পড়িয়া গেলে ; চক্ষু হইতে সর্বদা শ্বেয়া নির্গত ও সূর্যের আলোক অসহ্য হওয়া।

হিপার—চক্ষের উপর-পাতা ফুলা, ব্যথা ও তাহাতে হল ফুটানির ত্রায় যাতনা বোধ করা, রাত্রে পাতা জোড়া লাগা। সূর্য্য কিরণে চক্ষু নাড়ায় বেদনা।

### আঁজনি বা অঞ্জনি।

কখন কখন ইহা অত্যন্ত টাটায়। প্রদাহিত স্থান দিবসে ৩।৪ বার গরম জল দিয়া ধোত করিবা এবং রাত্রে তথায় ময়দার বা স্নজির পুল্টিস দিবা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা পল্‌স ব্যবস্থা। এক সারিয়া এক হওয়া এমনত স্থলে সল্ফর বা হিপার। আঁজনি সারিয়া সেই স্থানে শক্ত বুঁটি হইলে ষ্টাফিস। খাতু পরিবর্তন জ্ঞাত কখন কখন কিছু দিন মধ্যে মধ্যে সিলিসা ব্যবহার বিধি।

## চুল উঠিয়া যাওয়া ।

বুড়া সালিকের ঘাড়ের লোমগুলি গেলে কিরূপ কদর্য দেখায়। অবি-  
• বাহিতা কন্ঠার চুল উঠিয়া গেলে পরিজনেরা বিলক্ষণ উদ্ভিগ্ন ও শসব্যস্ত হন।  
নিম্নে এই রোগের কতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করা হইল।

তরুণ ও কঠিন রোগ আরোগ্যের পর চুল উঠিয়া গেলে—কার্বো, কাক্স,  
ফস-আ, লাইক, সল্ফর, সিলিসা, হিপার।

পুনঃ পুনঃ ও অধিক ঘামের জন্ত চুল উঠা পক্ষে—মার্ক।

অধিক রস রক্ত ক্ষরণ জন্ত চুল উঠা পক্ষে—চিষ্ট, ফেরম।

অধিক পারা ঘটত ঔষধ ব্যবহার জন্ত চুল উঠা পক্ষে—কার্বো, নাইট্র-আ,  
হিপার।•

অধিক কুইনাইন সেবন জন্ত চুল উঠিয়া গেলে—পল্‌স, বেল, হিপার।

পুনঃ পুনঃ শিরঃপীড়া জন্ত চুল উঠিয়া গেলে—ফস, সিলিসা, সেপি, হিপার।

শোক বা মনস্তাপ জন্ত চুল উঠিয়া গেলে—ইগ্নে, ফস।

মাথার সম্মুখের চুল উঠিয়া গেলে—আর্স, নেট্রম, ফস।

ব্রহ্মতালুর চুল উঠা পক্ষে—গ্রাফাইট, জিংক, লাইক, সেপি।

মাথার পশ্চাৎ ভাগের চুল উঠা পক্ষে—কার্বো, ফস, সিলিসা।

পার্শ্বস্থিত চুল উঠা পক্ষে—কালী, গ্রাফাইট, জিংক, ফস।

রগের চুল উঠায়—কাক্স, নেট্রম, লাইক।

ক্রুর চুল উঠিয়া গেলে—আগার, কালী, কাষ্ট, বেল।

টাক পড়া পক্ষে—আইড, কাস্ট্র, (ফস—বিশেষ কাণের পশ্চাভাগের টাকে।)

চর্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়ায় মাথা চুলকুনি হইলে—কালী, গ্রাফাইট,  
লাইক, সল্ফর, সিলিসা।

মাথায় অধিক খুঁকি উপলক্ষে—কাক্স, গ্রাফাইট, ম্যাগ্নিসা, ষ্ট্রাকিস।

চুল মধ্যে শাদা চট্‌চটে ঘাম পক্ষে—চিন, মার্ক।

চুল আঙুড়ি পাকিতে থাকিলে—গ্রাফাইট, ফস-আ, লাইক, সল্ফ-আ।

কাক্স—যে সকল স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ অধিক রক্তঃ ক্ষরণ হয় এবং

প্রস্রাবের পর যাহাদের রক্তস্রাব প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী (Lochia) এমন সকলের চুল উঠিয়া যাওয়া পক্ষে ।

লাইক—যাহাদের রক্ত উর্জগ বা মাথায় উঠে ।

সল্ফর—রক্ত উর্জগ, অর্শগ্রস্ত ও ধাতু-বিকৃতি পক্ষে ।

২। ৩ দিন এক মাত্রা করিয়া ঔষধ সেবন, পরে সপ্তাহ বিরাম ; উপকার বুঝিলে সেই ঔষধ, নতুবা অপর ঔষধ পূর্ব্বের মত । ‘ছোট ছোট করিয়া চুল ছাটা এবং ঠাণ্ডা জলে শতধারাপাণীধারে স্নান করিয়া মাথাটা শক্ত তোয়ালে বা ব্রস দিয়া কিছুকাল ঘর্ষণ বিধি । পেঁয়াজের রস চিনিতে ফেলিয়া অথবা কাস্তুর আদত আরোক ২ ১/৪ ফোটা জলে ফেলিয়া স্পঞ্জ দিয়া চুলের গোড়ায় সপ্তাহ অন্তর স্পঞ্জ করিবা ।

## কর্ণ-রোগ ।

কর্ণ-প্রদাহ ও কর্ণশূল ।

ঠাণ্ডা বা জলো বাতাস ও হিম ল্যাগা, চর্ম্ম রোগের গুণ্টা হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া ইত্যাদি কারণে কর্ণ-প্রদাহ হইয়া থাকে । কাণের ভিতর জালা, বাথা, দপ-দপানি এবং ভিতর বাহির গরম, স্ফীত ও লাল হয় এবং কখন কখন একপ টাটায় যে, প্রদাহিত স্থল স্পর্শ করিতে দেয় না, ও উহার তাড়সে জ্বর হয় । রোগ প্রবল হইলে বমন, হাত পা ঠাণ্ডা ও দড়্কা হইতে দেখা যায় ।

কর্ণ-শূল পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ হয় ; ইহার বাতনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অসহ্য হইয়া পড়ে । ইহার সহিত কর্ণ-প্রদাহের প্রভেদ এই যে, ইহাতে প্রায় জ্বর থাকে না ।

প্রদাহ হইলে কাণে তুলা দিয়া ঢাকিয়া সর্ব্ব প্রথম এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর পল্‌স দিবা এবং উহা ৩। ৪ মাত্রা দিয়া প্রতিকার না বুঝিলে এক মাত্রা সল্ফর দিয়া ১২ বা ২৪ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া পুনরায় পল্‌স বিধি । ইহা প্রায়ই নিফল হয় না । তৎকালে মস্তিষ্কের উত্তেজনার—বেল<sup>১</sup> অধিক জ্বর থাকিলে আকন ও বেল পর পর । যন্ত্রণা অসহ্য হইলে বেল ও কফি পর পর বিধি । অধিক কষ্ট হইতে থাকিলে গশমি বস্ত্র বা ভূষি গরম করিয়া পীড়িত স্থানে

লাগাইবা । বিশেষ ও নিয়মিত সময়ে কর্ণ-প্রদাহ ও কর্ণ-শূল পক্ষে—আর্স, জেন্স, নক্স ।

প্রদাহ রোগে—বেল ; নক্স, ব্রাই, মার্ক ; কামো, কাক্স, চিন ।

ঠাণ্ডী বা হিম জন্ত রোগে—কামো ; ডক্স, পল্‌স, মার্ক ; চিন, বেল ।

বাত সংক্রান্ত রোগে—পল্‌স, ব্রাই, মার্ক ; নক্স ; চিন, বেল, সল্‌ফর ।

ছেঁড়ার স্থায় যাতনা পক্ষে—কামো, পল্‌স, বেল, মার্ক, সল্‌ফর ।

দপ্‌দপানি পক্ষে—নাইট্র-আ, নেট্রন, ফস, মর-আ, সিলিসা, সেপি ।

হল্‌ফুটুনির স্থায় যাতনা পক্ষে—কামো, কাক্স, ড্রোস, নক্স, নাইট্র-আ, পল্‌স, মার্ক, বেল, সল্‌ফর ।

বাম কণ্ঠের রোগ এবং সকাল সন্ধ্যা ও প্রথম বার যাতনা বৃদ্ধি পক্ষে—সল্‌ফর ।

ডান কণ্ঠের রোগে—কাক্স ।

আকন—কর্ণের বাহ্য প্রদেশ উত্তপ্ত, লাল ও ক্ষীত । ভিতর প্রদাহিত এবং তথায় বেদা, ছেঁড়া ও স্পন্দিত হওয়া । অর, অস্থিরতা, উদ্‌যত্নতা, শব্দ-সহিষ্ণুতা । ঠাণ্ডা বাতাস লাগা অথবা কাণ হইতে বহু দিন স্থায়ী কোন অবস্থায় হঠাৎ বন্ধ হওয়া জন্ত রোগ ।

আণিকা—সামান্য হিম লাগায় পুনঃ পুনঃ রোগের আক্রমণ । কাণ গরম এবং তাহার ভিতর ও পশ্চাৎভাগ ভার ও ফুঁড়ুনি এবং আঘাত লাগার স্থায় ব্যথা, শব্দাসহিষ্ণুতা ।

আপারিকস—কাণ লাল, জ্বালা ও চুলকুনি । কাণের পেছন ফুঁড়ুনি ।

অমিল—কর্ণমধ্যে জ্বালা ও উত্তাপ, দপ্‌দপ করা ও কর্ণের ঝিল্লি ফাটিয়া পড়িবে বোধ হওয়া ।

আণ্ট—কাণ লাল, ক্ষীত ও উত্তপ্ত । ভিতর কাণ ফুলা ও মাঝে মাঝে চুলকুনি ; কাণের উপরে ও পেছনে স্ফোটক হইলে ।

কাম্প—কাণের উপর স্থিত অস্থি ফুলা ও তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা । নানা প্রকারের কর্ণ-শূল, কর্ণ ব্যথা, ছেঁড়া ও খুব অভ্যন্তরে চুলকুনি । শেষ বধিরতা ।

কামো—হিম লাগা ও হঠাৎ ঘাম বন্ধ জন্ত রোগে কর্ণ মধ্যে ছুরি দিয়া



বেধা ও ছিঁড়ে ফেলার আয় যাতনা অনুভব এবং সেই যাতনা অসহ্য হওয়া । শিশুর একপুংয়ে স্বভাব, অল্পে বিরক্তি ও তাহাকে লইয়া কেবল বেড়াইলে ভাল থাকা ।

কাঁকা—কাণের ভিতর বাহির প্রদাহ, বিশেষ এক (ডান) দিকের ; দুই প্রহর রাত্রে ও পূর্নাঙ্কে যাতনা বৃদ্ধি । কাণের খুব অভ্যন্তরে অসহ্য ব্যথার দরুণ রোগীর ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়া । কর্ণের উত্তাপ ও দুপদপানি ।

চিন—বহির্ভাগে ছেঁড়ার আয় ব্যথা, কর্ণ লাল, তাহার ভিতরে ফুটুনি এবং স্পর্শ করিলে বা পীড়িত কাণ চাপিয়া শুইলে যাতনা বৃদ্ধি । আর্নিকা ও পল্‌সের পত্র এই ঔষধ ভাঙিয়া খাটে ।

ডকা—ঠাণ্ডীর দরুণ কর্ণশূল, স্থির থাকিলে বিশেষ রাত্রে যাতনার আধিক্য এবং ঐ সঙ্গে গা কমি বমি থাকিলে ।

নক্স—কামোর পর ; উগ্রস্বভাব-বিশিষ্ট শিশুর রোগে ; ছেঁড়া ও হল ফুটুনির আয় ব্যথা, উর্কে কপালে ও রগে এবং নীচে মুখের অস্থিতে পর্য্যন্ত যাতনার বিস্তার এবং শেষ রাত্রে ও প্রাতে বৃদ্ধি ।

পল্‌স—কাণের বাহির প্রদেশ লাল, উত্তপ্ত ও ক্ষীত এবং অভ্যন্তরে বেধা ছেঁড়া, কামড়ান, ব্যথা ও তথা হইতে কিছু বাহির হইয়া আসিলে একরূপ বোধ, সমস্ত বদনমণ্ডলে ব্যথা-বিশিষ্ট স্ফোটক, কান্না, কখন কখন প্রেলাপ ।

প্লাটিনা—কাণের ভিতর ঠাণ্ডা বোধ, মড়মড়ানি ও ফিক লাগার আয় কষ্টকর ব্যথা ।

বারাইটা—ডান কাণের সম্মুখের হাড় ছেঁড়া । পার্শ্বে শয়নে কর্ণমধ্যে স্পন্দন ।

বেল—প্রচণ্ড কর্ণশূল । কর্ণে চাপুনি, ছেঁড়া ও তন্মধ্যে তীব্র ধাক্কা লাগা বোধ, গলা অবধি ব্যথা বিস্তীর্ণ, শিরঃপীড়া, কপালের শির উঠা ও দুপদপানি, চক্ষু লাল হওয়া, প্রেলাপ, বমন, হাত পা ঠাণ্ডা, পীড়িত স্থান স্পর্শনে, নড়ায় বা উচ্চ শব্দে যাতনা বৃদ্ধি ।

মার্ক—কর্ণের অভ্যন্তর ও বাহির প্রদাহ । সরস কর্ণ, ভিতর ঠাণ্ডা ও উপর জালা এবং গওদেশ চিড়িকমারা, কাণের অভ্যন্তরে টাটানি ও ফুঁড়ুনি । ঘর্ম্ম হইয়াও স্বস্তি না হওয়া, রাত্রি শয়নে যাতনা বৃদ্ধি এবং গাল ও দাঁত অবধি ছিঁড়ে পড়ার আয় বেদনা ।

লাকাসি—কর্ণ-শূলসহ গলা বাথা ও ভিদ্ভিদ্ভে জ্বর ।

সন্ধকর—বিরক্তির পর কর্ণের পশ্চাৎভাগ ও চক্ষু পর্য্যন্ত ফুঁড়নি । কর্ণ মধ্যে জালা, কর্ণ জলপূর্ণ বোধ হওয়া, কর্ণ শেঁটে ধরা, ছেঁড়া । ইহা ত্রিপনের বা মার্কেলের পর দিলে রোগের কল্লরটুকু সারে । পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ পক্ষে অথবা বাম দিকের কর্ণ-শূল এবং প্রথম রাত্রে যন্ত্রণাবিক্য হইলে ইহা বিশেষ খাটে ।

স্পাইজি—কাণ মধ্যে গজাল মারার স্থায় বেদনা এবং গালের অস্তির কানডানি ও ছেঁড়ার স্থায় বাথা ।

৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন এবং যন্ত্রণা স্তব্ধ হইলে প্রথম শোক লাগান উচিত । পথ্য লবু ।

### কাণ হইতে রস বা পূষ পড়া !

শৈশব ও বাল্যকালে, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের, কাণ পাকিয়া থাকে । কর্ণের অভ্যন্তরে পুরাতন প্রদাহ হইতেই রোগের উৎপত্তি । হার্মাদি স্ফোটক-পীড়ার পর ইহা প্রকাশ পায় ।

উতলা হইয়া কাণ হইতে রস পূষ হঠাৎ বন্ধ করা কোন মতে উচিত নহে, তাহা করিলে অনেক সময় ভয়াবহ ও সাংঘাতিক উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে । কাণ পরিষ্কার রাখা কর্তব্য এবং তজ্জন্ত ঔষদক জ্বলে বা হুধে জলে মিশ্রিত করিয়া কাণ ধোত করা বিধি । পোকা না পড়ে ও হিম লাগিয়া যাতনা না বাড়ে, এ নিমিত্ত পেঁজা তুলা দিয়া কাণ ঢাকিয়া রাখা পরামর্শসিদ্ধ । কর্ণ মধ্যে কীট জন্মাইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া পীড়িত কাণ ভরিয়া তিলের বা তিসির তৈল দিয়া আস্তে আস্তে কাণজের পলিতা বা লোন্না দ্বারা সেই পোকা বাহির করিবা । এবং ভবিষ্যতে পোকায় আর ভিন্ন না পাড়িতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা ।

হামের পর কাণ পাকায়—পল্‌স ; তাহাতে ফল না হইলে—সন্ধকর ।

বসন্তের পর কাণ পাকায়—কাক্কা, লাকাসি, সল্‌ফর । ( পাণি বসন্তে—মার্ক ) ।

আরক্ত (Scarlet) জ্বরের পর—আকন, বেল, মার্ক, লাইক।

স্ফোটক, গুটা বা পুরাতন ক্ষত হঠাৎ বন্ধ জন্ম—সল্ফর।

গরমির পীড়া হইতে উদ্ভব কর্ণশ্রাব পক্ষে—মার্ক।

গণ্ডমালা ধাতুর কর্ণশ্রাব পক্ষে—কাক্সা, লাইক, সল্ফর, সিলিসা, হিপার।

অধিক পারা ব্যবহার জন্ম কর্ণশ্রাব পক্ষে—আরম, নাইটি-আ, সল্ফর, সিলিসা, হিপার।

কাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিতে ক্ষত জন্ম তথা হইতে রস বা পুষ্প ক্ষরণ—আরম, সল্ফর, সিলিসা।

রোগ পুরাতন পক্ষে—কাক্সা, মার্ক, সল্ফর, হিপার।

কাণ হইতে শ্লেষ্মার স্থায় রস ক্ষরণে—পল্‌স, ফস, বেল, লাইক; রস পূৰ্ব পাতলা হইলে—কাক্সা, মার্ক, সল্ফর।

পুষ্প ক্ষরণে—কাক্সা, পল্‌স, মার্ক, হিপার। রক্তনাথ! পুষ্প ক্ষরণে পূৰ্ব ঔষধ গুলি এবং নাইটি-আ, পিট্রোল, লাকাসি, সল্ফর, সিলিসা।

কদম্ব্য গন্ধের রস ও রক্তশ্রাব পক্ষে—কাক্সা, পল্‌স, মার্ক, লাইক, সল্ফর, সিলিসা, সোরিন, হিপার। এবং পারা ব্যবহারের পর কদম্ব্য গন্ধের শ্রাবে—আরম, কার্বী, কাষ্টিক, সল্ফর, সিলিসা, হিপার।

কর্ণশ্রাবের সঙ্গে শিরঃপীড়ায়—মার্ক; উহা বিকল হইলে—বেল বা লাকাসি; এবং সৰ্ব্বশেষ—সিলিসা।

পুষ্প রক্ত নির্গমনের সঙ্গে গা হাত কামড়ান পক্ষে—কাষ্টিক।

সোহাগার জলে কাণের ভিতর ধোত করায় উপকার সম্ভব।

পুষ্প পড়া বন্ধ হইয়া হঠাৎ গলার বীচি আওরাইলে পল্‌স পরে আবশ্যক-মতে মার্ক বা বেল; পুষ্প বন্ধের পর জ্বর ও অত্যন্ত শিরঃপীড়ায়—বেল ৩৪ বার; প্রতীকার না দর্শিলে ব্রাই দিবা। হিম বা জল লাগা জন্ম রস নির্গমন স্থগিত হইলে এবং নড়া চড়ায় স্বস্তি বোধে—ডক্সা, রস; কিন্তু স্থির থাকিলে ভাল থাকা পক্ষে—বেল, ব্রাই। কাণপাকা সারিয়া তৎপরিবর্তে অণুকোষ ফুলিলে—পল্‌স, নক্স, আণিকা, মার্ক।

কর্ণ মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ ও কর্ণের অপরাপর উপসর্গ ।

কর্ণ-শূল ও তথায় পূন পড়া, শিশু-পীড়া, মাথায় রক্তসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে কর্ণ মধ্যে যে বিবিধ প্রকারের শব্দ হয়, রোগ আরোগ্যের সঙ্গে উহারাও সারিয়া যায় । কেবল মাত্র হিম লাগা রোগের কারণ হইলে এবং সন্ধ্যাকালে কর্ণ মধ্যে ঐরূপ শব্দের আধিক্য হইলে—পল্স; রাত্রে—ডকা, প্রাতে—নক্স । কর্ণে শব্দ হওয়া ও ঐ সঙ্গে অধিক ঘাম হইলে—মার্ক, অথবা ঘর্ম্মের এককালে অভাব পক্ষে—কামো । পারা-ঘটিত ঔষধ সেবন, পুনঃ পুনঃ ও দীর্ঘকাল অর ভোগ, কিম্বা যক্ষতের পীড়া জন্ত কর্ণ মধ্যে হিন্দ, হিস শব্দ পক্ষে—চিন, এবং তাহাতে প্রতীকার না হওয়া ও বাদলায় রোগী বৃদ্ধি পক্ষে—লীর্ব বিধি ।

কর্ণ মধ্যে শৌ শৌ, ভন ভন, গুন গুন ইত্যাদি শব্দ হওয়া—মাকন, তারন, কার্বো, কাষ্টিক, কোনাই, গ্রাফাইট, চিন, নক্স, নাইটি-নেটম, পল্স, ফস, লাইক, সল্ফর, সেপি ।

সংগীত ও বাদ্য শ্রুতিতে বিদ্রোহ—ফস-আ, সেপি, নেটম, ব্রাই ।

কর্ণ মধ্যে ফড়্‌ফড়ানি—কাকা, গ্রাফাইট, পল্স, বেল, স্পাইজি ।

কর্ণ মধ্যে জ্বালা—কাহ, ক্রিয়োস, সান্ডট ।

কর্ণ মধ্যে চুলকুনি—পল্স, সল্ফর, আম-কা, রস ।

### বধিরতা ।

অন্ত বাধির ফলস্বরূপ বা কোন কোন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে অনেক সময় শ্রবণশক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায় । ঠাণ্ডা ও চোট বা আঘাত লাগায় এবং বার্কাক্যাবস্থায় অনেকে ক্রম শ্রবণেন্দ্রিয় হ্রাস পায় । কোন কোন পরিবার মধ্যে বধিরতা পুরুষাণুক্রমিক ; সুতরাং পুরুষপরম্পরায় যৌবনকালেই সকলে বধির হইয়া পড়ে । সহবাস সময়ে রমণীর ত্রাস জন্ত কোন একটা সন্তান কালা হইয়া জন্মিলে, তাহার পরের সকল গুলিই, (সহবাস সময়ে ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও) প্রায়ই কালা, সুতরাং বোবা হইয়া থাকে । ইহার কারণ স্থির করা এককালেই অসম্ভব ; তবে দৈবশক্তি বলে ইহার শাস্তি হইলে হইতে পারে, নচেৎ অন্ত উপায়াভাব ।

বধিরতার প্রথম অবস্থায় তাহার চিকিৎসা অনায়াস-সাধ্য, কিন্তু দীর্ঘ-কালের হইলে আরোগ্য হওয়া কঠিন। “কিছু কম শুনি” বৃত্তিতে পারিলে সর্বাগ্রে কাণ দেখাইয়া তাহার ভিতরের ময়লা প্রভৃতি বাহির করাইবা। কার্বো এ অবস্থার উত্তম ঔষধ। ইহার পর রোগের মূল কারণটার অনুসন্ধান করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিবা এবং কারণ স্থির হইলে রোগ আরোগ্যের অনেকটা সম্ভাবনা হইবে।

আল্জিত বড় হওয়া জন্ত ভাল শুনিতে না পাওয়া বা বধিরতা এবং কথা কহিতে কষ্ট হওয়া—আরম।

এক স্থান কাল—আইস।

কর্ণের ও নাসিকার রস রক্ত পড়া বন্ধ জন্ত—লাকাসি, লেডম্, ত্রিপার, পল্‌স, বেল, মার্ক।

কর্ণে অধিক পোল জমাট জন্ত—কোনাট, মর-আ।

কর্ণ-শূলগ্রস্তের বধিরতা—কামো।

কর্ণ জলপূর্ণ বোধ—গ্রাফাইট।

কর্ণ হইতে শ্রাব ও কপাল ব্যথা জন্ত—কাক্স।

কর্ণ মধ্যে নিজের স্বর প্রতিধ্বনিত হওয়া, কাণ ব্যথা এবং সান্নাথ সন্ধি জন্ত—কাষ্টিক।

কাণ পাকা জন্ত—পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর, কাক্স।

কুইনাইন অধিক ব্যবহার ও তদ্বারা স্বর বন্ধ জন্ত—আর্স, কার্বো, কাক্স, নক্স, পল্‌স, ফস-আ, ভেরাট, সল্‌ফর, হিপার।

গণ্ডমাণ্ড-ধাতুবিশিষ্টের বধিরতা—আইড, কাক্স, বারাইট-কা, লাইক।

গরমীর পীড়া জন্ত—আইরিস, কাক্স, কালী-ফা, ফস, মার্ক-ক, সল্‌ফর।

চর্মরোগ বন্ধ জন্ত—আন্টিম, গ্রাফাইট, সল্‌ফর।

চর্মরোগ আরোগ্যের পর—সল্‌ফর; আন্ট, আর্স, কাষ্টিক, রাই, ফস-আ, হিপার।

চুলছাটার পর ও ঠাণ্ডা লাগা জন্ত—বেল।

চোয়াল নাড়ায় ভাল শুনিতে না পাওয়া জন্ত—গ্রাফাইট।

জলে ভেজা জন্তু—ডক্কা, রস ।

অরের পর, অর সহ মাথাঘোরা জন্তু—বেল ।

অরের (আরক্ত) পর—আপিস, নাইটি-আ, লাইক, বেল, হিপার ।

টাইফয়েড অরের পর এককালে শুনিতে না পাওয়া, অতিশয় দুর্বলতা—  
আর্জেন্ট-না, আর্গিকা, ফস, ফস-আ, ভেরাট ।

তরুণ ও কঠিন রোগের পর—আর্গিকা, ভেরাট, ফস, ফস-আ ।

তালুর নিম্নস্থ গ্রন্থির বৃদ্ধি জন্তু—আরম ; বেল, মার্ক, ষ্টার্কিস, সল্ফর ;  
আইড, কাক্কা, নাইটি-আ, বারাইটা ।

পারা অধিক ব্যবহার জন্তু—নাইটি-আ, ষ্টার্কিস, সল্ফর, আরম, কার্বো,  
হিপার ।

প্লাম্বন ফোটকাদি রোগ বন্ধ জন্তু—আন্ট, কাক্কা, সল্ফর ।

পূর্ণ বধিরতা—ট্রাম, হাইয়স ।

প্রাচীনের বধিরতা—চিন, পিট্রোল ।

প্রাচীনের দুর্বলতা সহ বধিরতা ও ভয়ানক মাথাধরা—চিন ।

বধিরতা সহ হৃৎকম্প—কার্ভিস ।

বধিরতা সহ বুক ব্যথা—ভেরাট ।

বসন্ত জন্তু—মার্ক ; আন্ট-টাট, পল্লস, সল্ফর ।

বাতাদি রোগগ্রস্তের—পিট্রোল, রোড ।

বাত অন্তর্হিত হইয়া বধিরতা—ব্রাই ও রস পর পর ; আবশ্যকমত—ডক্কা  
ও সল্ফর ।

ভাল শুনিতে না পাওয়া, বিশেষ পূর্ণিমা ও অমাবস্তায়—সিলিসা ।

মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয় জন্তু—কাক্কা, বেল, কঁফি, নক্স, সল্ফর ।

রস রক্ত ক্ষয় জন্তু—চিন, লাকাসি, লেডম, হিপার ।

রক্ত উৎসর্গ জন্তু—আরম, বেল, ফস, মার্ক, সিলিসা, হাইয়স ।

শব্দ কোন্ দিগ হইতে আসিতেছে বুঝিতে না পারা—কার্বো-আ ।

শব্দ কর্ণে প্রতিধ্বনিত হওয়া এবং পুরুষের স্বর ভাল শুনিতে না পাওয়া-  
ফস ।

সর্দি জন্ত—আর্স, কাল্লা ; কার্বো, পল্‌স, মার্ক, লেডম ।

সর্দি ও গলা ব্যথা জন্ত—কামো বা লাকাসি । গরম জলের কুলি ।

সর্দি জন্ত বাম কাণের বধিরতা—আলিয়ম ।

হাম জন্ত বা হামের পর—পল্‌স, কার্বো, বেল, মার্ক, হিগর ।

### কান্ধের অভ্যন্তরে গৌঁজ ।

দীর্ঘকাল কান্ধ পাকা থাকিলে তন্মধ্যে কখন কখন গৌঁজ হইয়া থাকে । ইহার ঔষধ কাল্লা ; এক সপ্তাহ প্রতি দিন এক মাত্রা করিয়া সেবনের পর এক পক্ষ বন্ধ রাখিবা । পরে পুনরায় ঐ ঔষধটা ক্ষিরা টাকিস পূর্বোক্ত নিয়মে ব্যবস্থা করিবা । গৌঁজ খুব বড় হইলে আফিমের জল দ্বারা প্রত্যহ দুই বার ধৌত করিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ দিয়া থাকেন ; কিন্তু গর্ভবতী ও অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে এই ব্যবস্থা বেশ নিষিদ্ধ ইহা বলা বাহুল্য ।

### কর্ণমূল প্রদাহ বা কাণের অধঃগ্রন্থি আওরান ।

এক বা উভয় কর্ণের অধোদেশে বীচি আওরায়, ক্রমে উহা অধিক ফুলিতে থাকে, কখন কখন সমস্ত গাল, চক্ষু ও গলা পর্যন্ত ফুলিয়া নিতান্ত বিস্ত্রী করে, এমন কি-রোগীকে চিনিয়া উঠা ভার হয় । গ্রন্থি কখন প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, হয় ত এক দিকে হইয়া তাহা কমিয়া অপর দিকে পূর্বের মত হয় । কখন বা ইহার তাড়সে বালকের কুচুকি ও বালিকার বকের ঘুটি আওরায় । চর্কণ করা ও গেলা কর্ত্তকর হইয়া পড়ে । ইহা সঙ্গ্রে কম বেশী জরও হয় । ফুলা যত বাড়ে জর তত কমে । এই রোগ অনেক সময় সংক্রামক রূপে অবস্থান করে এবং শীত ও বর্ষায় দেখা দেয় । ইহা সূর্যক অপেক্ষা বালকের অধিক হইয়া থাকে । এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ কাল শরীরস্থ থাকিয়া এই বিষ প্রকাশ পায় । সামান্য আকারের ব্যাদি হইলে ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে অধিক ঘর্ম, প্রস্রাব, বাহে, রক্তস্রাব হইয়া বা লাল ভাঙ্গিয়া ফুলা

ক্রমশঃ কমে ও অল্পে নিরাময় হয়। বসন্তাদি রোগের ন্যায় ইহা এক বারের অধিক একজনকে আক্রমণ করে না। কখন কখন ফুলা হঠাৎ মিলাইয়া যায়, আবার জ্বর দেখা দেয়। এই জ্বরের সঙ্গে যদি শ্বাস-কষ্ট ও নাথার উপসর্গ থাকে, তবে পীড়া ভয়াবহ হইয়াছে এবং ব্যাধি স্বস্থান ছাড়িয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিয়াছে বুঝিবা। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কর্ণগ্রস্থি-ফুলার পুনঃ প্রকাশ করিতে পারিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কখন কখন বীচি থাকে এবং সেই সময় যদি ভিতর দিকে ফাটিয়া শ্বাস-নালীতে উহার পুনঃ প্রবেশ করে, তবে দমন আটকাইয়া মৃত্যু হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়। কর্ণমূলের ফুলা মিলাইয়া যাইবার সময় কখন কখন বালিকার ত্বনে ও ডিম্ব-কোষে এবং বালকের অণ্ডকোষে ঐ প্রদাহ সঞ্চালিত হয়। তখন জ্বর, নাথাদি, পীঠ-ব্যথা, জ্বিতে লেপ, অক্ষুধা, এবং ত্বন বা কোষে ফুলা ও ব্যথা দেখা দেয়। যে দিকের কর্ণে পীড়া হয়, সেই দিকের ত্বন বা বীচি আওরায়। উভয় কোষ প্রদাহিত হইলে, পরে পুরুষের হানি বা জলদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। কোষ ও বীচির প্রদাহে কিছু দিনের জন্ত উহাদিগকে কাচ বা নেংটা দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত, যেন রোগের পুনরাবর্তন না ঘটে। রোগীর স্বতন্ত্র ও স্থির হইয়া থাকার ব্যবস্থা করিবা; কিন্তু তাই বলিয়া যেন নিয়ত শয়িতাবস্থায় রাখা না হয়। এই রোগে রোগীকে স্থির রাখা, লঘু পথ্য, কোমল দ্রব্য (যাহা চিবাইয়া খাইতে না হয়), ফলের রস ও নিরামিষ খোল প্রভৃতি আহার দেওয়া এবং গরম বস্ত্র বা কম্বুটার দ্বারা কাণ ও গলা ঢাকিয়া রাখা এবং ঠাণ্ডা বা প্রবল বাতাস না লাগান সর্বতোভাবে বিধি।

ঘর্ম বন্ধ, হিম লাগা বা ভেজা হেতু রোগ হইয়া থাকে। সর্দি, হাম, বসন্ত প্রভৃতি স্ফোটক রোগের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রকাশ পায়। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর এ রোগ প্রায় হয় না।

কর্ণমূল (ডানদিগের) প্রদাহ—বেল, আম-কা।

কর্ণমূল (বামদিগের) প্রদাহ—রস।

কর্ণমূল প্রদাহ, স্ফোটক ও জ্বর—কালী, বারাইটা, রস, হিপার।

কর্ণমূলগ্রস্থি পাণ্ডুবর্ণ ও নেটাঘটিত রোগ—কক্ক।



কর্ণমূলে ক্ষত ও নালী—নাইট্র-আ, ফাইটো, লাইক ।

কর্ণমূলের গ্রন্থি অত্যন্ত শক্ত হইলে—কার্বো, কোনাই, কালী, ক্রেমেটিন, বারাইটা, সিলিসা ।

রোগ সারিয়া গ্রন্থির আকার বড় ও শক্ত হইলে—আরম-মে ।

হামের পর—ডক্কা, মার্ক, রস ; আইড, মাগ-কা ।

কাণের অভ্যন্তরে দৃঢ় করা ফোটকের লক্ষণ ; এ অবস্থায় মার্ক ও ডিপার পর পর প্রয়োগ বিধি । অথবা প্রথম প্রথম পাঁচ ছয় বার পল্‌স দিয়া পরে সল্‌ফার এবং এক দিন পরে পুনরায় পল্‌স প্রয়োগ করিবা ।

কর্ণগ্রন্থি হইতে প্রদাহ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে—বেল, হাইয়স ; কুপ্রম, সল্‌ফার । বিশেষ ঐ সম্বন্ধে দড়কা হইলে বেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ পাকায় গেলে—ককু, কার্বো, বেল, নক্স পল্‌স সল্‌ফার, হাইড্রাস ।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ স্তন আক্রমণ করিলে—পল্‌স ।

কর্ণগ্রন্থি হইতে রোগ অণ্ডের বীচি আক্রমণ করিলে—নক্স, পল্‌স, মার্ক ; আরম, আর্নিকা, আর্স, কার্বো, ক্রেমেটিন, জিক্স ।

কর্ণপ্রদাহবশতঃ স্রবভঙ্গ জন্ম—কার্বো, বেল ।

কর্ণমূল পাকধরা কালীন—আর্স, ফস, সিলিসা ।

কর্ণমূলে পচা ধরিয়া গলিত অবস্থার উপক্রমে—ক্রিয়োস ।

কর্ণমূল প্রদাহ সংক্রামকরূপে অবস্থানকালীন শোঁদা (সুস্থ) দিগকে মার্ক দিবা ; ইহা প্রতিষেধক ।

আকন—অর, জিডে শাদা লেপ, লাল প্রস্রাব, কর্ণের বিসর্পপ্রদাহ ।

অপিস—কর্ণদ্বয় লাল হওয়া ও ফুলা, প্রদাহ ।

আম-কা—ডান কর্ণমূল-গ্রন্থি শক্ত হওয়া ও ফুলা ।

আয়লাছ—কর্ণ-গ্রন্থি বড় ও শক্ত হওয়া ।

আরম—প্রারম্ভিক রোগ ও রাত্রিকালে হাতে বেদনা হইলে ।

আর্নিকা—কর্ণমূল-গ্রন্থিপ্রদাহ, বিশেষ আঘাত ও পতন জন্ম ।

আর্স—কর্ণমূল ফুলা, প্রদাহ, জ্বর রোগে ।

কান্দ—কর্ণমূলপ্রদাহ এবং কান হইতে স্লেয়া ও পূব নির্গমন ।

কার্বে—মুহুর্ত্ত অর ও কর্ণমূলগ্রন্থি আওরণ, বীচির কিছুতে নরম না হওয়া ।  
পীড়ার পাকায় অক্রমণ এবং তৎপ্রদেশ অধিক জ্বালা করা ও তাহাব  
মাড়াধিকা, কোন খাদ্যই সহ না হওয়া, বদ হজম হওয়া, চোয়াডেকুর উঠা,  
অবভদ্র হওয়া । অধিক পারা ব্যবহারের পর রোগে ; কানের ছিদ্র ও পক্ষার  
প্রদাহ, স্পর্শ লাগা, মাথা ফিরাইলে ডান কান হইতে গলা পর্যন্ত বেদনা  
অনুভব । পাচড়ার পর কর্ণমূলপ্রদাহ ।

কান্ধা—গণ্ডমালাধাতুগ্রন্থের পীড়া । কান দিয়া পূব ও স্লেয়া নির্গমন ।

পল্ল—রোগ স্থানান্তরিত হইয়া তন বা অণ্ডকোষে প্রকাশ পায় ।  
( ইহাতে ফল না দর্শিলে—জ্বীলোকের পক্ষে কোনাই ও ধুরূষের পক্ষে—  
ক্রেমেটিস বিধি ) । অণ্ডকোষ আওরান এবং কুচ্ছিকাবধি শেঁটে ধরা, উঠিলে  
মাথা ঘোরা । মর্দি জন্ত কর্ণমূলপ্রদাহ । যাতনা রাতে বৃদ্ধি । প্রদাহ থাকিয়া  
থাকিয়া হওয়া ও থাকিয়া থাকিয়া যাওয়া, বাথা কখন বেশী, কখন কম, ঐ  
সঙ্গে হয় ত অরও থাকে । হামাদি ফোটক রোগের পর পীড়া এবং কর্ণ বেধা  
ছেঁড়া জন্ত চীৎকার করা ।

পিটোল—কর্ণগহ্বর ফুলা ও ব্যথা, কর্ণের পশ্চাভাগ টাটান ।

বারাইটা—কর্ণগ্রন্থি ফুলা ও শক্ত হওয়া, বিশেষ আরক্ত অরের পর । গলা-  
মধ্যে ছিপিবদ্ধ অনুভব এবং কথা কহিতে অশক্ত হওয়া ।

বেল—কর্ণমূল ফুলা হইতে সেই ফুলা মিলাইয়া যাওয়া এবং পরক্ষণেই  
অচেতন হওয়া বা প্রাণ বকা ও মাথার দপদপানি হওয়া । বদনমণ্ডল ও  
চক্ষু লাল এবং ডানদিগের কর্ণগ্রন্থি চক্চকে লাগু হওয়া ; ( বামদিগের কর্ণ-  
গ্রন্থির কাল রং হইলে—রঙ্গ ) ; নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা না হওয়া ।

ভেরাটিভি—রোগের সঞ্চিত পাকায়ের গোলদাগ থাকা ; বমন হইয়াও  
বকের কড়ার নিম্নপ্রদেশের ব্যথা না কমা ; দৃষ্টি মার্শলিত, মাথা ভার এবং  
অতিরিক্ত কপাল ব্যথা ।

নাক—ঠাণ্ডা লাগা জন্ত রোগ । অর, শীত ও তাপ পর পর হওয়া ।  
কর্ণগ্রন্থি ফুলা ও ব্যথা ; চোয়াল শক্ত, চক্ষণ করিতে ও গিলিতে কষ্ট হওয়া ;  
মুখ আসা ; রাত্রিকালে ও বাদলায় বৃদ্ধি হইলে । গণ্ডমালাধাতুগ্রন্থ, যাহা-

দিগের কর্ণগ্রন্থি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় এবং যেখানে রোগ জ্বর, একরূপ স্থলে মার্ক-প্রটে-আইড ও রোগী অতিশয় দুর্বল হইলে ফাইটোলাকা দেওয়া বিধি।

রস—বিসর্পের আয় প্রদাহ ও বিকারের লক্ষণ হইলে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত ও নাড়িতে কষ্ট এবং খঞ্জ হইলে। রাত্রে অস্থিরতা ও সর্বদা পাশ ফেরায় কিছু স্থিতি বোধ করা। টাইফয়েড জ্বরের উপসর্গে ইহা ও বেল পর পর। আরক্ত জ্বরের পর কর্ণপ্রদাহ ও উদরীর লক্ষণ দেখা দিলে।

হাইস—রোগ মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে, অচেতন হইয়া প্রলাপ বকিলে, বদন লাল, গলার বীচির স্পন্দপানি (বেল), শূন্য দৃষ্টি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎক্ষেপণ এবং আথা ঘোরা ও তাহার জড়তা হইলে। বেলের পর ইহা ব্যবহার হয় এবং ইহাতে ফল না দর্শিলে কুপ্রম-আ।

হিপার—পুরাতন রোগে এবং কাণ হইতে নির্গত রস যে অঙ্গে লাগে সে অঙ্গ হাজিয়া যাওয়া।

## নাসিকা-রোগ।

নাসিকাপ্রদাহ ও নাক ফুলা।

আঘাত বা ঠাণ্ডা লাগা, সুরাপান, ধাতু বিকৃতি প্রভৃতি জন্ত নাকের প্রদাহ বা আগা ফুলা ও লাল হওয়া এবং চুলকানি ও জ্বালা এবং কখন বা নাসারন্ধ্র মধ্যে শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ব্যথা-বিশিষ্ট আবের আয় হইয়া থাকে, কিন্তু উহার প্রায় পাকে না।

প্রদাহ বশতঃ ফুলায়—বেল ; ব্রাই, রস, মার্ক, হিপার।

পড়া বা আঘাত জন্ত ফুলায়—গার্লিকা, ( ৩, উহার আদত ( Mother ) আরোকে জল মিশ্রিত করিয়া নেক্‌ড়া দ্বারা উপরে লাগান )।

পারাবট্টিত ওষধ ব্যবহার জন্ত রোগে—হিপার, নাইট-আ ; আরম, বেল, লাকাসি, সলফর।

পারা ব্যবহার জন্ত নাক ফুলায়—আরম, নাইট-আ, হিপার।

সুরাপান জন্ত রোগে—নক্স, লাকাসি ; আর্দ, কাক্স, সলফর।

নাক অত্যন্ত ফুলা, বেদনা ও চুলকুনি পক্ষে—মার্ক ; এবং জালা ও বিসর্পের জ্বায় হইলে—বেল ।

নাকের উপর তিলের মত কাল দাগ পড়িলে—গ্রাফাইট বা সল্ফর ; লাল দাগে—ফস-আ ।

নাক ফুলা ও লাল জ্বা—বেল, মার্ক, ডিপার ।

নাকের ঠিক আগা লাল হইলে—রস, কান্সা ; তাম্র বর্ণ হইলে—আর্স, নেসিট ।

নাকের আগা ব্যথায়—রস ; গোড়া ব্যথায়—স্যান্ট, কাষ্টিক । নাকে আঁচিল পক্ষে—কাষ্টিক ।

তরুণ রোগে ঔষধ প্রত্যাহ একবার দিবা এবং ২৩ দিন পরে দশ দিন বন্ধ করিবা । পুরাতন হইলে সপ্তাহ অন্তর এক মাত্রা ব্যবস্থা ।

## নাসা-রোগ ।

নাসিকার অভ্যন্তরে এক খণ্ড ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে ; এই রোগ উপস্থিত হইলে সেই অঙ্গের শেষ ভাগে রক্ত সঞ্চয় হইয়া সেই স্থান অল্প পরিমাণে ( ক্ষুদ্র তন পের্যাজের কোবার জ্বায় ) ফুলিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে ঘাড়, গা হাত পা ব্যথা হয় ও কানড়াইতে থাকে ; কাহার কাহার বা সেই সঙ্গে জ্বরও হয়, অথবা পুণে জ্বর হইয়া পরে উল্লিখিত উপসর্গগুলি দেখা দেয় । এই সময় যাতনার আধিক্য হইয়া থাকে । অনেকের নাসা ভাঙা অভ্যাস আছে । কেহ কেহ নিজে ঢকাঘাস দ্বারা ভাঙেন, কেহ কেহ পরের দ্বারা ছুচ বা ছুরি দিয়া ভাঙাইয়া লন । নাসা ভাঙিলেই যাতনার শমতা হয় এবং জ্বর থাকিলে কমিয়া যায় । নাসা ভাঙিলে কাহার বেশী, কাহার বা কম রক্ত পড়ে । নাসা না ভাঙিলে কখন কখন বিকীরের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাকে নাসা লাট পাওয়া কহে । এই সকল রোগীকে বেল ও মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা সল্ফর ব্যবস্থা করিলে এককালে ধাতু পরিবর্তন হওনের সম্ভব । অরকালীন ছুই তিন মাত্রা আকন বা বেল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । নশ্র এই রোগের উত্তম প্রাত্যেধক ।

নাসিকা মধ্যে গেঁজ ।

( POLYPI OF THE NOSE. )

এক বা উভয় নাসারন্ধ্রে এক বা অধিক গেঁজ ঝুলিতে থাকে । উৎসার-  
অধিক বাড়িলে শ্বাসকষ্ট হইয়া থাকে, স্ততরাং মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস ফেলিতে  
বাধ্য হইতে হয় । তৎকালে অস্ত্র দ্বারা উহা ছেদন করা আবশ্যিক । কিন্তু  
তাঁহাতে রোগ সারে না । প্রথম হইতে উপযুক্ত ঔষধ পাড়িলে উহা বৃদ্ধি  
হয় না, বরং ক্রমে মিলাইয়া যাইবার সম্ভব ।

কাক্সা—এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ গেঁজে ছল ফুটনি ও চুলকুনি  
থাকিলে । নিষতঃ হাঁচি, পায়ের পাতা আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, শীতল সময় বাতাসে  
বৃদ্ধি । এক মাত্র মাত্র দুই বা—অধিকবার দিলে অপকার হইতে পারে ।

ফস্—গেঁজ হইতে অতি সামান্য কারণে রক্তপড়া, নাক বন্ধ, একহারা  
আকৃতি ।

ষ্টাফিস—নাক বন্ধ এবং সন্ধি ভিন্ন পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসারন্ধ্রে টাটান ও  
উৎসার মধ্যে মেড়মেড়ি পড়া । দীর্ঘ ক্রমাগত কাল হওয়া ।

• সিলিসা—রক্তপক্ষে অল্প বৃদ্ধি, নাসারন্ধ্রে মূলে চুলকনা-বিশিষ্ট কুস্কুড়ি,  
গওনালাপাতুগ্রাস্তের পক্ষে ।

সেপি—বিশেষ স্ত্রীলোকের নাক বন্ধ ও পুনঃ পুনঃ হাঁচি, প্রসাবে অত্যন্ত  
দুর্গন্ধ । আলুমেন—বামরন্ধ্রে গেঁজ ।

ঔষধ ৩ দিন সেবনের পর সপ্তাহ বন্ধ, পরে সেই বা অপন ঔষধ লক্ষণাভ্যাসী ।

অস্ত্র করার রোগ সারে না । ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিলে সকল  
চেষ্টা ব্যথা ।

নাক হইতে রক্ত পড়া ।

রক্ত প্রাণন ধাতু, উদ্ভেজনা, উদ্ধগ ( উদ্ধুক ), অপরা অর্শাদির শোণিত-  
পাব বন্ধ হইলে, নাক হইতে ধমনীস্থ লাল রক্ত পড়িয়া থাকে । রক্তের সপা-  
য়িত গতিবিধির অবরোধ নিমিত্ত শিরাস্থিত ছুঁই ও রক্তবর্ণের শোণিত নির্গত  
য । অর ও মৃগীর শোণাবস্থায় এ রোগ দেখা দিলে, স্নগন্ধ বলিয়া বুঝিয়া ।

বিজ্ঞ ডাক্তার পাগ কহেন, তিনি অন্ততঃ ৫ সহস্র জর বিকারের রোগীকে নাসিকা হইতে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পল্লিমধ্যে নাক ফোড়া ডাক্তার তাঁহার উপাধি; তাঁহার বহু গুণ সম্বন্ধেও নাক ফোড়ার ভয়ে কেহ তাঁহাকে ডাকে না। সানাত্ত পীড়ায় ঔষধ অনাবশ্যক, তবে প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলির মধ্যে উপযুক্তটী ব্যবহার্য্য।

নাসারক্ত দিয়া রক্ত পড়া, প্রাতে—আন-কা, আশ্রা, নক্স, নাইটু-আ, ব্রাই, মাথ-কা, ( কার্ণো ও কানী-কা—৯টার )

নাক দিয়া রক্ত পড়া, খুব প্রত্যাঘে—কাস্ত রোভিষ্ট; ও পুনঃ পুনঃ—চিন।

———বৈকালে ও তজ্জন্ত দৃষ্টি-মালিন্ত—ইণ্ডিগো। তটা ও তৎপূর্বে মাথা কামড়ান—মায়ে।

———সন্ধ্যায়—গ্রাফাইট, টার্ট, ড্রোস, ফস, ফেরম, সল্ফর, সল্ফ-আ।

———রাত্রে—বেল, ব্রাই, রস।

———প্রত্যাহ—ব্রাই। ২৩ বার ধরা—থুজা। বহুদিন রক্ত বরা—আর্গট।

———অতিরিক্ত নাসায়—আকন, আর্গিকা, ইপি, চিন, টিলিয়ম, বেল।

———আঘাত বা পতনের কাটা জন্ত—আর্গিকা, কালেনডুলা, বেলিস।  
লীন—নেটম-স।

• ———ঋতুর পূর্বে—পল্‌স, লাকাসি।

———ঋতুর রজঃ অতিরিক্ত করণে—আকন, কাক্স, ক্রোকস, সাবিনা।

———ঐ অত্যন্ত করণে—কাষ্টিক, গ্রাফাইট, পল্‌স, সিকেল, সেপি।

———ঋতুর রজঃ বন্ধ জন্ত—পল্‌স, ব্রাই, সেমিসি, সেপি।

———কৃমি জন্ত—মার্ক, সিনা, স্পাইজি।

———গরম বা রক্তবশতঃ—আকন, ব্রাই।

———গর্ভাবস্থায়—সেপি।

নাক দিয়া রক্ত পড়া, ধাতু বিকৃতি (রক্তপড়া ধাতু) জন্ত—কার্বো, কাক্সা, চিন, সিলিসা, সেপি, হামমে।

———ভেদ, ঘাম ও দুর্বলকারী কারণ জন্ত—চিন, ফেরম, সিকেল, কার্বো, সিনা।

———মাথায় রক্ত উর্দ্ধগ, রাগ জন্ত—আকন, বেল; কার্বো, রস।

———শ্রম জন্ত—আর্বিকা, রস।

———সর্দি জন্ত—আস, পলস; নিয়ত শ্লেষ্মা ও রক্ত ঝরা—কালী-বাট।

———উপর্যুপরি পাঁচ দিবস—কুটা। উপর্যুপরি সাত দিবস—সল্‌ফর।

———এক বৎসরের পর পুনর্বার রক্ত পতন—কালী-বাট।

———ঘোরাল (কাল) বর্ণের—কোকস, নক্স। উজ্জ্বল লাল ও পাতলা—চিন-স।

———ধমনীস্থ রক্ত পেয়ালা পেয়ালা পড়া এবং তৎপূর্বে মাথার চাপুনি ও জড়তা—কার্বো-আ।

———চট্‌চটে—কোকস।

———জমাট—কানো, প্লাটিনা, রস; (নক্স—প্রত্যুষে)।

———এক রক্ত দিয়া—কার্বো, কোকস। ডানদিগের রক্ত দিয়া—কালী বাট, ভেরাদি; বামদিগের রক্ত দিয়া—ফেরম-আ।

———কান্নার দরুণ—নাইট্রি-আ।

———গান করার জন্ত—ডিপার।

———গা হাত ও শরীর ধৌত কালীন—আন-কা।

———গলিত জ্বর (Putrid Fever) কালীন—আর্বিকা।

———টাইফয়েড (আস্রীক) জ্বরে—লাকাসি: নাক মুখ দিয়া রক্ত উঠা।

জ্বরের রূপ বা ভাবান্তর ইওন দিবসে (Critical days) নাক দিয়া রক্ত-পাত স্থলক্ষণ বলিয়া গণ্য, তবে অতিরিক্ত হইলে চিন দেওয়া বিধি। টাই-

ফয়েডের প্রথম প্রথম ও অবস্থা বা অনিয়মিত কালে ইহা মন্দ লক্ষণ বলিয়া জানিবা ।

নাসিকা হইতে রক্তপড়া, নাক ঝাড়াকালীন—ফস, সল্‌ফর ।

————নাক ঝাড়ার পর ও অতিরিক্ত হইলে—আগারি ।

————নিদ্রা কালীন—ব্রাই, ভেরাট, মার্ক ।

————নিদ্রাতঃ প্রভূষে এবং প্রচণ্ড হইলে—ষ্টানম ।

————বাহ্যে কালীন—কার্বো, ফস ।

————মারা ধরার পর—টাট-এ । মাথাধরায় রোগের শমতা—বুফো ।

————মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় জন্ত—আকন, আল্‌মেন, কাক্স, চিন, বেল ।

————সহ উৎকাশি—ইণ্ডিগো ।—নাক দিয়া রক্ত পড়া সহ মুচ্ছা—কাক্স, ক্রোকস ।

মুখ ধোয়াকালীন রক্ত পড়ায়—কালী-কা; নাখা নত করায়—ফেরম, ফস ।

বমনের পর ও বড় চটার পর রক্ত পড়ায়—আস ।

মাথা গুব উচ্চ রাখা এবং স্থির ভাবে থাকা, ঠাণ্ডা বা বরফজল নাকের ডাঁটিতে লাগান, মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস ফেলা, যে রক্ত দিয়া রক্তপাত হইতেছে, সেই পার্শ্বের হাত উচ্চ করিয়া রাখা অথবা গরম জলে সেই হস্ত ডুবান, উপর ঠোঁঠের অভ্যন্তরে নেকড়ার পুঁটুলি রাখা, নাক মধ্যে ঠাণ্ডা জলের পিচকারী বা নম্ব লওয়া, ইত্যাদি শোণিত ক্ষরণ বন্ধের উপায় । কপালে, ঘাড় ও পীঠে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ, নাক মধ্যে বরফটুকরা দেওয়া, যে দিকে রক্ত পড়ে সেই দিকের রক্তের বা চোয়ালের উপরের ধমনী সজোরে টিপিয়া ধরায় বা চাপায় অনেক সময় সুফল পাওয়া গিয়া থাকে । কখন রক্ত-জোড়া মোটা পলিতা পাকাইয়া হ্যামমেলিস আরোকে ভিজাইয়া নাক পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবা ।

আকন—সকল বয়ঃক্রমে বিশেষ যুবক ও রক্তাধিক সবলকায় পক্ষে, রক্ত উজ্জ্বল লাল ও অধিক পড়া, রক্ত উর্দ্ধগ হইয়া মাথাধরা, ধমনীর স্পন্দন, বদন আরক্তিম । রাগ জন্ত রোগ । নাক দিয়া নিঃশ্বাস না পড়া ।

আগারিকস—রক্তের গতির শিথিলতা জন্ত প্রাচীনের পীড়া । নাক ঝাড়ার পরে অধিক শোণিতপাত ।



## গাহস্থ-ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা ।

আন্ট—সন্ধ্যায় কয়েক দিন উপর্যুপরি নাক হইতে রক্তস্রাব ।

আম-কা—পুনঃ পুনঃ নাক দিয়া স্লেয়া ও রক্ত পড়া । বাম রক্ত দিয়া শোণিত করা । জ্বালোকের প্রাতে মুখ ধোঁয়াকালীন বা মধ্যাহ্ন আহারের পর নাক হইতে রক্ত পড়া । অধিক স্রাব ও কপাল ব্যথা ।

আম্বু-গ্রি—প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রচুর রক্তপাত ।

আরম—রক্ত মধ্যে ক্ষত এবং ঝাড়ায় রক্ত ও পুষ্ণ পড়া ।

আর্জেন্ট-না—গরমির পীড়া জন্ত নাকের ভিতর ঘা এবং তাহা হইতে পুষ্ণ রক্ত নির্গত ও ঝাণশক্তি হীন হওয়া ।

আর্জেন্ট-মে—সর্দি ও হাঁচি এবং পরে নাক হইতে শোণিত স্রাব হওয়া ।

আগিকা—আঘাত বা অধিক শ্রম জন্ত পুনঃ পুনঃ রক্তপাত ও তৎপূর্বে কপাল চুলকুনি ও সড়সড়ানি, নাক গরম এবং শোণিত জলবৎ ও নাল হওয়া ।

আর্স—রাগ বা বমনের পর রক্তপাত, অতিশয় তাপ ও অস্থিরতা ।

আলেট্রিস—নাক হইতে প্রচুর কল্তানি ও রক্তমাখা স্লেয়া ক্ষরণ ।

আসিড-নাইট্র—গরমির পীড়া জন্ত নাক দিয়া পুনঃ পুনঃ রক্তপাত হওয়া ।

আসিড-মর—অরু ও চাঁপিং কাশি কালীন নাক হইতে দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত ।

ইরিজিরগ—মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চয়, আরক্তিম বদন, অরু, রক্তপাত ।

প্রাতে শয্যায় নাক হইতে অতিরিক্ত শোণিত ক্ষরণ, পরে বুক ব্যথা হওয়া ।

কাহ—নাক হইতে রক্ত পড়া ও প্রচণ্ড হাঁচি ।

কার্বো—বৃদ্ধ ও শ্রুতের নাক হইতে রক্ত পড়া, বা প্রচুর ও অনবরত রক্ত পড়িতে থাকা, বদন পাক্সাশ বর্ণ, নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থ হওয়া, বাহ্যের সমস্ত কোঁত পাড়া বা মাথা নত করায় প্রত্যহ বৈকালে নাক হইতে ১০।১২ ফোটা রক্ত পড়া ।

কাক্স—নাক ঝাড়ায় কৃষ্ণবর্ণের শোণিত পাত ও অধিক রক্ত পড়া জন্ত মুচ্ছিতপ্রায় হওয়া ।

কানো—নাকে জনাট রক্ত ।

ক্রোকস—নাক হইতে কাল ও চট্‌চটে রক্ত পড়া এবং কপালে ফোটা কোটা ঠাণ্ডা ঘান হওয়া ।

চিন—অধিক রস রক্ত ক্ষরণ জন্ত ও জীর্ণাবস্থায় নাক হইতে পুনঃ পুনঃ ও দীর্ঘস্থায়ী রক্ত পড়া, বদন পাক্সাশ বর্ণ, কাণের ভিতর শব্দ, মুড়া ঠাণ্ডা

হওয়া এবং দুর্বলতা জন্ম মধ্যে মধ্যে মুচ্ছিতপ্রায় হওয়া । ইহাতে কল না হইলে ফেরম ।

টুলিয়ম—প্রাচীন ও দুর্বলের নাসিকা দিয়া অধিক শোণিত স্রাব, ক্রমাগত রক্ত পড়িতে থাকা এবং অল্প ঔষধে উপকার না হওয়া । প্রত্যহ অনেকবার অনেক রক্ত পড়া, বিশেষ মাথা নত করিলে বা অধিক শ্রমে ও পরে বদন অত্যন্ত পান্সাশ হইলে ।

থুজা—নাসারন্ধ্রে ব্যাধা হওয়া ও মেড়মেড়ি পড়া, নাক কাড়ায় খুব ঘন সবুজ স্লেয়া, রক্ত ও পূষ্ম মিশ্রিত ক্রেন্দ নির্গত হওয়া ।

নক্স—মাথায় রক্ত সঞ্চয়, কপাল ব্যাধা, অর্শের রক্ত বন্ধ জন্ম এবং বন্ধ মাতালের নাক দিয়া শোণিত স্রাব হইলে । নিয়ত প্রত্যাষে, জমাট ও কাল রক্ত, কখনো স্লেয়া সংযুক্ত হইয়া ক্ষরণ হওয়া ।

নাইটি-অ—প্রাতে নাক কাড়ায় ও অতিরিক্ত ক্রন্দন কালীন কাল রক্ত পড়া । গরমির পীড়া জন্ম পুনঃ পুনঃ নাক হইতে রক্ত ও পূষ্ম পড়া ।

পল্‌স—প্রাতে, জ্বর স্লেয়া ও রক্ত পড়া, টাইফয়েড জ্বরে নাক দিয়া শোণিত ক্ষরণ, ঋতুর রক্ত বন্ধ হইয়া তৎপরিবর্তে নাক হইতে রক্তপাত ।

প্লাটিনা—নাক হইতে জমাট রক্ত পড়া ।

ফস্—নাক কাড়িলেই রক্ত পড়া; নাসিকার অভ্যন্তরে প্রদাহ, শুষ্কতা, ও তৎস্থান হইতে অল্প অল্প রক্ত পড়া । দীর্ঘস্থায়ী ও প্রচুর রক্তপাত, গাত্র স্থানে স্থানে কালচে দাগ হওয়া । পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়া, বিশেষ বাহ্যে কালীন ।

• বেল—শিশুর, বিশেষ প্রদাহিক পীড়ায় অপ্রদাহিত পার্শ্বের রক্ত হইতে রক্ত পড়া । নেবা রোগগ্রস্তের জ্বরের সময় নাক হইতে ফোটা কতক শোণিতপাত । ঘুমন্ত নাক হইতে রক্ত পড়ায় নিদ্রাভঙ্গ ও পুনঃবার প্রাতে রক্ত পতন । অধিক গরম জন্ম মাথায় রক্ত সঞ্চয়; নড়ায়, গোলমালে, চক্-চকে আলোক দর্শনে বৃদ্ধি ও মুচ্ছা ।

ত্রাই—প্রাতে শয্যা হইতে উঠার পর বা রাত্রি, আবহাওয়া বা ঋতু পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লাগা এবং উদরের রোগ জন্ম নাক হইতে রক্ত পড়া । জ্বালোকের ঋতুর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে, অথবা এককালে বন্ধ হইয়া ঋতুর নিয়ম মত কয়েক দিন, অথবা গর্ভবতীর নাসারন্ধ্রে দিয়া রক্তপাত ।

ভেরাট—বিশেষ ডান রক্ত দিয়া রক্ত পড়া, নাক ও গলার অভ্যন্তর শুষ্ক।

মর-আ—জ্বর ও হপিং কাশির সময় নাক হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী রক্ত পড়া।

মার্ক—নাসিকা রক্তে রক্ত জমাট হইয়া বুলা। রাত্রিকালে নিদ্রাকালীন রক্ত জমাট, বাম রক্ত দিয়া রক্ত পড়া, ঘুমন্ত অবস্থায় ও কাশিতে কাশিতে শোণিতপাত।

রস—রাত্রি, প্রত্যুষে, গলা পরিষ্কার জল হাক হাক করায়, নাক ঝাড়ায়, বাহ্যে কালীন, হাই তোলায় ও কোন প্রকার শ্রমে নাক হইতে রক্ত পড়া। নাক হইতে পুনঃ পুনঃ কাল-বর্ণের শোণিতপাত, এবং প্রায়ই মাথা নত করায় শোণিত নির্গত হওয়া।

লাকাসি—অনেক প্রকার গীড়া, বিশেষ দুর্বলকারী জ্বর, জ্বর উপস্থিতিয়া রোগে নাক হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত ক্ষরণ। নাক ফুলা সহ রক্ত ও পুষ্ণ ত্যাগ।

সলফর—নাক ঝাড়ায় রক্ত পড়া। উপর্যুপরি ৭ দিন রক্ত পড়া ও নাক বেদনা হওয়া।

সিকেল—সর্বদা নাক দিয়া কাল পাতলা রক্ত পড়া, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নাজী ক্ষয় ও অপ্রাপ্য-প্রায় হওয়া। রক্ত ও মাতালের নাক হইতে অধিক রক্তস্রাব; জ্বর কালীন বড় দুর্বল, স্বক নীল ও ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া।

সিনা—কুমিগ্রস্তের নাসিকা রক্ত দিয়া রক্তস্রাব।

সিলিসা—গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের জ্বর রোগে বিশেষ উপকারী; দীর্ঘকাল নাক হইতে রক্ত পড়া। অতিরিক্ত রক্তস্রাব, নাক ঝাড়ায় রক্ত মাথা প্লেগ্মা পতন, নাসা রক্তে আঙুল দিলে রক্ত নির্গমন।

সেপি—নাক ঝাড়ায় রক্ত পড়া। ঋতুর রক্তের অবরোধ বা স্বল্পতা বশতঃ যে স্ত্রীলোকের নাক হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়ে, তাহার পক্ষে এই ঔষধ অধিক খাটে।

হানমে—নাক হইতে এক লাগাড়ে রক্ত পড়িতে থাকা, অথবা অতি মায়াত কারণে পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ।

ভয়াবহ উপনর্গে রক্ত অধিক ও অনবরত পতনে ঔষধ ঘন ঘন (সিকি

বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর) এবং ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত দিতে হইলে, দিবসে একবার । তজ্জন্ত—কার্বো, গ্রাফাইট, লাইক, সল্ফর, সেপি, হামমে ।

### নাকের হাড়ে ঘা বা ক্ষত ।

গরমীর পীড়া জন্ত যাহার নাসিকার অস্থিতে ক্ষত হয়, তাহার পক্ষে মার্ক ব্যবস্থা ।

উপদংশ রোগে অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে, সর্ব প্রথম আরম্ভ এবং ইহাতে কিছু দিনে ফল না দর্শিলে নাইট্র-আ, সল্ফর, সিনিসা ও কাক্সা ; এইগুলির মধ্যে এক একটা করিয়া আবশ্যক মতে পর পর প্রয়োগ করিবা ।

পারা অধিক সেবনের সঙ্গে ধাতু-বিকৃতি পক্ষে ফস-আ, লাকাসি, হিপর । উপকার হইলে ঔষধ বন্ধ বা যে ঔষধে উপকার হইয়াছে, সেইটী মধ্যে মধ্যে ব্যবহার হয়, দীর্ঘকালের জন্ত এমন ব্যবস্থা করিবা ।

হাতের চেট, পায়ের লম্বা অস্থি ও পাতার এবং ঐ অস্থির আবরক (periosteum), ইহার ফুলে, ব্যথাবিশিষ্ট হয়, তাহার উপরের চর্ম লাগ হইয়া মুখ লইয়া উঠে ও তথা হইতে জলবৎ দুর্গন্ধ পুষ এবং ধূলাবৎ অস্থি-খণ্ড বা হাড়ের গুঁড়া নির্গত হয় । এই রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল ভোগায় । প্রথম প্রথম অর্গিকা দিলে ব্যথা যায়, পরে মেজেরম । প্রদাহ ভিন্ন স্কন্ধ হাড় কোলা পক্ষে মার্ক-স । এতদ্বিন্ন নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যথাবিহিত প্রয়োগ করিবা ।

আসাকাটি—গণমালা ধাতু ও অধিক পারা ব্যবহার জন্ত অস্থি প্রদাহ, স্পর্শে ব্যথা, হাড়ে ঘা ও পাতলা কদর্যা পুষ ক্ষরণ ।

আরম্ভ—পারা ব্যবহার জন্ত নাকের ও গালের হাড়ে ঘা, এবং তথা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধসহ রক্ত পুষ নির্গত হওয়া ।

চিন—হাড়ে ঘা ও অধিক পুষ পড়া থাকিলে ।

নাইট্র-আ—বিশেষ গরমির পীড়া ও অধিক পারদ ব্যবহার জন্ত অস্থিতে ক্ষত (ফ্লোরিক-আ) ।

মার্ক—অস্থিপ্রদাহ, যেন উহা ভাঙ্গিয়াছে বোধ, ও তথায় ক্ষত হওয়া।  
গরমির পীড়া জন্ম নাসিকা রোগ।

মেজেরম—অস্থি আবর্তন ও পায়ের দীর্ঘ অস্থির Tibea প্রদাহ, বিশেষ  
রাত্রি হাড়ে প্রচণ্ড বেদনা।

কুটা—অস্থি আবর্তনে ও আঘাত দরুণ বেদনা ও তথায় বিসর্পের  
ভায় প্রদাহ।

ষ্টাফিস—আঙ্গুলের পর্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির প্রদাহ।

সিলিসা—হাড়ের কুচি বা ভগ্ন খণ্ড নির্গত এবং তথায় নালী ঘা ও তাহা  
হইতে পুষ্ট ক্ষরিত হওয়া।

### পিনাস ( OZENA ).

এই রোগে নাসারন্ধ্রে ক্ষত হয়। সেই ক্ষত হইতে কদর্যা দুর্গন্ধযুক্ত  
পুষ্ট নির্গত হইয়া কখন কখন নাসিকার উপাস্থি (Cartilage) নষ্ট করে, সুতরাং  
নাসিকার হাড়েও ক্ষত হয়। এই অবস্থায় নাকের ভিতর মেডুমেডি পড়িয়া  
উহার দ্বার একরূপ বন্ধ করে যে, ঐ মেডুমেডি পরিষ্কার করিয়া বাহির করা  
কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ স্থান হইতে নির্গত পুষ্ট ইত্যাদি শ্রাবের এত দুর্গন্ধ  
যে, নিকটে কাহারও তিষ্ঠান ভার হয়। পরে ক্রমে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের বিভাজক  
অস্থি ( Septum ), ক্ষয় হইয়া নাক বসিয়া যায় ও “গুলা খাঁদা” হয়।

অনেক স্থলে উপদংশ এই রোগের হেতু; কখন বা ধাতুবিবর্তিত জন্ম পিনাস  
রোগ প্রকাশ পায়। বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসক দ্বারা এই উৎকট রোগের  
চিকিৎসা করান উচিত।

আরম, মার্ক, হিপার; কোনাই, কস, লাইক, সিলিসা এই রোগের ঔষধ।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালন সর্বতোভাবে কর্তব্য। প্রত্যাহ একবার,  
কখন বা অধিকবার স্নান, গরম জলের পিচকারী দ্বারা নাক ধৌত করা এবং  
বায়ু চালিত গৃহে বাস বিধি। মৎস্ত নিষিদ্ধ।

## সর্দি।

হাঁচি হওয়া ও নাক চক্ষু দিয়া জল ঝরা সর্দির প্রধান লক্ষণ। ঐ সঙ্গে কাশি, শ্বসনজনিত, গলা ব্যাথা ও গলা ঘড়ঘড়ানি, মুখমণ্ডল সরস ও আরক্ত, গা হাত কামড়ান, তাপ, তৃষ্ণা, মুখ হা করিয়া নিদ্রা যাওয়া, নাক ভড়ভড়ানি, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অবসাদ বশতঃ সর্বদা শুইতে ইচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ অনেক সময় থাকে। প্রথম প্রথম জলবৎ, পরে ঘন জর্দাটে, সর্বশেষ পুষ্পের ছায় সিক্কিনী নাক দিয়া পড়ে। কখন কখন এই সর্দি অস্ত্রে নামিয়া পেট-ব্যাথা ও আমাশয়ের পীড়া জন্মায়। স্তনপান কালীন অবস্থায় শিশুর এই রোগ হইলে বড় জ্বর হইয়া এক দুই মাস কাল ভোগায়। নাক এককালে বন্ধ হইয়া যায়, ঘুমন্ত নাক ডাকে, মাই মুখে করিয়াই ছাড়িতে বাধ্য হয় এবং পেট না ভরায় রাগ ও বিরক্তির জন্ম স্তনের বোটা কামড়ায়। সেই জন্ম ও মুখের লালনা অধিক লাগায় প্রস্রাবের মাইয়ের অগ্রভাগ কখন কখন হাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় খুব সাবধানে ও অত্যন্ত করিয়া কিছুকে চোকা ছুদ খাওয়াইবা। ১০।২০ ফোটা করিয়া হইলেও, তাহা খানিক খানিক অন্তর দিতে থাকিবা। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে যেটা লক্ষণের সহিত মিলিবে, সেইটা দিবা। আম-কু, আরম, নক্স, পল্স, সাবু, সিলিসা।

হান হাঁচি কাশি প্রভৃতি রোগের পূর্বাঙ্কে কান্ধানি সর্দি হয়। অপর এক প্রকার, যদিও খুব বিরল, কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ। ইহাতে স্তন পান করিতে না পারিয়া ৩।৪ দিবসের মধ্যে অনাহার জন্ম মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, এমনত্ব হলে ২।১০ ফোটা করিয়া ছুদ থাকিয়া থাকিয়া মুখে দেওয়া, ছুদে নেকড়া ভিজাইয়া পেটের উপর দেওয়া, অথবা পিচকারি দিয়া উহা অগ্ন মধ্যে প্রবেশ করান ব্যবস্থা। ক্ষুধার পেট জনিতেছে—গলধঃকরণের উপায় নাই, শিশুর কষ্টের একশেষ, নিকটে থাকিয়া দেখা যায় না।

দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাসে শিশুর নাক বন্ধ হইয়া, বিশেষ নাকে মেডমেডি থাকিলে বিলক্ষণ কষ্ট পায়। উপযুক্ত ঔষধ দিলে ও গরমে রাখিলে ২।১ দিবসে আরোগ্য হয়, কিন্তু ধাতু বিকৃতি অথবা জনক জননীর গরমির পীড়া থাকিলে শীঘ্র সারে না। নাকের উঁটিতে ও রক্তে গরম হুত লাগানয় মেডমেডি বাহির হয়। কোন কোন সদ্য প্রস্রাবের নাক বন্ধ হইয়া ১।২

মাস থাকে—ইহাকে নক্স এক অর্ধবটিকা দুই চারি দিবস দিলে সারে ;  
কখন ইহার পর সাধু পূর্বমত বিধি ।

ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ বৃদ্ধি পাক্ষ—কামো, ডক্ক ।

সর্দি ক্রুর ও নাক বন্ধ—সেপি, ডক্ক, নক্স, ব্রাই ।

সর্দি ঘন, জর্দা শ্লেষ্মা ক্ষরণ ও শীত—পল্‌স, মার্ক ।

সর্দি, পূবে বাতাস লাগা জন্ত—ব্রাই ।

সর্দি, ভেজা বা হিম লাগা জন্ত—ডল্‌কা, রস ।

সর্দি, ও ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার বৃদ্ধি—ডক্ক ।

সর্দি, ও নাক ইহাতে জল ঝরা—ইউফ্রে, এক্স, কামো, পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর ।

সর্দি, ও নাক ইহাতে জল ঝরা দ্রুণ উপর ঠোট হাজা—আর্স ।

সর্দি, ও পুরাতন রোগে—কাক্স, লাইক, সল্‌ফর, সিলিস ।

সর্দি, সহ গলা ব্যাথা—বেল ।

সর্দি, সহ গা হাত ব্যাথা—মার্ক, সিমিসি ।

সর্দি, সহ ব্রাণ ও মুখের তার-শূন্যতা—কালী-বাই, পল্‌স ।

সর্দি, সহ দুর্বলতা—আর্স, জেল্‌স, সিমিসি ।

সর্দি, সহ মাথাধরা ও নাক বন্ধ—এক্স, জেল্‌স, ডক্ক, নক্স, সিমিসি ।

হামজ্বরের স্নায় সর্দি জ্বরের লক্ষণ, কেবল ইহাতে গুটী বাহির হয় না ।  
প্রথম প্রথম শীত হওয়া, অগ্নিতাপ ভাল লাগা, গালতাপ, শরীর টাটান,  
চক্ষু লাল, আলোক আতঙ্ক, কখন কখন বা প্রলাপ । কখনও ইহা  
সাংক্রামিকরূপে প্রকাশ পায় । সাবধান না হইলে ইহা ইহাতে ফুস্‌ফুস ও  
উপস্থানালী প্রদাহ হইতে পারে ।

আইড—বাতাস লাগায় সর্দি সরল হওয়া ।, পুরাতন রোগ, নাকফুলা  
ও ব্যাথা, দুর্বল শ্লেষ্মা ত্যাগ ।

আকন—শীত, তাপ, উৎকাশি, ভয়, অস্থিরতা । পুনঃ পুনঃ হাঁচি,  
নাক দিয়া গরম জল ঝরা । ঠাণ্ডা শুষ্ক বাতাস লাগা জন্ত সর্দি । নাক  
বন্ধ সহ জ্বর ।

অণ্ট—নাসিকা টাটান, মেড়মেড়ি পড়াতে রক্ত বন্ধ থাকার জন্ত খাস কষ্ট ।

আনাকার্ড—সর্দি, হাঁচি, চক্ষু হইতে জল ঝরা ।

আপিস—পুরাতন সর্দি, নাসারন্ধ্রে মেড়মেড়ি পড়া ।

আপোসাই—নাক টাটান, সর্দি, নাসারন্ধ্র ও গলা স্লেথ্না পূর্ণ ।

আফিস—ঝরা সর্দি সহ নাক জালা ও কুটকুটনি ।

আমিল—অতিরিক্ত হাঁচি, সর্দি ও নাসিকার বামরন্ধ্র দিয়া রক্ত পড়া ।

আম-কা—নাক দিয়া কটু জল ঝরা, ব্রাত্রে বা নিদ্রা সময়ে নাক বন্ধ হইয়া চম্কে চম্কে ঘুম ভাঙ্গা ।

আম-ম—সর্বদা হাঁচি, নাক বন্ধ ও শ্রাণ হীন হওয়া । জলবৎ সর্দি ঝরা জন্ত নাসারন্ধ্র ও উপর ঠোট হাজা । নাক মধ্যে কিছু রহিয়াছে বোধ হওয়া ও তাহা নির্গত করার জন্ত বৃথা চেষ্টা ।

আরম—পুরাতন রোগ, নাক বন্ধ, পুষ ও দুর্গন্ধ শব্দতানি ত্যাগ, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, শ্লাকিয়া থাকিয়া দম আটকান ।

আর্জেন্ট-না—অধিক হাঁচি ।

আর্জেন্ট-নে—অতিরিক্ত স্লেথ্না ঝরা, নাক সড়সড় করিয়া হাঁচি, নাক ঝাড়ায় ঘন আটা আটা সর্দি ও পরে রক্তপাত ।

আর্গ—নাক জালা, সর্বদা হাঁচি, অধিক কটু গরম জল ঝরার দরুণ নাক টাটান, ফুলা ও বন্ধ, অত্যন্ত অস্থিরতা, বলক্ষয়, নাক হইতে রক্ত পড়া ।

শীত, বিশেষ পানে, পুনঃ পুনঃ ও অল্প পান । জ্বর, অঙ্গ-ক্ষয়কারী স্লেথ্না, চক্ষু জালা করা ও তাহা হইতে জল পড়া । তাপ লাগান্নর যাতনার লাঘব হওয়া । ইহাতে ফল না হইলে লাকাসি বিধি ।

আলিয়ম-সিপা—নাক ও চক্ষু হইতে জল ঝরা, পুনঃ পুনঃ প্রেচণ্ড হাঁচি, বিশেষ গরম ঘরে প্রবেশ কুরায় । ঠাণ্ডা বাতাসের দরুণ সর্দি, প্রাতে যাতনার আধিক্য । ভয়ানক কাশি জন্ত কণ্ঠানলী হস্ত দ্বারা চাপা ।

আলুমিনা—প্রাচীনের পুরাতন সর্দি ও কটু স্লেথ্না ঝরা ।

ইউপাট—সর্দি দরুণ স্বরভঙ্গ, সর্ব শরীরের হাড় ব্যাথা, সন্ধ্যায় কাশির বৃদ্ধি ।

ইউফ্রে—চক্ষু ও পাতা লাল এবং তথা ও নাক হইতে অধিক গরম জল ঝরা, মাথার জড়তা । কেবল দিবসে কাশি, মার্কর পর ভাল খাটে ।



ইপি—সর্দিজ্বর, অধিক কাশি ও ভেদ। গলা ডাকা, বুক ধড়ফড় করা, বদন-মণ্ডল কখন লাল কখন বা পাক্রাশ বর্ণ হওয়া, চক্ষুর উর্দ্ধভাগে বেদনা। সর্দি ঝরা, নাক বন্ধ, ঘ্রাণ হীন হওয়া, গা বমি বমি ও অধিক শ্লেষ্মা তোলা, সর্দি হঠাৎ বন্ধ দরুণ হাঁপানি ও শ্বাস-কষ্ট হওয়া, ইহাতে না সারিলে ত্রাই। আকনে উপকার না হইলে ইহা প্রযুক্ত।

এক্সলস—নাক হইতে জল ঝরা, হাঁচি, মাথাধরা, ও খুলির সাড়াধিকা, চক্ষু ও গলা জ্বালা, গা বমি বমি। কখন নাক ও গলার শুষ্কতা সহ হাঁচি।

কামো—ঘাম বন্ধ বা হঠাৎ তাপের নূনতা জন্ম সর্দি, অল্প অল্প শীত, তাপ, তৃষ্ণা, নাক হইতে কটু জল ঝরা দরুণ রক্ত, ব্যথা ও হাজা, জলকাশির আধিক্য জন্ম পেটব্যথা, বিশেষ রাত্রে; ঘুমন্ত উৎকাশি, গলা ঘড়ঘড় করা ও স্বরভঙ্গ হওয়া, ইহাতে না সারিলে ইপি; চটা স্বভাব বিশিষ্ট; লইয়া বেড়াইলে শান্ত হওয়া।

কার্বেয়া—ঝরা সর্দি, স্বরভঙ্গ ও বুক ব্যথা, সর্বদা হাঁচি, মাথা দন্দদন্দ করা, চক্ষু জ্বালা কুরা, খুব জল পড়া, নাক বন্ধ, বিশেষ সন্ধ্যায়।

কাক্সা—দিবসে জর্দা ও দুর্গন্ধ কফ ত্যাগ, রাত্রে নাক শুঁক ও বন্ধ, অথবা নাক দিয়া জল ঝরা, পরে পেট ব্যথা। পুষ্কতন রোগ, নাক মধ্যে ক্ষত ও ঘ্রাণশক্তি কমা, নাকের গোড়ায় চিবনের ন্যায় বেদনা ও বিলম্বে রক্ত হইতে পূন্য ত্যাগ। দাঁত উঠা কালীন সর্দি ও শ্বাস-কষ্ট। ঋতুর পরিবর্তনে রোগ প্রকাশ পাওয়া। সর্দির ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত দুই রাত্রি এই ঔষধ এক এক মাত্রা। পরে চারি দিবস ঔষধ বন্ধ এবং ইহাতে ফল না দর্শিলে সকালে বৈকালে সন্ধ্যায় এক সপ্তাহ বিধি। ইহার পর কখন কখন সিলিমা দেওয়া হয়।

কালী-বাই—দধির ন্যায় শ্লেষ্মা, কখন উচ্চ গলা অবধি বিস্তৃত থাকায় দম আটকান প্রায় হওয়া। সর্দি দরুণ শ্বাস-কষ্ট; (ইহাতে না সারিলে ত্রাই)।

কালী-হাই—প্রবল হাঁচি ও নাক হইতে কটু জল ঝরা, তরুণ রোগ এবং চক্ষু নাক, তালু ও গলার অভ্যন্তর লাল হওয়া।

জেলস—সর্দিজ্বরের উৎকীর্ণ ঔষধ। অনেক সময় অল্প কোন ঔষধ দিতে হয় না। আবহাওয়া পরিবর্তনে সর্দি। হাঁচি ও মাথাধরা, নাক

সড় সড় করা ও তাহা হইতে জল বরা, স্নাক রক্ত বা রক্তমিশ্রিত সিকি তাগ, গলাব্যথা, গিলিতে কষ্ট হওয়া, ও কান অবশি বাথা লাগা, বধিরতা, স্বরভঙ্গ, কাশি, জ্বর ও স্থির থাকার ইচ্ছা, অথবা ইহাং এককালে বমহীনতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, মাথাধরা ও ঘোরা, মাথা, ভার জন্ত চক্ষুর পাতা পুনিয়া রাখিতে অশক্ত হওয়া, শীত, আগুন পোরানর ইচ্ছা, গলা ও বুক বেদনা, তৃষ্ণাহীন জ্বর এবং স্থির থাকিলে স্বস্তিবোধ করা ।

টাই-এ—সর্দি, নাক বন্ধ, দম আটকান কাশি, গলা সাঁই সাঁই ও ঘড় ঘড় করা, কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস । হাঁচি, নাক হইতে পুণ শ্লেষ্মা করা এবং গন্ধ ও তারবজিত হওয়া । সর্দি জ্বর, সরল কাশি, গলাব্যথা, গা-বনি বনি কোষ্ঠবদ্ধ ।

ডকা-কর্ষা বা শীতের রোগ, হিম, ঠাণ্ডা বাতান বা জল লাগায় সর্দি বন্ধি, মুখ শুষ্ক হওয়া অথচ তৃষ্ণার অভাব, সরল কাশি ও নগেঠে গরার উঠা, উদরানয়, নড়াচড়ার ভাল থাকা, ( হঠাৎ ইহার ঠিক বিপরীত ) ।

নঙ্গ—দিবাভাগে বিশেষ প্রাতে হরত টক গন্ধের অধিক বা অল্প শ্লেষ্মা বরা, রায়ে নাক শুষ্ক ও বন্ধ হওয়া এবং মুখদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও তাগ, এবং শিশু মাই টানিতে অশক্ত । উৎকাশি, মাথা কাটয়া পড়া, শীত, তাপ, নাক সড় সড় করা ও অধিক হাঁচি । সকালে উপসর্গ বৃদ্ধি ।

পলস—সন্ধ্যায় ও মারা রাত্রি নাক বন্ধ, সকালে গাঢ় শ্লেষ্মার নির্গমন । অনেক হাঁচি ও শরীরে বড় ব্যথা ; গলা ঘড়ঘড়ানি, জলকাশি, তার ও শ্বাণ-হীন হওয়া, সবুজ বা হলুদে কিম্বা কদর্যা গন্ধের পুণ এবং কখন কখন ডেলা ডেলা রক্ত পড়া, ঐ সঙ্গে দম্ব ও কর্ণশূল এবং উদরানয় থাকিলে ও রোগী নব্র প্রকৃতির হইলে ইহা বিশেষ খাটে । সন্ধ্যায় ও গরম গৃহে বাতনা বৃদ্ধি ।

ফস—পুরাতন সর্দি । পুনঃ পুনঃ হাঁচি ।

ফস-আ—পুরাতন রোগ । সর্বদা নাসারন্ধ্র মধ্যে অঙ্গুলি পোরা, নাক হইতে রক্ত মাথান কদর্যা গন্ধের পুণ ক্ষরণ ।

ফাইটোলাকা—এক নাক বন্ধ, অপর, বিশেষ ডান নাসারন্ধ্র হইতে অতি কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখ দিয়া নিঃশ্বাস তাগ । ঘোড়াচড়া কানীন উভয় রন্ধ্র বন্ধ হওয়া, গলা বা নাক পরিষ্কার জন্য ক্রমাগত হাক্ হাক্ করা ।

বাপ্টিসমা—পুরাতন রোগ। গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত। নাক ও চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে বেদনা। নাকের দুর্গন্ধ জ্ঞান।

বারাবরিস—পুরাতন সর্দি, জর্দাটে বা সজাটে পূর্ববৎ শ্লেষ্মা বাম নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত।

বরোইটা—ব্যাবি সাংক্রামিক রূপে উপস্থিত হইলে আক্রমণের পূর্বে ইহা সেবনে রোগ না হওনেরই সম্ভাবনা।

বেল—গলা ব্যথা ও স্বরভঙ্গ, মাথা দপদপানি ও নড়ায় তাহার বৃদ্ধি, নাকের ভিতর ও মুখের কূসে ঘা, ঘাড় ফুলা ও শক্ত। কাশিতে কাশিতে শিশুর কান্না, নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা না হওয়া। শীত ও তাপ পর পর হওয়া। আকন সেবন করিয়াও অল্প অল্প জ্বর এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম ও ফুলা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ব্রাই—ক্রুর শ্লেষ্মা, বুক ব্যথা, কাশি ও মাথা কাঁপনি। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদাহিত ও ক্ষতবিশিষ্ট। সর্দি-জ্বর ও শ্বাসথর্ব্বতা, কপাল ও চোয়াল বেধা, টানা, ছেঁড়া এবং নক্স ব্যবহারে উপকার না দিলে ইহা প্রযুক্ত্য।

ভেরাট-ভি—প্রচণ্ড জ্বর, নাড়ী দ্রুত, প্রলাপ এবং অন্ধাফেপের উপক্রম।

মার্ক—সাংক্রামিক সর্দি, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতঃস্রাব জন্ত মাথাধরা, চক্ষুজ্বালা করা ও তাহা হইতে জল পড়া, ঘন ঘন হাঁচি এবং নাক ফুলা ও লাল এবং উঠা হইতে প্রচুর সর্দি ঝরা, গলা ও দাঁত ব্যথা, উৎকাশি, রাত্রে যাতনাবিকা ও অধিক ঘাম। আর্সের পর ইহা অধিক খাটে, বিশেষ ত্রোগী স্থলকায়, কফাংশ ধাতুগ্রস্ত এবং নাসারন্ধ্র লাল ও ঘাবিশিষ্ট হইলে।

মার্ক-ভা—নাকের হাড় ফুলা, রন্ধ্রে মেড়মেড়ি পড়া এবং উহা পরিষ্কার করার রক্তপাত। নাক হইতে দুর্গন্ধ সজাটে পূর্ব নির্গমন। গরমির পীড়া হইতে রোগের উদ্ভব।

রস—পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাক হইতে অনিচ্ছাধীন ঘন জর্দা শ্লেষ্মা পড়া। নিঃশ্বাস অত্যন্ত গরম, নাসিকার নিম্ন প্রদেশে এবং উপরের ঠোঁটে জ্বর ঠুঁঠার জ্বায়ে ফুসকুড়ি হওয়া ও তথায় মেড়মেড়ি পড়া, হাড় ব্যথা। ভেজা জন্ত সর্দি।

লাইকপ—পীড়া ক্রুর হইলে। সকল প্রকার সর্দি, রাত্রে নাক বন্ধ দরুণ

মুখ দিয়া নিঃশ্বাস তাগ জন্ম গলা শুক হওয়া, কিন্তু বড় পিপাসা না হওয়া, নাথার গোলোযোগ এবং কপাল জ্বালা।

লাকাসি—নাক চক্ষু দিয়া জল ঝরা, নাক আটকান। মুখ শুক ও তথায় লক্ষ্য জ্বালা, উৎকাশি, শ্বাস-থর্বতা ও বুক ফুঁড়ুনি। গলায় হাত দিলেই কাশি ও দম-আটকান। বৈকালে ও নিদ্রার পর বৃদ্ধি। পুরাতন রোগ, নাসারন্ধ্র টাটান ও তথায় মেন্ডেনিডি পড়া, রক্ত ও পুষ্ণ ঝরা। নাক দিয়া অতিরিক্ত দুর্গন্ধ রস নির্গত। নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠ ফুলা ও টাটান, নাকে ছিপি পরান বোধ, কাণ মধ্যে ভৌ ভৌ শব্দ, মাথাধরা, চিন্তায় অক্ষমতা, বদ মেজাজ এবং নক্ষ ব্যবহারে উপকার না হইলে।

ষ্টিক্তা—নাক সড়সড়ানি, শুক ও ব্যথা, সর্বদা হাঁচি, চক্ষু পোড়া, কপাল ব্যথা ও গর্ভা শুক জন্ম গিলিতে কষ্ট।

সঙ্কর—জলের ঞায় সর্দি ঝরা, তার ও ব্রাণ হীন হওয়া, শীত তাপ ও পাঠাণ্ডা, পুরাতন রোগ, নাক বন্ধ, ঘন সজ্জা জর্দা শ্লেষ্মা নির্গত, নাক ব্যথা, বধিরতা। ঞতু পরিবর্তন নিমিত্ত ইহা দেওয়া বিধি, বিশেষ বাহার পরিপাক কার্য স্চাকরূপে ইয় না, তাহার পক্ষে অধিক উপকারী।

সাইক্লমেন—পুনঃ পুনঃ হাঁচি, প্রচুর সর্দি ঝরা, গন্ধ ও তার হীন, মাথা ও কাণে বেদনা।

সান্ধুই—কখন নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরা, কখন বা নাক বন্ধ হওয়া, নাক ঝাড়ায় প্রতিকার না হওয়া, মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলা, চক্ষু ছুঁইলে বেদনা, ডান চক্ষু হইতে জল ঝরা, গলা ও বুক ব্যথা, কাশি, পরে উদরাময়।

সামুকস—নাকে দড়ির ঞায় সিক্রি বা নাসারন্ধ্র এককালে শুক ও বন্ধ হইলে। ঞায়ু-প্রধান এবং ঞাহারা অধিক ঘামে ও দমকা বাতাসে বাহাদের সর্দি হয় এমত সকলের পীড়া পক্ষে। নাক বন্ধ জন্ম মাই টানিতে না পারা, রাত্রে হঠাৎ শ্বাস-রোধ।

সিপা—চক্ষু ও নাক হইতে প্রচুর জল ঝরা, কাশি, শ্বাসশ্বালী যেন ছিঁড়ে পড়া ও তজ্জন্ম বৃক্ষ চাপিতে বাধ্য হওয়া।

সিমিস—নাক হইতে জল ঝরা, হাঁচি, মাথাধরা, স্বরভঙ্গ, কাশি, গলা ও বুক ব্যথা এবং চক্ষুগোলক ব্যথা, পাতাভার জন্ম চক্ষু খুলিয়া রাখিতে না পারা।

ঠাণ্ডা বাতাসে কষ্ট । মাথার চুল টাটান ও আড়ষ্ট, সর্দি জ্বর, শরীরে বেদনা, অতিশয় স্নায়বিক দুর্বলতা ।

সিকেল—নাক বন্ধ ও জল বরা ।

সিলিসা—পুরাতন সর্দি, কটু স্লেথ্যা ক্ষরণ, স্লেথ্যা গাঢ় ও শক্ত জন্ম নাক বন্ধ, ভ্রাণহীন হওয়া, দীর্ঘকাল নাকের আগা চুলকুনি, প্রাতে নাক বন্ধ, দিবসে সর্দি বরা ।

সেপি—নাক ফুলা ও তাহাতে প্রদাহ, নাসারন্ধ্রে ঘা ও উহা টাটান, ক্রুর স্লেথ্যা, নাক বন্ধ, ভ্রাণহীনতা, পীঠ ব্যাথা, ঘাড় শক্ত, কাশি, পাকায় খালি বোঁক ।

স্পাইজি—প্রচুর স্লেথ্যা, রাত্রে উহা গলায় জনাট হওয়ায় দম আটকান প্রায় হওয়া ।

হাইড্রাস—নাক দিয়া নিরন্তর ঘন দিক্রি ও চক্ষু দিয়া জল বরা । নাসারন্ধ্রে হাজা ও টাটান ।

হিপার—অধিক পার্য ব্যবহারের পর অতি সামান্য কারণে সর্দি হইলে বিশেষ উপকারী । দম আটকান ও স্বরভঙ্গ, কাশি, অধিক স্লেথ্যা উঠা, গলা মধ্যে ঘেন চোঁচাড়া থাকা বোধ । নাসিকার এক প্রান্তের পীড়া, মাথাধরা ও নড়ায় বা ঠাণ্ডা বাতাসে বন্ধি, অথবা মার্ক ব্যবহারে উপকার না হইলে ইহা বিধি ।

অন্ন, লঘু ও শুষ্ক খাদ্য, ভাতের বহলে রুটী চিড়ে ভাজা মুড়ি বা সাগু, পপম । ঠাণ্ডা বাতাস লাগান অবিধি । সূর্যোদয়ের পর শয্যা হইতে উঠা এবং ঘান হইবার নিমিত্ত শরীরকে গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা এবং মধ্যে মধ্যে অন্ন অন্ন জল পান করিতে দেওয়া উচিত । সবদিকারের শরন কালীন এক বা দুই গ্লাস জল পানে বিলক্ষণ বর্ষ্য হয় । শয়নের পূর্বে কুহুই হইতে আঙ্গুর এবং হাঁটু হইতে পায়ে পাতা পর্যন্ত গরম জলে ১০।১৫ মিনিট কাল দোত করিয়া পরে গরম বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখায়, বর্ষ্য হইয়া স্বস্থতা লাভ করে । অথবা দুই দিবস জল পান এককালে বন্ধ রাখা উচিত । সজ্জনি অবস্থায় শীত, গা হাত ভার, হৃক শীতল, শরীর মাটি মাটি, এমন অবস্থায় আদত কপূরের আরম্ভ ১।২ কোটা চিনিতে ফেলিয়া বণ্টায় বণ্টায় খাইতে দিলে আশু উপকার সম্ভাবনা । এই শ্বেদোক্ত ব্যবস্থা বয়স্কদিগের পক্ষে ।

## দস্তোদাম বা দাঁত উঠা।

দস্তাধার হইতে অস্থিবিশিষ্ট হইয়া আবর্তন ভেদ করতঃ সচরাচর শিশুর ছয় মাসের পর দন্ত বিনির্গত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার কক্ষিং পূর্বে মাড়ি ফুলা ও তাহার সড়সড়ানির জ্ঞাত শিশু সদাই শক্ত দ্রব্য কামড়াইতে চাহে। এই সময়ে চুষির প্রয়োজন; রং করা চুষি ব্যবহারে অপকার সম্ভব, সুতরাং হাতের দাতের, কাষ্ঠের রং শূণ্য বা রবরের চুষি দেওয়াই বিধি। সর্ব প্রথম উপর পাটির মাঝের দুইটী, কয়েক সপ্তাহের পর, অপর পাটির দুইটী, এইরূপে ক্রমশঃ আড়াই বৎসরের মধ্যে সমুদয় ছেদ দাঁত নির্গত হয়। ঐকালে শিশুর মাড়ি শক্ত, মুখ দিয়া অধিক লালপড়া বা সামান্যতর উদরাময় এবং তাহার পূর্বাপেক্ষা কিছু অধিক কঁাছনে হইতে দেখা যায়। কখন কখন মাড়ির প্রদাহ বশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পায়। বিশেষ দুর্বল ও স্নায়ু-প্রধান শিশুর এক কালে অধিক দন্ত নির্গত হইলে অত্যন্ত জ্বর, অনিদ্রা, শরীর আইটাই করা, গালগলা ফুলা, চক্ষু আরক্ত ও ঘূর্ণী, দড়কা-কাশি, হিকা, অঘোর, ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবসন্ন হওয়া, মাথা সোজা রাখিতে না পারা, মাড়ি ফুলা, লাল, গরম ও ব্যথা এবং প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত মুখ টাটানি, উদরাময়, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে।

মাংস-ভোজীর ছায় অগ্রাহ্যরী মাড়ি তত শক্ত হয় না। বিশেষ কষ্ট ভিন্ন দাঁত নির্গত হয়। মাড়ি চিরিয়া দেওয়া ঐ প্রকার আবশ্যক হয় না—অস্ত্র করায় সেই স্থান শক্ত হয় এবং কাজেই দন্ত সহজে বাহির হয় না। ঔষধে উপসর্গ দূর না হইলে এবং দড়কা কালীন ও দাঁত দেখা যাইতেছে এমন স্থলে মাড়ি উদ্ধারিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দস্তোদাম কালীন শিশুকে হিম বা ঠাণ্ডী লাগাইতে অথবা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া অনুচিত। বিস্তৃত বায়ু সেবন ও মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিধি। ঔষধ দিনের মধ্যে ৩৪ বার এবং যে ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করা হয়, তাহা ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার বিধি।

দস্তোদাম সময়ে অনিদ্রা—আকন, কফি, জেলস, হাইয়স; (শরীর আই-

টাই—ক্রিয়োস)।

দস্তোদাম কালে কাশি—ক্রিয়োস, সিনা।

দস্তোদগম, অসময়ে, নিয়মিত কালের পূর্বে বা পরে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা  
কাঠি—নক্স, ব্রাই ; আকন, প্রথম, মাগিসা-ম, সল্ফর।

—সময়ে গা বমি বমি, শীত শীত ও ভেদ—ভেরাট।

—গা বমি বমি ও জমাট ছধ তোলা—কালী-ক্লো।

—জ্বর ও অধিক তৃষ্ণা—আকন।

—মাথা গরম, গওদেশ আরক্ত, চক্ষুর পুতলি বিস্তৃত—বেল।

—সবিরাম জ্বর, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা—জেলস।

—এক গাল পান্নাশ ও অপর গাল লাল—কামো।

যে সকল শিশু স্তনদুগ্ধ পায় না, তাহাদের দস্তোদগম সময়ে পীড়া—নক্স।

দস্তোদগম কালে দড়কা—ইগ্নে, ইপি, কামো, কাক্সা, কুপ্রম, নক্স, মার্ক, বেল।

—ভেদ—আর্স, কামো, কাক্সা, কালো-ক্লো, ডক্সা, পড, মার্ক।

—বমন—ইপিকা।

—ভেদ, ছধ বা জল বমন ও অতিশয় তৃষ্ণা—আর্স।

স্বভাবতঃ মুখ হইতে লাল ভাসিলে, তরল বাহ্যে হইলে, রক্ত মস্তিকে উর্দ্ধগ বা ফুস্ফুসে সঞ্চয় হইতে পারে না এবং ঐ সমস্ত উপসর্গ অতিরিক্ত না হইলে উহা নিবারণ করা অযৌক্তিক। হিম, বা ঠাণ্ডা লাগা জন্ত উহা হঠাৎ বন্ধ হইলে পুনঃ প্রকাশ নিমিত্ত বন্ধ করিবা।

আকন—মাড়ি উত্তপ্ত ও লাল, অঙ্গুলি, হাতের মুঠা বা স্তনের বোটা কামড়ান, মাথা গরম, জ্বর, অত্যন্ত তৃষ্ণা, সর্বদা কান্না, অস্থিরতা, প্রায়ই সবুজ জলবৎ ভেদ, কখন আম রক্ত, এবং কচিং কোষ্ঠবদ্ধতা।

আর্স—মাড়ি কাল ও জল পূর্ণ ফোঁকা বিশিষ্ট, মাথা ও বদন হাত দিয়া আঘাত করা, কণ্ঠের চেহারা, তৃষ্ণা জন্ত পুনঃপুনঃ ক্রুর করা, প্রায়ই অজীর্ণের দুর্গন্ধ মল, কখন কখন রক্ত মিশ্রিত, কচিং বা কঠিন বাহ্যে, দিন দিন ক্রশ হওয়া ও ত্বক তোবড়ান এবং শুষ্ক হওয়া, জল বমন, বিশেষ পানের পর। এগোড় ওগোড় ও ছট্‌কট্‌ করা।

ইগ্নে—অতি কষ্টে দস্তোদগম, ঘুমন্ত হঠাৎ চীৎকার করিয়া জাগা ও সর্বদা কাঁপিতে থাকা, (এইরূপ প্রত্যহ একই নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া); পুনঃ পুনঃ গা গরম ও ঐ সঙ্গে বমি; অধঃ-চোয়ালে আক্ষেপ আরম্ভ হওয়া;

দড়কা সহ কোষ্ঠবদ্ধ বা রক্ত বিশিষ্ট আম বাছে সহ কৌতপাড়া ও মলাশয় বাহ্য হওয়া ।

ইপি—দাঁত উঠা কালীন সর্ষদা ওয়াক তুলা, কখন বমন, নানা বর্ণের বা সর্বজা গাঁজলাটে ভেদ, চক্ষু পাক্সাশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কালুশিরা পড়া, সর্দি, গলা ঘড়ঘড়ানি ও দম আটকান কাশি ।

অপিস (এপিস)—দস্তোদগম সময়ে রাত্রে অনেক বার চীৎকার করিয়া জাগা, জিজ্ঞাসিলে বলে কিছুই নহে, শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ । প্রায়ই অকষ্টকর সব্জ জলবৎ, কখন কখন রক্ত মিশ্রিত ভেদ । সদা হাই উঠা ও অমুখ হওয়া । ইহা ক্রমান্বয়ে ১০।১৫ দিন সেবন বিধি ।

ককি—অস্থিরতা, অনিদ্রা ও তজ্জন্ত নেতাইয়া পড়া, গাত্রতাপ, কাদিতে কাদিতে হান্না, আবার কারা ।

কলসিন্ধু—মাড়ি ব্যথা, শূলের ন্যায় পেটে বেদনা, কখন কখন ব্যথিত প্রদেশ চাপায় স্বস্তি বোধ, জলো গাঁজলাটে আরক্তিম আম বা পাঁচু রঙ্গা হড়হড়ে ভেদ ।

কল্চিকম—দাঁত উঠা কালীন মাড়ি পাক্সিয়া উঠা, দড়কা, মাথা এগোড়-ওগোড় করা, ভেদ বা দীর্ঘ কোষ্ঠবদ্ধতা ও চক্চকে আমবিশিষ্ট মল তাগ ।

কানো—মাড়ি লাল ও ব্যথা, সামান্য শব্দে বা ঘুমন্ত চমকানো কারা, অঙ্গ-ক্ষেপ বা পেশী বিশেষের টিড়িকমারা, ঘন ঘন ক্ষুদ্র শ্বাস ও শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস, কখন কখন উৎকাশি, অত্যন্ত তৃষ্ণা, ভেদ, এক অপেক্ষা অপর গাল গাঢ় বর্ণের হওয়া ।

কাক্সা—কখন কখন আঙুড়ি দাঁত উঠা । কিন্তু প্রায়ই বিলম্বে ও আস্তে দস্ত বাহির হওয়া এবং তৎকালে অর বা দড়কা, গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের ঐ সময় চক্ষু প্রদাহ ও তথায় কুসকুড়ি ; মাড়ি খুব শক্ত হওয়া, ফুলা ও ব্যথা এবং শিশু দুর্বল ও তাহার চটা স্বভাব । যাহাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বড় ও বিলম্বে জোড়া লাগে, মাথা ঘামে, যাহারা অধিক দিনে দাঁড়ায় ও হাঁটে, যাহাদের পেট ডাগরা ও কাশি থাকে, এমত সকল শিশুর পক্ষে ইহা বিশেষ খাটে ।

কাস্তা-ফস—দাঁত উঠা কালীন পেট ফাঁপা ও ভেদ, দুধ লোস্তা লাগা জন্ত স্তনপান করিতে না চাওয়া, মাথা তুলিতে ও ফেরাইতে হুলিতে থাকা, নাক



হইতে জল ঝরা, কাণ ও নাকের আগা ঠাণ্ডা, অবির, ক্ষীত ও বাহির হওয়া ; চক্ষু যেন তৈলে বাহির হওয়া ; মাথার খুলি কোমল ও টিপিলে খড় খড় শব্দ হওয়া । বিলম্বে ও কষ্টে দাঁত উঠা, শরীর শীর্ণ, কাশি ও বুক ঘড় ঘড়ানি হওয়া ।

কাষ্টিক—মাড়ি ফুলা ও মাঝে মাঝে পাকিয়া উঠা, দড়কা, বমন, দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধতা বা চক্চকে আমযুক্ত মল ত্যাগ, বিশেষ চর্মরোগ থাকিলে ।

কিউপ্রম—ঝিঙ্ক মুখে দিলে মাড়ি দিয়া কামড়ান, মুখ শুষ্ক, পেট ব্যথা, শ্লেষ্মা বমন, সবুজ মল, অঙ্গ খেঁচুনি, হাত পা ছোড়া, আঙ্গুল বেঁকে যাওয়া, গলা ধরিয়া যাওয়া, গাঁজলু ভাঙ্গা, পুনর্ব্বার আক্ষেপ বা দড়কা না হওয়া পর্য্যন্ত চীৎকার ও কান্না ।

ক্রিয়োসোট—কষ্টে দাঁত উঠা এবং তজ্জন্ম কাশি, দড়কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, কখন বা ভেদ এবং যত্নে ঘুম না লাড়াইলে নিদ্রার অভাব, প্রথমতঃ প্রদাহ, পরে মাড়ি নরম হইয়া ক্ষয় হইতে থাকা এবং দাঁত বাহির হইবার পূর্বেই নষ্ট হওয়া । অথবা নিয়মিত সময়ের পূর্বে ছুধে দাঁত প্রথমে জন্মা, পরে কাল হইয়া শেষে ক্ষয় হয় । মাড়ি হইতে রক্ত পড়া এবং বদনে স্বাভাবিক বেদনা জন্ম আক্ষেপ । একহারা চটা-স্বভাব লোকের পক্ষে বিশেষ খাটে ।

গ্রাইট—মাড়ি ফুলা ও অত্যন্ত ব্যথা, রুদনে রসভরা ফুস্ফুড়ি, অস্থস্থ বা চুলকনা-বিশিষ্ট স্বক, কানের পশ্চাত্তাগ, গলা ও হাঁটুর খাঁজ হাজা ।

গ্লাফেলিয়ন-পলি—পেট কামড়াইয়া প্রচুর জলবৎ বলক্ষয়কারী ভেদ, বিশেষ গ্রীষ্মকালে ৬ দাঁত উঠা কালে ।

জিঙ্ক—দাঁত না উঠা দরুণ পীড়া, মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতের উপসর্গ । উৎকট রোগ ও রোগীর চরমাবস্থা । ঘোর তন্দ্রা, চক্ষুস্থির ও অন্ধ মুদ্রিত, বদন কখন লাল কখন ফেকাসে ও শীতল, হিমাক্ত, অচেতন, নাড়ী অপ্রাপ্য-প্রায়, শ্বাস-কষ্ট, পেট গরম ও খসা এবং অনিচ্ছাধীন শৌচ প্রস্রাব, ঢেঁড়ান, সর্পিঙ্গ কাঁপা, নাক মধ্যে আঙ্গুল দেওয়া বা ঠোঁঠ টানা, সদা পায়ের পাতা নাড়া । কখন প্রলাপ বকা, চিনিতে না পারা, মাথা এগোড় ওগোড় করা, চক্ষু ঘোরা, দড়কা, লাকান, গা গরম হওয়া, অস্থিরতা বিশেষ রাত্রি ।

জেল্ড—দস্ত উঠা কালে জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, হঠাৎ চীৎকার ও দড়কার উপক্রম, বলক্ষয় ।

ডকা—ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দাঁত উঠার বাতনা বৃদ্ধি, লাল ভাঙ্গা, উদরা-  
ময়, সন্ধি, পুনঃ পুনঃ হাঁচি।

নক্স—দাঁত উঠার সময় জ্বর, আনন্দ্রা বা ঝিমন, পেট ফোলা, কোষ্ঠ-কাঠিন্দ্র  
বা পুনঃ পুনঃ বাহে, উৎকাশি, শেষ রাত্রে বাতনা বৃদ্ধি, ঘনি ও এক ভাঁয়ে  
স্বভাব। যে সকল শিশু ঢোকা ছুধ খায় তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ ঝাটে।

নক্স-ম—বলক্ষরকারী\* ছেকড়া ছেকড়া ভেদ, ঝিমন, গ্রীষ্মে ও রাত্রে  
যাতনাধিক্য।

পড—মাড়িতে মাড়িতে ঘর্ষণ ও ঘুমন্ত গোঁড়ান এবং চীংকার করা, মাথা  
গড়ান, প্রাতে কষ্টকর সবুজ বা জলবৎ শাদা বা নানা বর্ণের ভেদ, জ্বাটেনেকার,  
দড়কা, গোগোল বাহির হওয়া। গ্রীষ্মে এবং আহার ও পানের পর বৃদ্ধি।

ফেরম—অল্পে অল্পে (একটু একটু করিয়া) দাঁত বাহির হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী  
অকষ্টকর দুর্বলকারী অজীর্ণের ভেদ, মলদ্বার হাজা এবং খাওয়ার পরই  
ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলা, শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্বল-কারী ঘাম হওয়া।\*

বেল—অতি কষ্টে দস্তোদগম সহ মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয় ও মস্তিষ্কের  
উপদাহ। মাথা অত্যন্ত গরম, অধিক গোঁড়ান, বদন ও চক্ষু আরক্তিম, চক্ষুর  
পুতলি বিস্তৃত, ঘুম ভাঙ্গায় আতঙ্কের দৃষ্টি, চমকান, লাকান ও কাঁদা, দড়কার  
পরই হুনিদ্রা, অপরাক্তে রোগ বৃদ্ধি, রাত্রে জ্বর ও সেই সঙ্গে প্রলাপ, সবুজ আম-  
যুক্ত টক গন্ধের মল তাগ, সেই সময় কম্প; কখন কখন বা অসাড় বাহে  
হওয়া, মাড়ি কখন কখন লাল, স্ফীত ও প্রদাহিত হইলে এবং তথায় ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র রক্ত শিরা উঠিলে।

বোরাক্স—মূথের ভিতরে ও মাড়িতে যা থাকা জন্ত শিশুর স্তন টানিতে  
ভাল না পারা, স্তন্যের স্তন্যনা ধরা ও সামান্য কারণে চমকান, কান্না এবং  
নিকটস্থ পদার্থ জড়াইয়া ধরা। নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চ হইতে নিম্নে অথবা কোল  
হইতে নামাইলে পতনের ভয়ে জাগিয়া পড়া; কষ্টে দাঁত নির্গত হওয়া।

ব্রাই—মাড়ি গরম, ফীত ও অন্ন লাল, ঘৃণ এবং ঠোঁঠ কাটাফাটা শুষ্ক, হয়ত  
পানের কিছু পরই অধিকৃত ছুধ তোলা, মল কঠিন ও পোড়ার স্থায়; প্রাতে  
ভেদ, গা ঠাণ্ডা ও শীত, স্থির থাকার ইচ্ছা, নাড়ায় কষ্ট, চটা স্বভাব, অধিক  
মাত্রায় পানের ইচ্ছা।

ভেরাট—মাড়ি ফুলা এবং দাঁত উঠা উপলক্ষে বমন ও কাটেনেকার, একটু সামান্য নড়ায় উহার বৃদ্ধি, প্রতিবার ভেদের পরই নেতাইয়া পড়া ও কপালৈ ঠাণ্ডা ঘাম, হাত পা ঠাণ্ডা, খুব দুর্বল, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, মুড়া ঠাণ্ডা হওয়া ।

মাগ্নিসা-কা—নিয়মিত সময়ের পরে দন্ত নির্গত হওয়া, সব্জা গাঁজলাটে টক গন্ধের ভেদ, পুনঃ পুনঃ টক বমন, অরুচি, রোগ পুরাতন হইয়া শিশুর দিন দিন শীর্ণ হওয়া ।

মাগ্নিসা-ম—দেহিতে দাঁত উঠা, শিশুর পেট ভাঙ্গা, মল লঘাকৃতি ও থানি-কটা বাহির হইয়াই ভাঙ্গিয়া পড়া ।

মার্ক—মাড়ি লাল এবং কখন জিহ্বা ও মুখের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, অধিক লাল ভাঙ্গা, সব্জা হড়হড়ে বা রক্ত-বিশিষ্ট ভেদ ও অতিরিক্ত কৌত পাড়া, জর্দা ও চড়া শ্রাণের প্রস্রাব, রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি। উদ্ভিন্নময় জন্ত (কামোর) পর ইহা বিশেষ ংটে ।

রিয়ম—দন্তোদগম কালে পেটে শূল বেদনা হইয়া টক ভেদ ও মল ত্যাগের পরও বিলক্ষণ বেগ, সুমস্ত শরীরে টক গন্ধ, ধুইলেও সে গন্ধ না যাওয়া, নড়িয়া বেড়ানয় বা গাত্রের আবরণ খোলায় ভেদ হইতে থাকা ।

লাইক—দন্তোদগম কালীন অর্ধমুদ্রিত চক্রে নিদ্রা ও নাখা এগোড় ওগোড় করা, পরে গৌড়ান, প্রস্রাবের পূর্বে চাঁৎকার ও কান্না, ত্যাগের পর শযায় (কাঁথায়) লাল বালুকাকণা দৃষ্ট হওয়া—পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় জন্ত পেট হড়মুড় করা এবং বৈকাল ৪ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত রোগ বৃদ্ধি, পরে রাত্রে সমভা ।

লাকাসি—মাড়ি গাঢ় বেগুনে বর্ণ ও স্পর্শে বেদনা, গিলিতে কষ্ট, গল্গা ছুইতে না দেওয়া, ঘুম আসিবার সময় দড়কা, নিদ্রা ভঙ্গের পর যাতনা বৃদ্ধি ।

ষ্টানম—দন্ত উঠা বশতঃ মৃগীর আয় মূর্ছা, উপুড়ে হইয়া না শুইলে শিশুর স্থির না থাকা ।

ষ্টাকিসিগ্রিয়া—দুধে দাঁত সম্পূর্ণরূপে বাহির হইতে না হইতে ভাঙ্গিয়া পড়া ।

ষ্ট্রাম—মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব বা গোলযোগ, মাড়ি পেষা, দাঁত কিড়নিড়ি করা, দড়কা সহ কান্না, নিদ্রা ভঙ্গে আতঙ্কের চেহারা, ঘুমন্ত অবস্থায় হাত, বিশেষ আবুল নাড়া, পচা গন্ধের কাল্চে ভেদ হওয়া ।

সল্ফর—দাঁত উঠা কালীন শাদা ও টক বা রক্ত-বিশিষ্ট সব্জ বাছে,

মলদ্বার হাজা ও টাটান, মল ত্যাগে চীৎকার ও ছটফটানি, গাত্রে অতিশয় চুলকনা-বিশিষ্ট স্কেটক, বার বার ঘুমভাঙ্গা, খুব প্রাতে অসামান ভেদ, আক্ষেপের পর মাথা গোঁজড়ান এবং চেহারা কখন লাল কখন ফেঁকাশে হওয়া । কোষ্ঠবদ্ধতা এবং নল্ল ও লাই দিয়া না সারিলে এবং ভেদে মার্ক সেবনেও রোগের কষ্টের থাকিলে, ইহা প্রয়োগ বিধি ।

সল্ফ-আ—মাড়ি ফুল্ল এবং তথা ও মুখে বা, সদা ছেপ ফেলা, খেঁতখেঁতে হওয়া ও সদা কান্না, অকুচি, জর্দা ছেক্ড়া ছেক্ড়া আম ও মল বাছে ও অতি-শয় ঢর্কল হওয়া ।

সাইপ্রিপিডিয়ম—মস্তিষ্কের উপদাহ, শিশুর মনের উত্তেজনা, অসময়ে হাসি ও খেলা, অস্থির ও জাগ্রত থাকা, ঘুমন্ত দেয়ালা দেথা ।

সিকুট—দাঁত কিড়িমিড়ি, দাঁতকপাটির ঝায় চোয়াল চাপা বা বন্ধ, দড়কা, হাত পা নড়-নড় ( শিথিল হওয়া ) করা ও ঝোলা অথবা কাষ্ঠবৎ শক্ত ও খাড়া বা সোজা থাকা, অর্দ্ধ নিদ্রা ও আইচাই করা ।

সিনা—মাড়ি পেবা বা দাঁত কিড়িমিড়ি, সদা নাক রগড়ান বা ঘষা, অধিক ক্ষুধা, খ্যাংখেঁকে উৎকাশি, পিপাসা, পানের পরই ভেদ, পেট ব্যথা জন্ম চীৎকার, ঘুমন্ত অলবাল ( ছটফট ) করা, কিন্তু দোলাইলে ভাল থাকা, কাদিতে কাদিতে হাসি ও পুনর্বার কান্না, বদন পাঙ্গাশ, বিশেষ নাক ও মুখের চতুষ্পার্শ্বে, প্রস্রাব হ্রদের ঝায় শাদা, থিটথিটে, শিশুর দিকে তাকাইলে, তাহার সহ কথা কহিলে বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে বিরক্ত হওয়া বা চটা, আবদারে হওয়া, কিন্তু প্রার্থিত দ্রব্য দিলে ছুড়িয়া ফেলা ।

সিলিসা—গওমালা ও কুনি-ধাতুবিশিষ্ট শিশুর পক্ষে ; পুনঃ পুনঃ বা নিয়ত মাড়ি হাত দিয়া ধরা, অল্লিক লালা ভাঙ্গা, সন্ধ্যায় জ্বর ও মাথা গরম, অথবা যাতাদের বড় মাথা ও দীর্ঘ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগে, ও মস্তকে প্রচুর ঘাম হয়, তাহাদের পক্ষে উপকারী । পেট শক্ত, গরম ও ফীত, ওঙ্কান মাড়িতে বেত্তারার ঝায় কুস্ফুড়ি ও তথাকার সাড়াধিক্য এবং শক্ত মূল খানিকটা বাহির হইয়া হড়াং ঝুরিয়া ভিতরে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়া ।

স্কুটিলোরয়া—বাতাধিক্য ধাতু, অতিশয় অস্থিরতা, হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা এবং পেশীর কম্প ও চিড়িক মারা ।

হাইয়স—মুখ মধ্যে অঙ্গুলি দেওয়া, মাড়িতে মাড়িতে সংঘর্ষণ ও চর্ষণ, চক্ষু চক্চকে ও লাল, তাহার পুত্রলি বিস্তৃত, বদন ক্ষীত ও উহার পেশীর খেঁচুনি, অসামান্য জলবৎ জর্দা ভেদ, গাঢ় নিদ্রা, বিড় বিড় করা ও শয্যা খোঁটা।

হিপার—মাড়ি খুব কোমল ও ব্যথা-বিশিষ্ট, পাকাশয়ের গোল বা বিকৃত ভাব, খুব টক বা কাঁকাল খাদ্যে স্ফূর্তি, শাদাটে টক গন্ধের ভেদ, সর্বদা অতিরিক্ত ও প্রচণ্ড চুলকুনি, বিশেষ মাথার খুলিতে।

### দন্ত-মাড়ির পীড়া।

নানাবিধ উপসর্গ।

মাড়ির প্রদাহে—বেল, মার্ক ; চিন, নক্স, ষ্টাফিস, সল্ফর, হিপার।

মাড়ি ফুলা—আম-কা, আম-ম, কাক্স, চিন, জিংক, নক্স, নেট্রম-আ, ফস, ফস-ম, মাড়িতে গ্যাজ, অথবা স্ফোটিক হইলে—ষ্টাফিস, সিলিসা, সল্ফর, কাক্স।

—ক্ষত—কাক্স, নেট্রম, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্ফর-আ।

—নালী ঘা—কাক্স, ফ্লো-আ, লাইক, ষ্টাফিস, সিলিসা।

—( Scorbutic ) শীতাদ ( দীর্ঘকাল টাটকা দ্রব্য বা তরকারী না থাওয়া দমন, বিশেষ জাহাজি নাবিকের রোগ পক্ষে )—কার্বো, কাস্টিক, ক্রিয়োস, চিন, নেট্রম, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্ফর।

অধিক পারদ ব্যবহার জন্ত মাড়িতে রোগ পক্ষে—কার্বো, চিন, নাইট্রী-আ, হিপার।

মাড়ি হইতে রক্তপাত—কার্বো, ষ্টাফিস ; আর্কট, আরম, কাক্স, জিংক, নাইট্রী-আ, মার্ক, সিলিসা।

### মাড়িতে স্ফোটক।

মাড়ি উত্তপ্ত, লাল ও ব্যথায়ুক্ত হয়, এবং কুলিয়া পাকে ও তথা হইতে বা গাল ফাটিয়া পু্য নির্গত হয়। নিম্নীল বা ক্ষত-বিশিষ্ট দন্তের উপদাহ জন্ত রোগ, প্রথমে যত্ন না করিলে ইহাতে দাঁতের অস্থির পর্দা উঠার সম্ভাবনা।

বেল—প্রদাহিত অবস্থা ; মুখ ও তালু পর্যন্ত টাটানি ; লাল, শক্ত ও বাথা-  
বিশিষ্ট ক্ষেটিক এবং সেই স্থানে জালা, দপদপানি ও হল ফুটুনির ভায়া যাতনা হয়।  
পূর্ব উপসর্গের সঙ্গে মুখ দিয়া অধিক লাল ভাঙ্গা থাকিলে—মার্ক । এই  
ঔষধদ্বয় পর পর ব্যবহার হইতে পারে এবং প্রথম প্রথম দিলে ফোড়া বসিয়া  
যায়, আর পাকিতে পারে না । প্রদাহ তত প্রবল না হওয়া এবং অক্ষুধা,  
কোষ্ঠবদ্ধতা ও চটা এবং বন্ধ-মেজাজি পক্ষে—নক্স । কিন্তু রোগী নব-প্রকৃতি  
ও উদরাময়-গ্রস্ত হইলে—পল্‌স । রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা পাণ্টে  
রোগাক্রান্ত হইলে—সল্‌ফর । মাড়ির ফুলা বৃদ্ধি, উদ্ভগ্ন এবং নরন হইয়া দপ্  
দপ্ করা এবং পুষ সঞ্চারের অবস্থায়—তিপর ।

সিলিসা—মাড়ির প্রদাহিত ফুলা ও বাথা । কয়া দাঁতের উত্তেজনা জন্ত  
মাড়িতে ক্ষেটিক । চোয়াল ফুলা, বাথা ও হ্রগ্ন জলবৎ পুষ করণ ।  
দীর্ঘকালের নালী যা ও মাঝে মাঝে তাহার মুখ বন্ধ, কিন্তু সামান্য কারণে সেই  
যার পুনঃ প্রকাশ । আনাড়ির হাত দিয়া দাঁত তুলার পর বে যাতনা হয়,  
ইহা সেবনে তাহা যায় ।

জান-দস্ত ( আঁকেল দাঁত ) নির্গমন জন্ত মাড়ি উত্তপ্ত, লাল ও বাথা-যুক্ত  
হইলে এবং ঐ সঙ্গে কম বেশী জর থাকিলে—আকন । তৎকালে মাড়ি টাটানয়  
আণিকা । বদন ফুলায়, কামো, বেল । জান-দস্ত কষ্টে ও দীর্ঘকালে নির্গত  
হইলে অথবা প্রদাহ সারিয়া অতি সামান্যতর উপসর্গ নিমিত্ত—কাব্বা ।

## মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া ।

ফস-আ—মাড়ি যেন ছাল-হীন হওয়া, টাটান, মাড়ি ঘর্ষণ বা স্পর্শে  
রুধির পাত ।

মার্ক—মাড়িতে বাথা, ফুলা ও ভিডভিডে, সামান্য কারণে রক্ত পড়া । (পূর্বে  
অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে—কার্বো, চিন ।

মাড়িতে ক্ষত ও সামান্য কারণে তথা হইতে রক্তপাত ও রোগজুর পক্ষে  
কাষ্টিক, রুটা, লাইক । অল্প কিছুতে উপকার না দশিলে, অথবা পাণ্টে  
পাণ্টে রোগ নিবারণার্থ—আলুমি, সল্‌ফ-আ, সিলিসা, সেপি ।

হিম ও ঠাণ্ডা না লাগা, পরিমিত আহার, সূরা আদি উত্তেজক ও গরম মসলা ব্যবহার না করা এবং যত সম্ভব অল্প মৎস্য মাংস খাওয়া ; বিশেষ সর্বদা নুঁখের অভ্যস্তর ভাগ পরিষ্কার রাখাও অবশ্য কর্তব্য ।

### দন্তরোগ ।

পাকাশয়ের গোলযোগ, হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা বা দমকা বাতাস লাগায়, জলে ভিজায়, দাঁতের গোড়ায় স্ফোটক ও উহার হাড়ে ক্ষত এবং তথাকার স্নায়বিক মজ্জা আবর্তন-হীন হওয়ায়, পদার্থ মাত্র সংস্পর্শে কষ্টের একশেষ হয় । বাতনা এত অসহ্য ও ভয়ঙ্কর হয় যে, পীড়িতকে পাগল করিয়া তুলে ।

বাল্যকাল হইতে দন্ত পরিষ্কার রাখা কর্তব্য । এই নিমিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে আত্মিক কর্তব্য কর্ম্ম মধ্যে দাঁতন করার বিধি দিয়াছেন । নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষু মুখে জল, পরে কয়লা বা খড়ি দিয়া দন্ত মার্জনা এবং প্রতিবার আহার বা জলযোগের পর কুল্লি করা ও বয়স্কদের খড়্কে খাওয়া আবশ্যিক । খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত টক দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ । একরূপ করায় দাঁত অনেক দিন ভাল থাকে । অধিক পারা ব্যবহার অথবা ধাতু বিকৃতি জন্ত কেহ কেহ অল্প বয়সে দন্তহীন হয় ।

ব্যাধি যদিও মারাত্মক নহে, কিন্তু ইহাতে কখন কখন রোগীকে পাগল প্রায় করে । উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে অগ্নিতে জলপড়ার স্থায় তদগেই যাতনার সমতা হয় এবং সেই মিমিত্ত এই প্রস্তাবটা বিশিষ্ট ও বাহ্যরূপে লিখিত হইল । উপসর্গের সহিত মিলিয়াইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে নিষ্ফল হইবে না, ইহা পূর্ণ বিশ্বাস ।

- সময় ও কাল ।

বসন্তকালের-দন্তশূল—পল্‌স ; আকন, কার্বো, ক্লোকা, ডক্কা, নক্স, নেট্রম, ব্রাই, রস, সল্‌ফর, সিলিসা ।

গ্রীষ্মকালের রোগে—আন্ট, কামো, কার্বো, কাল্‌কা, নক্স, নেট্রম, পল্‌স, বেব, ব্রাই, লাকাসি ।

বর্ষায়—চিন, নক্স, ব্রাই, মার্ক, রস ।

শীতে—রস ; আকন, আর্স, ইগ্নে, কামো, কার্বো, কাল্‌কা, কাস্টিক, ডল্‌কা, নক্স, পল্‌স, ফস, ফস-আ, মার্ক, সল্‌ফর, সিলিসা ।

- দস্তশূল, প্রত্যাষে—আর্স, ইগ্নে, চিন, ব্রাই, রস, ষ্টাফিস, হাইয়স ।
- প্রত্যাষে, বিশেষ নিদ্রাভঙ্গ মাত্র—কার্বো, নক্স, বেল ।
- পূর্বাঙ্কে—পল্‌স ; সল্‌ফর ; কার্বো, লাকাসি ।
- মধ্যাঙ্কে—ককু, রস ।
- বৈকালে—নক্স, পল্‌স ; কাক্স, কাষ্টিক, ফস, মার্ক, সল্‌ফর ।
- সন্ধ্যায়—পল্‌স ; ইগ্নে, নক্স, বেল, ব্রাই, রস, সল্‌ফর ।
- সন্ধ্যায় শয়নে—মার্ক, ( আন্ট—প্রতাহ ) ।
- প্রথম রাত্রে—কানো, চিন, নেট্রম, বেল, ব্রাই, রস, সল্‌ফর ।
- দুই প্রহরের পর—আর্স, কার্বো, নক্স, পল্‌স, মার্ক, ষ্টাফিস, সল্‌ফর ( ৩ প্রথম রাত্রের ঔষধ ) ।
- দিবা স্নাত্তি—কাক্স, কাষ্টিক, নেট্রম, বেল, সল্‌ফর ।
- কেবল দিবসে, রাত্রে না থাকা—কাক্স, কাষ্টিক, নেট্রম, বেল, সল্‌ফর ।
- কেবল মাত্র রাত্রে, দিবসে নয়—ফস ।
- নিদ্রা-কালীন—আর্স ।
- এক দিন অন্তর—চিন, নেট্রম ।
- প্রতি সপ্তম দিবসে—আর্স, ফস, সল্‌ফর ।
- নিয়মিত বা নির্দিষ্ট কালে প্রকাশ—আর্স, চিন, বেল ।
- ক্ষণ লুপ্ত ( ক্ষণিক ধরা, আবার ছাড়া )—আর্স, কাফি, কানো, কাক্স, চিন, নক্স, পল্‌স, বেল, ব্রাই, মার্ক, রস, সল্‌ফর, ষ্টাফিস, সিলিসা ।

অবস্থা ।

- দস্তশূল, উদরাময়-গ্রস্তের—কানো, নক্স, পল্‌স ।
- প্রদাহিক—আকন, জেল্‌স, বেল ।
- বাতগ্রস্তের—আকন, চিন, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর ; ব্রাই, মার্ক, রস, সিমিসি ।
- স্নায়বিক—কামেই, মোনোই, সাইপ্রি, সিমিসি, স্পাইজি । আকন, কাফি, নক্স, বেল, হাইয়স ।



কারণ ।

দন্তশূল—জলে ভেজা বা আর্দ্রস্থানে বাস জন্তু—রস ; ডল্কা, মার্ক ।

—ঠাণ্ডা পান জন্তু—মার্ক, সল্ফর, ষ্টাফিস ।

—ঠাণ্ডা বাতাস জন্তু—আকন, ডকা, ব্রাই, সিনিসি সল্ফর ।

—ঠাণ্ডা ও আর্দ্রতা জন্তু—নক্স-ম, রস ।

—দুর্বলতা জন্তু—আর্স, চিন ।

—পারা ব্যবহার—কার্বো, বেল, লাকাসি, ষ্টাফিস, হিপার ।

—সর্দি বা ঠাণ্ডী জন্তু—আকন, কামো, চিন, ডকা, নক্স, বেল, মার্ক, সল্ফর ।

—স্বাভাবিক দুর্বলতা জন্তু—গ্লোনোই, নক্স, সাইপ্রি, সিনিসি ।

—কাওয়া-পায়ীর—ইথের, কামো ; নক্স, মার্ক, লাইক ।

—কুমির উপসর্গ থাকিলে—আকন, কামো, সিনা, স্পাইজি ।

—কাঁছনে ও খেদাবিত স্বভাব-যুক্তের—ইথের, পল্‌স, রস ।

—চটা ও উগ্র স্বভাব ব্যক্তির—নক্স, ব্রাই ।

—চটা ও ঝগড়াটের—কার্বো, নক্স, ব্রাই ।

—স্নায়ু-প্রধান-ধাতু ও নারাকাতুরের—আকন, কফি, কামো, হাইয়স ।

—শিশুর—আকন, আণ্টে, ইথের, কফি, কামো, কাক্স, পল্‌স, মার্ক, বেল সিলিসা ।

—বামার—কফি, কামো, কাক্স, চিন, পল্‌স, প্রাটিনা, বেল, সাবিনা, সেপি ।

—ঋতু কালীন—আন-কা ; কফি, কামো, কার্বো, কাক্স, গ্রাফাইট, নেট্রম, ফস, লাকাসি ।

—ঋতুর পূর্বে—আর্স ।

—ঋতুর পর—কামো, কাক্স, ফস ।

—গর্ভাশ্রয়—আলুমি, কাক্স, সেপি ; মার্ক, সিনিসি, ( মাগ্নি-কার্বো, কামো, রাটান—গর্ভের প্রথম অবস্থায় । )

—মাই দেওয়া জন্তু—কার্বো, চিন ; আর্স, কাল্‌ক্স, বেল, মার্ক, ষ্টাফিস, পল্‌স, সেপি ।

স্থান ।

- দন্তেরপীড়া, উপর পাটীর—কার্বো, কাল্কা, চিন, নেট্রম, ফস, বেল ।  
 —নীচের পাটীর—আর্ণিকা, কামো, কাষ্টিক, ফস, রস, ষ্টাফিস, স্পাইজি, সিলিসা ।  
 —কসের দাঁতের—ক্রিয়োস, কার্বো, চিন, ফস, ব্রাই, ডিস্ক ।  
 —জ্ঞান-দাঁতের—রস ; আকন, কাল্কা, ষ্টাফিস, হাইয়স ।  
 —ফরা দাঁতের—কামো ; আন্ট, নক্স, পল্‌স্, মার্ক, সল্‌ফর, ষ্টাফিস ।  
 —ডানপার্শ্বের—বেল ; কফি, নক্স, নেট্রম, ব্রাই, ষ্টাফিস ।  
 —বামপার্শ্বের—নক্স-ম, ফস, সল্‌ফর, কামো ।  
 —সমস্ত এক সার বা পাটী শুদ্ধ—কামো, মার্ক, রস, ষ্টাফিস ।

দন্তের যাতনার রূপ বা আকার ।

- দন্তের ঘ্নতনা, উৎক্ষেপণ বা চিড়িকমারার স্থায়—কামো, নক্স, পল্‌স্, মার্ক, রস, ব্রাই, সল্‌ফর, স্পাইজি ।  
 —ক্ষিপ্তকারী, (পাগলপ্রায় করা)—আকন, আর্স, কুফি, কামো, ভেরাট, সাইপ্রি, সিলিসা, হাইয়স ।  
 —কন্ধনানি, বিধুনি—কামো ; চিন, পল্‌স্, ব্রাই, মার্ক ; আরম ।  
 —খননের স্থায়—আন্ট, ইথে, কাল্কা, চিন, ব্রাই ।  
 —চিবন বা কামড়ান—কামো, নক্স, রস, ষ্টাফিস ।  
 —চাপুনি, ছেঁড়া—নক্স, মার্ক, স্পাইজি, হাইয়স ।  
 —আলা—কামো, নক্স, নেট্রম, পল্‌স্, ফস, মার্ক, সল্‌ফর, সিলিসা ।  
 —টাতান, থাঁতলান—ইথে, পল্‌স্, রস ।  
 —টানা, ছেঁড়া—আন্ট, কামো, কার্বো, কাল্কা, চিন, নক্স, ফস, আ, মার্ক, রস, ষ্টাফিস ।  
 —থেকে থেকে ধরা—আর্স, পল্‌স্ ।  
 —দপ্পদপানি—আকন, ষ্টাফিস, হাইয়স ; কামো, কাল্কা, নক্স, স্পাইজি ;  
 ( দপ্পদপ, আলা ও হল ফুটুনি—মোনোই, বেল ) ।  
 —ছুটা করার স্থায়—নক্স, সল্‌ফর ; কাল্কা, ফস, মার্ক, বেল, লাক্সিস ।  
 —ব্যথা—জেল্‌স, পল্‌স্, মার্ক ।

দন্তের যত্ননা, স্থান পরিবর্তনশীল বা নড়ে বাথা—আকন, পল্‌স ।

——স্টেটে ধরা—কামো, মার্ক, হাইয়স ।

দন্তের অপরাপর উপসর্গ ।

দাঁত খুব ঘেঁসাঘেঁসি থাকা বোধ—কফি, নক্স, পল্‌স ।

——টিলি বোধ—হাইয়স ; আর্স, ব্রাই, মার্ক, রস ।

দাঁত যেন টেনে ফাক করা বোধ হওয়া—ফস-আ ।

দাঁত ঘেঁষা-বাহির করা—আর্গিকা, কাষ্টিক, নক্স, ফস, রস ।

দাঁত যেন ভিতর দিকে ঠেল মারা—রস, ষ্টাকিস ।

——বাহির দিকে ঠেল মারা—ফস ।

——চোয়ালের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে বোধ হওয়া—ষ্টাকিস ।

——ভোঁতা হওয়া—নক্স-ম, পল্‌স ।

——লম্বা হইয়াছে বোধ হওয়া—আকন, আর্স, কামো, কাষ্টিক, নক্স, ব্রাই, রস, হাইয়স ।

——বড় হওয়া বোধ—কাষ্টিক, ব্রাই, সল্‌ফর ।

দন্তশূল, কপাল অবধি বিস্তৃত—হাইয়স ।

——মাথা অবধি বিস্তৃত—আর্স, আর্স, কামো, নক্স, পল্‌স, রস, ষ্টাকিস, সল্‌ফর ।

——মাড়ি অবধি বিস্তৃত—কার্বো, বেল, মার্ক, ষ্টাকিস ।

——বদন অবধি বিস্তৃত—নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস, সল্‌ফর, হাইয়স ।

——চক্ষু ও নাকের গোড়া অবধি বিস্তৃত—ইঞ্জে সাইপ্রি, সিমিসি ।

——কাণ অবধি বিস্তৃত—পল্‌স, মার্ক ; আর্স, কামো, কাক্স, ব্রাই, ষ্টাকিস, সেপি ।

——বোজান ( অবরুদ্ধ ) দন্তের—সিকুটা ।

——নীচের পাটীর এবং ঐ ব্যথা বদন ও ঘাড় অবধি বিস্তৃত—বেল, স্পাইজি ।

——বদন ও গালদ্বয়ে বিস্তৃত—কামো, কাষ্টিক, ব্রাই, মার্ক, সিলিসা, ষ্টাকিস, সল্‌ফর ।

দন্তশূল চোরালের অস্থি ও বদন অবধি বিস্তৃত—নক্স, মার্ক, রস, লাকাসি

• সল্ফর, হাইয়স ।

উপর পাটীর দাঁত হইতে চঠাং রক্ত পড়া—কস ।

দাঁত হইতে রক্ত পড়া—সল্ফর, সেপি ।

ফৌপরা দাঁত হইতে রক্ত পড়া—ফস-আ ।

ফৌপরা দাঁত হইতে টক রক্ত চোরান—টাবাক্স ।

ফৌপরা দাঁত চুষিলে রক্ত নির্গমন—বেল ।

ফৌপরা দাঁত হইতে কাল টক রক্ত পুনঃ পুনঃ পড়া—গাফাইট ।

বাম কদের ফৌপরা দাঁত হইতে লাল গোষ্ঠা জল পড়া—সল্ফর ।

কদের দাঁত চুষাইয়া তৃণক জল নির্গমন—নিকোল ।

#### দন্তের বাতনার বৃদ্ধি ।

১। আহরকালীন—কামো, পলস, বেল, সল্ফর ।

আহারের পর—ইগ্রে, কামো, নক্স, ব্রাই, মার্ক, গাফিস ।

গরম খাদ্য—কামো, ব্রাই ।

গরমে বা তাপে—মার্ক, হিপার ।

চক্ষুণে—কামো, নক্স, ব্রাই, মার্ক, গাফিস ।

টিপিলে, চাপিলে—আকন, ব্রাই, হাইয়স ।

ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়ায়—কাকা, মার্ক,

ঠাণ্ডা বাতাসে—বেল, মার্ক, নক্স, সল্ফর, হাইয়স ।

ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়া গ্রহণে—কাকা, ব্রাই, বেল, মার্ক, সল্ফর, হাইয়স ।

#### দন্তের বাতনার সমতা ।

১। আহরকালীন—কামো, ফস, ফস-আ, বেল, ব্রাই, রস, সিলিসা ।

২। আহরকালীন পর—আণিকা, কামো, কাকা, ফস-আ ।

৩। গরম খাদ্য—আস, নক্স, ব্রাই, রস, সল্ফর ।

৪। গরমে বা তাপে—আস, নক্স, পলস, মার্ক, রস, গাফিস ।

৫। চক্ষুণে—কফি, চিন ।

৬। টিপিলে, চাপিলে—চিন, পলস, বেল, ব্রাই, রস ।

৭। ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোয়ায়—পলস, বেল, ব্রাই । ঊষা মুখে রাখায়—কফি, ব্রাই । ঠাণ্ডা জলে অঙ্গুলি ভিজাইয়া পীড়িত স্থানে দেওয়ায়—কামো ।

৮। ঠাণ্ডা বাতাসে—নক্স, পলস, রস, সেপি । বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে—আকন ।

৯। ঠাণ্ডা বাতাস মুখ দিয়া গ্রহণে—নক্স, পলস । অন্ধ বাতাসে সমতা—কাকা ।

- দাঁত ধোঁটায়—পলস। দাঁতে দাঁতে  
চাপায়—চিন, সেপি, হিপার।
- ১১। ধূম পানে (তামাক বা চুকট টানায়)—  
ইগ্রে, ব্রাই।
- ১২। নড়া বা পাইচারি করায়—চিন, নঙ্গ, ব্রাই।
- ১৩। নিদ্রাকালীন—বেল।
- ১৪। বিশ্রামকালীন—রস; বদিয়া থাকায়—  
পলস, রস।
- ১৫। পান করায়—কামো; গরম পানে—  
কামো, নঙ্গ, মার্ক।
- ১৬। শযায় অবস্থান কালে—আট, কামো,  
পলস, বেল, ব্রাই, মার্ক।\*
- ১৭। শয়নে—ইগ্রে, রস।
- ১৮। শয়নে, পীড়িত পাখে—আর্স।
- ১৯। শয়নে অস্বাধিত পাখে—ইগ্রে।
- ২০। বাহিরের বাতাসে—কোনাফ, ফস, বেল,  
সলফর। বিশেষ দমনকা বাতাসে—  
কাফা, চিন।
- ২১। সন্ধি বা ঠাণ্ডাতে—আট, আর্স, কাফা,  
মার্ক, সলফর।  
ঘরের বাহির হইলে—চিন, নঙ্গ, বেল,  
• ষ্টাকিস, সলফর।  
গরম ঘরে থাকায়—পলস, কামো, সলফর।  
শক্ষে—আর্স, কাফা, ব্রাই।  
অন্তঃকথা কহিলে—আর্স, ব্রাই।  
উষ্ণ দ্রব্য স্পর্শে—কফি, কামো, পলস,  
বেল, ব্রাই, স্পাইজি।  
চা পানে—ইগ্রে, চিন।  
সূরা পানে—আর্স, ইগ্রে, নঙ্গ।  
চিন্তায়—ইগ্রে, নঙ্গ, বেল।  
স্পর্শিলে—আর্গিকা, পলস, ব্রাই, ষ্টাকিস।  
জিহ্বা দ্বারা ঐ দ্রব্য স্পর্শিলে—ইগ্রে, চিন,  
কার্বো, মার্ক।
- ১০। দাঁত ধোঁটায়—ফস, আ। খুঁটিতে  
খুঁটিতে যে পযন্ত রক্ত না পড়ে—বেল।  
দাঁতে দাঁতে ঘষণে—ফস, মার্ক। দন্ত  
স্পর্শ করায়—নঙ্গ, ব্রাই।
- ১১। ধূম পানে—মার্ক।
- ১২। নড়াচড়ায়—পলস, রস।
- ১৩। নিদ্রাকালীন—মার্ক। নিদ্রার পব—  
নঙ্গ, পলস।
- ১৪। বিশ্রামকালীন—মার্ক।
- ১৫। পান করায়—বেল; গরম ভাল পানে—  
নঙ্গ, পলস, রস, সলফর।
- ১৬। শযায়—সলফর; উদ্রিয়া বসায়—আর্স,  
মার্ক, রস। শয্যার উত্তাপে—নঙ্গ, ব্রাই।
- ১৭। শয়ন বা কাঁত হওয়ায়—মার্ক; নঙ্গ,  
ব্রাই, স্পাইজি।
- ১৮। শয়নে, বাধিত পাখে—ইগ্রে, পলস, ব্রাই।
- ১৯। শয়নে, অস্বাধিত পাখে—নঙ্গ।
- ২০। বাহিরের বাতাসে—নঙ্গ, রস, সেপি;  
ঠাণ্ডা বাতাসে—পলস, কাফা।
- ২১। সন্ধি বা ঠাণ্ডাতে—পলস; কামো, চিন,  
নঙ্গ, বেল, মার্ক  
ঘরের বাহির হইলে—আট, পলস, হিপার।  
ঘর মধ্যে থাকায়—নঙ্গ, ফস, সলফর।  
সমতা, উপরে (বদনের বহিঃভাগে) রস,  
ষ্টাকিস। তাপ লাগানয়—আর্স, কাফা,  
বেল, হাইয়ন।  
উপরে ঠাণ্ডা লাগানয়—পলস; চিন, নঙ্গ,  
ষ্টাকিস, সলফর।  
গাত্রাবরণ পুলিলে—পলস।  
মাথা ঢাকিলে—নঙ্গ, ফস, মিলিমা।

দন্তশূল সহ আনুষঙ্গিক উপসর্গ ।

দন্তশীড়া সহ অস্থিরতা—আকন, কফি, কামো, ভেরাট, হাইয়স ।

——সহ উদরাময় ( ভেদ )—কামো, ডক্কা, মার্ক, রস ।

——সহ কম্প—পল্‌স ।

——সহ কোষ্ঠবদ্ধতা—নক্স, ব্রাই, ষ্টাকিস, সল্‌ফর ।

——সহ গলায় বীচি অমুরাণ—কামো, ডক্কা ।

——সহ গা হাত ব্যথা—কামো, পল্‌স, ব্রাই, মার্ক, রস ।

——সহ গলা ক্ষীত ( ফুলা )—মার্ক, বেল, নক্স ; আর্গিকা, কামো, পল্‌স ।

——সহ জ্বর—আকন, কাক্কা, ব্রাই, মার্ক, রস ।

——সহ মুখ শুষ্ক ও তৃষ্ণা—চিন ; অথবা পিপাসার অভাব—পল্‌স ।

——সহ মুখমণ্ডল আরক্তিম—আকন, আর্গিকা, কামো, নক্স, বেল, ব্রাই ।

——সহ মুখমণ্ডল জর্দা—পল্‌স, সেপি, স্পাইজি ।

——পাশ্চাত্য বর্ণ—পল্‌স ; আর্স ।

——ফুলা—কামো, নক্স, পল্‌স, মার্ক, ষ্টাকিস ; আর্গিকা ।

——মুখ বা গলা শুষ্ক—চিন, বেল ।

——সহ মুখ দিবা অধিক লাল ভাঙ্গা—মার্ক, ডক্কা, বেল, পল্‌স, রস ।

——সহ মাড়ি ফুলা—মার্ক, ষ্টাকিস ; চিন, নক্স, বেল, রস, সল্‌ফর ।

——সহ মাড়ি ব্যথা—মার্ক, ষ্টাকিস ; কার্বো, কাক্কা, পল্‌স ।

——সহ রক্ত উৎসর্গ—আকন, বেল, হাইয়স ; কামো, কাক্কা, চিন, ব্রাই ।

——সহ অগ্নি চোয়ালের পক্ষাবাত—নক্স-ম ।

——সহ হৃৎকম্প—স্পাইজি ।

দন্তের হাড় পদা পদা করিয়া উঠ ( Exfoliation )—আজ্জি-না, লাকাসি  
ষ্টাকিস ।

——দন্তশূল সহ মূচ্ছা—ভেরাট ।

## দন্তশূল ।

আকন—উত্তরে বা শীতল বায়ু লাগা, দাঁত উঠা, বা রক্তের উত্তেজনা বা  
উৎসর্গ জন্ত দন্তের বিবিধ যাতনা, যথা দগদগানি, বিদ্বনি, ফুটনি, মড়মড়ানি,

কখন বা কিঁকি লাগার জ্বা, অথবা থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড বেদনা, অতিশয় আঁহুরতা, পরে জ্বালা, স্ফূ ক করার জ্বা যাতনা, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, রাত্রে অসহ্য হওয়া, স্থির হইয়া বসার, ঠাণ্ডা জলে ও বাহিরের বাতাসে সমতা । এক স্থান হইতে বাথা হঠাৎ স্থানান্তর হওয়া, নড়ায় ও দাঁত স্পর্শ করায় যাতনাধিক্য, উঠায় মুচ্ছ্রতবৎ হওয়া, বদন পাঙ্গাশ বা উজ্জল লাল বর্ণ, সদা উদ্বিগ্নতা ও ভয় থাকা । কমবেশী জ্বর, অকথ্য ও ক্ষিপ্তকারী যন্ত্রণা হওয়া ।

আণ্ট—কোঁপরা দাঁতে বাথা, আহাৰ কাণীন মাথা অবধি বাজা (লাগা), ঠাণ্ডা জলে বৃদ্ধি, বাহিরের বাতাসে সমতা । অতি সামান্য কারণে দাঁত ও মাড়ি হইতে রক্ত পড়া । মাড়ির দাঁত ছাড়া হওয়া ।

আণিকা—হঠাৎ বাম বন্ধ, ভেজা, ঠাণ্ডা লাগা, আঘাত বা পতন জ্ঞা, অথবা দস্ত অস্ত্র করা বা তোলার পর বেদনা । গাল ফুলা, লাল ও ষ্ণ হওয়া এবং মাড়ির স্পন্দন ও তাহা কিন কিন করা । সৰ্ব্ব শরীর টাটান ; ( আদত আরক ১০১২ ফোটা জলে ফেলিয়া উহার কুলি ) ।

আর্স—প্রত্যহ বা নিয়মিত সময়ে, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে, নিদ্রাভঙ্গের পর বেদনা ধরা, দাঁত চর্চলে ও বড় হওয়া, মাড়ি সঁটে ধরা, চিড়িকমারা এবং কাণ গাল ও পা অবধি যাতনার বিস্তৃতি । বাথা অসহ্য ও হতাশ কারী ( আকন, কামো ) ; ঐ সঙ্গে শীত ও তাপ, অন্ন অন্ন পুনঃ পুনঃ পান, এককালে বলক্ষয়, নড়ায় ও উদ্ভাপে যাতনার সমতা, রাত্রে বৃদ্ধি । পুনর্বার রোগ না হয়, সে জ্ঞা বহুদশী দাঁতের রোগ আরোগ্য হইবার পর এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে কিছুকাল ব্যবহার করিতে কহেন ।

ইউফ্রে—নীচের পাটির দাঁতে ফুঁড়নি, (দস্ত স্পর্শে চর্ষণ কালে—কামো) ; যাতনা বৃদ্ধি, দাঁত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থও হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়া ।

ইথ্রে—দাঁত ঢিলা হইয়াছে বোধ ও ঠাণ্ডা জ্ঞা দস্তশূল হওয়া ।

ককি—দন্তে চিড়িকমারা, ছেঁড়া, অসহ্য ও ক্ষিপ্তকারী যাতনা, বিশেষ রাত্রে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বা বরফ জলে সমতা ( কামো, লাই ), মস্তক অতিশয় ক্ষুদ্র বোধ, অনিদ্রা, মুখ তারহীন হওয়া ।

কন্টিকম—দাঁত টানা, ছেঁড়া ও তাহাতে ফুঁড়নি, বিশেষ যথেষ্ট ঠাণ্ডা বাতাস গ্রহণ করায় । মাড়ি ছিঁড়িয়া পড়ার জ্বা বোধ, চোয়াল বন্ধ হওয়া ।

কামো—জ্বরে বা দমকা বাতাস লাগা ও ঘাম বন্ধ জন্ত দস্তের পীড়া এবং ঐ সঙ্গে কর্ণশূল থাকে । দাঁত ঢিলা ও লম্বা হওয়া বোধ, গাল ও মাড়ি ফুলা, আহার ও পানে বৃদ্ধি । অসহ্য ব্যথা, রোগীর হতাশ হওয়া, মাড়ি লাল হওয়া ও ফুলা, বাহিরে, রাত্রে ও ঠাণ্ডা পানে যাতনা বৃদ্ধি এবং অধৈর্য্য ও অত্যন্ত চট্টা স্বভাব হওয়া ।

কার্বো—দস্তশূল ; ঠাণ্ডা, গরম বা লবণাক্ত দ্রব্য আহারে যাতনা প্রকাশ বা বৃদ্ধি হওয়া । দাঁত ঢিলা, স্পর্শে লাগা, বিশেষ আহারের পর । দাঁতের মাড়ি ছাড়া হওয়া, মাড়ি ও দাঁত হইতে রক্ত পড়া এবং শীঘ্র শীঘ্র দাঁত ক্ষয় হওয়া, বিশেষ পূর্বে অধিক পান্য ব্যবহার থাকিলে ।

কাক্সা—দস্তের দপ্পদপানি, ফুঁড়ুনি বা টাটানি ; দমকা বাতাসে, কিছু পান করায় বা স্নানান্ত কারণে যাতনা বৃদ্ধি । ধাতু বিকৃতির লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ও অপর ঔষধে ফল না দর্শিলে ইহা বা সলফুর বা সিলিসা দেওয়া বিধি ।

কাষ্টিক—দাঁত টানা ছেঁড়া ও তাহার ফুঁড়ুনি এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় যাতনাধিক্য ও চোয়াল বন্ধ হওয়া, বা দাঁত কপাটি লাগা । বিশেষ মুখের ডান প্রদেশ, চক্ষু ও কাণ ছিঁড়িয়া পড়া, শীড়িত দাঁত ঢিলা বোধ হওয়া । রাত্রে শয্যায় যাতনা কমা ।

ক্রিয়োস—দস্তশূল এবং রগ ও কাণের ভিতর অবধি সৈঁটে ধরা ও বাজা ( লাগা ), বিশেষ বাম ভাগে এবং প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মাড়ি লাল ও ব্যথা হওয়া, কদর্যা গন্ধের ঝুঁকিয়াস ত্যাগ । ইহা সেবনে দাঁতের ক্ষতের যাতনা কুমায় এবং দাঁতকে এক কালে নষ্ট হইতে দেয় না ।

প্লোনোইন—খুব গরমের সময় ঠাণ্ডা লাগানয় দস্তশূল, মাথা ব্যথা ও দপ্পদ এবং গা বমি বমি করা, গলা সৈঁটে ধরা ও মুচ্ছিবৎ হওয়া ।

চিন—অধিক রস-রক্তক্ষয়, প্রসবের পূর্বে ও পরে, দীর্ঘকাল মাই দেওয়া, রাত্রে অধিক ঘাম এবং অপর কোন দুর্বলজনক কারণে দস্তশূল । নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে, দস্ত উৎক্ষেপণে ছেঁড়া, দপ্পদপানি, টেনে ধরা, বিশেষ উপর পাটির ও সম্মুখের দস্তের হইলে । কোন দ্রব্য সংস্পর্শে, ব্যথা, দাঁতে জিভ ঠেকায়, দমকা বাতাস লাগায় বা ধূম পানে যাতনা বৃদ্ধি, দস্ত খুব কসিয়া চাপায় সমতা । ঠাণ্ডা লাগায় পুরাতন দস্ত পীড়ার প্রকাশ হওয়া ।



চেলি—বাম দিকের উরু বিশেষ অধোপাটীর দস্ত স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ করা ও উহা নড়া।

জেল্‌স—হঠাৎ দস্তশূল ধরা জন্ত চমকান। পীড়িত দাঁতের সান্নিধ্য পেশীর সঙ্কোচন ও চিড়িক মারা, যাতনা গেলেও ঐ স্থানে সাড়াধিক্য থাকা।

ডকা—জলো বা আর্দ্র বায়ু জন্ত দস্তশূল, বিশেষ ঐ সঙ্গে উদরাময় থাকিলে। মাথার জড়তা, মুখ আসা, দাঁত ভেঁতা হওয়া বোধ। ঠাণ্ডা আব হওয়ায় যাতনা বৃদ্ধি।

নক্স—বাতগ্রস্ত, ঠাণ্ডী লাগা জন্ত, নেসাখোর, কায়িক অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমী, উত্তেজক ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজী, স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতাশীল, চটা ও একগুঁয়ে ব্যক্তির দস্তশূল। অকথা যাতনা হওয়া, দাঁত মের্টে ধরা, ছেঁড়া, ফুঁকরার স্থায় কষ্ট অসম্ভব এবং প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি, কাণ ও মৌলাটাকি অবধি ব্যথার বিস্তার এবং গলার বীচি আওরণ। দাঁত ঢিলা বোধ হওয়া, মাড়ি ফুলা ও তাহা হইতে রক্ত পড়া, সকালে যাতনার আরম্ভ বা তাহার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ। রাত্রে, ভোরে, গরম গৃহে বাস জন্ত বা সুরা, কাওয়া ও উষ্ণ পানীয় পানে যাতনা বৃদ্ধি; বাহিরের বাতাসে, গরমে, শ্বাস টানায় যাতনার সমতা।

নাইট্রী-আ—অধিক পায় ব্যবহার জন্ত রোগ। রাত্রে দস্ত চিড়িকমারা বা দপ্‌দপানি এবং তজ্জন্ত অনিদ্রা। দাঁত জর্দা ও ঢিলা হওয়া, মাড়ি ফেঁকাশে হওয়া, ফুলা ও তথা হইতে রক্তপাত হওয়া।

পল্‌স—ঋতু বন্ধ বা ঋতুকালে অত্যন্ত রজঃ স্রবণ সময়ে দস্তরোগ, অজীর্ণতা সহ ভেদ, অধিক পরিমাণে টক, মিষ্ট বা সুরা ও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার, হিমলাগা সহ শ্বাস-কষ্ট, ইত্যাদি কারণে ও নব্র-প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। দাঁতের চিবুনি ও ফুঁড়ুনি, মাড়ি খুঁটুনি এবং বদন, মাথা, চক্ষু ও কর্ণ অবধি ব্যথার বিস্তার। বদন মণ্ডলের রক্তহীনতা, দস্তের সমস্ত দ্বায়ু বেন সজোরে টান ধরিয়া হঠাৎ লোল হওয়া। সন্ধ্যা বা রাত্রি ১২টার পর ও গরমে বৃদ্ধি হওয়া, ঠাণ্ডা লাগার স্বস্তি বোধ করা।

প্লাটিনা—দস্তে পেচা ও খন্‌ন করার স্থায় যাতনা, দপ্‌দপানি, পরে উহার লাড়ক কমা, মাড়ি হাল্কা।

কম—সান্নাথ সন্ধি লাগায় দন্তশূল সহ মুখ আসা । দাঁত ছেঁড়া, বেঁধা, বাতাস লাগায় বা গরম খাদ্য তেজ্জনে বাতনার রুদ্বি, দাঁত ঢিলা ও ক্ষয় হওয়া এবং তথা হইতে রক্ত পড়া । মাড়ি ফুলা, বাথা ও ক্ষত বিশিষ্ট হওয়া, মাড়ি হইতে দাঁত ছড়িয়া পড়া, সান্নাথ কারণে তাহা হইতে রক্তপাত, ক্ষয় দাঁতে ও মাড়িতে স্ফোটিক হওয়া ।

কম-আ—দন্ত ছেঁড়া ; মুখে কিছু দিলে অথবা শয়নে বাতনা রুদ্বি । দন্ত তবিত্ত বর্ণের এবং বাদিকালে সম্মুখের দাঁত জ্বালা করা, মাড়ি ফুলা, দাঁত হইতে মাড়ির অন্তর হওয়া ও রক্তপড়া এবং তথায় বাথা-বিশিষ্ট শুষ্কী বাতিব হওয়া ।

বারাইটা কা—কেবল নার সন্ধ্যার সময় দন্তশূল, কাণ ও ঠাণ্ডা অবধি বিস্তার । ফোঁপরা দাঁতে গরম দ্রব্য সংস্পর্শে জ্বালা করা ও ফুঁড়ুনি, ক্ষতর পূর্বে বা ঠাণ্ডা লাগায় দাঁতের বাতনা এবং মাড়ি ও গাল ফুলা, এই সম্মে কর্ণের স্পন্দন ও মস্তকের পার্শ্বদেশে বেদনা হওয়াতে দাঁত ও মাড়ি হইতে রক্তপাত হওয়া ।

বেল—ঠাণ্ডা হইতে দন্তশূল, বিশেষ স্বীলোকের পক্ষে । এক দিকের অনেক দাঁতে দণ্ডদপানি ও বিঁড়নি । বাম দিকের কাণ ও দাঁত এবং শেষে বদন পর্য্যন্ত ছেঁড়া ; অগারের পরে ও রায়ে রুদ্বি । সম্মুখের দাঁত লম্বা বোধ, রক্ত উৎকণ, বদন অরুচিন, শব্দ ও আলোক অদৃশ, গলা শুষ্ক, তৃষ্ণা হওয়া বা মুখ আসা । দাঁতের মুজ্জ-প্রদাহ জগা উঠাতে জ্বালা ও দণ্ডদপ করা । বাথা হঠাৎ ছাড়া, অথবা এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে ধরা ও কোন দ্রব্য সংস্পর্শে সেই ব্যথার রুদ্বি । নিদ্রার পর বা নিদ্রা ভঙ্গে বাতনাদিক্য ।

রাই—দন্তে হল ফুটুনির গায় বাতনা ও দণ্ডদপানি, উত্তাপে তাহার রুদ্বি, ঠাণ্ডা জলে আশ্রু ক্ষণিক সমতা, বাতিরের বাতাস লাগায় অনেক স্থিতি বোধ । চর্ষণ কালীন দাঁত লম্বা ও ঢিলা বোধ হওয়া এবং চিড়িক মারা ; কানের মধ্যে বেঁধার গায় বাতনা । পীড়িত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে সমতা (অর্স) ও বিপরীত দিকে শয়নে রুদ্বি । ক্ষয় দাঁত হইতে বাথা ভাদ দাঁতে যাওয়া । রাগী ও একান্তে স্বভাবের ব্যক্তির পক্ষে ।

ভেরাট—দন্তশূল, শিরঃপীড়া, বদনমণ্ডল লাল হওয়া ও ফুলা, গা বমি বমি ও পিত্ত বমন করা, সর্কাস নীতন ও বলক্ষয় হওয়া, অতিশয় তৃষ্ণা থাকা ।

মার্ক—এক পাটি দস্তুর মধ্যে অনেকগুলির এক সময়ে ছেঁড়ার স্থান যাতনা হওয়া (কাগো, রস); দাঁত স্টেটে ধরা ও তাহাতে হল ফুটুনির স্থান যাতনা ও কাণ অবধি বিস্তার, অথবা ঐ যাতনার মধ্যে এক দাঁত হঠাতে অপর দাঁতে বাথার যেন লাফাইয়া যাওয়া, পীড়িত পার্শ্বের গাল ও রগ পর্য্যন্ত ব্যথা এবং সেই পার্শ্বের গলার বীচি আওরণ। দাঁত টাটান, ঢিলা ও খুব লম্বা হওয়া বোধ করা, মুখ আসা। আহার করায়, শয়নে, মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস টানায় যাতনা অসহ্য হওয়া; ঠাণ্ডা জলে ক্ষণিক মাত্র স্থিতি বোধ, কিন্তু গরমে সমতা হওয়া। প্রায়ই সকালে ব্যথা ধরা, হাত লাগায় রক্ত পড়া। মাড়িতে ক্ষত, রাত্রে ফুলা, ব্যথা ও জ্বালা করা; গর্ভাবস্থায়, বিশেষ ক্ষয়া দাঁতের পীড়া হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী। কেহ কেহ স্টোপরা দাঁতের গহ্বর মধ্যে এই ঔষধের ঝুঁড়া এক গ্রেণ পুরিয়া দিতে কহেন।

মাগ্নিসা-কা—রাত্রে দন্তশূল, স্থির থাকিলেও অত্যন্ত যাতনার ধমকে উঠিয়া বসা, দাঁত জ্বালা করা ও ছেঁড়া, এবং আহারের পর তাহাতে দপ্দপানি, হল ফুটুনির ন্যায় যন্ত্রণা, দাঁত ঢিলা বোধ ও গর্ভবতীর পীড়া হইলে। জ্ঞান দাঁত উঠা কালীন বিবিধ উপসর্গ থাকিলে।

মেজেরম—দাঁত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হওয়া, দাঁতে ব্যথা হওয়া এবং রগ ও মালাচাকি অবধি সেই ব্যথার বিস্তার। দাঁত বড় হওয়া বোধ ও তাহা স্পর্শে লাগা। মাড়িতে আলায়ুক্ত কুস্কুড়ি হওয়া।

রস—ভেজার পর ও বাত জন্ম দন্তশূল হইলে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। দাঁত যেন ছিঁড়ে বাহির হওয়া, উহা নড়া ও লম্বা বোধ হওয়া, মাড়ি জ্বালা করা ও চুলকুনি। সম্পূর্ণ বদনমণ্ডল টাটান, জ্বলো বাতাসে ও স্থির থাকায় ঐ সকল উপসর্গের বৃদ্ধি, বাহিরে তাপ লাগানতে স্থিতি বোধ করা।

রোভ—বড় বৃষ্টি কালীন দন্তশূল, বিশেষ কসের দাঁতের এবং কোন দ্রব্য সংস্পর্শে যাতনা বৃদ্ধি। \*রাত্রে দস্ত ও কর্ণশূল পক্ষে।

লাকাসি—ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় দস্তে যাতনা, পর্দায় পর্দায় উঠা, দস্তের হাড় মাড়ি ফুলা, ব্যথা এবং নীলিন-লালবর্ণ ধারণ করা।

ষ্টাকিস—ক্ষয়া বা ছিন্নাগ্রী (Stump) দস্ত হইতে ব্যথা উৎপন্ন হইয়া মাথা ও কাণ পর্য্যন্ত যাতনার বিস্তার, গাল ফুলা, ঠাণ্ডা জল বা ঠাণ্ডা বাতাস

গ্রহণে কষ্ট হওয়া । আহার কালীন বা পরে বা রাত্রে কিম্বা পীড়িত দাঁত স্পর্শে যাতনার বৃদ্ধি হওয়া । হঠাৎ দাঁত কাল হওয়া বা ক্ষয় হইয়া তাহা হইতে পদ্দা পদ্দা হাড় উঠা, ডান পার্শ্বের ও বাতগ্রস্তের দাঁতের পীড়া ; দাঁত বড় বোধ হওয়া, জিত নাড়িতে না পারা, হাত শীতল ও ঠাণ্ডা ঘামযুক্ত হওয়া । মাড়ি শাদা, ক্ষীত, ব্যথা ও ক্ষত-বিশিষ্ট এবং সামান্য কারণে তথায় রক্তপাত হওয়া ।

সলফর—চর্মরোগ বহু জন্ম দস্তশূল, ঠাণ্ডী অথবা দমকা বাতাস লাগায় রোগ প্রকাশ হওয়া । দস্তে টানা, ছেঁড়া ও স্ফুল্ক করার স্থায় বেদনা হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান ফুলা সহ মাথা দপ্‌দপ করা এবং গাল ও কাণের মধ্যে বিড়নির ন্যায় যাতনা । ব্যথা বাম পার্শ্বেই অধিক ও দাঁত বড় বোধ হওয়া এবং আহার কালীন উহা নড়া । রাত্রেও ঠাণ্ডা জলে যাতনা হওয়া । মাড়ি হইতে দাঁত ছাড়া, মাড়ি ফুলা, দপ্‌ দপ্‌ করা ও তথা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ত পড়া । দাঁতে নালী ঘা হওয়া ।

সাইক্লোমেন—সারারাত্রি দস্তের পীড়া, যেন শেষের ৩টা কসের দাঁত টানিয়া বাহির করা হইতেছে বোধ হওয়া ।

সাইপ্রি—অধিক রাত্রি জাগরণ ও রোগীর সূক্ষ্মতা এবং উদ্বিগ্ন জন্ম দস্তের ভাবনিক বেদনায় রোগীকে পাগল করিয়া তুলিলে এবং কোন প্রকার উত্তেজনা সহনে অক্ষমতা এবং অস্থিরতা, অনিদ্রা ও কম্পন থাকিলে এবং অত্যন্ত চটা ও রাগী হইলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক ।

সাবিনা—আহারের সময় ও পরে দস্তশূল । রাত্রে দাঁতটা যেন ভগ্ন হইয়া চূর্ণ হইবে বোধ হওয়া, পান করার, ধূম টানার ও শয্যার উত্তাপে যাতনা বৃদ্ধি হওয়া । বাত রোগ জন্ম দস্তের পীড়া হওয়া । পায়ের বুড়া আঙ্গুলে ও দস্তে সমকালে বেদনা হওয়া । মাড়িতে ফোটকি হওয়া ।

সিকুটা—ফোঁপরা দাঁত স্বর্ণ দ্বারা বান্ধান জন্ম চাপ পড়া বশতঃ দস্তশূল পক্ষে ।

সিনা—বাতাস বা ঠাণ্ডা পান জন্ম দস্তশূল পক্ষে ।

সিলিসা—গরম খাদ্য বা ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণে দস্তশূল হওয়া । চাবালী ও দস্তের আবর্তন-হাড়ের ব্যথা হওয়া । রাত্রে দস্তের কুঁড়নি জন্ম ঘুম না হওয়া । দাঁতের খোঁদলে (পোকা লাগিয়া বা অন্য কারণে দাঁতে গর্ত হইলে) পাক ধরা । মাড়ির প্রদাহ ও তথা হইতে রক্ত পড়া ।

সেপি—অন্তঃসত্ত্বার দন্তশূল । দাঁত হঠাৎ ক্ষয় হইয়া পদা পদা উঠিয়া যাওয়া । দন্ত স্পর্শ করায়, চাপায় বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায়, অথবা অধিক বকায় বাতনা হওয়া । কখন কখন কাণ অবধি ঐ বাতনার বিস্তার হওয়া ; বাহু হইতে আরম্ভ হইয়া আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত সড়সড় করা ; দন্ত ঢিলা ফৌপরা হওয়া ও সামান্য কথা কহিতে রক্তপাত । ইহার উপসর্গ—গাল ও গলার বাঁচি ফুলা, কাশী থাকা, বদনে জন্ম দাগ এবং তর্গন্ধ ও প্রচুর প্রস্রাব হওয়া ।

হাইয়স—ঠাণ্ডী বা প্রত্যবে শীতল বায়ু লাগা জন্ম দন্তশূল এবং উহা গাল হইতে কপাল অবধি বিস্তৃত হওয়া ; মাড়ি ফুলা ; দাঁত যেন খসিয়া পড়িবে, এইরূপ অনুভব হওয়া ; ফৌপরা দাঁতে চিড়িক মারা ও পা অবধি সেই বাতনা ; বদন, হাত ও আঙ্গুলে চিড়িক মারা । হিংসা জন্ম দন্তশূল, রক্ত মস্তিষ্কে উঠা ।

হিপার—গাল ফুলা ও ব্যথা ; দন্ত শেঁটে ধরা, চিড়িক মারা ; রাত্রে গরম গৃহে, আহার কালীন বা দাঁতে দাঁতে চাপায় বাতনার বৃদ্ধি । মাড়ি ফুলা ও তাহা স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হওয়া ও তথায় ফোটক থাকা । অধিক পারা ব্যবহার জন্ম দাঁত ঢিলা ও ক্ষয় হওয়া এবং মাড়ি হইতে অধিক রক্তপড়া । দাঁতের নালী বা ।

### মুখ-গহ্বর প্রদাহ ।

মুখ-গহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমুদয়কে একটা দৃষ্ট বলিলে বলা যায় । যদিচ স্থানে স্থানে আকারের ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু সকলেই এক প্রকার পদার্থে সম রূপে বিনির্মিত । এই নিমিত্ত পেটের পীড়া হইলে জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখে তর্গন্ধ এবং মাড়ি ও গালে বা হয় । ঠাণ্ডি লাগা, আহারান্তে মুখ ধৌত না করা, উত্তেজক খাদ্য খাওয়া ও উগ্র ঔষধ সেবনে মুখের প্রদাহ হয় ।

সামান্যতর প্রদাহে মুখভাস্তরের আমাশয়িক ঝিল্লি ( অর্থাৎ সর্বোপরি পরদা বা ছাল ) লাল হয় ও ফুলে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, কখন কখন ভিতরের ঠোঁঠ ফুলে ও তপাকার চামড়া উঠিয়া যায় এবং বাহির দিকে ফুস্ফুড়ি নির্গত হয় । মুখ দিয়া টস টক করিয়া লাল পড়ে, নিত্যন্ত শিশুদিগেরই এইরূপ হয় ; শিশু সাত আট বৎসরের হইলে এই সঙ্গে কম বেশী জ্বরও থাকে ।

প্রদাহের আধিক্য হইলে জিহ্বার ভিতর গালে কুট কুট বিন্‌কুড়ি বিন্‌কুড়ি শাদাদাগ দেখা দেয়, ক্রমশঃ উহারা একত্র হইয়া কম বেশী চাপ বাধে, পরে আপনা হইতেই উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে লাল দাগ থাকে, কিন্তু পুনরায় তথায় পূর্ব্ববৎ শাদা শাদা দাগ হয় ; কখন ইহা সমুদ্র মুখের অভ্যন্তরে ব্যাপিয়া পড়ে এবং তথা হইতে গলনালী, পাকশয় ও অস্ত্রে বিস্তৃত হয় । কখন একরূপ না হইয়া জিহ্বা ও মুখগহ্বরে ছোট ছোট বা এক সাংড়া একটা স্বতন্ত্র পরদার দ্বারা আবর্তন হয়, ইহার সঙ্গে অধিক জ্বর থাকে না ।

স্তনপানাবস্থা কালে শিশুদের এই রোগ হইয়া থাকে । দুর্বল ও অপুষ্টি-কর দুগ্ধপায়ীদিগের এই ব্যাধি অধিক হইতে দেখা যায় ।

আহারের অভাবে রোগ হইলে, তাহার পূরণ এবং স্তনদুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর ও অপুষ্তিকর হইলে, তাহা সর্ব্বাঙ্গে পরিবর্তন করিবা । সামান্যতর প্রদাহ পক্ষে মার্ক এক বা দুইবার করিয়া তিন চারি দিবস দিবা, তাহাতে না শারিলে সলফর । ইহার সহিত কোষ্ঠঘট্টে নক্স, উদরাময় থাকিলে পলস এবং আকন দেওয়া বিধি ।

মুখ ও গলার মধ্যে শাদা পরদা পড়া পক্ষে ডাক্তার তেস্ত সিনাবারিস বা মার্ক এবং পাকশয় ও অস্ত্রে একরূপ অনুত্ত্ব হইলে চায়না দিতে কহেন ।

## জিহ্বা-প্রদাহ ।

এই রোগে জিহ্বা ফুলে, উত্তপ্ত ও লাল হয় এবং মুখ হইতে অধিক থুথু নির্গত হইতে থাকে । কখন কখন জিহ্বা এত ক্ষীত হয় যে, মুখ-গহ্বরে এক-কালে বন্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্ত গিলিতে কষ্ট হয় ও দম আটকাইতে থাকে । ক্রমে ঐ ক্ষীত জিহ্বা শক্ত হইয়া পাকে, কিসা তাহাতে পচা ধরে ; কোন প্রকারে বসাইয়া দেওয়াই সুবিধা জনক । বিরক্ত বা গুণমালা ধাতু এই রোগের মূল কারণ ।

জিহ্বে আঘাত বা চোট লাগা, তাহা পোড়া বা দহন, তাহাতে পোকা মাকড় কামড়ান, কোন বিষাক্ত দ্রব্য লাগা, বা ঐ বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হওয়া, বাত, সর্দি, অধিক পান্য ব্যবহার এবং অপর কোন বস্তু হইতে প্রদাহ এখানে উপস্থিত হওয়া, ইত্যাদি এই রোগের উদ্বীপক কারণ । ইচ্ছা-বসন্তে কখন কখন জিহ্বা এইরূপ ফুলে ।

আকন—জিভে কুটকুটনি, বেঁদা, জালা, বদনমণ্ডল লাল হওয়া, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, নিয়ত ছটফট করা, জ্বর। অতিরিক্ত প্রদাহ স্থলে সর্ব প্রথম ইহা দিবা।

আর্গিকা—জিভ পোড়া বা ঝুলসান অথবা ক্ষয় দাঁতের আঘাত জন্ত তথায় প্রদাহ, সর্ব শরীর টাটান। (এক পোয়া জলে ২০ ফোটা আদত আরোক ফেলিয়া, সেই জলে দিবসে তিন বার কুল্লি করা)।

আর্স—রোগের সঙ্কটাবস্থায়, জিভে পচা ধরিলে বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক। জিভ কাল্চে বা ঘোর লাল, সর্বদা পোড়ার ভায় জালা, অত্যন্ত তৃষ্ণা অথচ অল্প পান, এক স্থানে থাকিতে না পারা, পচা ধরার পূর্বাবস্থা।

আর্টিকা উবেঙ্গ—পোড়া বা ঝলসান জন্ত পীড়া, জিভের রূপান্তর না হইয়া কেবল মাত্র জালা করা। (আর্গিকার ভায় ইহারও কুল্লি বিধি)।

আপিস—জিভ শুষ্ক, ক্ষীত ও প্রদাহিত, গিলিতে অক্ষমতা। জিভে জালা ও হলকুটনি (পল্‌স, মার্ক) মুখ ও গলা শুষ্ক। জিভ ক্ষীত হওয়া ও সেই সঙ্গে তৎপ্রদেশে শোথের (জল সংগ্রহ) ফুলা থাকিলে; (ইহা ও আর্স কখন পর পর দেওয়া বিধি)।

পল্‌স—পায়ের বুন্ধানুষ্ঠ প্রদাহ (Gout) বা অর্শ রোগ বন্ধ হইয়া জিভে প্রদাহ হইলে।

ফন-আ—কুর ও কঠিন রোগে, বিশেষ আর্গিকার কুল্লিতে প্রতিকার না হইলে ইহা প্রত্যহ ৩৪ বার সেবন বিধি।

বেল—জিভ ঘোরাল লাল, ফুলা ও স্পর্শে ব্যথা। বিসর্প সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগ। বদনমণ্ডল ও চক্ষু লাল, বিশেষ মস্তিষ্কের উপসর্গ থাকিলে।

মার্ক—জিভে প্রদাহ ও পাক ধরা, তাহা অতিরিক্ত ফুলা বা শক্ত হওয়া। জিভ যেন পুড়িয়াছে বোধ (কলসি) মুখ আসা, অধিক বর্ষে বাতনার সমতা না হওয়া।

লাকাসি—জিভ ফুলা এবং অতি কষ্টে উহা নাড়িতে পারা। প্রদাহ ও পচা ধরার আরম্ভে (আর্স), গলায় বন্ধ সংস্পর্শেও কষ্ট বোধ। নিত্রার পর শান্তনাধিক্য।

সলফর ও সিলিসা—রোগ নিশেষ নিমিত্ত ইহার ব্যবহৃত হয়।

বলা বাহুল্য যে তরল খাদ্যই বিধি এবং তাহাও অন্ন অন্ন (কুশম কুশম) গরমাবস্থায় দিবা । বিলক্ষণ না সারিলে কঠিন খাদ্য দেওয়া অনুচিত ।

## জিহ্বার নিম্নে ফোকা ।

RAMILA.

জিহ্বের নিম্ন বা উর্টা পীঠে কখন নিষ্টিবন-নালায় থুথু সংগৃহীত হইয়া সরস ফোকা হয় । ইহার আকার বৃদ্ধি হইলে জিহ্বকে এক পার্শ্বে বা উপর দিকে ঠেলিয়া তুলে । ইহাতে চিবান বা কথা কহা খুব কষ্টকর হইয়া পড়ে । বড় হইলে গালিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ এবং তৎপরে পূর্ণ আরোগ্য নিমিত্ত কাক্স বা মার্ক বিধি । অথবা রোগ দেখা দিতে দিতে ঐ ঔষধদ্বয় ও থুজা ব্যবহারে ফোকা বসিয়া যাইতে পারে ।

## উপজিহ্বা বা আলজিহ্বের পীড়া ।

প্রদাহ বশতঃ কখন কখন আলজিহ্বা বৃদ্ধি হয় এবং রোগ দীর্ঘকাল থাকিলে গলা সড়সড়ানি উপসর্গ দেখা দেয় । প্রথমতঃ এক বা দুইবার করিয়া নক্স তিন দিবস দিবা ; তাহাতে প্রতিকার না হইলে কাক্স, বেল, মার্ক, পল্‌স, সলফর ; এই সমস্ত ঔষধ পূৰ্ণ নিয়মানুযায়ী পর পর দিবা । সদা ঠাণ্ডা জলের কুন্নি ও গলায় জলপটি বাধায় উপকার হয় । মৎস্ত মাংস ও গরম মসলা ব্যবহার অনুচিত । আলজিভ ফুলা ও বড় হওয়া পক্ষে পূৰ্ণ ঔষধ ভিন্ন আইড, কফি, সিলিসা দেওয়া যায় ।

## জাড়ী-ঘা ।

অথবা আহার ও অপরিষ্কার অশ্র জিহ্বা, মাড়ি এবং ঠোঁঠ ও মুখের ভিতর যা হয় । অধিক হইলে একসাংড়া হইয়া পড়ে ; কখন কখন সমস্ত পাকনালী অর্থাৎ মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে । কেবল মুখে হইলে মুখ টাটার ও শিশু স্তন টানিতে পারে না । এ অবস্থা কোনক্রমে আশঙ্কার



নহে; ইহা গলায় উপস্থিত হইলে গিলিতে কষ্ট হয়; পাকায় আক্রমণ করিবে বমন ও সদা তিক্তা এবং অগ্নে নানিলে উদরাময় হয়। প্রায়ই মুখে আরহ হইয়া ক্রমশঃ নীচে নামে। ইহার বিপরীত হওয়া যদিচ বিরল, কিন্তু হইতে অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। দ্বিতীয়বার দস্ত উঠা কালীন অর্থাৎ ছয় সাত বৎসরের বালক বালিকার এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে যে জ্বর থাকে, তাহা সামান্য।

সোহাগার খই মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীলোকেরা জাড়ি ঘায় লাগান এবং অনেক সময় তাহাতেই আরোগ্য লাভ হয়। সোহাগা সহজ অবস্থায় মুখে লাগাইলে তথায় ঘা হয়, সুতরাং ইহা রোগের সদৃশ ঔষধ এবং এই নিমিত্তই ইহা ব্যাদি হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ক্ষত বাড়ে। তদনুসারে মার্ক-সল, কামো, কাকি ইহার এক একটা তিন চারি দিবস সেবন বিধি। সোহাগায় না সারিলে মার্ক দিবা।

কখন কখন ধাতু বিকৃতি জন্ত ভূমিষ্ঠ হইবার দুই সপ্তাহ মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়। শিশুকে প্রত্যহ ঈষৎক্ষণ (কুশম কুশম) গরম জলে স্নান করা-ইবা এবং পরিষ্কার সরু নেকড়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া মুখাভ্যন্তর পরিষ্কার করিয়া দিবা, সাবধান যেন ঐ নেকড়া সে না চুষে। ঔষধ মার্ক, তাহাতে না সারিলে আর্স না লাকাসি।

আইরিস—মুখ-গহ্বরে জ্বালা, জ্বিত ক্লমসান, গালে ঘা ও নিয়ত ছেপ উঠা।

আইড—মুখে জাড়ি ও পারার ঘা, তথাকার গ্রন্থি ফুলা ও ব্যথা, অধিক ছেপ উঠা।

আকন—জ্বর থাকিলে ১১ মাত্রা। অধিক কান্না, মুঠা কানড়ান, সজ্জা ভেদ, গাত্র স্পর্শে লাগা।

আরম-টি—মুখ ও নাসিকা রক্তের চতুষ্পার্শ্বে মেড়মেড়ি পড়া ও টাটান। মুখগহ্বর প্রদাহ, ফুলা ও ক্ষত থাকা এবং মুখ আসা।

আরম-দি—সমস্ত মুখগহ্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কুড়ি ও জ্বালা, চুলকুনি ও চিড় চিড় করা।

আর্স—কাল্চে বা নীলবর্ণের বা, মাড়ি জ্বালা, ফুলা ও সামান্য কারণে তাহা হইতে রক্ত পড়া, উদরাময় ও অতিশয় বলক্ষয় হওয়া।

উপাট—মুখের ভিতর কসের দিগে ঘা।

কাম্প—কফাংশ, স্থূলকায় শিশুর রোগ। মুখে ও জিভে জ্বালাজনক ফুসকুড়ী, মাড়ি ফুলা।

কামো—অধিক ঘা জ্বালা অতিশয় অম্লত্ব, কোলে লইয়া বেড়ানয় ভাল থাকে।

কার্বো—অধিক লবণ বা অম্লত্বাকর দান্য ব্যবহার জ্বালা মুখ খুব গরম, টাটান, মাড়ি ফুলা ও তথায় ঘা, দাঁত নড়া ও মাঝে মাঝে রক্ত মিশ্রিত লালা পড়া। ইহা ব্যবহারে সম্পূর্ণ না সারিলে হিপার।

ক্যালাকিলন—শিশুর এবং স্ত্রীলোকের পোয়াতি বা আঁতুড়ে অবস্থায় মুখে ঘা।

কর্ণস-সি—ঠাণ্ডা বা উদরাময় জ্বালা মুখ, জিভ ও মাড়িতে ঘা।

কার্কা—বিশেষ দাঁত উঠা কালীন পীড়া।

চিন—কালচে বর্ণের ঘা এবং পচা ধরিলে।

ডক্স—ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস লাগা দরুণ রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং গলায় বীচি আওকান।

নক্স—মাড়ি প্রদাহিত, মুখে দুর্গন্ধ ঘা, জিভ আড়ষ্ট, জিভে শাদা বা জ্বালা লেপ ও ব্যথা-বিশিষ্ট রূপ।

নাইট্র-আ—দুর্গন্ধ নিঃস্বাস, মাড়ি ফুলা ও ওকান এবং উদরাময়। মুখ ও গলায় ক্ষত, কদর্য্য কটু লালা নির্গমন (সেই লালা যথায় লাগে তথায় ঘা হয়) এবং শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল ফুসকুড়ি। উপদংশ সংশ্লিষ্ট রোগ জ্বালা।

নেট্রম—মুখে ঘা ও বেস্তারার স্থায় ফুসকুড়ি সহ জ্বালা ও বাক্যের জড়তা, জিভের এক দিক শক্ত হওয়া।

পল্‌স—মুখের ক্ষত সহ অস্বাভাবিক লক্ষণ; নবপ্রকৃতি ব্যক্তির রোগ ও ভেদ হইলে—উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির রোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে—নক্স।

বাপ্টিসা—মুখ মধ্যে টাটান ঘা, অতিশয় বলক্ষয়, মাড়ি ও দাঁতে ব্যথা ও তথা হইতে রক্ত চৌয়ান, জিভ ফুলা।

ব্রাই—ঘা এবং মুখ ও গুহ শুষ্ক, চক্ষু, কান, স্তন পানে অনিচ্ছা, মুখ ভিজাইয়া দিলে সহজে মাই টেনে থাওয়া।

মার্ক—মুখ দিয়া টস টস করিয়া অধিক লাল ভাঙ্গা, সমস্ত মুখে ও মাড়িতে ঘা, উদরাময়। ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লাইক—জিভের নীচে ব্যথা বিশিষ্ট ঘা।

লাকাসি—জিভের আগায় টাটান ঘা।

বোরাক্স—মুখগহ্বর গরম, তথায় ও জিভে ব্লেস্তারার স্থায় ফুসকুড়ি এবং ঘা ও অল্প রক্তপাত এবং মাই টানায় লাগার দ্রবণ শিশুর কান্না, পেটব্যথা, উদরাময় ও সদা নীচে পড়িয়া যাইবার আতঙ্ক।

ষ্টাভিস—মাড়ি ওকনে এবং অতি সামান্য কারণে তথা হইতে রক্ত পড়া। দুর্গন্ধ ক্ষত ও তথা হইতে লাল ভাঙ্গা। জিভের নিম্ন বা পীঠের দিকে ব্লেস্তারার স্থায় ফুসকুড়ি, চক্ষু মুখ বসা ও চতুষ্পার্শ্বে কালশিরা পড়া।

সল্ফর—আলা-বিশিষ্ট ঘা ও উহাতে ব্যথা, বিশেষ আহার ফালে। মুখ-গহ্বর গরম ও রাত্রে অধিক তৃষ্ণা। রক্ত মাখান লাল ভাঙ্গা; যাহারা অধিক কাল নিদ্রা যায় এবং যাহাদের অনেক বার ঘুম ভাঙে, তাহাদের পক্ষে ইহা অধিক খাটে।

সল্ফ-আ—অত্যন্ত দুর্বলতা, মুখ টাটানি, মাড়িতে ঘা, -গালের অভ্যন্তরে ফুসকুড়ি, অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছেপ উঠা, উদরাময় এবং স্বকের উপর কাল্চে দাগ পড়া।

হামিনে—জিভের ধারে ব্লেস্তারার ফুসকুড়ি ও তথায় ঘা।

হেল—বা দ্রবণ মুখ টাটান, দুর্গন্ধ ও অধিক থুথু সঞ্চয়, ঘাড় ও গলার বীচি আওরণ।

হাইড্রাস—জিভ ও ঠোঁঠে ক্ষত, মুখ গহ্বর ও মাড়ি ফুলা এবং লাল হওয়া ও যেন পুড়িয়া যাওয়া, জিভ নীরস হওয়া ও টাটান।

সামান্য প্রকারের জ্বর বা হইলে, ভেড়ার দুগ্ধ অথবা জাঁতি ফুলের পাতা স্বতে ভাজিয়া প্রত্যহ ২৩ বার করিয়া ২৩ দিন ক্ষত স্থানে লাগাইলে ঐ ক্ষত শুকায়। গুড়ের জল দিয়া ঘা ধোয়া উপকারী। জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লাগাইলেও উপকার হইতে পারে।

লঘু পথ্য, আশারের পর মুখ পরিষ্কার করা, প্রত্যহ এক দুই বার গাত্র মার্জনা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খুৎখটে ও বায়ু পরিচালিত গৃহে বাস, ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন কর্তব্য।

### মুখে পচা ধরা ।

সর্বপ্রথম গালের ভিতর একটা ফুস্ফুড়ী হইয়া তাহার চতুর্দিক স্ফীত ও শক্ত হয় এবং ক্রমে ঠোঁঠ, গাল, চক্ষু ও কণ্ঠমূল ফুলে, গলার বাঁচি আওরায় । ঐ ফুস্ফুড়ি হইতে কাল রস নির্গত এবং পরে তথায় দগ্ধগে যা হইয়া পচা ধরে । ইহা উদ্ধে কপাল ও চক্ষু গহ্বর এবং নিম্নে গলা ও বুক পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ; ইহাতে দস্ত, নাক ও তালুর হাড় পর্য্যন্ত নষ্ট হয় ; মাংস খসিয়া পড়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পচা লালা নির্গত হয় । শেষে উদরানয় ও বিকার হইয়া পাক্ষিক মধ্যে রোগী পঞ্চস্থ পায় । দুই হইতে দশ বৎসরের শিশুর এই রোগ হইয়া থাকে । দুর্বলতায় এবং হাম, বসন্ত, জ্বর, আমরক্তাদি তরুণ রোগে এককালে বলক্ষয় হইলে এই ব্যাধি দেখা দেয় । অধিক পারদ ব্যবহারও ইহা হৃৎসন সম্ভব । পীড়া অতি উৎকট, নিরাময় হওয়া সুদূর । বহু যত্ন ও সূচিকিম্মায় আরোগ্য লাভ করিলেও বাবজীবন শ্রীহীন হইয়া থাকিতে হয় ।

ডাক্তার হার্টমেন এই রোগে সর্বপ্রথম ৪ ক্রমের আর্স দিতে কহেন এবং ইহাতে বিশেষ ফল লক্ষ্য না হইলে ২ ক্রমের সিকেল দিতে কহেন । ইহা ভিন্ন আউড, চিন, ক্রিয়োস, রস, লিলিসা ব্যবহার্য্য ।

### স্বরভঙ্গ—গলা ভাঙ্গা ।

গলা বা স্বরনালীর আমাশয়িক কিল্লির উপদাহ বশতঃ স্বরভঙ্গ হয় ও প্রায়ই সন্দির সঙ্গে অবস্থান করে । হাম, উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ প্রভৃতি রোগ কালীন বা রোগের পরে ইহা প্রকাশ পায় । দীর্ঘকাল থাকলে বা পুনঃ পুনঃ হইলে আতঙ্কের বিষয় । কখন কখন এককালে ~~বৃদ্ধ~~ হয়—সন্দির দরুণ হইলে ঐ রোগের সঙ্গে সারে—কিন্তু স্বাভাবিক কারণে, যেমন অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা হইতে উদ্ভব হইলে, আরোগ্য সুদূর ।

কানো—সন্দি ও গদ্যায় অধিক শ্লেষ্মা জমা জন্য স্বরভঙ্গ, সন্ধায় জ্বর বোধ, কাশি ও রাতে বৃদ্ধি, বড় গের্ত্তেহে হইলে । বিশেষ শিশুর পক্ষে ।

কানো—দীর্ঘস্থায়ী গলা ভাঙ্গা, সকালে, সন্ধ্যায় ও অধিক কথা কহায় বৃদ্ধি । হামের পর স্বরভঙ্গ ও কাশি—পলসু, কানো ।

কাষ্টিক—স্বরভঙ্গ, বিশেষ প্রাতে। রোগ ক্রুর হইলে, বুক এবং কখন গলা ব্যথা। জ্বরের পক্ষাবাত জন্ম এককালে স্বরবন্ধ (হাইগস্)

জেলস্—স্বর বড় ক্ষীণ। শ্বাসনালীর দ্বারের (Glottis) পক্ষাবাত ও গিলিতে কষ্ট। গলা মধ্যে ক্ষত থাকা বোধ। স্বাভাবিক ধাতু ও হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের পীড়া।

ড্রোস—স্বরভঙ্গ, পূর্ব ভিতর হইতে শব্দ নির্গত হইতেছে বোধ হওয়া। পুরাতন রোগ, হামের পর গলা ভাঙ্গা।

নক্স—সন্ধির জন্ম স্বরভঙ্গ, বেন গলা চাপুনি জন্ম স্বরভঙ্গ, উৎকাশি সহ নাক বন্ধ, প্রাতে রোগ বৃদ্ধি।

পল্‌স—স্বর-বন্ধপ্রায়। কাশি; জর্দি, সবুজ, কদয়া শ্লেষ্মা নির্গমন।

ফস—স্বরভঙ্গ, বুক সঁটে থাকা ও উৎকাশি। এককালে স্বরবন্ধ (বেল, বাপ্টিস, সল্‌ফর) কর্তনালী ব্যথা জন্ম কথা কহিতে অশক্ত।

মার্ক—স্বরভঙ্গ সহ গলা গুড়গুড়নি ও জ্বালা, নাক হইতে পাতলা শ্লেষ্মা বরা। স্বররোধ ও নিয়ত গলা ভাঙ্গা, কাশি, রাত্রে অধিক ঘর্মে কিছু মাত্র সমতা না হওয়া।

সল্‌ফর—রোগ ক্রুর এবং বৃষ্টি ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি। পল্‌সের পর কসুর থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে। স্বররোধ ও দম আটকান প্রায়, দরজা জানালা খুলিবার ইচ্ছিত করা, কর্তনালীর সড়সড়ানি, ব্রহ্মতালু সদা গরম থাকা। একহারা, বাহারা কোলকুঁজা হইয়া চলে, তাহাদের পক্ষে অধিক খাটে।

সাম্‌সু—গলা ভাঙ্গা ও ভিতর হইতে কাশি, বুক চাপুনি, পুনঃপুনঃ হাই উঠা, অন্ত্রতা ও তৃষ্ণা।

সাম্‌সুইনে—নিয়ত কর্তনের কাশি, গলা ভঙ্গ, স্বররোধ, গলার শুষ্কতা, গলায় ফুলা বোধ, বকের উর্দ্ধভাগে চাপুনি ও ভার এবং পূর্ব রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা থানা থানা গয়ার উঠা। পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে ব্যবহার্য্য।

### গলা ভাঙ্গা।

স্বরভঙ্গ, কাশি ও বায়ুনালী ব্যথা—অনেক সময় ঠাণ্ডা হইতে হয়। হান বা কুপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; দীর্ঘকালের হইলে ভয়ের বিষয়।

কার্বো—দীর্ঘকালের স্বরভঙ্গ, সকাল সন্ধ্যায় ও কথা কহায় বৃদ্ধি ।  
হামের পর স্বরভঙ্গ ও কাশি ; ( পল্‌স, কামো । )

কাষ্টিক—স্বরভঙ্গ, বিশেষ প্রাতে, খুব ক্রুর রোগ, বুক এবং কখন কখন  
গলা ব্যথা থাকিলে । জিহ্বার পক্ষাঘাত জন্য স্বর-রোধপ্রায় হওয়া ।

কামো—সর্দির গলাভাঙ্গা, গলায় শ্লেষ্মা বসা, বিশেষ শিশুর পক্ষে ;  
স্বভাব বড় চটা হইলে ।

জেল্‌স—শ্বাসনালীর দ্বারের পক্ষাঘাত জন্ত গিলিতে কষ্ট হওয়া, মিহি  
আওয়াজ, গলা মধ্যে ক্ষত থাকা বোধ । পুরাতন রোগে ।

মার্ক—স্বরভঙ্গ এবং গলা জ্বালা ও সড়সড় করা, বামে সমতুল্য হওয়া,  
প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি ।

নক্স—সর্দির গলাভাঙ্গা সহ গলার কুট্‌কুটনি বড় একত্রে স্বভাব ।

পল্‌স—স্বরভঙ্গ জন্ত চীৎকার করিয়া কথা কহিতে না পারা, সরল সর্দি,  
নরম ঐক্‌তি ব্যক্তির পীড়া ।

ফস—ভঙ্গ ও বিলুপ্ত স্বর, পুরাতন গলাভাঙ্গা, উৎকাশি ; কঠিনালী  
ব্যথা জন্য কথা কহিতে কষ্ট, একহারা ও গোরবণ রোগীর পক্ষে উপযুক্ত ।  
একবার হইতে তিন চারিবার দ্বিবা ।

ড্রোস—গলাভাঙ্গা, খুব ভিত্তির পইতে স্বর নির্গত হওয়া বোধ ।

সাম্বুক—গলাভাঙ্গা, কাশি, বৃকে চাপুনি, পুনঃপুনঃ জন্তণ, তৃষ্ণা,  
অস্থিরতা ।

সল্‌ফর—বিলুপ্ত প্রায় স্বর, ঘরের ভিতর থাকিয়াও হাঁপানি ।

## আলজিহ্বা প্রদাহ

প্রদাহ বশতঃ কখন কখন আলজিহ্বা বড় হয় । রোগ দীর্ঘকাল থাকিলে  
গলা সড়সড়ানি উপসর্গ দেখা দেয় । সর্বপ্রথম নক্স প্রত্যহ দুইবার ; দুই  
দিবসে প্রতিকার না বৃদ্ধিলে মার্ক, বেল, কাক্স, সল্‌ফর, ইহাদের এক একটা  
পূর্ব নিয়মে দিবা । সর্বদা ঠাণ্ডা জলের কুন্নি অথবা গলায় জলপটি দেওয়া  
বিধি এবং মাংস, মৎস্য, গরম মসলা ব্যবহারে বিমত থাকিবা ।

## কাশি ।

অনেক উৎকট রোগের সঙ্গে এই উপসর্গটিকে অবস্থান করিতে দেখা যায় এবং সেই রোগ আরোগ্য হইলে কাশিও সেই সঙ্গে যায় । হিম ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, জলে ভেজা, পেটের পীড়া, স্নায়ুর উত্তেজনা ( বাতিক বৃদ্ধি ) বশতঃ সামান্যতর কাশি হয় । যে কাশির সঙ্গে সহজে গয়ার উঠে, তাহাকে সরল বা জল কাশি এবং যে কাশির সঙ্গে কিছুমাত্র গয়ার উঠে না, তাহাকে উৎকাশি কহে ।

আইয়ড—গলা সড়সড় বা স্ফুস্ফুস করিয়া কাশি—খানিকটা গয়ার উঠায় উহার সমতা ।

আকন—কণ্ঠনাগীর নিয়ত স্ফুস্ফুসনি জন্ম থুকথুকে কাশি, তামাক টানায় বা পান করায় ও রাত্রে বৃদ্ধি । ফুসফুস যথোচিতরূপে প্রসারিত না হওন জন্ম শ্বাস-কষ্ট, শ্বাস গ্রহণে বুক ফুঁড়ুনি । অর, রক্তাধিক্য-ধাতু (বেল) ও পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস জন্ম পীড়া ।

আণিকা—কাশি, অল্প রক্ত মাথান গয়ার উঠা, বৃকের পার্শ্বদেশের আক্ষেপ, কাশির পূর্বে কান্না । বুক ও পেট খ্যাখলানর জ্বায় ব্যথা করা । প্রায়ই প্রাতে উঠার পর বাতনা হওয়া ।

আর্স—যেন গন্ধকের ধূম লাগা জন্ম দম আটকান কাশি ( ইথে, চিন ), কষ্টে ও কখন কখন রক্ত মাথান গয়ার উঠা । কাশির পর ও মিঁড়ি ভাঙ্গায় শ্বাস-কষ্ট হওয়া ।

ইউপাট—প্রচণ্ড কাশি ও বুক টাটানি, হাত দিয়া বুক চাপিতে বাধ্য হওয়া । কাহার কাহার মতে ইহা মর্দি-কাশির উৎকৃষ্ট ঔষধ । হাঁচি, নাক হইতে নিয়ত জল বরা, অল্পপ্রত্যঙ্গ বেদনা করা, সন্ধ্যায় খ্যাকথেকে কাশি । হাম কাগীন স্বর-ভঙ্গ কাশি ।

ইউফ্রে—দম আটকান কাশি এবং নাক ও চক্ষু হইতে জলবরা, প্রাতে কাশি সহ প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা ও শ্বাস-কষ্ট হওয়া ।

ইথে—উদরের উর্দ্ধ প্রদেশের ( Pit ) উপদাহ বশতঃ খ্যাকথেকে কাশি, নাক হইতে জল বরা, আঁহীরের পর, রাত্রে শয়নের পর ও প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর বৃদ্ধি ।

ইণ্ডিগো—উৎকাশি ও নাক হইতে রক্ত পড়া ।

ইপি—অধিক শ্লেষ্মা সঞ্চয় প্রযুক্ত অবিশ্রান্ত দম আটকান, কাশির ধমকে মুখ চক্ষু লাল হওয়া, অতিশয় গা বমি বমি ও বমন করা ।

ইলাপ্স—কাশি ও কাল রক্ত উঠা এবং বুক ছেঁড়ার স্থায় বেদনা হওয়া ।

ওপি—চোক গেলায় বা শ্বাস গ্রহণে কাশি । কাশির উপক্রমে শ্বাসরোধ ও বদনমণ্ডল নীল হওয়া ।

ককু—কাশি এবং ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার সমতা ।

কর্ণস—কাশি সহ বাম স্তনের বোটার নীচে ব্যথা এবং বাম পাখুরা অবধি উহা বিস্তৃত থাকা ।

কলিম্স—কাশি ও গয়ারের সহিত জমাট রক্ত উঠা ।

কাক্টেস—কাশি সহ অতিরিক্ত হরিদ্রা বর্ণের প্রচুর গয়ার ত্যাগ ।

কাপ্স—কাওয়া দানৈ কাশি । গলা ও কান ভার হওয়া এবং কান কাম-ডুনি, কখন মূত্র-স্থালী প্রদেশ, হাঁটু ও পায়ে বেদনা, কফজ ধাতুর পীড়া, রাত্রে বৃদ্ধি ।

কামো—সর্বদা গলা ও বুক সড়সড়ানি, উৎকাশি, নিদ্রিতাবস্থায় কাশি বা শিশুর কান্না বা আব্দারের পূর কখন কখন দম আটকান কাশি, স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় জ্বর, উদরাময়, খ্যাতিথেতে স্বভাব ; শিশুকে লইয়া বেড়াইলে ভাল থাকা ।

কার্বো—স্বরভঙ্গ কাশি, সন্ধ্যা ও প্রাতে বা অনেক বকিলে বৃদ্ধি । প্রচণ্ড কাশি এবং থানিকটা জুর্দাটে পুষ বা সন্তোটে শ্লেষ্মা কিম্বা বুক জ্বালায় পর রক্ত উঠা ; (শেষোক্ত লক্ষণটিও আর্সের বিশেষ লক্ষণ) সন্ধি বা স্নায়বিক আক্ষেপ-যুক্ত দমকা কাশি সহ কটিনেকার ও বমন এবং বকের বাম প্রদেশে ফুঁড়ুনি ।

কাক্সা—গলা স্ফুড়স্ফুড় করিয়া উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি, অথবা প্রাতে গলা ষড়ষড়ানি ও গাঢ় জর্দা গয়ার উঠা (পৰিস) ; বকের সঙ্কোচন, সিঁড়ি ভাঙ্গিতে বেদম হওয়া । পুরাতন কাশি, শ্লেষ্মা বস। অধিক মাথা ঘামা ও কফাংশ ধাতু পক্ষে ।

কালী-কা—বৈকাল ৩ বা ৫ টায় প্রচণ্ড উৎকাশি, গয়ার উঠিলে তাহা গিলিয়া ফেলা ।

কালী-না—কষ্টদায়ক উৎকাশি সহ হৃৎকম্প ।



কালী-বাই—কাশি, দড়ির ভায় গয়ার ও গলায় ঐ গয়ারের আটকানি, এবং কষ্টে টানিয়া তোলা, বৃকের হাড়ের পশ্চাভাগে আলা বোধ, শ্বাস কষ্ট এবং কখন কখন রক্ত মাথান পুষ উঠা ।

কালী-হা—গলা সড় সড় করিয়া উৎকাশি হওয়া বা সজ্জা গয়ার উঠা, বিশেষ বহুদিনের গরমির পীড়া-গ্রস্তের হইলে ।

কাটিক—গলা সড় সড় করিয়া উৎকাশি, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, শীতল জল পানে সমতা, প্রাতে স্বরভঙ্গ, কাশি কালীন বুক ব্যথা এবং কাশিতে কাশিতে তেজে অনিচ্ছাবীন প্রস্রাব হওয়া । ( পলস, ভেরাট )

ক্রিয়োস—গলা সড়সড় করিয়া উৎকাশি হওয়া ।

কুপ্রম—আক্ষেপ-যুক্ত দম-আটকান উৎকাশি হওয়া অথবা দীর্ঘকাল কাশি থাকা, ঘনঘন শ্বাস ও গলা ঘড় ঘড় করা ।

কোমাই—বিয়ক্তি-জনক আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, অনেকক্ষণ থাকা এবং রাত্রে বৃদ্ধি হওয়া ।

কোবান্ট—কাশি ও বেন কণ্ঠনালী হইতে উজ্জল লাল রক্ত উঠা ।

ক্রোকস—কাশি ও বৃকের নিম্ন প্রদেশ চাপায় উহার সমতা ।

ক্রোটাল—কাশি সহ বুক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত, বিশেষ পৃষ্ঠের বাম ভাগ সঁটে ধরা বা টেনে থাকা ।

গোয়াজম—উৎকাশি, অত্যন্ত গয়ার তুলায় উহার সমতা ।

চিন—মাথা নীচু করিলে কাশি ; তুলিলে সমতা । আহারের পর প্রচণ্ড কাশি । বেন গন্ধকের ধূম লাগা জন্ত উৎকাশি, কথা কহা, হাসা, পান বা গাঢ় শ্বাস গ্রহণ কালীন কাশি, কাশি ও শ্লেষ্মা উঠা, কখন বা উহাতে রক্তের ছিটা থাকা ; রসরক্ত ক্ষয়ে দুর্বলতা জন্ত কাশি, স্বপ্নদেশ ব্যথা, কখন কখন বমন হওয়া ।

জিঙ্ক—কাশি ; ও পলা থাকারি দিয়া তোলা ; ডেলা ডেলা রক্ত বা দড়ির ভায় শ্লেষ্মা উঠা, মিষ্ট তারের গয়ার তোলা ।

জেলস—গলা সড়সড়ানি ও উৎকাশি, কণ্ঠনালী ও বুক আলা করা, স্বরভঙ্গ হওয়া । অল্প শীতের সময় কাশি ।

টার্ট-এ—কাশি ও আহাঃরাস্তে বমন । বুক সড়সড়ানি, দম আটকান, শ্বেতিয়া পড়া ।

ডকা—ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগা জন্তু । জলকাশি প্রাতে ও সন্ধ্যায় অধিক পাতলা শ্লেষ্মা, কখন বা রাত্রে উজ্জল লাল রক্ত উঠা, স্বর-ভঙ্গ ও শ্বাস-নালী শ্লেষ্মা পূর্ণ হওয়া ।

ডিজিট—আহারের পর কাশি হওয়া ও সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলা ।

ড্রোস—ঘন ঘন কাশি হইয়া দম ফেলার সময় না পাওয়া । সকালে কাশি সহ তিক্ত শ্লেষ্মা উঠা । আক্ষেপ-গুক্ত উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি এবং পরে খাদ্য বমন বা মুখ ও নাক দিয়া রক্তপাত হওয়া । পুরাতন কাশি ও স্বরভঙ্গ, বুক ও পাঞ্জরার নীচে বেদনা, চাপায় স্বস্তি, হাসায় বৃদ্ধি ।

নক্স—স্বাভাবিক বা সর্দির কাশি, শেষ রাত্রে ও ভোরে রোগ বৃদ্ধি হওয়া, গলা ও কুসকূসে গাঢ় শ্লেষ্মা থাকা, গলা স্ফুড়স্ফুড়ান, গা শীত শীত করা, কখন কখন কাঁটনৈকার ও বমন হওয়া, মাথা ফেটে পড়া, পাকাশয় ব্যথা করা, দিনে কাশি হওয়া, ভোরে গয়ার উঠা ; নড়ায় চড়ায় ও আহারের পর বৃদ্ধি অজীর্ণতা জন্তু রোগ এবং কখন কখন বমি হওয়া । ডাক্তারী “কফমিক্সচার” ব্যবহারের পর নক্স বেশ খাটে । কাশির দরুণ গলায় কটু কষায় তার বোধ করা ।

নক্স-ম—বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত •সড়সড়ানি জন্তু কাশি, বিশেষ গত্ভাবস্থায় ।

নিকোল—রাত্রে কাশি এত প্রচণ্ড যে, উঠিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া মাথা দরিতে বাধ্য হওয়া ।

নেট্রম—প্রতিবার টোক গিলিতে কাশি হওয়া ।

পড—স্বল্প বিরাম জ্বরের সহিত কাশি এবং জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সেই কাশি কমা ও বাড়া ।

পল্স—কাশির দরুণ স্তম্ভ শরীর কাঁপা, চক্ষু হইতে জল বরা ও উহা লাল হওয়া, প্রবল কাশি, দিবা ভাগে কিম্বা রাত্রে শয়ন মাত্রেই বৃদ্ধি, কপাল ব্যথা, উদরাময়, কখন বা বমন, জ্বর ভাব, বৃকের পার্শ্বদেশ স্ফুড়নি, রাত্রে উৎকাশি, উঠিয়া বসায় উহা বন্ধ হওয়া ।

ফস—গলা, বিশেষ বৃকের, সড়সড়ানির পর উৎকাশি ; কথা কহায়, হাসায়, পান করায়, বাহিরের বাতাসে যাওয়ায় বৃদ্ধি ; গলা ভাঙ্গা ; বুক টাটানি, বিশেষ বামদিকে । বামপার্শ্বে শয়নে কাশি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত

রাত্রি ঐ ভাবে থাকা। অত্যন্ত বলক্ষয়কারী কাশি, আক্রমণের উপক্রমে ভয়ে শিশুর উহা সামলাইতে যাওয়া। কাশি, জ্বর, মাদামারা, মূত্ৰা-ভয়, বদন ও ঠোঁঠ কাল্চে বর্ণ হওয়া এবং চট্‌চটে বা রক্ত-বিশিষ্ট শ্লেষ্মা তোলা, শ্বাস-কষ্ট হওয়া।

ফেরম—প্রাতে আপেক্ষযুক্ত কাশি, আহারে সমতা। উৎকাশি ও ভুক্ত পদার্থ বমন হওয়া।

বেল—আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষতঃ রাত্রে ও নড়ায়, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ সময়ে গোঁঙান, স্বরভঙ্গ ও দুই প্রহরের পর কাটেনেকার, দিন রাত কাশি, পেট টাটনি ও কাশি কালীন শিশুর কান্না। শ্বাসনালীতে ধূলা বা অপর পদার্থ প্রবেশ জন্ম গলা যেরূপ স্ফুড়স্ফুড় করে, সেইরূপ সড়সড়ানি, গুমস্ত কাশি, সন্দির বা মায়বিক কাশি, ম্যাথা ধরা, ঘাড় ব্যথা করা, হাঁচি হওয়া, ছেঁড়ার স্থায় পেটে বাতনা অনুভব করা।

ব্রাই—রাত্রে কাশির ধমকে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসা। কাশি কালীন মাথা ও বুক ফেটে পড়া। ঘন ঘন আক্ষেপ যুক্ত দম-আটকানো কাশি, বিশেষ আহার ও পানের পর। দিন রাত্রি শাদা বা জর্দাটে শ্লেষ্মা বা অল্প অল্প রক্ত উঠা এবং কাশির পর বমন ও কণ্ঠার হাড়ি ব্যথা হওয়া।

ভেরাট—প্রচণ্ড কাশি সহ কপাল ঘামা, বদন মণ্ডল নীল হওয়া ও অসামান্য প্রস্রাব (কাস্টিক, পল্‌স) ; কাশি সহ জর্দা গয়ার উঠা ও পরে বুক বেদনা হওয়া।

মঙ্ক—কাশি আসিলেই কুসকূসের আক্ষেপ ও শ্বাস-কষ্ট, যেন দম আটকাইয়া যাইবে বোধ হওয়া এবং এই ভাব সামলাইতে না সামলাইতে আবার কাশি।

মর-আ—কাশি সহ গলা জ্বালা থাকা।

মার্ক-স—কেবল রাত্রি বা কেবল দিবসে কাশি। উপন্যূপরি দুই দমক কাশির পর থানিকটা বিরাম, পরে আবার পূর্ববৎ হওয়া। নাক টাটান ও তাহা হইতে জল ঝরা ; গলা সড়সড়ানি ও কাশি, স্বরভঙ্গ, অঙ্গ কম্পনকারী উৎকাশি বা জলকাশি ; গয়ারের সঙ্গে রক্তের ছিট থাকা ; রাত্রে যথেষ্ট ঘর্ম হইয়াও শ্রুতি না হওয়া ; বমন কালীন নাক ও মুখ দিয়া রক্ত উঠা। প্রচণ্ড কাশি জন্ম কথা কহিতে অপারকতা।

মাগ্নিসা-কা—অতিরিক্ত কাশি । ক্ষুদে কনিগ্রস্তের রাত্রে আক্ষেপযুক্ত কাশি ।  
 \* মাগ্নিসা-স—কাশির দরুণ বুক জালা করা এবং উহা কমিলে বা গেলে  
 পুনরার কাশি হওয়া ।

মেজের—বমন না হওয়া পর্য্যন্ত এক লাগাড়ে প্রচণ্ড কাশি ।

মেফিট—পান করা, কথা কহা, পড়া ও গান করার কাশি এবং যেন কণ্ঠ-  
 নালী মধ্যে কিছু আটকাইয়া বা প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে বোধ হওয়া ।

মেনিরাহ—দম আটকান কাশি, শ্বাস গ্রহণ কালীন উহার বৃদ্ধি ।

রস—বুক সড় সড় করিয়া উৎকাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, জিহবার শুষ্কতা, অস্থিরতা,  
 মুখে রক্তের তার । জলে ভেজার দরুণ কাশি ।

কমেস—পুরাতন কাশি, কণ্ঠ-গহ্বরে নিয়ত বেদনা অনুভব, ( ফারস পর  
 ইহা খাটে ) ।

লাইক—ক্রুর কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, সংলগ্ন ( না-ছোড়-ভাবে লেগে থাকা )  
 শ্লেষ্মা, কখন কখন বমন । রাত্রে পান করার পর অধিক কাশি, বৃহৎ চাপ,  
 নাকের পাতা ক্ষণ বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হওয়া অবস্থা পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।  
 এই ঔষধ ২০০ ক্রিমের দ্বারা ডাক্তার উইলসন্স মনুষ্য ও পশুকে মুমূর্ষু অবস্থা  
 হইতে আরোগ্য করিয়াছেন । কাশি কালে ও পূর্বে শ্বাস থরথরতা হইলে ।

লাকাসি—দম আটকান উৎকাশি, গলায় কিছু আটকাইয়া থাকা বোধ  
 এবং তাহা তুলিবার বুথা চেষ্টা করা । ঘুম আসিলেই কাশি, পুনঃ পুনঃ গলা  
 থকরাণ ও ঢোক গেল্য । গলা সামান্য চাপিলে, কথা কহিলে, হাসিলে,  
 চোঁচাইলে দম আটকান উৎকাশি ; শ্বাসনালী বা বকের শুষ্কতা বা হৃৎহৃৎনি  
 জন্ত কাশি ।

লারো—কাশি, প্রচুর, গয়ার এবং উহার মধ্য উজ্জল লাল রক্তের  
 ছিটা থাকা ।

লেডম—প্রচণ্ড কাশি, দুই প্রহর রাত্রে পর বা প্রাতে কাশি, দুর্গন্ধ পুষ  
 উঠা এবং কখন কখন উহাতে উজ্জল গাঁজলা-বিশিষ্ট রক্ত থাকা ।

লোবেলা—দীর্ঘস্থায়ী দমকা কাশি, দড়ির ছায় শ্লেষ্মা উঠিয়া উহার সমতা ।

লিষ্টস্—প্রতিবার শ্বাস গ্রহণ কালীন কাশি ।

লিষ্টস-কা—গলায় কুঁড়নির দরুণ কাশি ।

ষ্টানম—কম্পনকারী উৎকাশি, রাত্রে বা ভোরে বৃদ্ধি, বিশেষ কথা কহিলে বা হাসিলে, কখন কখন তাহার পর অন্ন বমন, অথবা কাশি ও প্রচুর মিষ্ট বা লোস্তা শ্লেষ্মা উঠা, বুক টাটান, অতিশয় চর্কলতা ও ঘাম হওয়া ।

সল্ফর—দিবা রাত্রি ক্রুর উৎকাশি ; আহার বা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করা কালীন কাশি ও তৎকালে বক্ষের সংকোচন এবং পরে বমন বা অসামান্য প্রস্রাব, মাথা ধরা এবং বুক, পেট, নাজা, পাছায় বাথা অথবা গাঢ় শাদা বা জন্দা বর্ণের গয়ার বা সজ্জাটে ভর্গন্ধ পূন, বা শ্লেষ্মা কিম্বা লোস্তা বা মিষ্ট শ্লেষ্মা ত্যাগ । অর সম্বলিত কাশি ও অন্ন অন্ন রক্ত উঠা ; বৃকে সন্ধি বসা, ঘড়ঘড়ানি কাশি ও গাত্রে চুল্লুকনা হওয়া, পুনঃপুনঃ ঘুম ভাঙ্গা ।

সল্ফ-আ—কাশির দরুণ ডান চক্ষুর পাতার নীচে বেদনা ।

সাবিনা—গর্ভাবস্থায় কাশি ও কাশির পর থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠা ।

সিনা—শিশুর আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষ ক্রমি-রোগ-গ্রস্তের । হঠাৎ খাবি খাওয়ার ঞায় হইয়া কাশিলে যেন গলা দিয়া উপরে কোন পদার্থ উঠিতেছে বোধ করা ও সেই জন্ত পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে বাধ্য হওয়া ; নাক খোঁটা, কান্না ও কিছুতে শান্ত না হওয়া ।

সিমিসি—কথা কহিলেই কাশি হওয়া, কান্নাই মৌন থাকা ।

সিলিসা—দিন রাত কাশি, ব্যায়াম করায় বৃদ্ধি, চিত হইয়া শয়নে শ্বাস-কষ্ট হওয়া, পেট ডাংরা ও তাহার অধিক ঘাম হয়, এক্রপ ও গঙনালা-ধাতুগ্রস্ত শিশুর পুরাতন কাশি থাকা পক্ষে ।

সেপি—সরল কাশি ; প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রচুর লোস্তা শ্লেষ্মা উঠা । গঙ-মালা-ধাতু-গ্রস্তের পুরাতন রোগ ; কাশি সহ ঘন, জন্দা, সজ্জা বা পৃথক পচা শ্লেষ্মা তুল্য । শিশুর কাশির সঙ্গে কান্না ও থাকিয়া থাকিয়া দম আটকান, গা বমি বমি করা, কাটনেকান, কখনও বা বমন হওয়া ।

স্পঞ্জ—কাশি সহ বৃদ্ধ জালা করা, কিন্তু আহার ও পানে তাহার সমতা । পুরাতন কাশি ; পৃথক শ্লেষ্মা উঠা ; ক্ষয়জর, বিশেষ রাত্রে ; হাতের আঙ্গুলের আগা ও নখ লাল ও বিস্তী হওয়া ।

স্ট্রইলা—দিন রাত বিরক্তি-জনক উৎকাশি । পুরাতন রোগ, প্রচুর চট-চটে শ্লেষ্মা উঠা, তহাও কখন বা সহজে কখন বা কষ্টে তোলা ।

হাইয়স—প্রচণ্ড আক্ষেপযুক্ত বলক্ষয়কারী কাশি ; রাত্রিকালে, বিশেষ শয়ন করায়, উঠিয়া বসাতে সমতা (পল্‌স) । সর্ব শরীরের পেশীর উৎক্ষেপণ । যুবতী ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের কাশি । বেলের পর অনেক স্থলে ইহা বিশেষ খাটে ।

হিপার—প্রচণ্ড স্বরভঙ্গকারী উৎকাশি, দম আটকাইবার আশঙ্কা, চক্ষু হইতে খানিক জল ঝরিয়া কাশির সমতা । শরীর অনাবৃত থাকায় ও ঠাণ্ডা হইলেই কাশি ; রাত্রে এবং কথা কহিলে, আহারান্তে বা সিঁড়ি উঠায় বৃদ্ধি হইলে ।

### কাশি বৃদ্ধি ।

বৃদ্ধি, আব হাওয়া পরিবর্তনে—কাফা ।

— প্রাতে—কার্বো, পল্‌স ।

— দিবসে—কার্বো, সল্‌ফর ।

— সন্ধ্যায়—আর্স, কার্বো, লাকাসি ।

— রাত্রে—আর্স, কাস্টাস, কার্বো, কাফা, কোনাই, লাকাসি, হাইয়স ।

— ঠাণ্ডা জলীয় দ্রব্য ব্যবহারে—আর্স ।

ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, আক্সেনি, ব্রাই, হিপার ।

— আর্দ্র আব হওয়ায়—কার্বো, ডঙ্কা, পল্‌স, মার্ক, সল্‌ফর ।

— বাহিরের বাতাসে—ফস্ ।

— কথা কহায়—কার্বো, ফস্, হিপার ।

— আহারের পর—আর্স, পল্‌স, লাকাসি

— শয়নে—লাকাসি, সল্‌ফর ।

— নিদ্রার পর—পল্‌স, লাকাসি ।

— গলায় চাপ পড়ায়—লাকাসি ।

— হানিলে—ফস্, হিপার ।

অপরাপর উপসর্গ সহিত কাশি ।

— কাশি, আর্দ্র—কাফা, পল্‌স, স্কুইল ।

— আক্ষেপযুক্ত—ইপি, কার্বো, হাইয়স ।

— কষ্টকর—আর্স, কালী-বাই, হিপার ।

— ফুর—ট্রিলিয়ম, বারাইটা, লাইক, হিপার ।

— গুরুপক্ষে—ফস্, লাকাসি ।

— খ্যাকপক্ষে—পল্‌স, সল্‌ফর ।

— থুকপক্ষে—ফস্, লাকাসি ।

— প্রচণ্ড—কাফা, পল্‌স, লাকাসি ।

— কাশি সহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যাধি—আক্সেনি, কার্বো, ব্রাই ।

— অস্ত্র টাটানি—পল্‌স ।

— কঠিনালী টাটানি—কালী-বাই, কার্বো, নাইটী-আ, লাকাসি ।

— ক্ষয়ক্ষয়—আর্স, ফস্, ষ্টানম ।

— গলা ভাঙ্গা—কার্বো, কাফা, পল্‌স, ফস্, স্পঞ্জ, হিপার ।

— গলা সড়সড়ানি—কার্বো, কাফা, ফস্, লাকাসি ।

— গলা সাঁই সাঁই করা—আর্স, ইপি, কাস্টাস, পল্‌স ।

— গা বমিবাক্তি করা—আর্স, ইপি ।

— দম আটকান বোধ—আর্স, ইপি, কাস্টাস, পল্‌স, সল্‌ফর, হিপার ।

— দুর্বলতা—আর্স, চিন, ট্রিলিয়ম, লাইক ।

— ফুটুনি—আক্সেনি, কাস্টাস, লাকাসি ।

— কাশি সহ বমন—ইপি, পল্‌স, সল্‌ফর ।

— বুক ব্যাধি—কার্বো, কাফা, সল্‌ফর ।

— বুক ঘড় ঘড় করা—কালী-বাই, কাক্স, পলস, ফস, সলফর, হিপর।

— বুক টাটানি—কালী-বাই, কার্বো, নাইট্রি-আ, লাকাসি।

— বুক চাপুনি—আস্কেপি, ইপি, কাস্তস, ফস।

— বুক শেঁটেধরা—আস্কেপি, ফস।

— হাস-খর্বতা—আস', ইপি, লাকাসি।

— স্বর-রোধ—কালী-বাই, থলস, ফস।

নিষ্ঠীবন—বা গয়ার।

— প্লেগ্মা, অধিক—আস্কেপি, কার্বো, পলস, স্কুলা।

— কদয়া—কাক্স, বাপ্টিসা, ষ্টানম, স্পঞ্জ।

— ঘন—কাক্স, পলস, ষ্টানম, সলফর, হিপর।

— জর্দা—কাক্স, পলস, সলফর, হাইড্রাস।

— ধূসর বর্ণের—কালী-বাই।

— প্রচুর—ট্রিলিয়ম, হাইড্রাস।

— লেগে থাকা—আস', কাক্স, কালী-বাই।

চিন, ফস, লাইক।

শাদাটে—আস্কেপি, সলফর, স্কুলা।

— সজ্জাটে—কার্বো।

কাশি সনয়ানুসারে।

কাশি, বর্গাকালে—কার্বো, ভেরাট।

— বসন্তকালে—আস', ভেরাট, ব্রাই।

— শীতকালে—আকন, কামো, জেলস, বেল, ব্রাই, মার্ক।

— হেমন্তকালে—কার্বো।

কাশি, প্রাতে—ইউস্কে, কালী-বা, চিন, নয়, পলস; আইড, আর্দিকা, আস', ইয়ে, কক্স, কামো, কাক্স, নেট্রম, লাইক, সলফর।

— পূর্বাঙ্কে—আগারি, আরম, ক্যানফর, ব্রাই।

— মধ্যাঙ্কে—আগার, বেল, ষ্টাকিস, (ইউস্কে—ঘুমন্ত)।

— দিবসে—আম কা, ডাউস্কে, ফস, রস, লাকাসি।

— কেবল ১০ দিবসে, রাত্রে নয়—বেল; আনাকার্ড, সাঙ্খু।

— সন্ধ্যায়—আস', কাস্প, কাক্স, নাইট্রি-আ, পলস, হিপর; কার্বো, নেটম, মাক, সিলিসা, সেপি, সলফর।

— রাত্রিকালে—আকন, আম-কা, আস', কার্বো-আ, কালী, কাক্স, কোনাই, গ্রাফাইট, পলস, পিট্রোল, বেল, (১০টা রাত্রে ও মিনিট কতক অন্তর) লাকাসি, সলফর, সিলিসা, সেপি, হাইয়স।

— কেবল রাত্রে, দিনে নয়—সেপি; কাষ্টিক, ষ্টাকিস। শিশুকে শয্যায় শয়ন করাইলেই—সেপি।

— দুই প্রহরের পূর্বে ও সন্ধ্যা হইতে ১২টা রাত্রি—ষ্টানম (১২টা হ'তে ভোর)।

— দুই প্রহরের পর—নয়, বারাইটা কা, কাক্স।

— সূর্যাস্ত সময় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত—আরম।

— রাত্রি দিবা—সিলিসা, স্পঞ্জ; ইয়ে কামো, ফস, (নেট্রম—কাশিতে কাশিতে বেদম হওয়া)।

— একদিন অন্তর ও প্রচণ্ড—নয়।

— দুইদিন অন্তর (Every 3d. day) আনাকার্ড, লাইক।

— ষড় কালীন—কফি।

- গর্ভাবস্থায় ও রাত্রি বৃদ্ধি—কোনাই ।
- ৯০ জরায়ু বেদনা—বেল ।
- প্রীহা ফুঁড়নি—কার্বো, বেল, সল্ফর ।
- ও আলজিত বড় হওয়া—আলুমি, বাপ্টিস, মার্ক ।
- নাতিপ্রদেশ ছেঁড়া—ইপি ।
- ঘুম পাকিলেই—লাকাসিস ।
- কাশিতে কাশিতে অচেতন হওয়া সিনা ।
- কাশি জন্ত ঘুম না হওয়া—পল্‌স, (সেপি, রস—অনবরত কাশি ।)

কাশি-বৃদ্ধি—সময়ানুসারে ।

- বৃদ্ধি, প্রাতে ও দিবসে—ইউফ্রে ।
- প্রাক্তে ও সন্ধ্যায় নম্ম, বেল ।
- সকাল ১০ হইতে ১২ টা—নেট্রম ।
- বৈকাল ১ হইতে ২ টা—আস' ।
- বৈকাল ৩ হইতে ৪ টা—লাইক ।
- সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে—কাস, ক্রাঙ্কা, সেপি ।
- রাত্রি—আস', মার্ক-স, হাইয়স ; (ও ঘুমন্ত—কামো, লাকাসি ।)
- সন্ধ্যা হইতে ১২ টা রাত্রি—রস, হিপার ;
- স্থায্যতাপে—আস্ট ।
- নড়া চড়ার—আস', জিক্স ।

কাশির সমতা (কমী) ।

- কাশির সমতা, প্রাতে—ককু, প্রাটি ।
- মধ্যাহ্নে—ফস' ।
- সন্ধ্যায়—আম-ম, ককু, সল্ফর ।
- দুই প্রহর রাত্রের পূর্বে—আপিস ।

কাশির প্রকার ভেদ ।

- কাশি, আক্ষেপ যুক্ত—ইপি, কার্বো, কুপ্রম,

ড্রোস, নম্ম, পল্‌স, ব্রাই, সিনা, হাইয়স, ইগ্নে, কামো, চিন, বেল, ভেরাট, সল্ফর ।

উৎকাশি বা গুরু কাশি—আকন, আলুমি, ইগ্নে, নম্ম, পিটোল, ফস, ব্রাই, লাকাসি, হাইয়স ; ইপি, কামো, কাঙ্কা, কোনাই, জেল্‌স, বেল ।

কাশি, শরীর কম্পনকারী—আলাকার্ড, ইগ্নে, ইপি, পল্‌স, সল্ফর ।

— কুজুরের ডাকের স্থায়—বেল, ট্রান, হিপার ; ডকা । দিনরাত—স্পঞ্জ ।

— থেকথেকে—আলুমি, ফস, সালুই, আস', ইগ্নে, ইউপাট ।

— থকথুকে—আকন, ষ্টানম, ইগ্নে, নম্ম, বেল, ব্রাই ।

— গলাভাঙ্গা—আকন, বেল, ষ্টানম ; কার্বো ফস, হিপার ।

— গলা গুড়গুড়কারী—ইগ্নে, ইপি, কামো, কাঙ্কা, জেল্‌স, নম্ম, বেল, ব্রাই, লাকাসি, হাইয়স ।

— দম আটকান—ইপি, কুপ্রম, চিন, ড্রোস, সল্ফর, সাম্ব', সিনা ; আস', কামো, ব্রাই ।

— প্রচণ্ড—আকন, ইউপাট, পল্‌স, বেল ।

— শান্তকারী—ষ্টানম, ক্রোকস, মার্ক, সিলিসা, আস', কাঙ্কা, নম্ম, পল্‌স, সল্ফর, সের্পি ।

— সর্দি বিশিষ্ট—কামো, নম্ম, পল্‌স, রস ; ইউপাট, ইগ্নে, ইপি, মার্ক ।

— সঁই সঁই শব্দ বিশিষ্ট—ক্রিয়োস, সাম্ব' ।

— সরল বা পাতলা গম্মার উঠা—আকন, কাঙ্কা, নম্ম, পল্‌স ।



— স্নায়বিক—ইথের, ইপি, নক্স, প্রক্স, ব্রাই, হাইরস।

— হপিং কামির স্নায়—কোনাই, ড্রোস, পড।

— অবিশ্রান্ত একলাগাড়ে—সেপি (ইউফ্রে)

— উৎকাশি (সুইলা—উৎকাশি বা সরল কাশি।)

— কথা কহিতে না পারা—কুপ্রম।

কাশি সহ শ্লেষ্মা বা গদ্যার উঠা।

শ্লেষ্মা, গাঁজন্তা বিশিষ্ট—আস', পলস, ফস।

গাঢ় বা ঘন—পলস, কাফা, ক্রিয়োস, বেল, লাইক, ষ্টানম, সল্ফর, হিপর।

— চট্‌চটে—আস', কামো, জিক, নক্স, ফস, ষ্টানম, ষ্টাকিস।

— জলবৎ—আস', কামো, কার্বো, গ্রাফা-ইউ, মার্ক।

— ঠাণ্ডা—ফস; নক্স, সল্ফর, লাকাসি, ষ্টানম।

— দড়িবৎ—কালী বাই, আর্জেন্ট, হাই-ড্রাস।

— দুধবৎ—আস', সল্ফর, সেপি।

— পুষবৎ—কাফা, কালী-কা, কোনাই, চিন, লাইক, সিলিসা, সেপি; আস', সল্ফর, ষ্টানম, ষ্টাকিস।

— শক্ত ও ডেলার স্নায়—কোনাই, নেট্রম, ফস, ব্রাই, স্পঞ্জ, সিলিসা।

— প্রচুর—আস', ইউফ্রে, কাফা, পলস, লাইক, ষ্টানম, সেপি; কার্বো, ডকা, সল্ফর, সিলিসা।

— গন্ধ, কদর্যা—কাফা, নেট্রম, লাইক, বাপ্টিসা।

— গন্ধ, টক—কামো, কাফা, ডকা, নক্স, সল্ফর, ষ্টানম, সেপি।

— গন্ধ, পোড়া (ও তার)—পলস, ব্রাই, রস।

— গন্ধ, পচা—সাদুই; কাফা।

— কালচে বা নীলবর্ণ—কালী-বা, চিন, নক্স।

— জর্দা বর্ণ—কাফা, পলস, ফস, ষ্টানম, সিলিসা; কার্বো, ব্রাই, লাই।

— ধূসর বর্ণ—আম্বা, লাইক, সেপি; আস', কাফা, ক্রিয়োস, নক্স, সিনা, সেপি।

— পাটকিলে বর্ণ—ব্রাই; কার্বো, ফস, সিলিসা।

— সবুজ বর্ণ—কালী-আইড, কার্বো, পলস, লাইক, ষ্টানম, ফস, সেপি।

— শাদা—লাইক, সেপি; আকন, কার্বো, পলস, ফস।

— লালচে, নরচে পড়ার স্নায় বর্ণ—ফস, ব্রাই।

কাশি—নিষ্টিবণ বা শ্লেষ্মার আশ্বাদ

(তার)।

শ্লেষ্মার তার, কমলা লেবুর স্নায়—ফস।

— কড়াই-ডুটির স্নায়—জিক, পলস।

শ্লেষ্মার তার, গাছড়ার স্নায়—নক্স, ফস-আ; (গাছড়ার গন্ধ—জেলস)।

শ্লেষ্মার তার গন্ধকের স্নায়—নক্স, ফস, সল্ফর।

— চর্কির বা তেলের—কাষ্টিক, পলস; আসাফাটি, সিলিসা।

— টক—কাফা, কালী, ফস, আস', কামো।

- ভিক্ত—কামো, পল'স, আস', ড্রোস,  
নন্স, নাইট-আ, ভেরাট, লাইক, সেপি ।
- ছুথের—আস', সল'ফর, সেপি, চিন,  
নন্স, নেট্রম, পল'স, বেল, সল'ফর ।
- খাতুর—কুপ্রম, ইপি, রস । তামার—  
কুপ্রম, কালী, নেট্রম, লাকাসি ।  
লোহের—কুপ্রম, কাক, সল'ফর ।
- পচা—আর্গিকা, আস', কামো, কার্বো,  
কোনাই, পল'স, সেপি ।
- পেঁয়াজের ছায়—আসাফাটি, সল'ফর,  
রহনের তার—আস' ।
- মিষ্ট-ফস্ট, ষ্টানম, পল'স, মন্সম, রস ।  
( চিনির ছায়—কাক, লাইক, সল'ফর ) ।
- মন্সিচের তার বা কাল—আকন, আস',  
মেজের, সল'ফর, সাবাড ।
- লোস্তা—আস', ফস, লাইক, সেপি,  
কার্বো, চিন, পল'স, বেল ।
- কাশি—করণাধুসারে ।
- কাশি, আর্গিতা জন্ত—ডকা, মার্ক ।
- অর্শ বন্ধ হওন জন্ত—ইউফ্রে ।
- উদরাময় হওন জন্ত—ইপি, কামো, মার্ক ।
- উজ্জল পদার্থ দেখা জন্ত—ষ্টানম ।
- কারা জন্ত—আর্গিকা, কামো ।
- ক্ষুধা জন্ত—কালীকা ।
- গন্ধকের ধূম লাগা জন্ত—আস', পল'স,  
লাকাসি ।
- গলা মধ্যে ক্ষত থাকা জন্ত—লাকাসি ।
- গলার উপদাহ জন্ত—বেল, ব্রাই, মার্ক ।
- গান করা জন্ত—ড্রোস, ষ্টানম ।
- ঠাণ্ডা আব হাওয়া জন্ত—কাষ্টিক ।
- ঠাণ্ডা পান জন্ত—কার্বো, কুইলা ।
- ঠাণ্ডা বাতাস জন্ত—আকন, কার্বো,  
ফস, ব্রাই, লাকাসি ।
- ঠাণ্ডা জন্ত—ডকা, ব্রাই ।
- ধূম পান জন্ত—আকন, ড্রোস, লাকাসি ।
- পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস জন্ত—আকন,  
হিপার ।
- পড়া বা চৈতান জন্ত—নন্স, বেল ।
- পান করা জন্ত—সিলিসা, আস', ড্রোস,  
ব্রাই, লাকাসি ।
- পূবে বাতাস জন্ত—আকন, বাপ্টিসা ।
- শাসনালী ও বুক জ্বালা জন্ত—জেল'স ।
- চুলকুনি, গলার, জন্ত—কোনাই, নন্স,  
সিলিসা ।
- ঐ, বুকের, জন্ত—পল'স ।
- কঠনালীর জন্ত—বেল ।
- দাঁত উঠা জন্ত—কামো, কাক ।
- পাণি বসন্তের পর—আন্ট ।
- পায়ের পাতা বা মাথা অনাবৃত করার  
জন্ত—সিলিসা ।
- বিরক্তি জন্ত—ইগ্রে, কামো, নন্স, ষ্টাফিস ।
- মিষ্ট আহার জন—মন্সম ।
- ঋতুর রজোবন্ধ জন্ত—পল'স, মিলি ।
- শুষ্ক শুড়ুনি ( কঠনালীর ) জন্ত—কামো,  
লাকাসি, আকন, আর্গিকা, ফস-আ,  
সাবিনা, সেপি ।
- ( গলার ) জন্ত—আজ'ট-না, কোনাই,  
চিন, জেল'স, নন্স, নেট্রম, পল'স, ফস,  
রস, লাকাসি ।
- ( বুকের )—ফস ; ফেরাট, রস, ষ্টানম,  
সেপি ।

- খাস অবরোধ জন্ত—আস', কুপ্রম।
- খাস কষ্টকর জন্ত—ইপি, ফস।
- ঘন ঘন জন্ত—ইপি, ব্রাই।
- শিশুকে দীর্ঘকাল স্তন পান জন্ত—  
ফেরম আ।
- ফোটক বন্ধ বা অপ্রকাশ হওন জন্ত—  
ডকা।
- হামা জন্ত—আর্জেন্ট না।
- হাসি জন্ত—চিন, ড্রোস, ফস, ষ্টানম।  
হামের পর—কার্কো, কোনাই, ড্রোস।
- হাত অনৌযত করায়—পল্‌স, হিপার।
- ইচ্ছা বসন্তের পর—আস', কোনাই,  
ড্রোস, বেল, মার্ক।

### কাশিকালীন বা তৎসঙ্গে বিবিধ উপসর্গ।

- কাশিসহ—অল্প কনকনানি—বেল।
- অহিরতা—আকন, দামু, কফি।
- অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব—কাকা, পল্‌স।
- উদ্বিগ্নতা—আকন, ড্রোস, সাধু, সিনা,  
প্পল, হিপার।
- কান্না ( তৎকালে—হিপার, বেল ) ; তৎ-  
পূর্বে (আর্গিকা, বেল) ( তৎপরে, বিশেষ  
স্পর্শ করিলে কান্না—সিনা )।
- মাথা ও বুকের কাপুনি—রস।
- মাথার অভ্যন্তরে ঐ—ট্যাট-এ।
- সর্কশরীরে ঐ—ফস, বেল।
- কাষ্ঠবৎ—ইপি, কুপ্রম।
- খেঁচনি—হাইয়স, (কাপ্প—সর্কশরীর।)
- গলাভান্না—ইউপাট, কামো, জেল্‌স,  
ডকা, নল্ল, পল্‌স, ফস, বেল, ব্রাই, মার্ক।
- গলা বড়ঘড়ানি—কাকা, ডকা, পল্‌স,  
হিপার।

- ঘার—আস', কামো, ফস, রস, লাইক।  
সেপি, সল্‌ফর। ( বদনে মুক্তার নায়  
ফাটা কাটা—আর্জেন্ট-না )। ( ওপি—  
প্রচুর ঘার )।
- চক্ষুদে জল ঝরা—ইউফ্রে, পল্‌স।
- রক্তশ্রাব—কামো, কার্কো, নল্ল।
- জ্বালা কঠনলীতে—আকন, ফস, প্পল
- গলাতে—ইউফর, ফস-আ।
- পাকাশয়ে—হিপার।
- বৃকে—কাষ্টিক, ফস, প্পল।
- জ্বর—( আকন, ইপি, কোনাই, নল্ল,  
নেট্রম, সাবাড—উৎকাণ। ( কালী, কাকা  
সবল ) (ইউপাট—সবিরামজ্বর বন্ধ জন্ত)  
( পড—জ্বরবিরাম জ্বরে )—( এই, রস,  
বেল, লাইক, —টাইফড জ্বরে।
- টাটান কঠনলী—ফস।
- গলা—সল্‌ফর।
- প্‌কাশয়ে—ব্রাই।
- পেট—নল্ল, পল্‌স, বেল, ভেরাট, হাইয়স।
- বৃক—আস', ইউপাট, কার্কো, কাষ্টিক,  
ফস, মার্ক, লাইক, সিলিসা।
- দম আটকান—আস', ইপি, টাট',  
লাকাসি, হিপার।
- দন্তশূল—লাইক, সেপি।
- নাকদে রক্তপড়া—আয়স, ড্রোস, পল্‌স।  
( ইণ্ডিগো—প্রতিবার কাশিতে )।
- বদন কালচে—ইপি, ড্রোস, সাধু।  
কোঁকাসে—পল্‌স, ( লাল—বেল )।
- বদন—টাট'-এ, ড্রোস, ব্রাই, ইপি, কার্কো,  
নল্ল, পল্‌স, ফস, ভেরাট, মার্ক, লাইক,  
সেপি।

বাধা, কণ্ঠার হাড়ে—ব্রাই। কাঁধে—চিন,	মুখে জল উঠা—আস', ব্রাই।
পলস। (কোমরে—পলস, মার্ক) (ঘাড়ে	রক্তপড়া—ইপি, ড্রোস, নল্ল, মার্ক।
বেল) (পাকাশয়ে ইপি, জোলস, নল্ল,	Sternum (বুকের অস্থি) হাতদে চাপা
পলস, কস, বেল, ব্রাই, রস, লাইক)	—ব্রাই।
(পাঁজরার নিম্নে—নল্ল, ব্রাই,) মাথার	—সর্দি—নেট্রম, স্পঞ্জ, ইগ্নে, নল্ল, বেল,
পেছনে—ফেরম মার্ক—ব্রক্তালা—সল	সল ফর।
ফর—কপাল—আর্গিকা, ষ্ট্রেটম)।	হাঁচি—বেল।
বুক উত্তপ্ত—ইউপাট।	হাপানি, আস', ইপি, কুপ্রম, টার্ট'এ,
বুক ফুঁড়ুনি—আকন, বেল, ব্রাই, মার্ক।	ড্রোস, নল্ল, সিনা।
বুকে রক্তসঞ্চয়—আলো, বেল।	গা-বমিবমি—অপি, আস'।
মাথাধরা—নল্ল, নেট্রম, বেল, ব্রাই,	
সল ফর, কাপস, কাফা, পলস, মার্ক।	

## ডিপথেরিয়া বা মুখ-গহ্বর ও নাসিকারক্রে কৃত্রিম ঝিল্লি।

গা শীত শীত, শাঝে মাঝে তাপ ও অস্থির দরুণ ঝেঁংঝেঁতে থাকিয়া এক হুই দিবস পরে গলা ব্যাধাযুক্ত ও গরম হয়। গিলিতে কষ্ট, গলায় বীচি আওরান, মুখমণ্ডল সরস হওয়া, চক্ষু দিয়া জল ঝরা, এবং আলজিহ্বা, তালু ও তল্লিহ্বিত গ্রন্থিতে লাল ফুট ফুট দাগ ; হুই এক দিবস মধ্যে উহারা চর্কির জ্বাঘ শাদা হইয়া এবং ক্রমে বাড়িয়া একলাঙ্গড়া হইয়া যায় ; ক্রমশঃ উহা নরম হইয়া উঠিয়া যায় বা খসিয়া পড়ে ; কিন্তু পুনরায় অপর একখানি ঐরূপ কৃত্রিম ঝিল্লি তথায় অবস্থান করে। কখন কখন নাসিকারক্রে ঐ রোগ দেখা দেয় এবং তথা হইতে জর্দা, রক্তবিশিষ্ট, হুর্গন্ধ ও (যথায় লাগে) ত্বক-ক্ষয়কারী রস নির্গত হয়। মুখ নাক হইতে বিস্তৃত হইয়া গলনালী আক্রমণ করিলে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে। তখন আর সহজে গিলিতে পারে না, দুই নাক দিয়া বাহির হয়। খাঁস-নালীতে নামিলে দমকা কাশি, নাকিস্বর, ক্রমে ভঙ্গ স্বর হয় ; অবশেষে গলা ধরিয়া যায়, এবং ক্রূপ (Croup) সদৃশ উপসর্গ দেখা দেয়। পাকাশয়ে ধরিলে গা' বমি বমি, বমন, উপর পুট ব্যাথা, কামড়ান ও ভেদ হইয়া থাকে।

এই রোগ কখন কখন সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে, এবং তৎকালে অনেকেই মারা যায়। আমলাদের বিষয় যে, আমাদের দেশে এ ব্যাধি অতি বিরল। প্রথম হইতেই ইহাতে বল ক্রম করে; জ্বর ও অপরাপর লক্ষণ ইহার সঙ্গে দেখা দেয়। ৭ হইতে ২১ দিন এই ব্যাধির স্থিতি। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসের বোল, অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে ঠাণ্ডা জল ও বরফ চুষিতে দেওয়া বিধি। গলার মসিনার প্লটস বা পূর্ব নিম্নে জলপটি দেওয়া যায়।

আকন—রোগ আরম্ভে, বিশেষ সবেলকায় শিশু পক্ষে। জ্বর, তালু মাকাল-লাল, গলা জ্বালা, ফুঁড়নি, ভর, উষ্মগ।

আঁপিস—ঝিলি ময়লা ধূসর বর্ণের, চক্ষুপার্শ্ব ফুলা, গিলিতে গেলে কাণে বাজা, ত্বকে চুলকনা-বিশিষ্ট স্ফোটক, বাহ সড়-সড়, অথঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাত ন্যায়, চক্ষের দুর্বলতা।

ত্রাই—কৃত্রিম ঝিলি—তালু ও Tonsil এ; ঠোঁঠ শুষ্ক ও ফাটা, অধিক মাত্রায় পান, নড়ায় যাতনা বৃদ্ধি, মল-শুষ্ক ও শক্ত। উঠিলেই গা-বমি-বমি।

বেল—কণ্ঠনালীর সঙ্কুচিত হওন বশতঃ আক্ষেপযুক্ত, কর্কশ, গভীর, খেঁকখেঁকে কাশি; নড়িলে চড়িলে কঁাদিলে বা ঘুম হইতে উঠিলে বৃদ্ধি, উর্দ্ধগ, চক্ষু লাল, আলোক-অসহিষ্ণুতা, ফুস্ফুসে ঘড়ঘড়ানি ইত্যাদি উপসর্গে। গলাব্যথা, গিলিতে কষ্ট, পুতুলীর বিস্তৃতি, ঝিমুনি, নিদ্রাহীনতা, ঘুমন্ত হঠাৎ চমকান, গিলিতে কষ্ট, মল শুষ্ক ও উজ্জল লাল হওয়া।

কাস্পিকম—গলনালীতে লঙ্কার রস লাগার ন্যায় চিড়চিড়নী ও মুখের গহ্বরে অধিক কৃত্রিম ঝিলি থাকিলে। গিলিতে লাগা, নাক দিয়া রক্ত পড়া। পীঠে শীত শীত, ( মলে Diphtheric deposit ), মাথা ঘোরা।

ব্রোমাইন—কণ্ঠনালীতে আরম্ভ হইয়া মুখের ভিতর দিকের গহ্বরে রোগ উপস্থিত হইলে বা মুখের অন্তর গহ্বর হইতে কণ্ঠনালীতে নামিয়া গলা-ঘড়ঘড়ানী দমআটকান ও ক্রূপের স্রাব কাশি হইলে। দম আটকান কাশি সহ স্বরভঙ্গ।

কেলী-বাইক্রম—গলা ও উপশ্বাস-নালীতে কৃত্রিম ঝিলি নামিয়া ক্রূপের স্রাব কাশি এবং চাপ, চাপ টানিলে বাড়ে, এক্রূপ গহ্বর অধিক পরিমাণে উঠিলে। বাম কাণে ব্যথা; কর্ণমূল ফুলা; হামের স্রাব স্ফোটক; জিহ্বা লাল চকচকে; মুখগহ্বরে ঘা; নাক হইতে দড়ির স্রাব সিক্রি, গলা ফুলা ও ছুইতে না দেওয়া;

নাক মুখ দিয়া হুর্গন্ধ শ্লেষ্মা পড়া । ঘূমের পর বৃদ্ধি, প্রস্রাবে লাল বালি, গরম পানি বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা সমতা ।

লাকেসিস—গল-নলীর বাম পার্শ্বে ঝিল্লি হইয়া তথায় অবস্থিত বা ক্রমে ডানদিকে বিস্তৃত হইলে বেল দিয়া পরবর্তী সন্ধাকালে উপকার না হইলে ।

লাইকপ—ডান পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া রোগ বাম দিকে বিস্তৃত হইলে অথবা সর্ব প্রথম নাসিকারন্ধ্রে দেখা দিয়া ক্রমে নীচে নামিয়া ব্যাধি গলা আক্রমণ করিলে । নাক বন্ধ, নিশ্বাস ত্যাগে নাকের পাতা প্রসারিত ।

লাচনানটিস—এই রোগের সঙ্গে গলা শক্ত হওয়া ও ব্যথা থাকা এবং এক দিকে গলা বাঁকিয়া থাকিলে । (Tonsils) তে শাদা ঘা ।

মিউরিয়াটিক আসিড—কৃত্রিম ঝিল্লির উপক্রমে শাদা শাদা দাগ হইতে আরম্ভ হইলে ৩ ক্রমের ১ ফোটা ফি ঘণ্টায় । প্রতিকার হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর, নতুবা অল্প ঔষধ ।

মার্ক—তালু ও তল্লিহু গ্রন্থির অত্যন্ত ফুলা ও তথায় ফুট ফুট শ্বেদা দাগ, গলা লাল হওয়া, সর্দি, অধিক ও হুর্গন্ধ লাল পড়া, গলায় বীচি আওরান । ২ ক্রমের শুঁড়া ঔষধ, ২ ঘণ্টা অন্তর, ১৮।১২ বারের প্রতিকার না হইলে আইওডাইড অথ মার্ক দিবা এবং তাহাতে পূর্ব্বে সেবনে ফল না দর্শিলে এবং রোগ নাক ও গলায় বিস্তৃত হইলে কালীবাইক্রম ।

নাইট্রিক আসিড—প্রস্রাব ঘোড়ার ছায় কটু-স্রাণ ; শ্বাস পচা গন্ধের, বেগে নাক বাওয়া । প্রথম ঔষধ দিয়া রোগের সমতা না হইয়া গলায় বীচি আওরান, ব্যথা ও ডগ্‌ডগে লাল হওয়া ; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে । মুখে ঘা ; নাক দিয়া হাজাকক ; পাতলা, প্রচুর, পূর্ববৎ শ্লেষ্মা ; কণ-বিলুপ্ত নাড়ী ; নাক দিয়া হুর্গন্ধ নিঃশ্বাস সহিত কদর্য্য ক্লেদ ঝরা ।

কালীক্লোরিকম—পূর্ব উপসর্গ বৃদ্ধি হইলে, নাড়ী ফুলা ও লাল হওয়া এবং কৃত্রিম ঝিল্লি কেবল মুখ গহ্বরে থাকিলে ।

আর্স—সুপথ্য করিয়াও অত্যন্ত বলক্ষয় হইতে থাকিলে । এক ফোটা বা অর্দ্ধ ফোটা, এক ঘণ্টা অন্তর । উপকার হইলে অধিককাল অন্তর । অস্থিরতা, ঠাণ্ডা জল কিন্তু অল্প অল্প পান বা গরম জল পানে সমতা ; দুপর রাত্রে উপসর্গ বৃদ্ধি । নাক দিয়া হুর্গন্ধ নিঃশ্বাস সহিত কদর্য্য ক্লেদ ঝরা ।

ফাইটোনকা—Fauces ( নলীদ্বার ) and Tonsils অভ্যন্ত প্রদাহিত ও ঘোরাল ঝিল্লি-বিশিষ্ট, শ্বাস দুর্গন্ধ, গিলিতে প্রায়ই অশক্ত, এমন অবস্থাপন্ন হইলে। পীঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ; অভ্যন্ত বলক্ষর।

কাছ—মুখ ও গলা জালা, নেতান, সর্বদা কোটা কোটা প্রস্রাব।

শ্বাস-নালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি উপস্থিত হইলে নিশ্বাস-কষ্ট ও স্বর-বিকৃতি হয়, তৎকালে আইওডিয়ম, ব্রোমিয়ম, কালীবাইক্রম ২ ক্রমের পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক করিয়া দেওয়া বিধি। প্রথমে আইওডাইন ১৫ মিনিট অন্তর ৪ বার ; পরে এক ঘণ্টা অন্তর এবং উপকার বুঝিলে দুই ঘণ্টা অন্তর। এক দিনে কোন ফল না দেখিলে, দ্বিতীয়টী পূর্বমত সেবন এবং তাহাতে প্রতিকার না হইলে, তৃতীয়টী ঐরূপ দিবা এবং ইহাতে কিছু না হইলে ও গলা ফুলা, নিশ্বাসের ও লালার কদর্য্য ভ্রাণ হইলে, মার্ক আইড পূর্বমত দিবা।

ভয়াবহ রোগে আইওডাইড অভ মার্ক ও কালীবাইক্রম, পরে কার্ক-আম, দিবা। অম্ম-কাষ্টিকম, শ্বাসমার্গে রোগ আক্রমণ বশতঃ নিশ্বাস কষ্ট হইলো বা মুখ ও গলা হইতে রক্ত চুইয়া পড়িয়া অভ্যন্ত বলক্ষর পক্ষে ও আর্স বা আইওডাইড অভ আর্স, অভ্যন্ত বলক্ষর, অতিরিক্ত গাল গলা ফুলা, পচা গন্ধ শ্বাস হইলে। কিন্তু এ অবস্থায় আরোগ্য হুক্ষর। রোগের প্রথম প্রথম ও নব্ব প্রকৃতির হইলে সুপথ্য এবং সর্ব প্রথম মিউরিয়্যাটিক আসিড, পরে মার্ক আইড ও কালীবাইক্রম প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে।

কৃত্রিম ঝিল্লির উপরে গ্লিসিরাইন (Glycerine) তুলি করিয়া দিবা। পর্দা উঠিয়া গেলে মিউরিয়্যাটিক আসিড ১ ক্রমের ঐ স্থানে লাগাইবা। ফেকুম-মিউরেটিক, কালীবাইক্রম, ইহারও ঐরূপে ব্যবহৃত হয়। খাটি সুরা (alcohol) লাগান বিধি। শিশুদের ছোট তুলি দিয় ভিতরে হইলে ২য় ওষধে ভাবরা (Boil diluted Alcohol and inhale the vapours for 10 or 12 m.) ঘর বিছানা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। রোগীকে শয়ন করাইয়া স্থির রাখিবা, অনেকের পঞ্চম দিবসে মুচ্ছা হইয়া থাকে।

ডাক্তার বেস কহেন এই রোগে কার্বোলিক আসিড ৫ ফোটা, ভিনিগর (সির্কা) ১৫ ফোটা দেড় ছটুক জলে ফেলিয়া ঐ জল কৃত্রিম ঝিল্লির উপর পুনঃ পুনঃ লাগাইলে, উহার পতন হয়। কাইটোলাকা অক্টাভা ভিজান বা সিঙ্

জলের কুল্লি বা উহার পুষ্টি করিয়া গলায় লাগাইলে ঝিল্লি থসিয়া পড়ে এবং তথায় আর নূতন ঝিল্লি হয় না । শেষোক্ত ঔষধ খাইলেও বিশেষ ফল লাভ হয় ।\* আহার—টাটকা, হৃদ্ব অথবা মাংসের ঝোল ।

### বক্ষ-আবরক প্রদাহ ।

#### PLEURISY.

বকোগ্রস্বরস্থিত যন্ত্র সমস্ত একটা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত আছে, উহার সম্মুখ-ভাগের প্রদাহ হইলে বুকের এক দিকে মাইয়ের নীচে ফুটুনের ভ্রায় ব্যথা এবং শ্বাস গ্রহণ কালে উহার আধিক্য বা বৃদ্ধি হয় ও রোগী সেই পার্শ্বে শয়নে অক্ষম । পশ্চাভাগের ঝিল্লির পীড়াতে পৃষ্ঠদণ্ড নাড়া পাইলে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যথা ঘাড় অবধি বিস্তৃত হওয়াতে গলাধঃকরণ কষ্টকর, ত্বক শুষ্ক ও গরম, নাড়ী দ্রুত হয় ও উৎকাশি জন্মে । কখন কখন এই রোগের সঙ্গে নিউম নিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস থাকে ।

সর্দি ও ফুসফুস প্রদাহ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয় ।

কখন কখন ঐ ঝিল্লি মধ্যে জল সঞ্চার হয় । তৎকালে শ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর হইতে থাকে । সুস্থ বৎসর অপ্রাদাহিক পার্শ্বে শয়নে রোগী অক্ষম, অথবা শুইলে দম আটকায়, পাশ ফিরিতে অতিশয় কষ্ট হয় এবং তৎকালে বুকে জল নড়া বিলক্ষণ টের পাওয়া যায় । প্রস্রাব দুর্গন্ধ এবং ধরিলে তলায় ঝাঁকরি পড়ে ।

নিতান্ত শিশুদিগের এ রোগ হইতে দেখা যায় না এবং বালকগণেরও অধিক হয় না ।

আকন—অর ও বুকের বেদনা পক্ষে । উৎকাশি, এগোড় ওগোড় করা, শ্বাস-থর্কতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ । ডান, পাশে শয়নে অক্ষমতা ।

ব্রাই—বুকে অত্যন্ত বেদনা, নড়িলে ও কাশিলে বৃদ্ধি । দ্বিত শাদা হওয়া ও পিপাসা ।

এই ঔষধদ্বয় কখন কখন পর পর তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়, কেবল ইহাদিগের ব্যবহারেই অনেক সময় নিরাময় হওন সম্ভব ।

\* বয়স বুঝিয়া ঔষ্ধ হইতে ২ ফোটা আদত আরক ২ । ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবা ।



সল্ফর—রোগ নিঃশেষ না হইলে বা ক্রমে না সারিলে বা পূৰ্ণ ঔষধে ফল না দর্শিলে, কিম্বা আবর্তন মধ্যে জল সঞ্চার হইতে থাকিলে, বাম দিকের নিম্ন হইতে উৰ্দ্ধ-পাখুরায় বেদনা উঠিয়া স্থায়ী হইলে, একটু নড়াতে বেদনার বৃদ্ধি হলে ওষ্ঠাধর উজ্জল লাল হইলে, ব্রাই ও রসের পর।

এই রোগ সম্বন্ধে অনিদ্রা ও ছটফটানি থাকিলে কাফি ও বেল পর পর দিবি; হাত পা ঠাণ্ডা গা গরম, বা এক পার্শ্বশোয়াতে বেদনা হেতু পুনঃ পুনঃ পাশফেরা এবং ইহার সঙ্গে অধিক উৎকাশি থাকিলে আর্গিকা দেওয়া যায়।

ডাক্তার তেস্ত এই রোগে প্রাতে স্পঞ্জিয়া এবং মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে লাকেসিস দিতে অহরোধ করেন। পথ্য জর কালের ভ্রায় লঘু এবং বেদনা স্থানে মসিনার পুন্টিস দেওয়ায় যন্ত্রণার লাঘব হওন সম্ভব।

কখন বক্ষঃস্থলের মাংসপেশীর বাত বশতঃ ঐরূপ বৃক ব্যথা হয়; নিম্নস্থ লক্ষণে রোগদ্বয়কে প্রভেদ করা যাইতে পারে। বক্ষঃস্থলের আবরক প্রদাহে শ্বাস গ্রহীণ কালীন; বাতে নিশ্বাস ত্যাগ বা প্রশ্বাস কালীন ব্যথা ঠেকে। প্রথম পীড়াতে পীড়িত স্থান স্পর্শ মাত্রেই, অপর পীড়াতে পীড়িত স্থান জোরে টিপিলে ব্যথা লাগে; শেষোক্ত রোগে প্রায় জর থাকে না। বাতের বৃক ব্যথার ঔষধ আর্গিকা ও পলস এবং ইহার সঙ্গে পৈত্তিকের জর থাকিলে ব্রাই ও রস।

## হৃৎপিণ্ড ও তদাবর্তন প্রদাহ।

(CARDITIS.)

প্রায়ই অল্প রোগের সঙ্গে এই রোগ দেখা যায়। স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিলে নিম্নস্থ উপসর্গ হয়। জ্বর, সর্বদা শীত, পরে এক লাগাড়ে গাত্র-তাপ এবং তৎকালে অনেক দূর ব্যাপিয়া বৃক ধড়ফড়ানি, নাড়ী প্রথম প্রথম মোটা, পরে সূক্ষ্ম, অতি দ্রুত ও অসমান, অথচ হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন বলবৎ, অদ্রুত ও ক্ষণ-বিলম্ব, ছটফটানি, নিশ্বাস কষ্ট, পাশ ফিরিলে হৃৎপ্রদেশ হইতে বাম হৃদয় ও বাহু পর্য্যন্ত জ্বালা ও ফুটনি, কখন বা কেবল বৃক ও পেটে ঐরূপ যন্ত্রণা, হৃৎপ্রদেশ ফুলা ও তথায় জল সঞ্চার, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ সরস ও ওষ্ঠ ত্রীহীন, নাসিকা ও গওদেশ ঈষৎ নীল, প্রশ্বাস কালীন নাকের পাতা ফোলা, অন্ত্যস্ত পিপাসা, কিন্তু যন্ত্রণা হেতু অধিক পানে অক্ষম, প্রস্রাব অল্প ও ঘোরাল

এবং সর্বশেষে পায়ের পাতা ফুলা ; বসিলে বা নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ক্ষণিক সমতা, কিন্তু নড়া, মাইটানা বা আহাৰ করাতে কষ্ট বৃদ্ধি, খিল খিল করিয়া হাসা, মুচ্ছা এবং সর্বশেষে অচৈতন্য অবস্থায় দড়কা হইয়া প্রাণত্যাগ । হুং-পিণ্ড ও তদুপরি আবর্তনের পূর্বোক্ত উপসর্গ হয়, কিন্তু ইহার অন্তরস্থ ঝিল্লির ঐ রোগ হইলে, হুংপ্রদেশে তীব্র বেদনা হয় না, বুক কাঁপিতে থাকে, অধিক তাপ বা পিপাসার অভাব, অনিদ্রা, ছটকটানি, শ্বাস প্রাণাসে নাক ডাকা, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, শরনাবস্থায় দম আটকান, উঠিয়া বসিলে কিঞ্চিৎ সমতা, পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট হয় ।

হিম, আঘাত লাগা, তয়াদি মনের সমতা-নাশক কারণ এবং হুম বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্ম-ফোটক-রোগ হঠাৎ অন্তর্ধান হইয়া এই রোগ জন্মিতে দেখা যায় ; বহু পরীক্ষা করিয়া রোগ-বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হয় এবং হুংপিণ্ডের উহা করিতে সক্ষম । উপসর্গ সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলেই ফল দর্শায়, এই বিশ্বাসে কঠিন ভয়াবহ উৎকট রোগ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে । বিষয়াদিগের সহসা ঐ সকল ব্যাধির চিকিৎসা করা উচিত নহে ; কিন্তু উত্তম চিকিৎসক নিকটে না থাকিলে যত্নে সীহিত লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে, অনেক সময় কৃতকার্য হওন সম্ভব । বাত, প্লুরাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাধি অবস্থান করে ।

আকন, বেল, ত্রাই, তরুণ ব্যাধি পক্ষে ।

আকন—ডান পাশে শুইতে অশক্ত । হুংপিণ্ডপ্রদেশে ফুঁড়ুনি ; নাড়ী বল-বতী, মোটা ও বেগবতী বা ক্ষুদ্র ও দ্রুত ; বুক ধড়কড়ানি ও অতিশয় ষাৎনা, রোগীকে নাড়িলে মুচ্ছা, দুর্বলতা, কিছু মাত্র শ্রমে শ্বাসাবরোধ, শরনে নিশ্বাস-কষ্ট, উঠিয়া বসার সময় কতক সমতা, অত্যন্ত গাত্র-তাপ ও পিপাসা । ইহার সঙ্গে বাত অর্থাৎ গাঁইট ফুলিলে, লাল হইলে ও ব্যথা থাকিলে ; বিশেষতঃ হিম লাগা বশতঃ রোগে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বেল—প্রবল জ্বর, অত্যন্ত গাত্র দাহ, ঘন ঘন শ্বাস, অত্যন্ত বুক ধড়-কড়ানি (যেন ইহা ফাটিয়া পড়িবে বোধ) এবং তজ্জন্ম কম্পজ্বর ; গলা ও রগের শিরা উঠা ও দপদপানি, পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা ও তাহার সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, কাট-নেকার ও হুংপ্রদেশে ফোঁড়ার স্থায় বেদনা । এতদ্ব্যতীত মস্তিষ্ক উত্তেজনার

লক্ষণ—প্রলাপ, খট্‌ম'টে দৃষ্টি, চক্ষুর গোলক ঘোরা, দড়কা, অসাড়ে বাহে, ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে । হিম লাগা, স্ফোটক, চর্ম-রোগ অন্তর্হিত হওয়া বা বাত জন্ত রোগে ইহা বিধি । ঔষধ প্রয়োগ নিমিত্ত পূর্বোন্নিখিত সমস্ত উপসর্গ থাকা আবশ্যক করে না, বেগের এক বা দুইটা প্রধান লক্ষণ থাকিলেই ইহা ব্যবহার করিবা । হৃৎপিণ্ডের উপর ও অন্তরাবর্তন, উভয় পীড়ায় ইহা প্রয়োগে উপকার সম্ভব ।

তাই—অন্ন অপ্রবল, প্রাতে অন্ন অন্ন ঘর্ম হইয়া স্বপ্ন বিরাম হয় ও তৎ-সময়ে কিঞ্চিৎকাল স্ননিদ্রা ঘটে ; রাত্রে অধিক শ্বাস-কষ্ট, বিশেষতঃ নড়িলে বা শুইয়া থাকিলে । বৃকে থেকে থেকে ফোঁড়ার ছায় ব্যথা এবং নড়ায় বৃদ্ধি ; ইহার সঙ্গে বাতের লক্ষণ থাকিলে ইহা আরও বিশেষ খাটে । বহুকালের রোগে হৃৎপিণ্ডের উপরাবর্তন প্রদাহে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ফুঁড়ুনি, নড়িতে ও শ্বাস কেনিতে কষ্ট ; স্থির থাকিতে চাওয়া ।

লারোসিবেসস—অত্যন্ত শীত ও অত্যন্ত তাপ, হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের অসমতা, ফুসফুসের হ্রস্বলতা বলতঃ নিশ্বাস কষ্ট এবং ঐ যন্ত্র নিঃশক্তি হইয়া শ্বাস কার্যের অবরোধের আশঙ্কা থাকিলে ।

আর্গিকা—পুরাতন রোগে এবং পতনে ও নড়া ধরিয়া টানাতে বক্ষের অস্থি ও উপস্থি স্থানভ্রষ্ট হওন জন্ত পীড়ায় ।

কানাবিস—বৃক ধড়ফড়ানি হেতু শরীর কাঁপুনি ও রোগীর উৎকর্ষা ; অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃকের স্পন্দন শুনা যায় ; অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং ফোটা কতক শাদা ঘোলাটে মূত্র ত্যাগ ।

কল্‌চিকম—বাত জন্ত হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবর্তন প্রদাহ । কষ্টকর, অসমান, ঘন ঘন শ্বাস, প্রবল হৃৎস্পন্দন, বৃকে ফুটুনির ছায় ব্যথায় শিশুর চমকে উঠা বা কান্না, ইহার সঙ্গে সমস্ত অঙ্গের গাঁইটের, কখন একটা কখন বা অপরটার, ফুলা, লাল হওয়া, ছুঁইলে ব্যথা এবং উহাদিগকে গরম রাখিলে কতক সুস্থতা ; অন্ন, পিপাসা, বিশেষতঃ রাত্রে ; ঘর্ম এককালে অভাব অথবা প্রাতে হ্রগন্ধ ঘর্ম এবং তাহাতে জরের লাঘব না হওয়া । প্রস্রাব ঘোরাল ও অন্ন মাত্রায় । ইহা ও আকন পর পরে দেওয়ায় অধিক উপকার সম্ভব ;

আর্স—হৃৎপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার বা উহার প্রদাহে ব্যবহৃত হয় ।

হাম ও ( Scarlet ) জরের পর, অস্থিরতা, রাত্রে বাড়া, কোনপ্রকারে শান্তি নাই । হাতের অসাড়তা, অঙ্গুলি ঝিম ঝিম করা, ঠাণ্ডা ঘাম ।

স্পাইজিলা—পাণ্টে পাণ্টে রোঁগে পড়া অথবা পুরাতন রোগ পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী ; তরুণ প্রদাহে হৃৎপিণ্ডের ও নাভির স্পন্দন অসমান, হৃৎপিণ্ডে ফুটুনি, হাত দিলে ব্যথা, সমস্ত শরীর বা পেট টাটান, কখন শীত, কখন তাপ এবং সন্ধ্যায় উপসর্গ বৃদ্ধি । একটুকু নড়ায় বুকে ফুঁড়ুনি । আকন দিয়াও জরের প্রতিকার না হইলে ।

পুরাতন হৃৎপিণ্ডের রোগে সল্ফর ও সেপিয়া, এইরূপ এক পক্ষ অন্তর পর পর কিছুকাল দেওয়া বিধি । নূতন রোগে প্রয়োজন বিশেষে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয় । জরের অবস্থায় সাণ্ড প্রভৃতি লঘু ও হর্কলাবস্থায় অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য দিবা ।

ভেরাট—শয়নে কষ্টের লাঘব, উঠিলে বা নড়িলে বুক ধড়ফড়ানির বৃদ্ধি, কিন্তু অপর অপর উপসর্গ আর্স সদৃশ ।

অবস্থা বুঝিয়া ১ হইতে ২৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে । ৩৪ মাত্রায় ফল না দর্শিলে, লক্ষণাভুযায়িক অপর ঔষধ ব্যবহার বিধি । ঔষধ ব্যবহার কালীন রোগীকে স্থির রাখা নিতান্ত আবশ্যক, পা শুষ্ক ও গরম রাখিবা এবং কোনমতে জলে ভিজিতে দিবা না । সন্ধ্যায় আধপেট আহার এবং যত পারে জল পান করিতে দেওয়া বিধি ।

## উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ ।

( BRONCHITIS. )

অন্ন-নালীর উপরি ভাগে শ্বাসনালী অবস্থান করে । গলা হইতে থানিক দূর নীচে নামিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হয় এবং উহার খণ্ডদ্বয়ে দুইটি ফুসফুস সংলগ্ন থাকে । পূর্কোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বয়কে ( Bronchia ) উপশ্বাস-নালী কহে ।

দস্ত উঠা বা কৃমি প্রভৃতি রোগের ফল স্বরূপ কখন কখন উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ হয় ।

দস্ত উঠা জনিত রোগে ক্রিয়োসটম এবং কৃমি হেতু রোগে ইনাম বা

ভাওলা ও ডেরেটা ব্যবহারে ফল দর্শে। ডেজা, হিম নাগা বশতঃ শিশুদিগের এই রোগ স্বতন্ত্র রূপে হইতে দেখা যায়।

সর্ব প্রথম সর্দি, উৎকাশি—স্তন পান করিলে, ঢেকুর তুলিলে বা কাঁদিলে কাশি উপস্থিত হয়। নিশ্বাস ঘন ঘন (এক মিনিটে ৬০ হইতে ৯০ বার) ও কষ্টকর; এবং তজ্জন্ম হই স্বক ও নাকের পাতা অনবরত নড়ে ও পেট কিঞ্চিৎ ফুলে, শ্বাস গ্রহণে হিস হিস শব্দ হয়। পঞ্জর প্রদেশে অন্ন চাপিলে কাশি এবং নিদ্রাকালীন কখন কখন শ্বাসাবরোধ, অন্ন অন্ন জর, হৃৎ শুক ও গরম, বিশেষ মস্তক ও হাতের চেটয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ থাকে; পীঠে কাণ্ডপাতিয়া শুনিলে শ্লেষ্মা-ঘড়ঘড়ানির ও সাঁই সাঁই শব্দ শুনা যায়, মাঝে মাঝে ঐ শব্দ থাকে না, আবার পুনর্বার হয়।

রোগের অবলাবস্থায় কাটকাটা জর; নাড়ী প্রথম মোটা, পরে কঠিন ও ক্ষুদ্র, অতিশয় দ্রুত (এক মিনিট মধ্যে ১৫০ হইতে ১৮০ বা তদধিক কিষা অগণনীয় স্পন্দন), অনিবার্য পিপাসা, অক্ষুধা, প্রস্রাব অত্যন্ন, লাল ও ঘোলা, মুখ মণ্ডল এককালে পান্নাশ বর্ণ, কিন্তু কাশির পর ক্ষণিক আয়ত্ব। নিয়ত অস্থিরতা, সর্বদা নিঃশ্বাসে বেড়ানর ইচ্ছা, মুখে মুষ্টিপোরা, সর্বদা হাত পা নাড়া ও অধিক শ্বাস গ্রহণাশয়ে মাথা পেছন দিকে, কৈলা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। রোগ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, নিত্যন্ত শিশু সকলের হরিদ্রা বর্ণ, কিঞ্চিৎ বড়দিগের কৃষ্ণ বা নীল এবং অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পান্নাশ বর্ণ ও স্বক্ ঠাণ্ডা হয়। কাশি কমে, উহার কৈনিকনে স্বর থাকে না এবং সর্বশেষে থেকে থেকে শ্লেষ্মা বমন হইতে থাকে।

সাংঘাতিক হইলে জিহ্বায় শুষ্ক পাটুকিলে ছাতা, দস্ত কিড়িমিড়ি, ঘড়-ঘড়ানি শ্বাস, বলক্ষয়, নাড়ীর ক্ষণ-বিলুপ্তি, গাত্র ক্রমশঃ অধিক ঠাণ্ডা ও কোঁকশে হইতে থাকা, কপাল বুক ও হাত পায়ঃ ঠাণ্ডা ঘর্ম এবং ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মৃত্যু। কখন কখন শেষাবস্থায় দড়কা হয় এবং শিশু অঘোর থাকে। রোগের প্রথমে কেবল মাত্র উৎকাশি হয় বা উহার সঙ্গে অত্যন্ন মাত্র গষার উঠে; বৃদ্ধির অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেষ্মা কখন কখন রক্ত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। কখন কখন আপনা হইতে (এমন কি ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত) কাশি, শ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গের শিথিলতা হইয়া যুগ-তৃষাণং

আশা বর্জন করে, কিন্তু ঘণ্টা কতক পরেই পূর্বমত রোগ দেখা দেয় । বিশেষ, প্রশ্বাস ক্রমশঃ কম ও স্বাভাবিক না হইলে, নির্ভয় হওয়া যায় না । কখন কখন বৃকে সর্দি বসিয়া গলা বড়বড়ানি হয় ও বৃক সাঁই সাঁই করে এবং দূর হইতে উহা শুনা যায় । ইহা হইতে কখন কখন দম-আটকান ও নীল-রোগ (Cyanosis) হইয়া থাকে । এ অবস্থায় প্রায় কাশি থাকে না, গয়ারও উঠে না ।

জরের অবস্থায় সাণ্ড, অ্যারাকুট, গঁদের জল, নিতাস্ত ছন্ধ-পোষাকে ছধ জল, পরে অবস্থা বুঝিয়া পথ্য । নিরাময় হইলেও, কিছু দিন পর্য্যন্ত হিম, ঠাণ্ডা, জলীয় বাতাস না লাগে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা ।

বৃকে ও পীঠে গরম পুন্টিস, ফোমেন্ট বা উষ্ণ সেক, বৃকে তৈল ও টার্পিন মালিস, গরু জলের বাষ্প আঘ্রাণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে (দম আটকান) বা শ্বাস কষ্টের লাঘব হওন সম্ভব ।

এই রোগে আকন, ব্রাই, ফস ব্যবহারে অনেক সময় কৃতকার্য হওয়া যায়, আবশ্যক মতে অপর ভৈষজ্যগুলিও উপকারী । অবস্থা বুঝিয়া ঔষ্ধ হইতে তিন, চারি বা অধিক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি ।

আকন—রোগের প্রদাহিক অবস্থা, খুব জ্বর, বৃক ও গলা শুড়শুড়নি হইয়া ঘনঘন খুকখুকে উৎকাশি, বৃক সাঁই সাঁই, শ্বাস অবরোধ, স্বরভঙ্গ, মাথাধরা, তৃষ্ণা এবং কখন অত্যন্ত মাত্রায় চটচটে গয়ার উঠা । ঠাণ্ডা পূবে বাতাস লাগা জ্বর রোগ । ইহা দিয়া ও গাত্রতাপ না কমিলে ও চেষ্টায় গয়ার না উঠিলে হিপর ।

আপিস—বৃক খ্যাথলান ; কাশি, বিশেষ শয়নে ও নিদ্রায়, (লাকাসি), গলার মধ্যে দড়ির স্তায় আঁটাল গয়ার এবং উহা পুনঃ পুনঃ হাক করে তুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হওয়া কালী-বা ।

আরম-টি—সবল কাশি, কিন্তু সক্ষিত গয়ার তুলিতে অশক্ত । গলা-ব্যথা, স্বরভঙ্গ, পাতলা স্লেয়া ঝরিয়া নাসিকা বন্ধ ও ঠোঁঠ জ্বালা ।

আর্শিকা—খুকখুকে উৎকাশি, বিশেষ প্রাতে । শিশুর অনেক কাঁদার পর কাশি, বৃক ও পেট খ্যাথলান সহ শ্বাস-থর্কতা । স্লেয়া ও জমাট রক্ত উঠা ।

আর্স—থকথকে উৎকাশি সহ বৃক ব্যথা অথবা সরস কাশি এবং কষ্টে রক্ত মাধান গয়ার তোলা । শ্বাস কষ্টে জ্বর বসিতে বাধ্য (আপিস), সন্ধ্যা বা

রাত্রে ঠাণ্ডা পান বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় দম আটকান কাশি । অথবা নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, ক্লীণ, অসম, কণ-নুষ্ঠ, স্বক্ শীতল, এককালে নির্বীৰ্য্য, এরূপ সঙ্কটাবস্থায় ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইয়া চালা করিলে বা টার্ট-আ অপর অপর ভৈষজ্য দিবা ।

আস্কেলিয়াস-টি—অতিরিক্ত পরিমাণে শাদা শ্লেষ্মা উঠা, হৃৎপ্রদেশে কাঁটা ফুটুনি হাপানির ভ্রায় কষ্টকর অবরোধিত শ্বাস ।

ইউপাট—কর্কশ কাশি ও বুক ব্যথা, হাত দে বুক চাপা, দুই হাত দিয়া মাথা চেপে ধরিতে বাধ্য হওয়া ।

ইউফ্র—উৎকাশি সহ চক্ষু দে জল ঝরা । কেবল দিবসে কাশি ও কষ্টে গয়ার তোলা বা কেবল মাত্র প্রাতে ; এবং প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা ও নৈশ-শ্বাস ।

ইমে—সন্ধ্যায় নিয়ত শ্বাসক্বেদে কাশি । গলকের ধূম-লাগায় কাশির ভ্রায় ।

ইপি—ঘন ঘন কষ্টকর নিঃশ্বাস, অবিশ্রান্ত কাশি, চক্ষু বদন আরক্তিম, শ্বাসনালা শ্লেষ্মা পূর্ণ, কিন্তু উঠে না ও শ্বাসরোধ ; প্রতি ফেপ কাশির পর কপাল ঘামা, অধিক গা-বমি বমি ও শ্লেষ্মা বমন ।

কাউস—দিন রাত শ্লেষ্মা ঘড় ঘড়, আক্ষেপযুক্ত কাশি ও অল্প শ্রমে শ্বাস-কষ্ট ; সন্দির কাশি সহ অধিক মাত্রায় চটচটে গয়ার উঠা, রাত্রে শয়নে দম-আটকান ।

কাম্প—স্বরভঙ্গ, উৎকাশি, সন্ধ্যা ও রাত্রে বৃদ্ধি । বুক দন্দপানি, মাথা-ধরা, গা-বমি বমি ।

কামো—পুনঃ পুনঃ কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি, ঘুমন্ত কাশি, গলা সাঁই সাঁই, পিপাসা, উদরাময় । শিশু পক্ষে আকনের পর বিশেষ খাটে, বড় খিট্‌খিটে, অধৈর্য্য ও নিরে বেড়ানয় ইচ্ছুক ।

কার্বো—স্বরভঙ্গ এবং কাশি, সন্ধ্যায় । অর, আক্ষেপযুক্ত কাশি, সন্ধ্যাতে শ্লেষ্মা বা জর্দা পুষ তোলা—বুক শেঁটে থাকা, শ্বাস ধ্বংসতা, বুকের মধ্যে জলন্ত অগ্নির ভ্রায় জ্বালা জন্ত সর্বদা পাখার বাতাস করিতে বলা, কাশি সহ বমন । বুক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ব্যথা ।

প্রাচীনের শীত পড়িলেই কাশি ও প্রত্যাষে অধিক চটচটে সবুজ বা জর্দাটে-শাদা ও ঘন পুষ ও শ্লেষ্মা উঠে, কখন বা উহাতে রক্তের দাগ থাকে ।

ঐ সঙ্গে শ্বাস কষ্ট ও অল্প শ্রমে নাড়ীর দ্রুত গতি হওয়া, এ সমস্ত উপশ্বাস-নালীর পুরাতন রোগে দেখা যায় ।

তরুণ রোগে—অল্প নিমিত্ত—আকন ।

থুকথুকে উৎকাশি নিমিত্ত—আকন, ব্রাই ।

শ্বাস ধ্বংসতা ও দম আটকান—আস, ইপি, টার্ট এ, ফস ।

গলা সাঁই সাঁই—ইপি, টার্ট-এ, পল্‌স, ফস, ব্রাই, স্পঞ্জ ।

প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা—পল্‌স, হিপার ।

অত্যন্ত চটচটে,—কালী-বাই, লাকাসি, স্পঞ্জ ।

অতিশয় বলক্ষয়—আস ।

নয়—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট ; বুক শেঁটে ধরা, বিশেষতঃ বাতে স্বরভঙ্গ, উৎকাশি, রাঁত্রি বা প্রাতে বৃদ্ধি এবং উপর পেটে বা পাজরায় ফোড়ার শ্বাস ব্যথা । অথবা বুকচাপা কাশি, অতি কষ্টে আটাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা উঠা, তৃষ্ণা, কঠিন কোষ্ঠ ও আহারান্তে যন্ত্রণার আধিক্য । অল্প, কিন্তু একটু নড়ায় শীত ।

পল্‌স—ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস, বুক গরম, গলা ঘড়ঘড়ানি, স্বরভঙ্গ, কম্পকারী কাশি, সন্ধ্যা বা প্রাতে ও পাশ ফিরিয়া শয়নে বৃদ্ধি । অধিক পরিমাণে জর্দাটে কখন কখন রক্ত মিশ্রিত গরার উঠা, সর্দি হেতু নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন ; গা গরম, পিপাসা অভাব । রাত্রে উৎকাশি, উঠিয়া বসায় সমতা ।

ফস—আকন বা বেল ব্যবহারে অল্পের ও প্রদাহের তচ্ছন্ন পড়িয়াছে, কিন্তু বুক গরম, নিশ্বাস কষ্ট, বুক ভার, গলা সড়সড় করিতেছে ; উৎকাশি, হাসা বা বকায় বৃদ্ধি এবং পরে লোম্বা ও দড়ির শ্বাস শ্লেষ্মা উঠা । অথবা ফুসফুস প্রদাহ সম্বলিত হইয়া রোগ-শঙ্কর হইলে । স্বরলুপ্ত, কঠিনালীতে ব্যথা জন্ম কথা কহিতে অশক্ত ।

ফস-আ—সন্ধ্যায় উৎকাশি ও প্রাতে জর্দা গরার উঠা । কাশি কালীন মাথা ধরা, গা বমি বমি, অল্প বমন, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব । পুষ্যৎ কদর্য গরার ।

বার্পিসা—কাশি ও কষ্টে গরার তুলা বা প্রচুর ও কদর্য ঘ্রাণের নিষ্ঠীবন উঠা এবং রাত্রে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট ও বুক সঙ্কোচন ও চাপুনি বোধ ।

বারাইটা—বুকে চাপুনি, পূর্ণতা ও ভারবোধ এবং শ্বাস-ধ্বংসতা ও শ্বাসকষ্ট,



স্বরভঙ্গ বা এককালে অবরোধ এবং ঘড়ঘড়ে শব্দ-বিশিষ্ট স্বর বা উৎকাশি।  
প্রাচীনের রোগে অধিক ব্যবহার্য।

বেল—কফাংশ ধাতুবিশিষ্ট বা সবলকার শিশুর পক্ষে এবং এই রোগের  
সঙ্গে ফুসফুস-প্রদাহ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা বিধি। আকন দিয়াও অর,  
গাত্র-তাপ ও নিশ্বাস-কষ্টের লাঘব হয় না, পুনঃ পুনঃ আক্ষেপযুক্ত, বলক্ষয়-  
কারী কাশি, বিশেষ রাত্রে ও তৎসঙ্গে গ্যাঙানি, কাশির পরই হাঁচি, গলা  
ঘড়ঘড়ানি, গলা ব্যথা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, এমন-কি, যেন মাথা ফেটে পড়া  
ও কাশিলে উহার বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল আরক্ত। প্রতি ক্ষেপ কাশিবার  
পর শিশুর কান্না। নিদ্রাকালীন চম্‌কান, লাফান।

তাই—শ্বাস ধ্বংসতা ও কষ্ট নিমিত্ত উঠিয়া বসিতে বাধ্য (আস), উৎকাশি,  
শ্বাসনালী জ্বালা, বুক ফুঁড়ুনি। প্রত্যবে প্রচণ্ড কাশি ও খানিকটা গয়ার  
উঠা, কখন ঐ সঙ্গে রক্তের ছিট থাকা, তৎকালে মাথা ফেটে পড়া বোধ—  
স্থির থাকার ইচ্ছা। ইহার সঙ্গে বক্ষ-আবরক প্রদাহের লক্ষণ, বুক-ফুঁড়ুনি  
থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ খাটে।

কাক্স—গলা সড়গড়ানি ও উৎকাশি, বিশেষ সন্ধ্যা ও রাত্রে বা ভোরে।  
কাশি ও জর্জর শ্লেষ্মা তোলা, বুক শেঁটে ধরা ও শ্বাস-কষ্ট; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা  
ও আর্দ্র।

কালী-কা—কাশিসহ শ্বাস-কষ্ট, রাত্রি ৩টায় বৃদ্ধি।

কালী-বাই—শ্বাস ও উপশ্বাস-নালী জ্বালা, কাশি ও দড়ির ভায় গয়ার  
উঠা এবং ঐ কাশিতে পায়ের পাতা অবধি টান পড়া। (ফস)

কাষ্টিক—অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক কাশি, বিশেষ রাত্রে; স্বররোধ, বিশেষ  
প্রাতে। গলা ব্যথা ও নিয়ত সড়সড়নি জন্ত থকথকে কাশি। কাশি-  
কালীন পাছায় বেদনা ও অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব (পলস)।

কুপ্রম—অত্যন্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি, শরীর কাঠবৎ হওয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ ও  
অচৈতন্য। কাশি অস্ত্রে বর্ষন, শ্লেষ্মা ঘড়ঘড়ানি ও নিশ্বাস সাঁই সাঁই শব্দময়।

চিন—রোগাবসানে দুর্বলতা দূরীকৃত করণোদ্দেশে কিছু দিন ইহা দেওয়া  
বিধি। কাশি, কষ্টে গয়ার তুলা, কখন রক্ত-মিশ্রিত; কাঁধ ব্যথা, বুক  
ফুঁড়ুনি; কাশি ও গলা ঘড়ঘড়নি।

ভেল্লস—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, বিশেষ শ্বাস-প্রধান ধাতু পক্ষে ।

টার্ট-এ—অধিক শ্লেষ্মা বশতঃ অত্যন্ত বৃক ঘড়ঘড়ানি, শ্বাস-কষ্ট ও দম-আটকান প্রায় হইলে । দুর্বলতা বা অপর কারণে হঠাৎ কাশি বন্ধ । গলার পালক বা অঙ্গুলি দিয়া শ্লেষ্মাটা তুলিয়া ফেলিলে আশু প্রতিকার হয় । প্রদাহ ক্রম ক্রম অবধি বিস্তার হইলে ইহাতে বিশেষ কল লাভ হয় । টপির পর ভাল খাটে ।

ট্রিলিয়ম—দুর্বল ও প্রাচীরের বলক্ষয়কারী কাশি ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা ।

ডক্কা—সর্দির পর সরল কাশি, স্বরভঙ্গ, রক্তবিশিষ্ট গয়ার উঠা বা পাড় শ্বাস-গ্রহণে হৃৎপিংয়ের ভ্রায় কাশি ।

ড্রোস—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি, বিশেষ সন্ধ্যা বা রাত্রে । সরল কাশি, জর্দী শ্লেষ্মা উঠা, স্বরভঙ্গ, কাশিকালীন বৃক ব্যথা জন্ত হাত দিয়া সেস্থান চাপিতে বাধ্য হওয়া । গা বমি বমি, অন্ন বমন, পরে শ্লেষ্মা উঠা ।

ভেষাট—আক্ষেপযুক্ত দম আটকান কাশি জন্ত বদন নীল বর্ণ হওয়া, শিশুর নেতিয়া পড়া ও কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, গয়ার বমন ও অসামান্য প্রস্রাব । ঠাণ্ডা হইতে গরম ঘরে প্রবেশ বা শীতল জল পানে বর্ধি । কণ্ঠনলী হুড় হুড় করা ও বৃকের অভ্যন্তর হইতে কাশি ও ঘড়ঘড়ানি ; কিন্তু কিছুই উঠে না, শ্বাস কষ্ট, পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদন, ভেদ, বমন ।

মার্ক—বৃক শুষ্ক, ক্লিষ্টকর কাশি, ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস ও উচ্চতর শ্বাস, নাক ফুলা, স্বরভঙ্গ । পলা ঘড়ঘড় করিয়া কাশি, রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠা, বৃক মাথা ফেটে পড়া, নাক দিয়া জল বরা ও রক্তপাত, উদরাময়—ডান দিকে শয়নে কাশি বৃদ্ধি (বামে—ফস) অধিক ঘাম হইয়া ও বাতনার সমতা না হওয়া । ইহা সেবনের পর রাত্রে ঘাম হইতে থাকিলে ডক্কা দিবা ।

রস—বৃক ব্যথা—( Sternum ) বক্ষ-অস্থির নীচে সড়সড়ানি হইয়া কাশি, সন্ধে অস্থিরতা, হাসা বা চোঁচানয় বৃদ্ধি । বাতের ব্যথা, নড়াচড়ায় সস্তি । জলো হাওয়াতে ও ছই প্রহর রাত্রে পর যাতনাধিক্য ।

ক্রমেন্স—পুনঃ পুনঃ একলাগাড়ে দীর্ঘস্থায়ী কাশি ; কথা কহা, গাঢ় শ্বাস বা ঠাণ্ডা বাতাসের শ্বাস গ্রহণে অথবা শ্বাসনলী চাপায় কাশির বৃদ্ধি । সন্ধ্যায় ও শয়নে বাতাস লাগায় কাশি । শ্বাস ও উপশ্বাস নলী ব্যথা ।

লাইক—রাত্রি কাশি বৃদ্ধি ও তৎকালে পিপাসা, বুক ভার, জর্দাটে লোস্তা গয়ার উঠা, নাকের পাতা চোপসাইলে ও বিস্ফারিত হইলে ।

লাকাসি—বুক ভার, ঘন ঘন শ্বাস, ক্রিষ্টকর উৎকাশি, অনেক চেষ্টায় অত্যন্ত আটা-বিশিষ্ট বা গাঁজলাটে এবং কখন কখন রক্ত মিশ্রিত গয়ার তোলা, স্বরভঙ্গ । গলা ও কণ্ঠনলী স্পর্শে ব্যথা এবং উহা চাপায় প্রচণ্ড কাশি । পুরাতন রোগ, থেকে থেকে কাশি এবং মাথা, গলা, চক্ষু, কাণ ব্যথা, নিদ্রা ও আহ্বারের পর বৃদ্ধি । শয়ন করিলেই ও ঘুমন্ত কাশি, যথোচিত বায়ু অভাব জন্ত হাঁপানি, গলা যেন শ্লেষ্মা পূর্ণ কিন্তু বহু চেষ্টাতেও না উঠা, স্বরভঙ্গ ( কখন কখন দীর্ঘ হায়ী ), নাক দিয়া জল ঝরা ।

লাকুটা—অতিরিক্ত আক্ষেপযুক্ত কাশি ও পরক্ষণে বমন । তাপ না হইয়া তৎপরিবর্তে কাশি ।

লোবেলা—ক্রব কাশি সহ শ্বাস কষ্ট, গলা মধ্যে 'আটাল গয়ার জন্ত সদা হাক হাক করিয়া তুলিবার চেষ্টা ; অধিক থুথু উঠা ।

ষ্টিক্ট-প—রাত্রি অনবরত কাশি জন্ত নিদ্রা না হওয়া ও শয়নে অক্ষমতা, দিবা ভাগে 'ভাল ধাকা । থকথকে উৎকাশি, যেন ফুসফুসে একটা চাপ সংগৃহীত রহিয়াছে বোধ হওয়া ।

ষ্টানম—প্রচুর সম্ভাটে মিষ্ট তারের গয়ার উঠা ও তৎপরে বুক ব্যথা বা ফুঁড়নি । সেপির পর খাটে ।

ষ্টাকিস—কাশি সহ চটচটে জর্দাটে প্লুয় বা রক্ত বিশিষ্ট গয়ার উঠা, বিশেষ রাত্রি । বুক ঘা থাকার স্থায় ব্যথা ।

সলফর—গলা-ভাঙ্গা, স্বর-রোধ, কণ্ঠনলীর সড়সড়ানি, সর্দাদা বুক ঘড়ঘড়ানি ও তথায় ফুঁড়নি ও উহা পাঠ অবধি নিস্তৃত হওয়া, বাম দিকে বেদনা । কাশি ও অধিক গাঢ় শাদা গয়ার উঠা । পুরাতন রোগ ও কখন কখন হৃৎকম্প এবং কাশি কালীন মাথা ও বুক ব্যথা । ব্যাধির কিছু কক্ষর থাকিলে ইহা দিয়া এককালে নিরানয় কর । চর্মরোগ অন্তর্ধান জন্ত পীড়া ।

সাবিড—কাশি সহ বমন বা রক্ত উঠা, বিশেষ শয়ন কালে—সন্ধ্যা রাত্রি এবং ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি ।

সালুই—গলা শুষ্ক ও কণ্ঠনলী ফুলা বোধ, অতিরিক্ত কাশি, গাল

আরক্তিম, বুকে ব্যথা । সর্দি ঝরা ও পাতলা বাহে । হাত ও পায়ের পাতায় জ্বালা ।

সিনা—শিশুর কৃমি জন্ম আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি—সন্ধ্যায় । বদন মলিন, ইঠাৎ চমকান, দম আটকান, খাবি থাওয়া, নাক খোঁটা এবং প্রস্রাব ধরিলে দুগ্ধবৎ শাদা হওয়া ।

সিলিসা—কুব কাশি, প্রচুর, স্বচ্ছ বা পূয় বিশিষ্ট শ্লেষ্মা উঠা ; বক্ষ-অস্থি ব্যথা, শরীর ঠাণ্ডা, রাত্রে দম আটকান কাশি ।

সেনেগো—গলা ও কণ্ঠনলীতে শুড়ুশুড়ুনি ও জ্বালা এবং শয়ন করিলে শ্বাস রোধের আশঙ্কা ।

স্কুইলা—চট্‌চটে শাদাটে প্রচুর পরিমাণে গয়ার, কখন-সহজে কখন কষ্টে তোলা—পূর্বাতন বা সর্দিকাশি ।

স্পঞ্জ—উপশ্বাসনালী-প্রদাহ বশতঃ দিন রাত উৎকাশি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; অথবা কণ্ঠনলী জ্বালা ও সড়ুসড়ানি, কাশিতে কাশিতে অন্ন দড়ির ছায়া গয়ার উঠা, বুক গরম, ঘন ঘন ও কষ্টকর নিশ্বাস, স্বরভঙ্গ । শ্লেষ্মা ও পূয়-মিশ্রিত নিষ্টিবন, শীর্ণতা, হাতের আঙ্গুল, আগু ও নখ বিশ্রী ও কালচেবর্ণ । কেহ কেহ ইহা আকনের পর দেন ।

সেপি—অতিরিক্ত লোম্বা গয়ার উঠা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাশি ও রক্ত মাখান শ্লেষ্মা উঠা, দিবসে গয়ার এবং কাশিকালিন বুক বা পীঠ ফুঁড়ুনি ।

সাইয়স—আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, রাত্রে ও শয়নে বৃদ্ধি । কণ্ঠনলীতে শুড়ুশুড়ুনি জন্ম কাশি, বদন কালচে, পেশীর উৎক্ষেপণ । হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের কাশি রোগ ।

হাইড্রাস্টিস—সর্বদা কাশি, স্বরভঙ্গ, ঘন জর্দা দড়ির ছায়া প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা সহ অক্ষুধা, দুর্বলতা, বিশেষ প্রাচীন পক্ষে ।

হিপার—ঘড়ঘড়ে দম আটকান কাশি, ১২টা রাত্রে বৃদ্ধি । পশ্চিমে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় কাশি । শয়নে গলা ভাঙ্গা উৎকাশি ও শ্বাসরোধ আশঙ্কা, চক্ষু দিয়া খানিকটা জল পড়িয়া ওভাব যাওয়া । কথা কহা, শিঁড়ি উঠা, শরীর শীতল হওয়ায় রোগ বৃদ্ধি ।

হেপটিকা—বুকের ডান দিক সংকোচ হওয়া ও ব্যথা । বুক সড়ুসড়ানি, চুলকুনি, প্রচুর জর্দা ও সরের ছায়া খুব মিষ্ট গয়ার উঠা ।

তরুণ রোগে অরাদি প্রবল থাকিলে তরুণ পথ্য ; পুরাতন হইলে অবস্থা বুঝিয়া খাদ্য—ছত্র, সাণ্ড, আয়ারুট, যব এবং সুপক্ক কলও এক আদটুকু দেওয়া যাইতে পারে।

আন্টিমটার্ট—অত্যন্ত তৃষ্ণা, অন্ন অন্ন ও পুনঃ পুনঃ জল চাওয়া। পূর্ব ঔষধে কতক দূর মাত্র উপকার হইয়া আর ফল দর্শিতেছে না, এমনত স্থলে ইহা প্রয়োগ বিধি। অথবা অধিক শ্লেষ্মা একত্র হওয়া বশতঃ অত্যন্ত বুক বড়বড়ানি, নিশ্বাস কষ্ট ও দম আটকান প্রায় হইলে ; কিম্বা নিজীব ও অবসন্ন অবস্থায় ব্যবহার্য্য। . এ অবস্থায় পালক বা অঙ্গুলী গলায় দিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলাইতে পারিলে যন্ত্রণার আশু প্রতিকার হয়।

আর্স—পূর্ব ঔষধ নিষ্ফল হইলে এবং নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, ক্ষীণ, অসমান, ক্ষণ-বিলুপ্ত, ত্বক শীতল, রোগী এককালে নিবীৰ্য্য হইয়া পড়িলে, ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইয়া সঙ্কটভাব উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আন্টিমটার্ট ব্যবহার বিধি। পুনঃ পুনঃ অন্ন অন্ন পান, মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ উপক্রম।

নক্স—নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, বুক সঁটে ধরা, বিশেষ রাত্রে ; স্বর ভঙ্গ, উৎকাশি, শেষ রাত্রে বা প্রাতে বৃদ্ধি এবং উপর পেটে বাপাঁজরায় ফোড়ার ভ্রায় ব্যথা। অথবা বুকচাপা কাশি, অতি কষ্টে আটা-বিশিষ্ট গয়ার উঠা, মুখ ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, পিপাসা, অক্ষুধা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও আহারান্তে যন্ত্রণার আধিক্য।

লাকেসিস—বুক ভার, ঘন ঘন শ্বাস, ক্লিষ্টকর উৎকাশি, অনেক চেষ্টার পর অত্যন্ত আটা-বিশিষ্ট বা গঁজলাটে এবং কখন কখন রক্ত-মিশ্রিত গয়ার তোলা, স্বর ভঙ্গ।

পল্স—ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস, বুক গরম, গলা বড়বড়ানি, স্বরভঙ্গ, কম্পকাশ, সন্ধ্যায় বা প্রাতে ( বিশেষ পার্শ্বে শুইলে ) বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে জর্দাটে, কখন বা রক্তমিশ্রিত, গয়ার উঠা ; সর্দি হেতু নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া।

মার্ক—রোগের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ম থাকিলে ইহাতে কখন কখন ফল দর্শে। বুক শুষ্ক প্রায়, বা শ্বাসনালাতে মড়মড়ানি হইয়া ক্লিষ্টকর কাশি, নিশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, ও প্রশ্বাস উচ্চ, নাক ফুলা, স্বরভঙ্গ ; অথবা নিদ্রার পূর্বে গলা বড়বড় করিয়া কাশি বা সরল কাশি ও রক্তমিশ্রিত গয়ার উঠা ; কিম্বা

বুক ও মাথা ফেটে যাওয়ার ভয় ব্যথা, নাক দিয়া জল বরা, স্বরভঙ্গ, উদরা-  
ময়, বমন ও নাক দিয়া রক্তপাত । এই ঔষধ সেবনের পরও রাত্রে ঘর্ম  
হইতে থাকিলে ডক্টা দেওয়া বিধি ।

সেপিয়া—অতিরিক্ত লোস্তা গয়ার উঠা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাশি বৃদ্ধি ।

ষ্টানম—অতিরিক্ত সজাটে মিষ্ট গয়ার উঠিলে ।

সল্ফর—রোগের অবসানে যৎকিঞ্চিৎ কস্মর থাকিলে এবং ইহা পুরাতন  
হইয়া না পড়িতে পারে, এ নিমিত্ত ; অথবা অধিক পরিমাণে শাদাটে গয়ার  
উঠা পক্ষে ইহা বিধি ।

লাইকপ—রাত্রে কাশি বৃদ্ধি ও তৎকালে পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, ত্বক আর্দ্র,  
বুক ভার, জর্দাটে ধূসর লোস্তা গয়ার উঠিতে থাকিলে । নাকের পাতা লাল  
ও বিস্তৃত হইলে ।

চাইনা—রোগাবসানে দুর্বলতা দূরীকরণোদ্দেশ্যে কিছু দিন দেওয়া বিধি ।

## গলনালী-প্রদাহ ।

( ANGINA SORE THROAT. )

তালু ও তল্লিগ্নস্থ গ্রন্থিদ্বয়, ঋণনালী ও গলকোষ, ইহাদিগের প্রদাহ হইলে,  
ঐ সকল স্থান সামান্যতর ফুলে ও লাল হয় এবং টাটায় ।

প্রথমতঃ সামান্য সর্দি-জ্বরের ভ্রায়, শীত তাপ অস্থিরতা, মুখ-গহ্বর শুষ্ক  
ও গরম, এবং নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ । টানিতে না পারায় স্তম্ভপায়ীরা মাই  
মুখে করিয়াই ছাড়িয়া দেয় ও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু চুষুক দিয়া  
খাইতে কষ্ট হয় না । রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় কখন কখন পুনঃ পুনঃ কাটেনকার  
ও বমন এবং স্বর কর্কশ ও অল্প নাক ঘড়ঘড়ানি হইয়া থাকে । প্রদাহিত ফুলা  
কখন কখন পাক ধরে এবং ক্ষয় জর হইয়া মৃত্যু হয় ।

দ্বিতীয়ের প্রদাহে গ্রন্থি দ্বয়ের আকার বৃদ্ধি, তৃতীয়ের প্রদাহে স্বরভঙ্গ ও  
ধাসকষ্ট, চতুর্থের প্রদাহে গলা ব্যথা, গিলিতে কষ্ট, গলার বীচি আওয়ান  
প্রভৃতি উপসর্গ থাকে ।

কফাংশ-ধাতুবিশিষ্টেরই এই রোগ অধিক হইয়া থাকে । হিম লাগা ও  
সেঁংসেতে গৃহে বাস রোগের প্রধান কারণ । হামের পর ইহা হইতে দেখা

যায় । উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ ও সর্দির পর এবং উভয় ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন ইহা অবস্থান করে ।

সন্ধ্যায় পূর্বোন্নিখিত নিয়মে গলায় ভালপটি লাগাইয়া ফুলে বা অল্প গরম শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা আবর্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে, রোগের আরম্ভে বিলক্ষণ ফল দর্শায় । অরকালে লঘু পথ্য ; রোগ সামান্য লক্ষণযুক্ত হইলে সূপথ্য, কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া অনুচিত ।

সর্দির অবস্থায় কামো, ব্রাই, বেল চারি ঘণ্টা অন্তর পর পর দিলে আরোগ্য হওয়া সম্ভব ।

ইলাপ্প-ক্ষত—পুরাতন ক্ষত ও গিলিবার সর্বদা কষ্ট হওয়া ও অনেক সপ্তাহ থাকি, জল বা অধিক বাতাস লাগার রোগে ।

জেলস—গিলিতে কাণ অবধি বাজা ( লাগা )—যেন অন্ন-নলীতে কিছু আটকান জন্ত কষ্ট ; অন্ননলীর মুখ হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত জ্বালা ।

হিপার—গিলিতে যেন মাছের কাটা গলায় বেঁধা বোধ । গণ্ডমালা-ধাতু, পাক ধরার উপক্রম, বিশেষ পারা ব্যবহার জন্ত রোগে ।

হাইড্রাস—আমাসয়িক ঝিলিহে ক্ষত । Fauces ( নলীদ্বার; যথায় মুখ-গহ্বর সরু হইয়াছে ) লাল লাল উচ্চ উচ্চ, রক্ত-পোরা ; ঠাণ্ডীতে বৃদ্ধি হওয়া ।

ইথ্রে—যেন গলা মধ্যে কোন কিছুর জমাটের চাপ থাকা বা গিলিবার সময় ফুঁড়ুনি, উহা কাণ অবধি বিস্তৃত হওয়া ও তৎকালে ব্যথা ও জ্বালা; কঠিন অপেক্ষা জলীয় সামগ্রী খাওয়া কঠিন । Tonsils লাল ও ক্ষীত বা কঠিন ও ছোট ছোট ক্ষত দ্বারা আবৃত ।

আইড—পুরাতন গলা-ব্যথা । নলীদ্বার যেন চাঁচা ও জ্বালা-বিশিষ্ট এবং অন্ননলী অবধি বিস্তৃত, নলীদ্বারের সংকোচন ও অপ্রকাশ্য পুরাতন উপশ্বাস-নলী-প্রদাহ ।

কালী-বাই—নলীদ্বারে গহ্বর বা ঘা । গলা-ভাজা-কাশি ও দড়িবৎ শ্লেষ্মা উঠা বা নাক দিয়া ঐরূপ সর্দি নির্গত হওয়া । কর্ণমূল ফুলা ।

লাকাসি—পানে ঘ্রণা, গিলিলে নাক দিয়া বেরণ । গলায় চাপ নয় ও সর্বদা গিলিবার ইচ্ছা, কিন্তু গিলিবার সময় কাণ অবধি বাজা ; গলা ছুঁইতে

না দেওয়া ; বাম দিকে ব্যথা আরম্ভ বা সেই দিকে অধিক । বৈকাল বা নিদ্রার পর বৃদ্ধি ।

লাচলাহু—গলা অধিক শুষ্ক, বিশেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে ; তৎসহ কাশি ; গলার বাম দিকে ফুলা বোধ, শুষ্কতা সহ অনিদ্রা, পরে গলা ভাঙ্গা ।

লাইক—ডান দিকে ব্যথা আরম্ভ বা বৃদ্ধি, সকালে উঠিয়া বড় চটা । ৪ হইতে ৮টায় বৃদ্ধি, নলীদ্বার পাটল বর্ণ, নাক বন্ধ—মুখ দিয়া নিশ্বাস ।

মার্ক—গিলিবার কালীন প্রচণ্ড ফুঁটুনি—কাণ বা গলার বাঁচি অবধি বিস্তৃত, প্রচুর থুথু ও মুখে কদর্যা গন্ধ । গলার চাপ নামাইবার জন্ত সর্বদা ঢোক গেলা । জলীয় পদার্থ গিলিলে নাক দিয়া বেরণ, অধিক ঘামে সমতা না হওয়া—রাত্রে বৃদ্ধি, জ্বিতে ঘা, মাড়ি ও জ্বিতের নীচে ফুলা, Tonsils প্রদাহিত, পাড় লাল বা ক্ষত-বিশিষ্ট বা পুষ্য বিশিষ্ট হওয়া বা আস্তে আস্তে গলায় ঘা বিস্তৃত হওয়া ।

নক্স—গিলিবার কালীন গলায় যেন ছিপি, গলা যেন হাজা বা Raw, পাকাশয়ের পীড়া জন্ত, চটা ও একগুঁয়ে, প্রাতে বৃদ্ধি ।

মায়েনম ওকাইডেটম—পুরাতন রোগ, গলা শুষ্ক ও চাঁচার স্থায় ।

ফাইটোলকা—যেন Itatypeতে লাল গরম লোহ গোলা স্থিত, গল্ল ধরা বা Trachea যেন কসে ধরা বোধ, নেতান, দাঁড়াতে অক্ষমতা, কদর্যা ছর্গন্ধ নিশ্বাস, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া ।

পল্‌স—গলা, তালুপার্শ্ব-গ্রন্থি ( Tonsils ) ও অ্যান্‌জিন নীলিম-লালবর্ণ ও ক্ষীত । গলায় ফুঁড়ুনি, ঢোক গিলায় সমতা, সন্ধ্যায় শীতসহ বেদনা বৃদ্ধি, গলার শিরা উঠা ।

রস—(Pharynx) গলকোষের তলয় দপ্‌দপ্‌ করা । গিলিবার সময় গলা সঙ্কোচন, অস্থিরতা, রাত্রে বৃদ্ধি, নড়ায় স্বস্তি ।

স্যাংগুই—গলা শুষ্ক হওয়া, পানে উহা না যাওয়া, ক্রমাগত কাশিসহ মাথায় বেদনা ও গালের খানিক লাল, গলায় ক্ষত জন্ত ব্যথা, গলা ফুলা ও স্বরবদ্ধতা ।

সিলিসা—গলা মধ্যে ফুঁড়ুনি ও দপ্‌দপানি—যেন একটা ফোঁড়া হইবে, প্রায়ই বাম দিকে, scrofula গণ্ডমালা-ধাতু পক্ষে ।



সন্ধ্যা—পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ, ফোড়া ফাটিলে বা শীঘ্র শীঘ্র না সারা, গণ্ডমালা-ধাতু, বাহাদের সর্বদা ফোড়া পাচড়া হয়, গা আঁচড়ালে ক্ষত হয়, যথায় লক্ষণযুক্ত খাটিতেছে না।

রোগ কঠিন হইলে জলের বা দুধ ও জলের ভাবরা গ্রহণে যাতনা কমে।

আকন—ঠাণ্ডী লাগায় (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ফুলা ও গাঢ় লাল বর্ণ প্রদাহের পক্ষে, খুব জ্বর, গলা ব্যথা, গিলিতে ও কথা কহিতে কষ্ট, গলা জ্বালা, সঙ্কোচন, ফুটুনি, দম আটকান।

এন্ডুলস—গলা শুষ্ক ও জ্বালা-বিশিষ্ট, গিলিতে লাগা, (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থিতে ও তালুতে অধিক রক্ত সঞ্চয়, সর্বদা ব্যথা ও ঢোক গিলিবার ইচ্ছা।

আলুমিনা—গলা ও মুখ টাটান ও Raw হওয়া ও বেন আক্ষেপিক সঙ্কোচন—মুখ-আসা, এবং গিলিতে বা মুখ খুলিতে অসক্ত।

আম-ম—ঠাণ্ডী লাগায় গিলিতে, কথা কহিতে বা মুখ হা করিতে না পারা, উভয় (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ক্ষীত বা পচা ধরার উপক্রম।

আপিস—গিলিতে জ্বালা, হল ফুটুনি, গলায় কিছুমাত্র সংস্পর্শে অসহ বোধ, তাপে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় সমতা, মুখ ও গলা শুষ্ক এবং তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ফালা, খুব প্রদাহিত।

আরম-টি—জ্বিত শীঘ্র শীঘ্র ফোলা সহ ফুটুনি (Prick) ও জ্বালা, গলায় প্রদাহ ও শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রচুর কটু ক্ষয়কারী শ্লেষ্মা বা থুথু নিঃসরণ, কসে ও ঠোঁঠে ফাটা ও বা ও নাড়া পেলে রক্তপর্দা, ব্যথা জ্বর মুখ খুলিতে অশক্তি।

বারাইটা—সামান্য হিম লাগায় তালু-মূল-প্রদাহ, যেন গলা মধ্যে ছিপি থাকা, তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি পাকিবার উপক্রম।

বেল—সাক্ষা ঢোকে বেদনা বৃদ্ধি, গিলিবার কালীন গলায় জ্বালা ও বেদা, পান করায় গলায় আক্ষেপ ও নাক দিয়া জল নির্গমন। যেন গলায় ছিপি থাকা, নিয়ত হাক হাক করিয়া তোলা বা ঢোক পেলা। (Fauces) নলী-দ্বার সঙ্কোচন; মাথায় রক্ত সঞ্চয়; ব্যথা, ডান দিকে আরম্ভ বা সেই দিকে অধিক, পেশী ও গলায় গ্রন্থি ফুলা, (Tonsils) তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ক্ষীত, প্রদাহিত, গাঢ় লাল বর্ণ।

ব্রাই—স্পর্শে গলায় লাগা, মাথা ফিরাণয় ব্যথা, যেন গলায় মধ্যে কঠিন

পদার্থ থাকা বোধ, কাজেই গিলিতে কষ্ট, গলা শুষ্ক হওয়া ও ব্যথা ও ফুঁড়ুনি জন্ম কষ্টে কথা কহা, শীত, স্থির থাকিতে ভালবাসা ।

কাস্টেস—যেন কেহ গলায় হাত দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছে, এমন বোধ । অগ্ন্যনালীর সঙ্কোচন জন্ম গলাধঃকরণ না হওয়া, অধিক জল পান করিয়া ( ঢক ঢক করিয়া ) জোর করিয়া উহা নামান । মুখ ও গলা ব্যথা এবং তথায় ক্ষত থাকা, সর্ষদা শয়ন ও নিদ্রার ইচ্ছা, এবং বাহিরের বাতাস ও হিমের ভয় । জ্বর, শীত, তৃষ্ণা, পরে তাপ, গলায় ব্যথা, জ্বালা ও আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন ।

কার্বোলিক-আ—নিয়ত গিলিবার ইচ্ছা, গিলিলে কষ্ট । গলার ব্যথা ও পূর্ণতা, কাণ অবধি বিস্তৃত, মুখ হইতে অতিরিক্ত কদর্যা চর্গন্ধ ।

কামো—সন্ধ্যায় জ্বর, শীত ও তাপ পর পর ; অস্থিরতা, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাওয়া ; ( Tonsils ) তালু-পার্শ্বস্থ-গ্রন্থি বা কর্ণমূল বা গলার বীচি আওরান । কাণ বন্ধ এবং গলা ব্যথা ।

সিলিসি—গিলিতে গলায় ব্যথা, গলার স্থানীয় শুষ্কতা, জন্ম কাশি, ঠাণ্ডা বাতাসে আতঙ্ক ।

কফি—সর্দি, গলার উপদাহ জন্ম কাশি, অনিদ্রা, তাপ, গেঙান ও নিলাপ, পীড়িত স্থানের সাড়াধিকা ।

আকন—জ্বর, গাত্রতাপ, পিপাসা, অস্থিরতা, গিলিতে কষ্ট, গলার ভিতর গাঢ় লালবর্ণ ও তথায় ফুঁড়ুনির ছায় ব্যথা, কথা কহিলে বৃদ্ধি । রক্তাধিক ও রাতিকের ধাতু পক্ষে এবং শীতকালের রোগে বিশেষ খাটে ।

ডক্সা—হিম লাগা প্রযুক্ত সামান্যতর রোগ পক্ষে এবং উপস্থান-নালীর প্রদাহের আশঙ্কা থাকিলে । • প্রথম প্রথম এই দুই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল লক্ষিত হয় ।

কামো—হিম লাগা বা ঘর্ম বন্ধ হেতু গলার ও তালুর নিম্নস্থিত গ্রন্থির বীচি আওরান, কঠিন দ্রব্য গিলিতে অক্ষমতা, বিশেষ শয়নাবস্থায়, যেন গলায় কিছু আটকাইয়া আছে, এমন বোধ এবং তাহা গিলিয়া ফেলা বা নামাইবার সতত বুঝা চেষ্টা, গলা সড়সড়ানি হইয়া হক হক করিয়া কাশি, স্বর ভঙ্গ । এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ, এক অপেক্ষা অপর গালের বর্ণ গাঢ়, কালো, কোলে

লইয়া বেড়াইলে ভাল থাকে, গাত্রতাপ । গা শীত শীত উপসর্গ থাকিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা ।

বেল—মুখমণ্ডল ও গলা ফুলা, মুখগহ্বর ও গলা শুষ্ক হওয়া, গিলিবার কালে গলা ও কর্ণ পর্য্যন্ত বাজা । কখন কখন গিলিতে অশক্ত হওয়া, নাক দিয়া ছুধ বাহির হইয়া পড়া । অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু পানে আতঙ্ক, গলকোষ উজ্জ্বল গাঢ় লাল, গলার বীচি আওরান এবং ফোড়া বা ক্ষত হইবার আশঙ্কা হইলে । কখন কখন প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডল লাল ও ক্ষীত, চক্ষু আরক্ত হওয়া ও আলোকের অসহিষ্ণুতা এবং মুখ ও গলা মধ্যে হড়হড়ে শাদা গরার থাকা ; অথবা হঠাৎ মুখে বা হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়া, তালু-নিম্ন-গ্রস্থি আলজিব লাল, কখন কখন ফুলা, ব্যথা, অতিরিক্ত লালভাঙ্গা, জিভে ছাতা পড়া প্রভৃতি লক্ষণে ।

পল্স—কক্ষ প্রধান ধাতু বা নম্র প্রকৃতি পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী । সর্দি লাগার পর গলনালীর ভিতর শুষ্ক ও ফুলা বোধ, তালু ও তল্লি গ্রস্থি লাল ; গলায় কালশিরা পড়া, সন্ধ্যায় শীত, অথবা প্রদাহ প্রযুক্ত গলার ভিতর বেঁধা, এবং গিলিবার কালে উহার অধিক স্থান ডগ্‌ডগে লাল, নাক বন্ধ, মাথা ব্যথা, দাহবিশিষ্ট জ্বর, কিন্তু পিপাসার এককালে অভাব বা অতি স্বল্প মাত্র, নাকি বা ভঙ্গ স্বর ; বিশেষ এই রোগ প্রসূক্ত পাকশয়ের উত্তেজনা হইয়া মুখে জল উঠা বা জল বা পৈত্তিকের বমন উপসর্গ থাকিলে ।

### ক্রুপ বা ব্রুংরিকাশি ।

(CROUP.)

অন্ননালীর দ্বায় শ্বাসনালীর অমাশয়িক ঝিল্লির প্রদাহ হইয়া তত্পরি কৃত্রিম ঝিল্লি হইয়া থাকে । এই রোগের নাম ক্রুপ । মাই ছাড়ার পর ৮ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ইহার আধিক্য দেখা যায় । হিম, পূবে বা উত্তরে বাতাস লাগা, শীতকালে বেড়া হওয়া, নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস ও তৎসঙ্গে অপুষ্টির বা অযথা খাদ্য আহার বশতঃ উদরাময়, অতিরিক্ত চীৎকার এবং আদিবল বা কোলিক প্রবৃত্তি \* থাকা, ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয় । এক-

\* জনক জননীর শুক্র ও শোণিতের বিকৃতি বশতঃ সন্তানের রোগ হয় । যথা অর্শ, কাশি প্রভৃতি ( Hereditary disease ) ।

যার এই ব্যাধি হইলে পুনঃ পুনঃ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওন সম্ভব । কিন্তু হেমিওপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে সে আশঙ্কা থাকে না । ব্যাধি তীব্র ও ভয়াবহ হইলে কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, সচরাচর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে এবং কচিং দুই তিন সপ্তাহের পর মৃত্যু হয় । এই রোগ কখন বা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে, হাম ও ছপিংকাশির সঙ্গে থাকিলে তাদৃশ ভয় থাকে না ।

পূর্বে কোন রোগ নাই, হঠাৎ রায়ে কখন ঘুমন্ত অবস্থায়, কনকনে স্বর বিশিষ্ট কাশি, শ্বাস গ্রহণ কালে মোরোগের ডাকের ত্রায় শব্দ, প্রচণ্ড অর, দম আটকান প্রায় হইয়া যেন শ্বাসাবদ্ধক পদার্থ গিলিয়া অধঃকরণের আগ্রহতা, অথবা গলনালী বল পূর্বক মুষ্টি দ্বারা চাপ দিয়া উহা বহিষ্করণের চেষ্টা । ইহার পরই হয়ত ক্ষণিক স্থিতি, কিছু মাত্র উপসর্গ থাকে না, আবার পূর্বাপেক্ষা প্রবল বেগে রোগ আক্রমণ করে, অধিক শ্বাস গ্রহণের আশয়ে মাথা পশ্চাৎ দিষ্টক ফেলা, এবং স্বর বন্ধ, মুখ রক্ত হীন, চক্ষু জ্যোতিঃ হীন ও স্থির, নির্জীব, হস্ত পদাদি শীতল ঘর্ষ যুক্ত, চেতনা শূন্য বা দড়কা হওয়া । কখন বা ওরূপ না হইয়া প্রথম প্রথম সাগাশ সর্দি অর, কাশি, পুনঃ পুনঃ কাচি, চক্ষু দিয়া জল ঝরা, অন্ন স্বর-ভঙ্গ, মাথা ভার, অবসন্নতা ইহা দিন দিন উপসর্গ সকল অধিক বলবৎ হইতে থাকে । এই রূপ ২।৪ বা অষ্টাহ থাকিয়া পরে শ্বাস-ক্লান্ততা বশতঃ শিশু শয্যায় উঠিয়া বসিয়া কাশিতে ও কুক্ষুট স্বরবৎ শব্দ করিতে থাকে, শ্বাস ও কাশি এত ঘন ঘন হয়, যে উদ্ভাদের মধ্যে বিরাম দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে শ্বাস বন্ধ হেতু মৃতের ত্রায় দেখায় । যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা হয় না, কিন্তু সন্দাই আবল্য থাকে, হিস হিস প্রশ্বাস, নাকের পাতা ঘন ঘন বিস্তৃত ও আকৃকিত হয়, এবং হঠাৎ বা ক্রমশঃ কৃত্রিম কিল্লি দ্বারা শ্বাস মার্গ পূরিত হওয়ায়, ক্রমে নিশ্বাস রোধ হইয়া শিশু পঞ্চম পায় । এক হইতে তিন ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত এই সকল ভয়াবহ উপসর্গ হইয়া যন্ত্রণার শমতা হয় । কখন কখন ১২।১৪ ঘণ্টা বিরামাবস্থায় থাকে, তৎকালে গাত্রতাপ, অন্ন অন্ন শ্বাস-কষ্ট, কিঞ্চিৎ স্বর-ভঙ্গ দেখা যায় । শিশু হয়ত খেলাইতে থাকে, বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, পুনরপি হঠাৎ ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে, কিয়ৎকাল পরে আবার হয়, কিন্তু ক্রমশঃই মধ্যবর্তী বিরামকালের স্বল্পতা হইতে

থাকে। কুকুট স্বরবৎ শ্বাসের শব্দ ও কৃত্রিম ঝিল্লি এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

মুখ গহ্বর ও পাকনালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি রোগ সম্বন্ধে পূর্বে লেখা গিয়াছে, শ্বাস যন্ত্র সম্বন্ধে ঐ ব্যাধি এ স্থলে বর্ণিত হইল। কখন কখন প্রথম, গল-কোষে আরম্ভ হইয়া কণ্ঠ বা স্বরনালীতে রোগ উপস্থিত হয়। কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও উপশ্বাসনালী ইহাদিগের ভিন্ন স্থানে রোগ ধরিলে উপসর্গের বিভিন্নতা দেখা যায়।

কণ্ঠার ক্রূপ অধিক হইয়া থাকে। টুঁটি বা কণ্ঠ বাথা, প্রথম হইতে অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট, এককালে বাক্য রোধ বা স্বরের বিলোপ, শ্বাসের সঙ্গে হিস হিস শব্দ এবং কঁকননে ও কুকুট ধ্বনিবৎ কাশি, এই সকল ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং রোগ অল্প কাল মধ্যে সাংঘাতিক হয়।

শ্বাসনালীর ক্রূপ পূর্বাংগে অল্প হয়, ইহার উপসর্গ ও রূপ প্রচণ্ড বা অত্যন্ত কাল স্থায়ী হয় না, কণ্ঠের নিম্ন দেশ বাথা, সর্দির ত্রায় কাশি এবং কখন কখন বহু দিন পর্য্যন্ত কুকুটবৎ ধ্বনির অভাব, পূর্বের ত্রায় স্বর-ভঙ্গ বা দম আটকান হয় না, এবং ব্যাধি ওরূপ সাংঘাতিক নহে।

উপশ্বাস নালীর ক্রূপে শ্বাস সহ ঘড়ঘড়ানি শব্দ, প্রথম হইতে প্রবল জ্বর, নাড়ী ও নিঃশ্বাস দ্রুত, আকর্ষণ করিলে বুকের অভ্যন্তরে খনখনে শব্দ, কাশি পূর্বের ত্রায় কর্কশ নয় এবং বিলম্বে ক্রূপের কাশি অল্পভূত হওয়া।

শ্বাস-কোষের স্বল্পতা, স্বর প্রকৃতাৱস্থায় ত্রায় হওয়া, জরের লোপন, সর্বাঙ্গ ঘর্ম্ম, কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র সরস থাকা, নাক দিয়া রক্তস্রাব, কৃত্রিম ঝিল্লি উঠিয়া যাওয়া ইহারা স্বলক্ষণ।

### ক্রূপ—কুজিত বা ঘুংরি কাশি।

রোগ হঠাৎ আক্রমণ পক্ষে—আকন, স্পঞ্জ। পূর্বাংগে সর্দি কাশি থাকিলে—প্লুস, হিপর। আফেপয়ুক্ত কুজিত শব্দের কাশ জন্ত—আকন, ইপি, কুপ্রম, জেলুস, লোবেলা, স্পঞ্জ। বৃক ঘড়ঘড়ানি পক্ষে—ইপি, টাট-এ। পাণ্টে পাণ্টে রোগাক্রান্ত হওন পক্ষে—আইস, কালী-রাই, ব্রোম।

আইড—কণ্ঠনালী ও বৃক বাথা, অক্ষুট বাক্য, শিশুর গলা হাত দিয়া ধরা,

শ্বাসকষ্ট, স্বর কৰ্কশ ও ভাঙ্গা, অধিক শ্লেষ্মা উঠা, হুলকায শিশুর মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা হওয়া । গণ্ডমালা-ধাতু-গ্রস্তের পক্ষে । অর থাকিলে আকন সহ পর পর । নতুবা ইহা ও হিপার পর পর দিব। শ্বাস বা উপশ্বাস-নালীর রোগে অধিক ব্যবহার্য্য ।

আকন—প্রবল অর, জোরে প্রশ্বাস ফেলা, ও তৎপরে স্বরভঙ্গ, খেঁকখেঁক কাশি, চোক গিলিতে শিশুর কান্না ( যেন গলা ব্যথার দরুণ ) । প্রদাহের অবস্থায় ইহা ঘন ঘন প্রয়োগ বিধি ।

আর্স—রোগের অন্তিম অবস্থা, হিমাজ, নাড়ী ক্ষুণ্ণ ও অপ্রাপ্য, এক ফালে বলক্ষয় । সঙ্কটাবস্থা ও ফসের পর ব্যবহার্য্য ।

ইপি ও ব্রাই—কাশি আক্রমণ কালীন দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ডাং তেস্ত ইহা দ্বিগুণে দিতে কহেন ।

কালী-বাই—কৃত্রিম ঝিল্লির উপক্রম বা ঝিল্লি হইয়াছে, এমত অবস্থায় এপি ও কাশির সঙ্গে দড়ির তায় শ্লেষ্মা উঠা ও কনকনে শ্বাস । ক্রমশঃ রোগ প্রকাশ, প্রথম অল্প অল্প শ্বাস ও স্বরভঙ্গ, কুজিত কাশি, ক্রমে শ্বাসনালীতে কনকনানি শব্দ, কণ্ঠনালী ও তালু-পাশ্বে গ্রন্থি লাল হওয়া, ফুলা ও তথায় কৃত্রিম ঝিল্লি পড়া । মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, দূর হইতে শ্বাস-শব্দ শুনিতে পাওয়া । শ্বাস-নালীতে বেদন।

কামো—সর্দি জন্ত কুজিত কাশি, শ্বাস-নালীতে শ্লেষ্মা জন্ত সাঁই সাঁই ঘড়ঘড়ানি ও স্বরভঙ্গ । রাত্রে ও ঘুমন্ত অবস্থায় রোগ বৃদ্ধি । কোলে লইয়া বেড়ানয় শান্ত থাকা ।

কুপ্রম-মে—আক্রেপযুক্ত দম আটকান কাশি, স্বরভঙ্গ ও সর্বদা শব্দন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা ।

জেল্‌স—কষ্টকর ও ঘন ঘন শ্বাস ও ক্রুপের শব্দ বিশিষ্ট ; শিশুর খাবি থাওয়া, বেদম হওয়া এবং হাত দিয়া গলা ও টুট অঁকেড়িয়া ধরা ।

টার্ট—বুক ও শ্বাসনালীতে অধিক শ্লেষ্মা বসাতে সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড়ানি, শব্দ, কিন্তু কিছু না উঠা, দম আটকান কাশি, জ্বর, বিশেষ প্রথম রাত্রে ও বমন ইচ্ছা । রোগের প্রবলাবস্থায়, মাথা পেছন দিকে ফেলা, কপাল এবং কখন কখন সর্বোচ্চ ষামে ভিজিয়া যাওয়া ।

নয়—রাত্রি ১২টা হইতে ভোর পর্য্যন্ত শ্রান্তকারী উৎকাশি, অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

ফস—অত্যন্ত স্বরভঙ্গ সহ কণ্ঠনালীতে ব্যথা জন্ম কথা কহিতে অক্ষমতা। শ্বাস-থর্ব্বতা, সন্ধ্যায় যাতনার বৃদ্ধি। রোগ সারিয়া স্বরভঙ্গ থাকিলে অথবা পীড়া পাণ্টে না হইতে পারে, সে নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য। কখন ইহা হিপারের, কখন বা আকন ও স্পঞ্জিয়ার পর দেওয়া যায়।

বেগ—গলা ভাঙ্গা কাশি, বদন ও চক্ষু আরক্রিম হওয়া, কণ্ঠনালী টাটান, উহা স্পর্শ করিলে দম-আটকান। মুখগহ্বর উজ্জ্বল লাগ, আক্ষেপযুক্ত উৎকাশি, স্নাত্রে বৃদ্ধি, ঘুম ঘুম অথচ নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চমকান, লাকান।

ত্রাই—ছই প্রহর রাত্রে পর বুকভার, আক্ষেপযুক্ত কাশি আসিয়া ঘুম ভাঙ্গা এবং খানিক গয়ার না উঠা পর্য্যন্ত ক্রমাগত কাশিতে থাকায়,

ব্রোমাইন—কণ্ঠনালীর পেশির আকুঞ্জন, দম আটকান, স্বরভঙ্গ, হিস হিস স্বরবিশিষ্ট-কুপের ছায় কাশি, গলা ঘড় ঘড়, খাবি খাওয়া, মুখগহ্বর উত্তপ্ত হওয়া, শ্বাসনালীতে কৃত্রিম ঝিল্লি ইত্যাদি সমস্ত লক্ষণ সহজ শরীরে ব্রোমাইন খাইলে হয় এবং বিষণ্ণ বিষমৌষধঃ নিয়মামুসারে এই ব্যাধির ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১১২ ঘণ্টা অন্তর—অতি কঠিন রোগে ও শ্বাস ঘড়ঘড়ানি থাকিলে।

মার্ক—স্বরভঙ্গ, নাক দিয়া জল ঝরা ও রক্ত হাজা, শ্রান্তকারী উৎকাশি।

লাকাসি—রোগের চরমাবস্থা, ফুসফুসের পক্ষাঘাত হওন উপক্রম। কণ্ঠনালীতে কিছুমাত্র সংস্পর্শে ব্যথা ও দম আটকান কাশি, ঘুমন্ত এগোড় ওগোড় করা। অত্যন্ত বলক্ষয়, শরীর শক্ত হওয়া, গা বমি বমি, মুচ্ছা।

স্পঞ্জ—যেন গলার কিছু আটকান ও কণ্ঠনালীর এক্রপ সঙ্কোচন যে, তাহা দিয়া শ্বাস কার্য্য সমাধা হওয়া হঃনাথ্য, শ্বাস-কুচ্ছতা বশতঃ গলা উচ্চ করা ও পেছন দিকে ফেলা, কর্কর ও কুচ্ছট ডাকের ছায় শব্দময় কাশি, অত্যন্ত শ্লেষা উঠা, হিস হিস শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস, মধ্যে মধ্যে দম আটকান। রোগের সকল অবস্থাতেই, কিন্তু কেহ কেহ প্রথমে মাত্র উপকারী কহেন। অর না থাকিলে কেবল ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে, অর থাকিলে ইহা ও আকন পর পর।

হিপার—প্রতি দস্তোদামকালে ক্রুপের শ্রায় কাশি, গলা ঘড়ঘড়ানি, দম আটকান কাশি, স্বর দুর্বল, দিবসে মাত্র গয়্যার উঠা—রাত্রে নয়; শেষ রাত্রে রোগের বৃদ্ধি। রোগ আরম্ভে, কৃত্রিম ঝিল্লি হইবার পূর্বে, অথবা আইড ও ব্রোমাইন ব্যবহারে দম আটকান ও ঝিল্লি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। গাত্রাবরণ খুলিলেই কাশি, খুব ঝিমন ও প্রচুর ঘাম। শ্লেষ্মা তুলিবার নিয়ন্ত চেষ্টা বা মাথা ঘাড়ের দিকে ফেলা, গলা আঁকড়াইয়া ধরা। রোগ প্রবলতর ও দ্বন্দ্বজ হইলে ইহা, অংকন ও স্পঞ্জ পর পর ব্যবহারে অধিক ফল হয়।

আন্টিমটার্ট—বুক ও শ্বাসনালী সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড়ানি শব্দ, বেনু তথায় অধিক শ্লেষ্মা বসিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র না উঠা, দম আটকান কাশি, গাত্র তাপ ও নড়ী দ্রুত, বিশেষ সক্ষ্যায় ও প্রথম রাত্রে।

স্বরভঙ্গ নিমিত্ত হিপার, বেল, কার্কো, আর্গিকা ইহারও উত্তম ঔষধ।

ট্রাই ও ইপিকা—ডাক্তার তেস্ত এই রোগে পর্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর ও কাশি আক্রমণ কালে দশ মিনিট অন্তর দিতে কহেন। প্রথমটীর বিশেষ লক্ষণ দুই প্রহর রাত্রের পর বুক ভার, আক্ষেপযুক্ত কাশি হইয়া নিজাভঙ্গ এবং খানিক গয়্যার না উঠিলে উহার বিরাম হয় না।

অবস্থা বুঝিয়া ১০, ১, ২, ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আক্রমণের অবস্থায় ঘন ঘন, অপর কালে অধিক অন্তর। আরোগ্য হইতে থাকিলে ক্রমশঃ অধিক বিলম্বে দিতে থাকিবে।

প্রকৃত ক্রুপ আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা, বিশেষ শ্বাস-কষ্টের সমতার নিমিত্ত দুইটি হাত সহ হয় একরূপ গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে, যে পর্য্যন্ত না দম আটকান ভাব যায় এবং তৎসময়ে ১০।২০।৩০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা আকন দিবে। ৪।৫ পুরু নিংড়ান ভিজ্জা নেকড়া গলায় দিয়া দুই পুরু ক্লানেল বা গরম বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া সমস্ত রাত্র রাখিলে উপকার দর্শে। দ্বিতীয় রাত্রে একরূপ উপসর্গ পুনর্বার উপস্থিত হইলে, পূর্বের শ্রায় গরম জলে হাত ডুবান ও গরম জলে নেকড়া (পশমী হইলে ভাল হয়) ডুবাইয়া গলায় ধরিবে, উহা ঠাণ্ডা হইতে দিবে না, পুনঃ পুনঃ বদলাইবে। নেকড়া পাত পাত করিয়া দিলে শীঘ্র শীতল হয়, এই জন্ত পুটলি করিয়া ধরাই শ্রেয়। প্রথম ৩।৪ রাত্রি



বৃদ্ধির কাল, ঐ সময়ে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। এই রোগে দীর্ঘকাল ঘুমাইতে দেওয়া অপরাধমর্শ। যত অধিক নিদ্রার পর রোগ আক্রমণ করে, ততই প্রচণ্ড হয়, এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ঘুম ভাঙ্গান উচিত।

পীড়িত অবস্থায় অল্প অল্প চর্ষ ও জল, ভয়ের অবস্থা উদ্ভীর্ণ হইলেও লঘু পথ্য। শিশুকে গরম রাখিবে, আরোগ্য হইলেও দিন কতক ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগিতে দিবে না।

### বুক ধড়ফড়ানি—হৃৎকম্প।

কখন কখন হৃদয়ের যান্ত্রিক পীড়া, কখনও বা অত্র ব্যাধির আনুষঙ্গিক উপসর্গ স্বরূপ হৃৎকম্পন প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, অধিক পরিমাণে সূরা, আফিম, গাঁজা, তামাক, চা, কাওয়া প্রভৃতি গরম দ্রব্য ব্যবহার, বিশেষ স্নায়ুপ্রধান-ধাতুগ্ৰস্ত ব্যক্তির এই রোগ হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য, গুরুভোজী-ব্যায়াম রহিত অথবা পান্নাশবর্ণ, একহারা, উদ্বিগ্নচেতা ও অজ্ঞানতা দ্রুত পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চয় হয় এমত সকলের এবং (Gout) বাতের সঙ্গে সঙ্গে (অথবা দুর্বল করে, এমন কোন কারণ উপস্থিত হইলে এ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা)। অথবা রক্তক্ষয় ফ্রোটকাদি চর্মরোগ হঠাৎ বন্ধ হইলে এ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

হঠাৎ আক্লাদ হইতে পীড়ায়—কফি।

ভয় হইতে পীড়ায়—আকন, ওপি, কফি, ভেরাট।

বিরক্তি হইতে পীড়ায়—কামো।

রক্তাধিক্য জন্ত—আকন, আরম, ওপি, কফি, ফস, ফেরম, বেল, লাকাসি, সলফর।

রক্তক্ষয় বশতঃ বা দুর্বলের পীড়া—চিন, কান্কা, নক্স, ফস-আ, ফেরম, ভেরাট, হেলন।

যা শুকান বা চুলকুনি পাচড়া বন্ধ নিমিত্ত—সলফর, আর্স, লাকাসি।

গলার গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি হওন জন্ত—আকন, কাস্টাস, জেলস, ভেরাট-ভি।

যাহাদিগের শরীরের শীঘ্র শীঘ্র বাড় হয়, এমত সকল পক্ষে—আকন, পলস।

দীর্ঘকাল কোন ক্ষয়কারী রোগ ভোগ জন্ত বুক ধড়ফড়ানি পক্ষে—ষ্ট্রাক্সিস ।

দীর্ঘকাল স্তন দেওয়ার জন্ত—আলাটিউস, নক্স ।

রাগ জন্ত—আকন, কামে ।

উদ্বিগ্নতা জন্ত—নক্স, ভেরাট ।

অজীর্ণতা জন্ত পাকশায়ে বায়ু সঞ্চয় ও হৃৎস্পন্দন—নক্স, পল্‌স, লাকাসি,  
লাইকপস ।

হৃৎকম্প এবং ঐ সঙ্গে মাথা ও বুক স্পন্দন ( With reverberation through head and chest ) —বেল ।

অতিশয় উত্তেজনা ( Excitement ) জন্ত—কফি, পল্‌স ।

হৃৎকম্প নহু নাড়ী দ্রুত ও মোটা (Quick bounding pulse)—আকন ।

—————নাড়ী ধড়াস ধড়াস (Heavy bounding) করিয়া ( জোরে )  
স্পন্দন—বেল ।

————সহ গা বমি বমি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপা—ককু ।

————সহ দৃষ্টির মালিগ্রা—জেল্‌স ।

————কাণ মধ্যে ভন ভন শব্দ—নক্স, বেল, লাকাসি ।

————মূর্ছাপ্রায় ( দুর্বলতা )—আকন, আর্স, কাক্সিস, লাকাসি ।

————মানা মারা ( Lowness of spirit )—ইথে, নক্স, পল্‌স ।

————হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের—ইথে, কাক্সিস, জেল্‌স, পল্‌স ।

————পিত্ত প্রধান ধাতুর—নক্স ।

————রোগ অত্যন্ত ক্রুর হইলে—আর্স, লাকাসি, সল্‌ফর ।

আকন—সবলকায়, বুক চাপ, হাত গা ভার ও শ্রান্তি বোধ, ঝলক ঝলক তাপ—বিশেষ বদনে, কষ্টকর ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস—বিশেষ নিদ্রিতাবস্থায় ; কখন বকের বাম দিকে বেদনা, বিশেষ নড়ায় বা উপরে উঠায় । হৃদয়ের স্পন্দন প্রচণ্ড ও তজ্জন্ত ছটফটানি । নিশ্চয় মরিবে এই দৃঢ় সংস্কার । শ্বাসকষ্ট জন্ত উঠিয়া কসিতে বাধ্য । ভয় বা সুরাপানের পর রোগ ।

আর্স—রাতে আইটাই ও বুক ধড়ফড়ানি এবং ভিতরে জ্বালা, শ্বাসকষ্ট,

শয়নে যাতনা বৃদ্ধি ( ডিজিট ) পায়চারি করায় কতক সমতা, খুব তৃষ্ণা, কিন্তু অত্যন্ত পানে তৃপ্তি, বলক্ষয়, মৃত্যুভয়।

আলোট্রিস-ফার—দীর্ঘকাল সন্তানকে স্তন দেওয়া, অথবা বহু দিবস রাত্রি জাগরণ কিম্বা অধিক উদ্বিগ্নতা জন্ম বুক ধড়কড়ানি রোগে ব্যবহার্য্য।

আসাফাটিডা—বামার রজঃবন্ধ বা অধিক শ্রম জন্ম পীড়া।

ইথেসা—হিষ্টিরিয়া প্রস্তের হৃৎকম্প। শোক ও অগ্নোদ্যম জন্ম পীড়া, গলা মধ্যে যাতনা ও অম্লধ, হতাশ ও মাদামারা।

ওপি—হঠাৎ ভয় পাওয়া জন্ম হৃৎ-স্পন্দন এবং অতি সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ।

ককু—হৃৎকম্প জন্ম দম আটকান, দুর্বলতা জন্ম মাথাঘোরা, হাত পা কাঁপা, অবসন্নতা এবং কথা কহা, আহার বা পান করায় রোগ উত্তেজিত বা বৃদ্ধি।

কফি—নূতন রোগে—হঠাৎ অতিরিক্ত আহ্লাদ উপস্থিত হওয়ায় বুক ধড়কড় ; অথবা হৃৎকম্প সহ স্নায়বিক উত্তেজনা, থেকে থেকে দম আটকান ও উৎকর্ষা, হতাশ হওয়া।

কাক্সা—স্কোটক বা বদনের ত্রণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া বা আত্ম-মৈথুন জন্ম হৃৎকম্প।

কাক্টস—মানসিক বিশৃঙ্খলা হইতে হৃদয়ের স্নায়বিক স্পন্দন ; অথবা পুরাতন পীড়া কিম্বা যথা নিয়মিত কাপে বন্ধস্থলের সংকোচন সহ মুচ্ছা ও হৃৎকম্প এবং প্রাতে গাত্রোথানের পর যাতনাধিক্য।

কাক্সর—শরীর ঠাণ্ডা, বদন পাক্সাশবর্ণ ও হঠাৎ শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎ-স্পন্দন।

কামো—রাগ বা বিরক্তির জন্ম রোগ। হৃৎকম্প সহ তৎপ্রদেশে বেদনা ও চাপুনি, শ্বাসকষ্ট সহ অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা।

গ্রাফাইট—রজঃ বন্ধ ও হৃৎকম্প, বদনে ফুসফুড়ি।

চিন—রস বন্ধক্ষয় বা দীর্ঘকাল স্তন দেওয়া দক্ষণ দুর্বলতা জন্ম হৃৎকম্প।

জেলস—হিষ্টিরিয়া দক্ষণ হৃৎকম্প। হৃদয়ের পূর্ণতা, ভার, উৎক্ষেপণ, স্পন্দন, দৃষ্টির মালিগ্ন।

ডিজিট—কথা কহায়, নড়ায় বা শয়নে হৃৎকম্প। যেন একবার নড়িলেই

হৃৎ-স্পন্দন এককালে রোধ হইবেক । হৃৎপ্রদেশ সংকোচন বা তথায় তীব্র কুঁড়ুনি (রস) । হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়া সহ পা ও পায়ের পাতা ফুলা ।

থিয়া—অধিক বকা, মানসিক শ্রম ও অনিদ্রা সহ হৃৎকম্প ।

নক্স—রক্ত বা পিত্তাধিক্যের প্রাতে রোগ সহ বমন, উদ্বেগ বা বৃকে চাপুনি, অথবা শয়ন করা বা প্রতিবার আহারের পর অসুখ । ঐ সঙ্গে বৃকে উত্তাপ বা জ্বালা সহ অনিদ্রা, বিশেষ রাত্রিকালে আইটাই করা । কাওয়া, মদ, গরম মসলা অধিক ব্যবহারের পর রোগ ।

নাইট-আ—সামান্য মনের উত্তেজনা জন্ত হৃৎকম্প ।

নেট্রম—দীর্ঘকালের মেটে পাণ্ডু রজঃ বন্ধ ও হৃৎ-স্পন্দন ।

পলস—স্নায়বিক ধাতু বা হিষ্টিরিয়া গ্রন্থের পীড়া, বিশেষ রাত্রিকালে, বৃক ও হৃদয়ের রক্তের গতি এবং সামান্য কারণে পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হৃৎকম্প ; রাগ, আনন্দ, কষ্ট, অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হওয়ার পীড়া ; বাম পার্শ্বে শয়নে বা কোম্র প্রকার নির্দিষ্ট ভাবে থাকা জন্ত ; ভোরপেট বা অত্যন্ত আহার সহ বৃক ভার, শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টিমালিন্য, হিকা, বৃক জ্বালা, কখন কখন অতিরিক্ত গা বমি বমি করা ও বমন, পাকাশয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকা । নবযুবতীর ঋতু কালীন বা উহা বন্ধ হওয়ার হৃৎকম্প ।

ফস—হৃৎ-স্পন্দন, আহারের পর বা মানসিক উত্তেজনায় উহা বৃদ্ধি হওয়া, বৃক সঁটে ধরা জন্ত শ্বাসকষ্ট ও অতিশয় দুর্বলতা ।

ফস-আ—যাহারা শীঘ্র শীঘ্র বীড়ে, আত্ম-মৈথুন ও দীর্ঘ শোক হইতে রোগের উৎপত্তি ।

বেল—হৃৎকম্প সহ ক্ষণলুপ্ত নাড়ী । স্থিরাবস্থায় হৃৎ-স্পন্দন ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি । হৃৎপ্রদেশে যাতনা, মাথা দপ্পদপানি । হৃৎকম্প এবং সর্কাক্স স্পন্দন, বৃক যেন কসে বন্ধন ও পাখুরা বেদনা ; শ্বাস-ধর্মতা, বিশেষ উপর তলার উঠায় ।

ভেরাট—বৃক ধড়াস ধড়াস করা ও বাহির হইতে তাহা দেখা যাওয়া ( ডিজিট ), শয়নে কষ্টেব লাঘব, নড়ায় ধড়কড়ানি বৃদ্ধি ; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বলক্ষয়কারী ভেদ, উদ্বিগ্নতা ও মৃত্যুভয় ।

মক্স—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রন্থের হৃৎকম্প ।

রস—স্থির হইয়া বসায় প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দন, সেজন্য সর্বদা ঠাইনাড়া।  
হৃদয়ের ফুঁড়ুনি সহ বাম বাহুর খজ্ঞতা ও সাড়ের ন্যূনতা।

লাইকোপস—হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি বা অজীর্ণতা জন্ত হৃৎকম্প।

লাকাসি—হৃৎস্পন্দন সহ ঠাণ্ডা ঘাম, মূর্ছা ও শ্বাস-থর্ব্বতা, আহার বা  
শ্রমের পর, হতাশ, রাগে দম আটকান।

সল্ফর—স্ফোটক বা চর্মরোগ হঠাৎ বন্ধে হৃৎস্পন্দন। সিঁড়ি ভাঙ্গায়  
হৃৎকম্প অথবা ব্যাধি নিঃশেষ করার নিমিত্ত ইহা ব্যবহার্য্য।

সিকেল—হৃৎস্পন্দন ও জলবৎ প্রচুর রজঃ ক্ষরণ।

সেপি—রজঃ বন্ধ, নাড়ী কম্পাশ্বিত ও ক্ষণলুপ্ত সহ হৃৎস্পন্দন।

সর্বোৎকর্ষ শীতল ও হঠাৎ বুক ধড়ফড়ানি হইলে আদত কপূরের আরোক  
সৌকান বা চিনিতে ফেলিয়া, সিকি হইতে এক ফোটা পর্য্যন্ত বৃষস বুঝিয়া  
১০।১৫ মিনিট অন্তর দিবা।

রোগ পুরাতন হইলে নিরাময় হওয়া সুহৃদ্ব, তবে তাৎপর্য্য রাখিতে  
পারিলে যাতনার লাঘব হয়।

রোগীকে স্থির রাখিবা, নিকটে জনতা হইতে দিবা না, পাঃ গরম ও শুষ্ক  
রাখা বিধি এবং কোন মতে জলে ভিজিতে দিবা না; সন্ধ্যায় অধ পেট আহার  
এবং শয়নের পূর্বে কিছু অধিক পরিমাণে জল খান করিতে দিবা।

### ক্রান্তাক্ষেপ—দড়্কা।

মস্তিষ্ক ও মজ্জার উত্তেজনা বশতঃ সর্বোৎকর্ষ, বিশেষতঃ হস্ত ও পদের খেঁচুনীকে  
ক্রান্তাক্ষেপ বা দড়্কা কহে। এই রোগ শৈশবকালেই অধিক হয়। সপ্তম  
বৎসর বয়ঃক্রমের পর, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় বালকের বিশেষ কারণ ব্যতীত এই  
রোগ দেখা দিলে ইহা মৃগী রোগের পূর্ব লক্ষণ জানিবা। নিম্ন লিখিত কারণ  
বশতঃ এই ব্যাধি সচরাচর হইয়া থাকে।

মাতা বা সন্তানের আহারের অনিয়ম, অজীর্ণ, প্রবল ভয়, রাগ, শোক,  
আত্মদ্রাঘতা মনের সমতানাহক কারণ, কিম্বা শিশুর শরীরে আঘাত লাগা  
ইত্যাদি উপলক্ষে এই রোগ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত দস্তোদগম,

ছোট ও বড় কুমি, স্ফোটক বিশিষ্ট চন্দ্ররোগের হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া, অতিরিক্ত হপিং কফ ( Hooping-cough, কানী বিশেষ ), পাকশয়ে পরমা প্রভৃতি অজীর্ণ উত্তেজক পদার্থের অবস্থান বশতঃ এবং হাম বসন্তের পূর্বাহ্নে ও মস্তিষ্কাবর্তন প্রদাহের প্রথম এবং সকল প্রকার সাংঘাতিক রোগের শেষাবস্থায় এই ব্যাধি দেখা দেয় ।

রোগ কখন কখন হঠাৎ হয় ; কিন্তু অনেক সময় অনিদ্রা, অস্থিরতা, হঠাৎ মাই কাম্‌ড়ে ধরা এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া, কান্না, গৌয়ান ; এইরূপ অবস্থায় খানিক থাকিয়া চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত করিয়া ঘুরাইতে থাকা, পরে অঙ্গুলীতে চিড়িকমারা, চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ, মুখের বর্ণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন, দেয়লা করার ঝায় মুহু হাসি, শ্বাসকষ্ট ও পরে ক্ষণ-বিলুপ্ত নাড়ী ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় । তৎপরে হাই তুলিয়া, গা আড়া মোড়া ভাঙ্গিয়া, চক্ষু-গোলক ঘূর্ণিত বা স্থিরাবস্থায় দড়কা উপস্থিত হয় । মুখ বুক বা উদর হইতে খেঁচুনি আরম্ভ হইয়া অশ্রুত বিস্তৃত হয় ।

রোগ মুহু প্রকৃতির হইলে মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর সামান্যতর চিড়িক মারা, এক চক্ষু বিকৃত হওয়া, এক অঙ্গের আক্ষেপ, অথবা পর্যায়ক্রমে উভয় অঙ্গের খেঁচুনি হইয়া থাকে । কঠিন হইলে সর্কান্ধের আক্ষেপ, চক্ষু ঘূর্ণায়মান বা বিকটাকার ও বহির্গত হওয়ার ঝায় দেখায়, অথবা সর্কদা মিট মিট করা ; জিহ্বা এককালে বাহির হইয়া পড়ে বা কখন লম্বমান, কখন সমুচিত হয় ; মুখে গুঁজলা ভাঙ্গা, ঘর্ষ, শ্বাসরোধ, দৃঢ় শুল্কি বাঁধা, হাত পা খেঁচুনি ও ছোড়া, মস্তক এবং বদনমণ্ডল সর্ব প্রথম আরক্ত, পরে কখন কখন সর্কান্ধ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বা লালবর্ণ হওয়া, ইত্যাদি উপদ্রব হয় । বায়ু উদগার ও নিঃসরণ ; মূত্রকচ্ছতা ইহার সঙ্গে সঙ্গে কখন দেখা যায় । কখন কখন মিনিট কতক থাকিয়া রোগ সারে, কখন বা ঘণ্টা কতক থাকিয়া ক্ষণিক বিরামের পর পুনরায় পূর্ব মত তেজে আক্রমণ করে । প্রচণ্ড বা ঘন ঘন হইলে ইহা সাংঘাতিক হইতে পারে ।

ইহার সঙ্গে গাত্রতাপ নাড়ী ক্রত, বা জ্বর ও অচেতন থাকিলে, মস্তিষ্কে প্রদাহের আশঙ্কা হয় ।

ক্রমশঃ খেঁচুনি কম পড়ে এবং একবার কান্নার পর শিশুর পূর্ববৎ সহজ

চেহারা হয়। তৎপরে নিদ্রা যায় এবং প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম হইয়া এককালে নীরোগ হইয়া উঠে।

আক্ষেপ—দড়কা—আঘাত বা পতন জন্ত—আঙ্গুরা, আর্গিকা, বেল, সিকুটা।

— — অঙ্গ স্পর্শ করায়—বেল ; আঙ্গুর, ককু, ষ্ট্রাম।

— — অজানিত কারণ জন্ত—ইগ্নে।

— — অঙ্গীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ বা পেটকাঁপার জন্ত—নক্স।

— — আতঙ্ক জন্ত—আকন, টায়ে, ( ওপি—ঘুমন্ত ) বেল, হাইয়স।

— — আত্ম-মৈথুন বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়দোষ জন্ত—চিন, ফস, ফস-আ, ফেরম, সল্ফ-আ। ( ও মৃগীরোগ )।

— — পাকাশয়ে অগ্ন জন্ত—কামো, নক্স, পল্ফ, বেল।

— — আলোক দৃষ্টে—বেল, ষ্ট্রাম।

— — আহার ( অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য ) জন্ত—ইপি, নক্স, পল্ফ।

— — কান্না ও উত্তেজনা জন্ত—ইগ্নে।

— — ক্রমি জন্ত—ইগ্নে, মার্ক, ষ্ট্রানম, সল্ফর, সিনা, সিকুটা, হাইয়স।

— — ক্ষুদ্র ক্রমি জন্ত—ইগ্নে, সিনা।

— — ঘন ঘন ও উপযূঁপরি—ভেরাট-ভি।

— — জলীয় পদার্থ দেখা বা স্পর্শ জন্ত—বেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স।

— — ঠাণ্ডা জলে অবগাহন জন্ত—রুস।

— — ঠাণ্ডী লাগা জন্ত—কামো, বেল।

— — ও তৎপূর্বে শূল বা পেট বেদনা—কামো, কু প্রম, কু প্রম-আ বেল।

— — ও তৎপূর্বে শরীর বিন বিন করা ( সাড় কমা )—বেল।

— — ও তৎপরে শরীর বিন বিন করা ( সাড় কমা )—নক্স।

আক্ষেপ—দড়কা ও তৎপরে তজ্জা বা অঘোর হওয়া—ইথে, ওপি, কামো,

কাক্ষর ।

— দাঁত উঠা কালীন—কামো, বেল ।

— তদ পানে—নেটুম ।

— নিদ্রাভঙ্গে—বেল ।

— নিয়মিত° ( এক ) সময়ে—ইথে, ষ্ট্রাম, সিকেল ।

— পানের দরুণ—বেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স ।

— ভয় হইতে—ইথে, ওপি, ষ্ট্রাম ।

— মস্তিষ্কের অপ্রকাশ্য রোগ জন্ত—জেলস, ভেরাটিভি, বেল ।

— রাগ হইতে—আকন, ইথে, ককু, পিট্রোল, বেল, ষ্ট্রাকিস, সেপি ।

— রাগে—ওপি, কাক্সা, কু প্রম, সিনা, হাইয়স ।

— বাহিরের বাতাসে থাকায়—কার্বে, নক্স, সার্সা ।

— বিরক্তি জন্ত—কামো ।

— স্ফোটক বা শুটি মস্তকাত্ত বা বসা জন্ত—নাট ।

— সহ উদ্বিগ্নতা—ইথে, কু প্রম, হাইয়স ।

— কামা—আরম, আলুমি কাষ্টিক ।

— চক্ষু খেঁচুনি—কামো, কু প্রম, বেল, হাইয়স ।

— চক্ষুর পাতা খেঁচুনি—ইথে, কামো, বেল, ওপি, হাইয়স ।

— চক্ষু-পুত্তলির বিজ্ঞতি—বেল, ষ্ট্রাম, সিনা ।

— চীৎকার—বেল ; ইথে, ওপি, কাষ্টিক, লাকাসি, হাইয়স ;  
ইপি, নক্স, প্রম, ভেরাট ।

— দাঁত কিড়মিড়—কাষ্টিক, সিকুটা, হাইয়স ।

— বদন কাল্‌চেয়ারা—ইথে, ওপি, হাইয়স ।

— বদন খেঁচুনি—ইথে, ওপি, কামো, বেল ।

— বদন পাঙ্গাশ বর্ণ—ইপি, সিকুটা, সিনা ।



আক্ষেপ—দড়কা—বদন পর পর পাক্সাশ ও লাল হওয়া—ইথে, কামো।

- — বদন ক্ষীত—বেল ; কামো, কাম্ফর, হাইয়স, ইপি।
- — বমন—কুপ্রম, কুপ্রম-আ, নক্স ; ইপি ভেরাট।
- — মুখে গাঁজা ভাঙ্গা—হাইয়স ; কুপ্রম, বেল, লাকাসি, সিকুটা।
- — হাত মুষ্টি বাঁধা—ইপি, ওপি, কামো, বেল, হাইয়স।
- — হাঁপানি—আক্সিট্রা, ইথে, ওপি।
- — হাসি—ইথে, ক্রোকস, বেল।
- — হাম বসন্তের পূর্বাঙ্কে—আকন ও কফি পর পর।
- — হাম বসন্ত হঠাৎ বসে যাওয়া পক্ষে—বেল, ব্রাই, পর পর।
- — ছপিং কাশী জন্ম—করেলিয়া-ক্ৰ।

হঠাৎ ভয়ের দরুণ হইলে ওপিয়ম ; কিছুকাল বিলম্ব হইলে পর—আকন, হাইয়স, বেল।

হঠাৎ রাগের দরুণ—কামো।

বিরক্তি বশতঃ হইলে—কামো।

শোক বশতঃ—ইথেসা, ফস-আসিড।

পড়া বা আঘাত দরুণ হইলে—আর্গিকা এবং আবশ্যিক মতে ইহার পর—বেল বা সিকুটা।

অতিরিক্ত আহার বা অজীর্ণ বশতঃ রোগে—ইপিকা, নক্স, পল্‌স।

পেটে অগ্নির দরুণ—কামো, নক্স, পল্‌স।

বড় ক্রমি দরুণ—সিনা, ২০০ ক্রমের ; হাইয়স, ষ্টানম, মার্ক, ইথেসা, সল্‌ফর।

ক্ষুদ্র ক্রমি দরুণ—সিনা ২০০ ক্রমের ও ইথেসা।

ছপিংকফ ( হাঁপকাশী ) দরুণ—করেলিয়াক্রবা।

মস্তক বা তদাবর্তনের দাহ বশতঃ হইলে—বেল।

হাম বসন্তের পূর্বাঙ্কের দড়কা পক্ষে—কামি ও আকন পর পর।

হাম বসন্ত হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার দরুণ দড়কায়—বেল ও রাই।

অন্ত রোগের আনুষঙ্গিক না হইলে কেবল এই মাত্র পীড়ায় ডাক্তার তেস্ত হেলবোর ১৫ মিনিট অন্তর দেন।

দড়কা হইতে মৃগীরোগ উপস্থিত হইলে, এক মাস কাল পর্য্যন্ত প্রাতে ওপিয়ম দুই মাত্রা এবং অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় দুই মাত্রা বেল দিবা; দ্বিতীয় মাস পড়িলে প্রাতে দুই বার ওপিয়ম ও বৈকালে দুই বার সিকেল দিয়া ডাক্তার তেস্ত অনেককে রোগ মুক্ত করিয়াছেন।

দড়কা হইলে স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় অঁস চুপড়ির জল খাওয়াইয়া দেন। ডাক্তরেরা এ অবস্থায় জোলাপ ব্যবস্থা করেন। অথবা শুক্লপাক, ও অধিক আহ্বারের দরুণ রোগ হইলে অন্ন উষ্ণ জল পান দ্বারা বমন, কিম্বা জল বা তুধের পিচকারী দিয়া বাহ্যে করাইলে ব্যাধির শমতা হয়।

দড়কা উপস্থিত হইলে, সহ্য হয় এরূপ গরম জলে ৫।১০ মিনিট হাঁটু অবধি ডুবাইয়া রাখিবা, নরম পড়িলে শুষ্ক বস্ত্রে মুছাইয়া সমুদয় শরীর ফ্রানেল বা অল্প গরম বস্ত্রে ঢাকিবা, ইহাতে ঘর্ষ হইয়া রোগের প্রতিকার সম্ভব। প্রথম চেষ্টায় ফল না দর্শিলে, অথবা শীঘ্র ইহার পুনরাক্রমণ হইলে পূর্বমত পা ডোবান ও যে অবধি চেতনা না হয়, মাথায় ১ বা ১।১০ হাত উর্দ্ধ হইতে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবা। প্রথম চেষ্টা নিফল হইলে নিরাশ বা ক্ষান্ত হইও না, কখন কখন পুনঃ পুনঃ এইরূপ করার পর সিদ্ধ হওয়া যায়।

অতিরিক্ত শারীরিক উত্তাপ, মস্তিষ্কে রক্ত উঠা, দাঁত উঠার সময়, মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের উপদাহ, মূত্রাশয়ের পীড়া, ক্রমি, অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধতা বা ওলাউঠা হইলেও শিশুর দড়কা হয়।

আকন—ভয় জন্ত রোগ এবং ওপিয়ে প্রতিকার না হইলে; অথবা সর্দি, মেরুদণ্ডের প্রদাহ, দাঁত উঠা ও ক্রমি জন্ত দড়কা। খুব জ্বর, ঘুকের শুষ্কতা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, দাঁত কিড়মিড়ি ও আক্ষেপযুক্ত হিকা, অথবা শিশুকে স্পর্শ করিলে বা নাড়িলে ব্যথা বোধ, হাত পা কাঁপুনি—বিশেষ রাত্রিকালে, চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বা পরে শরীর শক্ত, চোয়াল ধরা, চক্ষু বিকট, ও বদন কখন লাল কখন ফেঁকাসে হওয়া।

আগারিকস—পেট খেঁচুনি ও বেন সমস্ত শরীরের কাঁপুনি; দড়কা, এডো-

এড়িঁবা কোণাকোণি অঙ্গের, যেমন ডান হাত ও বাম পা, কাঁপুনি। সোজা চলিতে না পারা, পথে ছমড়ি খাওয়া, হাত দেধরিতে গেলে প্রায় ফড়িয়া যাওয়া, মৃগী, পুনঃ পুনঃ ও প্রতিবার অধিক ভেজে রোগের আক্রমণ, শেষে ক্রমশঃ কমা। চক্ষুর পাতার নৃত্য; হাত ও পায়ের আঙ্গুল চুল্কনা, জালা ও লাগ হওয়া। জাগন্ত শিশুর অঙ্গ অনিচ্ছাধীন চালনা, নিদ্রিত অবস্থায় ওরূপ ভাব যাওয়া।

আপিস—দড়কা, চীৎকার, বালিসে মাথা গৌজড়ান, মস্তিষ্কের প্রদাহ বশতঃ রোগে।

আমিল-নাই—প্রসবের পরক্ষণই অঙ্গ খেঁচুনি (ইহার ঘ্রাণ লওয়া)। মৃগী, একটা আক্রমণ শেষ না হইতে অপরটার উপস্থিত হওয়া। সমস্ত পেশীর আক্ষেপ।

আর্গিকা—পড়া বা আঘাত দরুণ দড়কা। ঔষধ খাওয়া ভিন্ন ইহার ১০ ফোটা আদত আরোক এক ছটাক জলে দিয়া ঐ আরোক দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত স্থান প্রত্যহ এক বা দুইবার ধুয়াইবা।

আটিমিসিয়া—বিশেষ দাঁত উঠা কালীন এবং একটার পর আর একটা, এইরূপ খুব ঘন ঘন আক্ষেপ। কুমির দরুণ রোগ (ষ্টানম, সিনা); মৃগীতে অধিক ব্যবহার্য্য, ৩ হইতে ৫ সপ্তাহ অন্তর রোগ প্রকাশ, একটা চক্ষুর পুতলির বিস্তৃতি, জিব ছেঁড়া, আঙ্গুল পঁজ করা, ঘন ঘন প্রচণ্ড আক্ষেপ, বিশেষ দিবসে, ও অচেতন হওয়া এবং ঐ সঙ্গে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘাম থাকিলে অধিক খাটে। নব যুবতীর প্রথম ঋতুকালীন মৃগী পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্স—দাঁত উঠার সময়ে বা দুর্বল শিশুর কাটকাটা গাত্রতাপ, মৃগী দিন বা রাত্রে প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর, যথা নির্দিষ্ট সময় রোগের প্রকাশ, অথবা বেদনা বা অসুখ, গরম বাতাস স্পষ্ট উর্দ্ধে মস্তিষ্কে তাড়া দিয়া উঠা ও অজ্ঞান (Stupor) হইয়া পতন এবং চৈতন্ত হইলে কষ্ট যাওয়া, কিন্তু কেবল অবসন্নতা থাকা। বৈকালে দাঁড়া জালা, প্রজাব-দ্বার জালা, পায়ের ডিষে পুনঃ পুনঃ খাল-ধরা, পা ছড়াইয়া ফেলা, হাতে খেঁচুনি হইয়া পেছন দিকে পড়া, পরে চীৎকার, এগোড় ওগোড় করা ও হাত ছোড়া এবং বুড়া আঙ্গুল বিস্তৃত রাখিয়া দৃঢ় মুষ্টি বাধিয়া স্নায়ু দিকে নত হইয়া পড়া, ঐ সঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা, অন্ন অন্ন পুনঃ পুনঃ

পান ; উদরাময় ; কিছু খেলেই তুঙ্গে ফেলা, ঘন ঘন আক্ষেপ এবং কিছুতেই শান্ত না হওয়া । মৃতবৎ, শরীর গরম ও বিবর্ণ, ক্ষণনুপ্ত শ্বাস, মুখের ছই কোণ পর পর বক্র হওয়া, পরে সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিয়া শ্বাস ও চেতনা হওয়া, অধিকক্ষণ অন্তর এইরূপ হইয়া শেষে মৃত্যু হয় ; কিন্তু সময়ে এই ঔষধে প্রতিকার সম্ভাবনা ।

আসাফাটিডা—শিশুর ক্রমি বা উদরের স্নায়বিক বিশৃঙ্খলতা জন্ম দড়কা বা মৃগী দেখা দিলে ।

আর্স-আই—শিশুর মূত্রাঙ্গের পীড়া জন্ম ও প্রস্রাব অত্যন্ত হইলে শিশু বা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বামার আক্ষেপ ও টঙ্কারের খেঁচুনি, বিশেষ ঘুম আসিবার সময়ে ; বদন টেড়া বাঁকা—বিশেষ বায়ুগ্রস্তের । শিশুর অঙ্গ শীতল, একদৃষ্টে চাউনি, মাঝে মাঝে চীৎকার, ভুভুদ্রবা বমন । মৃগী, অজ্ঞান ও আক্ষেপ জন্ম দম আটকান প্রায়, কষ্টে গেলা, মাথা পেছনে ফেলা, অঙ্গ খেঁচুনি বিশেষ বদন এ ঠোঁটের ; এক গাল লাল অপর শাদা—অথবা পর পর ঐরূপ হওয়া, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা ।

ইগ্নে—বিশেষ মাতার শোক, ভয়, প্রবল মানসিক উত্তেজনার পর নিজের, কিম্বা স্তনপায়ী শিশুর দড়কা বা মৃগী ; রক্ত, দুর্বলকায়, খুঁতখুঁতে ও ক্ষণঃ পরিবর্তনশীল স্বভাব বিশিষ্টের ক্ষেপে, অথবা ব্যাধির কারণ অল্পভব করা যায় না, এমন স্থলে ইহা প্রযুক্তা ; প্রত্যহ বা একদিন অন্তর নিয়মিত সময়ে রোগের অ্যক্রমণ । ঘুমন্ত হঠাৎ চমকান, ক্ষান্না ও চীৎকার ও কাঁপা, বদন অত্যন্ত পান্নাশ ( ওপিতে খুব লাল ) হইলে ; এক এক অঙ্গের বা সমস্ত পেশীর এক লাগাড়ে খেঁচুনি ; অচেতন ও অনিচ্ছাধীন কান্না বা হাসি । ভয় হইলে, ক্রমি থাকিলে, ক্ষোটকে, অরের আরম্ভে, বাতাধিক্যে এবং বালককে শাস্তি দিবার পর নিদ্রাভঙ্গে প্রচণ্ড দড়কা ও টঙ্কারের ন্যায় খেঁচুনি ও সদা হাই তোলা । হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ, বিশেষ ঐ সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস থাকিলে ।

ইথুগা—শিশুর শীর্ণ ও হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হওয়া, বৃদ্ধা আঙ্গুল চেঁচের দিকে সঁধন, মৃগী ; নাভি প্রদেশ হইতে উজ্জ্বা (Aura) উঠা, অচেতন, চোয়াল ধরা, নাড়ীর ক্ষুদ্রতা, কাঠিন্য় ও দ্রুত ভাব, এবং আক্রমণ কালে ত্বকের হরিদ্রাবর্ণ । বদন লাল, চক্ষুগোলকের অধোগমন ( মৃগীতে উর্দ্ধগমন ) ও তাহার পুত্গুলি

স্থিরতা ও বিস্তৃতি, মুখে শাদা গাঁজলা ভাঙ্গা এবং প্রচণ্ড অঙ্গ-খঁচুনি হইলে।

ইপি—অতিরিক্ত বা গুরুপাক আহার জন্ম, অথবা ঠাণ্ডী দরুণ হামাদি ফোটক-জরে গুটা বসিয়া গেলে, শিশুর দড়কা, বদন পাঙ্গাশ, সদা গা বমি বমি, বমন ও সবুজ ভেদ, হাঁপানি, আড়াভাঙ্গা ও শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ। অবচার জন্ম বমন হইতে থাকিলে কিঞ্চিৎ বয়স্কদের গরম জল ও তাহার সঙ্গে অল্প লবণ মিশাইয়া খাওয়াইয়া অল্প তুলিয়া ফেলাইলে বমি ও আক্ষেপ উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। মৃগী সহ অঙ্গ খঁচুনি থাকিলে।

এস্থলস—মৃগী ; সামান্য আক্ষেপ সহ চেতনাহীনতা (Stupor) ও ভেবাগঙ্গা-রামের চেঁহারা, রক্তহীনতা, কখন কখন হাত মুঠাবাঁধা, চক্ষু-পুত্তলির বিস্তৃতি, একদৃষ্টি চাউনি, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, চোয়াল ধরা, প্রদর, অধিক বা কষ্টকর রক্তস্রাব হইলে।

ওপি—প্রসূতীর রাগ বা ভয় জন্ম অথবা নবপ্রসূতের আতঙ্ক জন্ম রোগ। দড়কা কালীন বা পূর্বে চীৎকার, বদন ক্ষীত, কাল্চে বর্ণ, স্বাসকষ্ট, সর্কাজ কাঁপুনি, হাত পা এদিক ওদিক ফেলা, ফেল ফেল করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি, কান্না, অঘোর হইয়া নাক ডাকান এবং সর্বশেষে অচেতন ও শৌচ প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। বালকের শারীরিক সাজা পাইবার পর শরীর শক্ত এবং মুখ ও বদনের পেশীর খঁচুনি ; মাতা হঠাৎ ভয় পাইয়া তদগে মাই দিলে শিশুর বদন ক্ষীত ও গাঢ় লাল, চক্ষু উপরে উত্থিত ও আক্ষেপযুক্ত হয়। থেকে থেকে দড়কা এবং বিরামকালে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক ডাকা, গাত্রে হেথা সেথা কাল্চে দাগ।

ককু—সর্বশরীর খঁচুনি, তলপেটে খাললাগা, বদন লাল ও গরম (বেল সহ পর পর) বামার ঋতুকালীন বা আঘাত বা পতন জন্ম মৃগী হইলে।

কফি—মাতার অত্যন্ত আফ্লাদ (ও তৎকালে মাই দেওয়ায়) অথবা সম্ভ্রান্তের দুর্বলতা ও অতিরিক্ত হাঙ্গ বা আমোদ বশতঃ দড়কা হওয়া (শিশুকে অথবা হাসান সর্বতোভাবে অসুচিত), বায়ু বা স্নায়ু প্রধান ধাতুর সর্কাদা দড়কা হওয়া ও বিশেষ কারণ না বুঝিতে পারিলে ইহা দেওয়া বিধি।

কামো—মাতার রাগ বা বিরক্তি জন্ম স্তন্যজীবীর রোগ, দাঁত উঠা, ঠাণ্ডী লাগা, পেটে অঙ্গ হওয়া, বার্ত ও রক্তাধিক ধাতু এবং হামাদির পর দড়কা

ব্যবহৃত হয়। এক অপেক্ষা অপর গাল গাঢ়বর্ণ, অর্ধমুদ্রিত চক্ষু, ঝিগন, নিদ্রিতা-বস্ত্রায় বদনের পেশীর চিড়িক মারা, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, আক্ষেপাবস্থায় নিয়ত গৌণান, চেতনাশূন্যতা, গলা ঘড়ঘড়ানি, দ্রুত ও শব্দযুক্ত শ্বাস, চক্ষুগোলক ঘুরণী, দৃঢ় মুঠা বাঁধা, মাথা এগোড়ওগোড় করা ও তথাকার চুল মধ্যে গরম ঘাম হওয়া, পেট ব্যাথা ও ফুলা, সবুজ তেদ, টক বমন, ঘুমন্ত দেয়ালা দেখা, ( মুচকে মুচকে হাসি ) ও জাগ্রতাবস্থায় কোলে করিয়া বেড়ানয় ভাল থাকা। অজীর্ণ জন্ম রোগ ; চক্ষুর পাতা ও বদনের পেশীর চিড়িক মারা, একপ্তয়ে খাঁত-খোঁতে ও রাগান্বিত হওয়া। শিশুর সর্বদা পেটে শূল ব্যাথা ও টক বমন হইয়া মৃগী হইলে।

কান্দুর—দাঁতকপাট লাগিলে বা সমস্ত শরীর কাঠের জায় শক্ত ও সর্কাস্ত্র নীত হইলে কিম্বা সর্দি বন্ধ দরুণ দড়কায় বা অথ কোন উপযুক্ত ঔষধ নিকটে না থাকিলে ইহা ( কপূর ) ব্যবহার্য্য। যে পর্য্যন্ত রোগের প্রচণ্ডতা না যায়, মাঝে মাঝে ক্ষণকাল আরোকের শিশি নাকে ধরিবা, অথবা এক ফোটা আরোক একটু চিনিতে ফেলিয়া যে অবধি উপকার না হয়, উহার একটু একটু অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাকিবা। দাঁতকপাট লাগিলে, আরোকের ঘ্রাণে প্রতীকার না হইলে, উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দাঁতেষু মাড়িতে ঘসিতে থাকিবা। দড়কা সহ মৃগী, মাথার সন্মুখভাগ বা ব্রহ্মরন্ধ্র বসিয়া যাওয়া, বদন লাল ও স্ফীত, সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস, সর্বশরীর ঠাণ্ডা ও তন্দ্রা থাকিলে।

কালী-কা—বহু উল্কার হইয়া আক্ষেপের সমতা হইলে।

কান্ধা—ঋতুকালীন বা তাহার প্রাক্কালীন মৃগী। ভয়, দীর্ঘ পালা জ্বর, চর্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়ার জন্ম পীড়া, ও পূর্ণিমায় বিরক্তি, ঠাণ্ডা জল পানে ও পা দোলানয় বৃদ্ধি। আক্রমণের পূর্বে মুখনাড়া, হৃদয়ে বেদনা ও ঘড়-ঘড়ানি, যেন তাহার মধ্য দিয়া বা কড়ার নীচে দিয়া পার পাতায় কোন পদার্থ নামা, আক্রমণের পর মাথা ধরা, মাথা ঘোরা ও ঘাম, অতিশয় তৃষ্ণা ও ক্ষুধা ; বমন, তেদ। প্রচুর আহারে শরীর শীর্ণ, প্রচুর রজঃ, গলার বীচি আওরান। গওমালাধাতু, যাদের দাঁত খুব শীঘ্র কিন্তু অধিকাংশ সময় বিলম্বে উঠে, মাথা বড়, দেহিতে ব্রহ্মরন্ধ্র বোড়া লাগা, ঘাড়ের বীচি ফুলা, নিদ্রায় মাথা অধিক

ঘামা, পেট ভাগর ও শক্ত, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, এমন সকলের দস্তোদগম কালীন দড়কা, বিশেষ বেলের পর ভাল খাটে।

কান্দা-আ—মৃগী আক্রমণের পূর্বে হৃৎপিণ্ড বেদনা ও চাপা।

কাষ্টিক—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেঁচুনি, দাঁত কিড়িমিড়ি, হাসি ও কান্না; অনিচ্ছাধীন বা পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব; গা গরম, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; ঠাণ্ডা জল লাগায় পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ। উপর অঙ্গের দড়কা, সন্ধায় নিত্রাকালীন আক্ষেপ, চক্ষু বিকট, গা বরফবৎ।

ক্রিয়োস—দাঁত উঠা কালীন মাড়ি ফুলিয়া দড়কা; নেবা ও দড়কা।

কুপ্রম-আ—স্ফোটক-জরে গুটা বসা জন্তু দড়কা।

কুপ্রম-মে—দড়কার পূর্বে শ্লেষ্মা বমন এবং বিরাম ও পুনঃ আক্ষেপ; আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত বিমন ও ভোমামারা, আক্ষেপ কালীন চীৎকার করিয়া কান্না, ছটফটানি ও অঙ্গ বক্র করা, পেট কোলা ও অনিচ্ছাধীন বাহে হওয়া। কান্নায় বেদম হইয়া পায়ের পাতা তোলা পাড়া করা। লুকাইবার ইচ্ছা; স্বর-লেট বা আরক্ত জরের গুটা অন্তর্হিত হইবার পর দড়কা, ঘুম ভাঙ্গার পর বাতনা বৃদ্ধি। পানীয় গিলিতে গেলে (Girgling) শব্দ হওয়া। মৃগী, অতিরিক্ত খেঁচুনি, এবং শিশু বিশেষ ক্ষতিকারক হইলে।

ক্রোকস—দড়কা সহ হাসি ও লাফান। দড়কা ও হৃৎপিণ্ড কাশি পর পর।

মোনিন—মৃগী আক্রমণের পূর্বকালীন মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয়, তথায় পূর্ণতা বোধ, কাণ মধ্যে শব্দ, বুক ফাটিয়া পড়িবেক বোধ, হাত পায়ের অঙ্গুলি খেঁচুনি ও ছরকুটে পড়া। মাথায় রক্ত সঞ্চার জন্তু শিশুর দড়কা; খেঁচুনি সহ মাথা ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চয়, বদন পর পর লাল ও ফেঁকাসে হওয়া, হাতের আঙ্গুল সব ছরকুটে পড়া (সিকেল)। প্রসববেদনা কালীন দ্রুতক্ষেপ, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, অচেতন, হাত মুঠাবাঁধা ও বুড়া আঙ্গুল চেষ্টার মধ্যে প্রবেশ করান। দাঁত উঠা কালীন দড়কা এবং বেলের লক্ষণ সঙ্গত। মস্তিষ্কের বিল্লি প্রদাহের সূত্র আরম্ভে ও স্থলকায় শিশুর রোগ পক্ষে।

জিজিয়া-আ—দীর্ঘকালের মৃগী; বিরামকালীন হতাশ। গাল ও ঠোঁঠ চুলকুনির পর, অজ্ঞান, আক্ষেপ ও খেঁচুনি, বিশেষ ডান দিকের; বমন, বদন পান্নাশ ও ফুলা বা গাল লাগি ও গরম, কামাতুরতা; জ্বীলোকের প্রদর, ও ঋতুর গোল।

জেলস—ঋতু বদ্ধ দরুণ মৃগী, গলা ধরা । আক্রমণের পূর্বে মাথার পেছন দিকে পূর্ণতা ও বেদনা এবং ইহার পর কপাল ও ব্রহ্মতালুর জড়তা (Dull-feeling) । দাঁত উঠা কালীন দড়কা, হঠাৎ চীংকার ; অর-বোধ, মাথা-ভার ; আক্ষেপকালীন বদন লাল ও ঘাড়ের শিরার সজোরে স্পন্দন এবং আক্ষেপ অবসানে ভোমামারা । মস্তিষ্কে পীড়া জন্ম রোগ । ( প্রসববেদনা কালীন ১২ ঘণ্টায় ৩৭ বার দড়কা, গুহ দ্বার অল্প মাত্র ফাক হওয়া, ও জল না ভাস্কা প্রভৃতি উপসর্গে ২০ মিনিট অন্তর ইহা প্রয়োগে এক ঘণ্টায় প্রসব হইতে দেখা গিয়াছে ) । পাকশয়ের উপদাহ জন্ম পীড়া ।

টার্ট-এ—বসন্ত হাম প্রভৃতি স্ফোটক-রোগের স্তূটি বসিয়া যাওয়া দরুণ দড়কা ও শ্বাস-কষ্ট এবং ত্বক পাকশ বর্ণ ।

নল্ল—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণতা ও পেশীর অধিক চিড়িক মারা । মাতার অধিক সুরা বা কাওয়া পান বা গুরুপাক আহার জন্ম স্তন্যজীবীর পীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, চেকড়ান, অঙ্গ খেঁচুনি ও মাথা পেছন দিকে ঝাঁকান এবং রাগ বা বিরক্তি হইলে পুনঃ রোগের প্রকাশ । শিশুর দাঁত উঠা বা জন্ম মতের অধিক ঔষধ ব্যাধার বা অজীর্ণতা বা পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় বশতঃ দড়কা পক্ষে ; প্রত্যহ ২০।৩০ বার অঙ্গাঙ্ক্ষেপ ও তৎকালে অতিরিক্ত ক্ষুধা, হাত মুঠা, বাঁধা, সদা কান্না, মাথা এগোড়\*ওগোড় করা এবং কখন বা গলার বীচি আওরান, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা । সূর্য্যোদয়ে দড়কা ; চক্ষু, চক্ষুর পাতা ও মুখ খেঁচুনি, বদন চোপ্পান, আক্ষেপের পর চিত থাকে । পায়ের পাতা স্পর্শে দড়কা । বিরাম কালে বমন, প্রচুর ঘাম, কোষ্ঠবদ্ধতা, বদ মেজাজ, চটা । মৃগী—বহুদিনের—প্রথমতঃ রাগ হইতে উৎপন্ন, চক্ষুফুলা, কাণমধ্যে শব্দ, মুখ শুষ্ক, পেট ফাঁপা, হাত পায় ঝিঁঝি লাগা, মাথা ঘোরা ও পশ্চাত্তানে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে ।

নাইট্রেট-আফ আমিল—মৃগীর উপক্রমে অর্থাৎ যখন উয়ার ( Aura ) গতি অনুভব হয়, তৎকালে এই আরোকেয় ছিপি খুলিয়া নাকের গোড়ায় ধরিলে রোগ প্রকাশ না হওন সম্ভব ।

পড—দাঁত উঠা কালীন পাঁচ রঙ্গা হড়হড়ে ভেদ, দড়কা, মাথা এগোড় ওগোড় করা ( কল্চি ) ।



পাসিফোরা-ইন—বিশেষ গরম দেশের টঙ্কার পক্ষে ।

প্লাটিনা—অনতিদার্য বয়স্কদিগের আত্মমৈথুন জন্ত শীর্ণতা ও দড়কা (কল্টি) ; শিশুর দাঁত উঠা কালীন চোয়াধ ধরা, অঙ্গ খেঁচুনি ও টঙ্কারের জ্বাৰ হওয়া, তৎপরে চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং কসের আক্ষেপ, পা উচু ও ফাক করিয়া চিত হইয়া থাকা, খুব সকালে রোগের আক্রমণ, বিশেষ বদনের পেশীর খেঁচুনি এবং স্পষ্ট বাক্য কহিতে অক্ষমতা, এককালে শূন্যতা না হওয়া ।

ফাইটোলকা—চিবুক বৃকের দিকে টানা (বেল), টঙ্কার, দাঁতকপাটি, ঠোঁঠ উলটান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত, হাত মুঠা বাঁধা, পার পাতা ছড়ান ও আঙ্গুল বাঁকান ।

বেল—মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্ত পীড়া, ঘুমন্ত চমকান, শিশুর আক্ষেপ, বদন আরক্তিম ও চক্ষুর পুতলির বিস্তৃতি ও কোঁদে কোঁদে উঠা, গোঁড়ান, অঙ্গ চিড়িক মারা ; অথবা একদৃষ্টি চাউনি, চক্ষুর পুতলির বিস্তৃতি, আলোকে আতঙ্ক, সমস্ত শরীর বা অঙ্গবিশেষ কাঠবৎ ও ঠাণ্ডা সহ হাত ও কপাল জ্বালা, বদন ও চক্ষু আরক্ত এবং বিকট, হাত পা ছোড়া, স্বক গরম ও শুষ্ক, মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ, রোগের অবসানে তন্দ্রা এবং আক্রমণের পূর্বে মুচুকে মুচুকে বা খল খল করিয়া হাস্য, ঘন ঘন দ্রুত শ্বাস, নাক ডাকা, বুক মুখ চাপা, চেতন প্রাপ্তে অসাড় শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও গাত্র স্পর্শে পুনঃ দড়কা ; এবং সন্ধ্যা ও রাত্রে আক্ষেপ প্রবল হওয়া । স্থলকায় এবং সূচত্বর ও সুবোধ শিশুর এবং যে ঘুমন্ত চমকায় তাহার অধিক খাটে । দাঁত উঠা কালীন দস্ত কিড়মিড়ি শ্বাসনালীর আক্ষেপ, বদন ও মুখ খেঁচুনি এবং গলা ও অগ্ননালীর আক্ষেপ জন্য দম আটকানর আশঙ্কা ও গিলিতে কষ্ট হইলে ; ঘুম ঘুম, বদন চকচকে ও লাল এবং তথায় প্রচুর ঘাম বা শুষ্কতা ও উত্তাপ । মৃগীতে ব্যবহার্য ।

ব্রাই—হাম বা বসন্তের গুটি বসার দরুণ দড়কা এবং চেতনাহীন অবস্থায় ইহা ও বেল অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পর পর এবং ঠাণ্ডা জল সরু ধারাবীতে দিবা । দুই ঘণ্টায় প্রতীকার না দেখিলে বেল ও কুপ্রম পর পর এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে ষ্ট্রাম ও কুপ্রম, পূর্বমত এবং সর্বশেষ লাকাদি ও সলফর পর পর দেওয়া বিধি ।

ভিক্স—অধিক রজঃ ভাঙ্গা সহ মৃগী ।

ভেরাট—হঠাৎ মনের প্রচণ্ড উত্তেজনা জন্ম রোগ, বদন ঠাণ্ডা ও নীল, কর্ণালে শীতল ঘাম, এককালে শিশুর আক্ষেপ ও উদরাময়, (গর্ভাবস্থা বা প্রসবের পর অঙ্গ-খঁচুনি ।)

ভেরাট-ভি—দাঁত উঠা কালীন উপযুপরি ঘন ঘন মুচ্ছা । উদরাময়ে রক্তহীনতা দরুণ দড়কা ও টঙ্কার । মৃগী—পূর্বে উপসর্গ ভিন্ন—গাঁজা ভাঙ্গা, সকল পেশীর ভয়ানক খঁচুনি ।

মক্ষস—থেকে থেকে প্রচণ্ড অঙ্গ খঁচুনি, টঙ্কার, হাত ও পায়ের পাতা শক্ত ও ছোড়া, পরে সেই অঙ্গে অতিশয় বেদনা । হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তের মৃগী ।

সিমিসি—জরায়ু বা ডিম্বকোষে উপদাহ জন্ম মৃগী, বিশেষ রক্তঃ-ক্ষালীন, অথবা বাতরোগ সন্নিহিত হইলে । দৃষ্টির ভ্রম, কর্ণমধ্যে শৌ শৌ শব্দ হওয়া ; হঠাৎ, পা, মাথা, বদন, জিভ ও সমস্ত পেশীর খঁচুনি, নাড়ী মৃদু হ্রস্ব হওয়া ।

মার্ক-আইড—শিশুর প্রস্রাবের অল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে । •

মার্ক—কুমি দরুণ ও রাতে দড়কা, নাক চুলকুনি, মাড়ি ফুলা, লালাভাঙ্গা ও উদগার, পেট স্ফীত ও শক্ত, সবুজ ভেদ, হাত পা খঁচুনি ও ছোড়া, শরীর কাঠবৎ, জ্বর, কান্না এবং আক্ষেপের পর নির্জীব হওয়া ।

লাকাসি—জাগন্তু ভাল থাকে, কিন্তু কি দিবাভাগে কি রাত্রিকালে নিদ্রাকালীন দড়কা, ( বা অপর রোগ ) দুই প্রহর রাত্রের পর ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার, কান্না, হৃৎকম্প, গোঁড়ানু ও প্রবল খঁচুনি, বিশেষ মুখপেশী এবং শরীর কাঠবৎ শক্ত হওয়া । কাদিতে কাদিতে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া, বদন ফেকাশে, মুখে ফেনা, বক্ষঃস্থলের স্পন্দন, পেট স্ফীত, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, তন্দ্রা । ইহা মৃগী তেও ব্যবহার্য্য ।

লারো—আতঙ্কের পর দড়কা । আক্ষেপকালীন বা পূর্বে কিম্বা পরে খাবি খাওয়ার ত্রায় স্বাস প্রস্থান, খঁচুনির পর সমস্ত পেশীর পক্ষাঘাত । অঙ্গ খঁচুনি, ত্বক্ কালচে, খটখটে দৃষ্টি, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, দাঁতকপাটি, আক্ষেপকালীন শরীর মধ্যে যেন তাড়িত হানা ।

ষ্টামগ—কুমি জন্ম জ্বর ও দড়কা । প্রতি দণ্ড নির্গমন সময়ে হতচেতন, বদন পাক্রাশ ও ক্রত আক্ষেপ হওয়া—বিশেষ সন্ধ্যার সময় ।

সাইপ্রিডিয়ম—মস্তিষ্কের উপদাহ, অনিদ্রা, ঘুমন্ত হাসি। অসময়ে হাসি ও খেলা।

সিকুটা—হঠাৎ কাষ্ঠবৎ হইয়া যাওয়া ও এক দৃষ্টি চাহনি। মাথা ও উর্দ্ধ অঙ্গের প্রচণ্ড আক্ষেপ। মাথা পেছন বা স্মৃগ্ধ দিকে ঝাঁক। ক্রমি জ্বর রোগ। দড়কার পর নেতিয়া পড়া।

হেল—ভয়ানক অঙ্গ খেঁচুনি ও শরীর অতিরিক্ত গীতল হওয়া; অর্ধ মুদ্রিত চক্ষু, শিবনেত্র, নিব্বান, মধ্যে মধ্যে চোংকার করা ও ঝাঁকে উঠা। নির্দিষ্ট অবস্থায় পেশীর চিড়িক মারা, মস্তিষ্ক মধ্যে যেন তাড়িতের গতি, পরে শরীর চালনা; ঝাঁইভাজার গুঁড়ার ছায় প্রস্রাবে তমানি পড়া।

হাইয়স—মৃগী ও অজ্ঞানতা; শরীরের অস্থিরতা; সর্বাস্পের—মাথা হঠতে পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্য্যন্ত—সকল পেশীর খেঁচুনি, এক লাগামে আক্ষেপ; শিশুর দড়কা, ভয়ের দরুণ বা আহ্বারের পর। শিশুর ঘুমভাঙ্গার পর ক্ষুধা, বদন কাল্চে, গাজাভাঙ্গা, জিভ কামড়ান। ক্রমি, প্রসববেদনার সময় বা ঝাঁতুড়ে অবস্থার অঙ্গখেঁচুনিতে অধিক ব্যবহার্য। বেলের ছায় ইহাতে মস্তিষ্কের পউসর্গ দেখা যায় না। অঙ্গসমূহের তেড়া ঝাঁক গতি—প্রথম এক, পরে পরে অপরাপর অঙ্গের উৎক্ষেপণ। কোন অঙ্গের শেষভাগের আক্ষেপ, অতিরিক্ত খেঁচুনি, ধুইকাঁটার ছায় হওয়া। ঘুমন্ত অঙ্গ চিড়িক মারা, চমকান, মাথা ভার, খুঁতখুঁতে স্বভাব, মুখ কাঁপা ও গাঁজা ভাঙ্গা, দাঁত কিড়মিড়ি, চেকড়ান, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব ত্যাগ, অথোর নিদ্রা ও ঘড়ঘড় শ্বাস, পান করিতে গেলেই দড়কা। Choreaতে খাটে। হুর্লতা, চলিতে পা টলমল করা, দূরস্থ পদার্থ নিকট বোধে উহা ধরিতে যাওয়া। বাহাদের দড়কার ধাতু, যথা—সর্বদা অস্থিরতা, চেকড়ানি, পেটের গোল, জিভ অপরিষ্কার, হুর্গন্ধ নিঃশ্বাস, তাহাদের পক্ষে হুর্ধের সঙ্গে অল্প অল্প বাথারি চুণের থিতন জল (Lime water) দেওয়ায় বিশেষ ফল হয়। রোগাক্রমণ কালীন গাত্রাবরণ সকল খুলিবা, মাথা উচ্চ রাখিবা, বদনে মাঝে মাঝে জলের ছিটনি মারিবা ও বিশুদ্ধ টাটকা বায়ু সেবন করিতে দিবা এবং মাথায় সর্বদা ঠাণ্ডা জলের পটা দিয়া রাখিবা।

হাইড্রোসাই-আ—বদন, চোয়াল ও পীঠের আক্ষেপ, শরীর নীল বা কাল্চে

বর্ণ হওয়া। চীৎকার করিয়া হঠাৎ পতন, চোয়াল ধরা, গলা ঘড়ঘড়ানি, মুখ বিকৃতি, অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়ী, ভয়ঙ্কর চেহারা, চক্ষুর পুত্তলি বিস্তৃত, গলা ফুলা, শরীর শক্ত, পেট ফীত। হতাশ বা চটা ও বিরক্ত। কখন কখন আক্রমণের পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যতিক্রম।

সিনা—কুমি জন্তু রোগ, শিশুর একগাল লাল ও অপরটী শাদা, কদর্যা নিঃশ্বাস ত্যাগ; নাক ঝোঁটা ও রগড়ান, নরসদা ঢোক গেলা, কাশি, প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে শাদা হওয়া, আক্ষেপ বৃকে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীর শক্ত হওয়া।

সিমিসিফুগা—দাঁত উঠার দরুণ দড়কা। বদন ও চক্ষু আক্রমণ, চক্ষুর মাড়াপিক্য, খুঁতখুঁতে হওয়া। কেবলমাত্র বাম দিকের আক্ষেপ।

সিলিসা—মূগী—তিথী ঘটত রোগ, বিশেষ কক্ষপক্ষে, রক্ত উর্দ্ধগ হওয়া অথবা কপাল গরম, বা মাথা রাত্রে ঘামা, বা ঘাড় হইতে ব্রহ্মতালু পুনঃ পুনঃ বেদনা, সকালে শিরঃপীড়া ও মাথাঘোরা এবং উহা খুব ভারি বোধ, মনসিক শ্রমে অপটু এবং নিস্তেজ চেহারা হওয়া।

কালোফিলম—মাতুর গোলযোগ জন্তু ও প্রকাশ হইবার কালীন মূগী।

ট্রান্স—অজ্ঞান, অচেতন, মাথা পেছন দিকে নিক্ষেপ, বিশেষ উর্দ্ধ অঙ্গ খেঁচুনি, বদন লাল ও ফীত, জড়ের চেহারা, চীৎকার, বদনের অতি ভয়ঙ্কর খেঁচুনি জন্তু বিকৃত দৃশ্য; শরীর স্পর্শনে বা উজ্জ্বল চকচকে পদার্থ দর্শনে রোগের পুনরাক্রমণ।

সুপ্ফর—মূগীর আক্রমণের পূর্বে যেন শরীরের মধ্য দিয়া কোন পদার্থ গতিবিধি করিতেছে, চীৎকার, শরীর শক্ত; ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ উপস্থিত। অনেক সময় (বেলের পর) ইহার পর কখন কান্ধা ব্যবহার্য।

হাইড্রাটিন্স—পূর্ক ঔষধ প্রয়োগের পর বদনে লাল লাল দাগ হইলে।

মূগী রোগগ্রস্তের একা থাকা অবস্থিত।

প্লম্বম—মূগী ও পাতন রোগে। রোগ আক্রমণের পূর্বে পা ভার ও অসাড়, এবং দীর্ঘস্থায়ী অচেতন্য; গলা দিয়া একটা গোলা উর্দ্ধে উঠা বোধ, অঙ্গ খেঁচুনি।

আবিসিঙ্ঘিয়ম—অঙ্গ খেঁচুনির পর অজ্ঞান হইয়া পতন, জিভ কামড়ান,

মুখে গাঁজা ভাঙ্গা । ( ব্যাঙের ছাতা কৌড়ক খাওয়া, দড়কাদি রোগে বিশেষ উপযোগী, কারণ ঐ বিষ নাশ করা ইহার রাসায়নিক কার্য্য । )

### মূচ্ছা ।

আঘাত—বিশেষ মাথায় লাঠি মারায়—অধিক রক্তপাতে বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখায়, অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক যাতনায়, অধিক ইঞ্জিয়ার উত্তেজনায়, ভিড়ের মধ্যে, অথবা সংকীর্ণ ও বদ্ধ বায়ু মধ্যে দীর্ঘকাল থাকায়, পুরাতন ও দুর্বলকারী পীড়া ইত্যাদি কারণ উপস্থিত হইলে ; হঠাৎ এককালে বলহীন, শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম, পাঙ্গাশ বর্ণ হওয়া, কাণ মধ্যে শব্দ, সরিসার ফুল দেথা, শ্বাস ও সাড়ম্বর শক্তি রহিত প্রায়, নাড়া ক্ষুণ্ণ বা অপ্রাপ্য ইহার লক্ষণ । মাস্তকে রক্তের গতির যে কোন কারণে বাতিক্রম হইলে মূচ্ছা হইয়া থাকে । পীড়িত, দুর্বল, বিশেষ ঔষুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের অধিক হয় । অনেক সময় মিনিট কতক পরে ইহা সারে । কঠিন জ্বর আরোগ্যের পর হঠাৎ কোঁকে জেবের উঠ, অধিক রস রক্ত ক্ষয় ভ্রম ক্রিয়া হৃৎরোগ সম্বন্ধে মূচ্ছায় অনেক স্থলে সাংঘাতিক হইয়া থাকে । মূচ্ছায় মৃত্যুর সকল লক্ষণই উপস্থিত হয়, তবে বিশেষ এই যে, ইহাতে বগল গুরুম ও চক্ষু সমেজ থাকে, নাকের আগায় তুলা বা আয়না ধরায়, তুলা যদি নড়ে ও আর্সিতে যদি দাগ পড়ে, তবেই শ্বাস চলিতেছে জানা যায় । মূচ্ছা ঘাট্টিবা মাত্রেই তাজা ও বিসুদ্ধ বায়ু বিশিষ্ট জনতা শূণ্য স্থানে মাথা নীচু করিয়া শোয়াইবা এবং গলা, বুক ও পেটের বস্ত্রাদি খুলিয়া বা ঢিলা করিয়া দিবা ; পরে বদন, ষাড় এবং আবশ্যক মতে কড়ার নীচে পেটে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিবা ও বাতাস করিবা । কপাল ও মাথা গোলাপ জলে বা লেভাণ্ডার ওয়াটার দিয়া ধোত এবং কজ্জা, চেট ও হাত পা ঘর্ষণ করা বিধি । এ সকলে ফল না দর্শিলে ও শরীর ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে কপূরের আরোক ( বা অভাবে গুঁড়া কপূর ) মধ্যে মধ্যে ঘ্রাণ লইতে দিবা অথবা নিসাদল বা আমোনিয়া শোকাইবা । ওড়িকলম বা গোলাপ জল ।

আতঙ্ক বা ভয় হইতে মূচ্ছা—আকন, ওপি, কলসি, কফি ।

আঘাত, পতন, চোট লাগা—আর্গিকা ।

হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা—ইগ্রে, কামো ।

অতিরিক্ত যাতনা—আকন, ককু, কামো ।

ক্ষিপ্তকারী—ভেরাট ।

রস রক্ত ক্ষয় ও দুর্বলতা জন্ম—চিন ; আর্স আলাগ্রিটুস, কার্বো, ভেরাট ।

পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা—নক্স-ম, গন্ধস, লাকাসি, ষ্ট্রাম ।

আহারের পর মুচ্ছা—নক্স, ফস-আ ।

প্রসবের পর—আর্স, চিন । এ বড় ভয়াবহ অবস্থা; এই সময় ২০ মিনিট অন্তর এক পূলা জলদিয়া অল্প অল্প ব্রাণ্ডী খাইতে দিবা ; শরীর (A teaspoon-ful) বরফবৎ হইলে আর্স ৫ মিনিট অন্তর এবং শরীর গরম ও চেতনা হইলে চিন ১৫ মিনিট অন্তর দিবা ।

মুচ্ছা সহ জ্বর রোগ—কাষ্টস, ডিজিট ।

অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর—ভেরাট ।

অতিরিক্ত আহ্লাদ—আকন, ওপি, কফি ।

শোকে—ইগ্রে ।

রাগ ও বিরক্তি জন্ম—কামো, নক্স, পলুস ।

প্রাতে মুচ্ছা—নক্স ।

অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে—কার্বো ।

আকন—অতিরিক্ত হৃৎকম্প, রক্ত উদ্বীর্ণ, কাণ মধ্যে শব্দ, বদন পাক্ষাশ, একদৃষ্টিতে চাউনি, মানসিক উত্তেজনা, হঠাৎ ভয় পাওয়া ।

আর্গিকা—আঘাত, পতন ও চোট লাগা জন্ম রোগ ।

আলাগ্রিটুস—অতিশয় দুর্বলতা, সাড়াধিক্য, নিস্তেজতা, পাক্ষাশ বর্ণ, মুচ্ছা, ক্রমে পীঠ বুক ও উরুতে ঘাম ।

কফি—ভয় জন্ম রোগ এবং আকনাইটে না সারিলে ।

কামো—কোন প্রকার মানসিক অধিক উত্তেজনা জন্ম, ব্যথার প্রাবল্য হেতু এবং ঐ সঙ্গে মাথা ঘোরা, সব আঁধার দেখা, বধিরতা ও গা আড়ম্বাড়া ।

কাক্টস—বুক যেন গৌহ পাত দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে বোধ, এবং আবশ্যক মত তাহার প্রসারণ না হইতে পারা জন্ম খাস-কষ্ট । নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে দমআটকান ও মুচ্ছা, বদনে শীতল ঘর্ষ, নাড়ী তর্জ্জনি ছাড়া ।

ডিজিট—সর্ব প্রথম কিছুকাল নাড়ীর ক্ষণ-লুপ্ত গতি, পরে মুচ্ছা । হৃৎ-রোগ সম্বন্ধীয় পীড়া সহ মৃত্যুর চেহারা এবং ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকা । (এমত সঙ্কটাবস্থায় যে পর্য্যন্ত শরীর গরম না হয় আর্স দশ মিনিট অন্তর দেওয়া যাইতে পারে ।

কার্বো—নিদ্রার বা সকালে উঠার পর বা শয্যায় থাকা অবস্থায় মুচ্ছা । অধিক রক্ত ক্ষয়, বা তরুণ রোগ বা জরের পর ইহা দেখা দিলে । অধিক পারা ব্যবহারের পর ।

চিন—রক্ত ক্ষয়, ঘোড়ার জোলাপ ব্যবহার, প্রচুর ঘর্ষ, বহু দিন পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন দেওয়া, রাত্রি জাগরণ বা অধিক মানসিক শ্রম জন্ম পীড়া ।

নক্স—অধিক বা গুরু আহার, অথবা খাবার সময়ের অনিয়ম জন্ম রোগ, বিশেষ গর্ভাবস্থায় বা রোগীর শুশ্রূষা নিমিত্ত অধিক ভাবনা চিন্তা ও রাত্রি জাগরণ জন্ম গা বমি বমি, কিছু দেখিতে না পাওয়া, মধ্যে মধ্যে চক্ষুর সম্মুখে অগ্নির ফিল্ম দেখা, পাকাশয়ে বেদনা, কাঁপুনি, রক্ত উর্জগ হওয়া ।

নক্স-ম—মূচ্ছার ধাতু ও যে সকল বামায় ঋতুর গোল বা উহা এককালে বন্ধ ও বাহারা সদা বিনয় ।

ফস-অ—আহারের পর মুচ্ছা এবং নক্স দ্বিয়া প্রতীকার না হইলে—বিশেষ যথায় স্নায়বিক দুর্বলতা জন্ম পীড়া ।

নক্স-স—মূচ্ছা সহ বৃকে আক্ষেপ অথবা তৎপরে মাথা ধরা, এবং সন্ধা বা রাত্রে, বা বাহিরে হইলে ।

লাকাসি—মূচ্ছাকালীন পূর্বে বা পরে হাঁপানি, সরিষারফুল দেখা, বদন পাক্সাশবর্ণ, গা বমি বমি, বমন; শরীর শক্ত, চোয়ালে খাল লাগা, খেঁচুনি, বদন ফুলা, নাক দিয়া রক্ত পড়া, বৃকে বেদনা বা ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া ।

ট্রাম—প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা, মৃতবৎ হইয়া হঠাৎ ধড়াস করিয়া পড়িয়া যাওয়া, খাস অবরুদ্ধ প্রায় হওয়া এবং এইরূপ প্রত্যেক বার দীর্ঘকাল থাকা ।

ভেরাট—অল্প শ্রম, এমন কি বাহ্যের বেগাদতে মূচ্ছা । অধিক কুইনাইন ব্যবহারের পর রোগ । মূচ্ছার পূর্বে মনোকষ্ট ও হতাশ হওয়া ।

হিপার—অসহ্য বা পাগল করিয়া ফেলে এমন ব্যথার পর মূচ্ছা, অথবা সামান্য শ্রমে অত্যন্ত দুর্বল ও মূচ্ছা হওয়া ।

কান্ধর—আদত আরোক—মূচ্ছা ও মাথার সন্মুখ ভাগ বসিয়া যাওয়া ।

ভেরাট-ভি—ঘন ঘন মূচ্ছা ।

হাইয়স—বৃক্ষস্ত চমকান, মাথা ভারি, খিটখিটে ।

ব্রাই—গুটী বসা দরুণ রোগ, কাশি ও শ্বাস কষ্ট ।

ওপি—( ভয় হইতে মূচ্ছা )—বদন আরক্তিম, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ, নাক ডাকা, চক্ষু উপর দিকে তুলা ।

মূচ্ছা—ষুভতীর অধিক হয়—আঘাত লাগা, বিশেষ মস্তকে, ঘুরপাক খাওয়া, অতিরিক্ত বা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, অধিক শোক বা আনন্দ ( Pleasure ) ভোচকানি ( দীর্ঘ অনাহার ), অধিক রক্তপাত বা ভেদ, অধিক রাগ বা অপমান, অধিক গরম গৃহে থাকা, গরম জলে স্নান, সমারোহে অবস্থান ; খুব শীতে আগুনকে পেছন করিয়া আহাৰ করা, রক্তপাত দর্শন অথবা বাধক বেদনার পর ইত্যাদি কারণে মূচ্ছা ।

বালকের—মূচ্ছা সহ হাঁপানির যন্ত্রণা ( with asthmatic sufferings )—  
লাকাসি ; ক্রিয়োস, বার্ব ।

- রস রক্তক্ষয় জন্ত—চিন, কার্বো, নক্স, ভেরাট ।
- রক্তের ফুটুনি জন্ত—আকন, নক্স, পিটোল, বেল ।
- নাক দিয়া রক্তপড়া—ক্রোকস, লাকাসি ।
- সঙ্কায়—নক্স, মক্স; কাক্স, নেটুম, লাইক, হিপ ।
- সহ বদন স্ফীত ( Bloating ) আর্স ।
- পাক্সাশ; আকন, নক্স, পল্‌স, লাকাসি ।
- লাল—আকন ।
- আতঙ্ক ( ভয় ) হইতে আকন, ওপি ; ইগ্নে ।
- শোক—ইগ্নে, ষ্টাকিস ।



- মাথাধরা—গ্রাকাইট, নেট্রম, লাইক, ষ্ট্রাম।
- তাপ—নক্স, পিট্রোল, বার্ব।
- ঘরের উত্তাপ জ্বল—ক্রিয়োস, স্পাইজি।
- হিষ্টিরিয়া রোগের; ইয়ে, কার্বো, ককু, কোনাই, নক্স ম, মস্ক।
- আহারের পর, নক্স, সস-আ।
- প্রাতে—নক্স, কোনাই।
- নড়া চড়ায়—নক্স, ভেরাট।
- সহ'গা বমি বমি—নক্স, নেট্রম, লাকাসি।
- বাতে—নক্স, মস্ক।
- বেদনা হইতে—অকন, কামো, হিপব।
- সহ'জ্বপিতে বেদনা—লাকাসি।
- জ্বকম্প—অকন, নক্স-ম।
- ঘাম—বার্ব, লাকাসি,
- দাঁড়াইতে গেলে—অকন।
- সহ'শীত কাঁপুনি ( Shivering ) অকন, কলসি, কাক্স।
- দৃষ্টির গোল—কাক্স, নক্স, লাকাসি।
- নাক ডাকা—ষ্ট্রাম।
- কাঁপুনি—নক্স।
- মাথাঘোরা—আর্স, কার্বো, লাকাসি।
- বমন—নক্স, পল্‌স, লাকাসি, সল্‌ফর।

## মৃগী ।

কোথায় কিছু নাই, রোগীর হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়া, চক্ষু মাথায় উঠা, ধড়-বিকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপর দিকে তুলি, দাঁত লাগা, ক্ষণে ক্ষণে এপাশ ওপাস, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা ও প্রচণ্ড গৈঁচুনির পর অর্ধ ঘণ্টা কাল গাঢ় নিদ্রা, পরে কোন অমুখের অভাব, কেবল মাত্র কিছু দুর্বল বোধ । কাহারো বা বহু মাস অন্তর, কাহারো বা প্রত্যাহ ২০।৩০ বার হয় । সামান্যতঃ রোগ ২।৩ বার অথবা ২।৩ দিন অন্তর একবার দেখা যায়, কাহার বা পূর্বাঙ্কে মাথা বেদনা, দৃষ্টি-মালিগ্র, চক্ষু-সম্মুখে অণ্ডনের ফিল্কি, জ্বৎকম্প প্রভৃতি উপসর্গ অথবা পায়ের বুড়া আঙ্গুল বা অপর দূরস্থিত অঙ্গ হইতে ব্যাথা জ্বৎপ্রদেশ বা মাথায় উঠা । কাহারো মৃষ্টি শ্রবণ, আনন্দ, ব্রাণ শক্তির ব্যতিক্রম হয় এবং কাহারো বা উন্মাদ বা ভাব উদ্বেগে উঠিয়া অচেতন করে এবং রোগী চীৎকার করিয়া ঢুলিয়া পড়ে । তৎকালে চক্ষু অন্ধ মুদ্রিত, শ্বাসরোধ প্রায়, গিলিতে না পারা, গলা ঘড় ঘড়, মুখে ফেনা, চোয়াল ধরা, বদনের পেশীর নানা ভঙ্গি, শরীর ঠাণ্ডা ঘামে আবৃত, অগাড়ে শোচ প্রস্রাব ও বমন, পরে অঘোর নিদ্রা, তাহা ভাঙ্গার পর কখন কখন বহুদিন মাথা ধরা থাকা, যে কথাটি বলিতে বলিতে রোগাক্রান্ত হন, বহুক্ষণের পর স্তম্ভ হইলে পদের বক্রী বাক্য গুলিন বলেন—তঁাহার পক্ষে রোগের কাল ও ঘটনা সব অস্থায়ী ও অলিক মাত্র ।

১০ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ককাল মধ্যে এই রোগ দেখা দেয় । নবযুবতীর অনেক সময় ইহা ঋতুসংক্রান্তই হয়, যথা রজঃ প্রচুর বা বন্ধ হইলে, কখন বা গর্ভাবস্থায় ভয় শোক বিরক্তি জন্ম ও হইয়া থাকে । আত্ম মৈথুন, অধিক শ্রম, আঘাত বা চোট লাগা, গরমির পীড়া, বাত, প্রভৃতি কারণ হইতে রোগ প্রকাশ পায় । রোগ হঠাৎ মারাত্মক নহে বটে, কিন্তু ইহাতে অরণ শক্তি ও বুদ্ধির ক্রমশঃ হ্রাসতা হয় । অবশেষে সকল কর্মের বাহির হইয়া জীবিতগণের গলগ্রহ স্বরূপ থাকিতে হয় । মৃগী রোগগ্রস্তের ক্ষুধা খুব বাড়ে, কিন্তু কোনমতে এককালে অধিক খাইতে দিবা না, বিশেষ রাত্রিকালে । একা থাকিতে বা পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া স্নান করিতে দিবা না । কিছু কিছু ব্যায়াম আবশ্যক এবং মর্কদা হর্ষিত রাখিতে চেষ্টা করিবা এবং তজ্জন্ম হাল্কা কার্য্যে ও ধর্ম্ম কর্ম্মে মন নিযুক্ত রাখা বিধি । অল্প বয়সে বা আত্মবিক্ষিপ্ত পীড়া হইলে আরোগ্য সম্ভব, তবে পুরুষ পুরুষা-

গত, অথবা প্রকৃত রোগ কিম্বা দীর্ঘকালের রোগ হইলে ইহা সারা স্তব্ধ। তবে অনেক স্থলে স্তন্যদুগ্ধে থাকিলে কতকটা ভাল থাকে। ঝাড়ান বা মেস্মেরিজমে কখনও বিশেষ উপকার হয়। কুদৃষ্টি, ডাইনে খাওয়া, পেঁচয় পাওয়া প্রভৃতি সমস্ত স্নায়বিক রোগ মাত্র, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত মেস্মেরাইজার বা রোজারা ঝাড়াইয়া ও জল পড়া দিয়া নিরাময় করে। ভূত প্রেত ডাইন থাকে থাকুক, কিন্তু সংসারের যাবতীয় পদার্থ নিয়মাবধীন। প্রকৃতিকে বিশেষ রূপ জ্ঞানার নামই বিজ্ঞান। যিনি যত পরিমাণে ইহাকে জানিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ক্ষমতাশীল হইয়াছেন।

রোগ আক্রমণ কালে পীড়িতকে শয়ন করাইয়া তাহার গলা ও বুকের কাপড় বা বন্দ খুলিয়া দিবা এবং মুখ মধ্যে একটা কাক ছিপি পুরিয়া দিবা, যেন আপন জিত কামড়াইয়া রক্তপাত না করে এবং নিকটে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি হাত পা ধরিয়া রাখেন একরূপ করিবে। যুগ্মে আর ভাবনা নাই। দীর্ঘস্থায়ী হইলে মধ্যে মধ্যে কপূরের আরোক শুকিতে দিবা।

অজীর্ণকারী খাদ্য জন্ত—ইপি, নক্স।

বর্ষ বন্ধ জন্ত—আকন, নক্স, বেল, লাকাসি, সল্ফর, সিলিসা।

তাত্র বা সেকো বিষের ধূম লাগা জন্ত (আর্স-তাত্র বিষে)—কুপ্রম, ভেরাট, মার্ক।

পারা অধিক ব্যবহার জন্ত—ষ্ট্রাম।

ভয় বা আতঙ্ক জন্ত—ওপি, কামো, কুপ্রম, নক্স, হাইয়স।

মাথায় আঘাত দরুণ—আকন, ককু, বেল, সল্ফর, সিকুটা।

রস রক্ত ক্ষরণের দরুণ হ্রাসিত জন্ত—কাস্কা, নক্স, সল্ফর, সিলিসা।

রক্ত উর্দ্ধগ (সবলীর) জন্ত—ইপে, ওপি, নক্স, বেল।

সুরা বা তামাক বা অপর নেসার আদিক্য হেতু—ওপি, কুপ্রম, নক্স, লাকাসি, হাইয়স, (বেল-আফিমের)।

আতপ-তাপ বা সর্দি গর্শ্ব হইতে রোগে—মার্ক-ক।

বড় কুমি হইতে—সান্ট নাইন।

ক্ষীতে কুমি হইতে—কোসো।

## উর্দ্ধনৃত্য—তাণ্ডব রোগ। (CHOREA.)

মুখ মণ্ডল ও অঙ্গপেশী হান্তজনক ভাবে কম্পিত ও সঞ্চালিত হওয়া এক বা বহু পেশীর অনিচ্ছাধীন আক্ষেপ এবং তজ্জন্ত অঙ্গ অতিরিক্ত তেড়া বাঁকা হইয়া যাওয়া। বৌবনাবস্থা প্রাপ্তির কিছু পূর্বে এবং বালক অপেক্ষা বালিকার অধিক হইতে দেখা যায়। এ রোগে বিশেষ ভয় নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক সময় মানসিক শক্তিকে দুর্বল এবং কেচিং বা জড়প্রায় করিয়া তুলে। ভয়, বিরহ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উত্তেজনা, হঠাৎ চর্ম্ম রোগ অন্তর্হিত হওয়া; বাত, ক্রমি, আত্ম-মৈথুন, এ সমস্ত রোগের উদ্দীপক কারণ। কখন কখন অস্ত্রের দেখা দেখি ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে। সাধারণে ইহা উড়ো-বাতাস-লাগা কহে। জ্বীলোকের মেটে-পাণ্ডু বা রক্ত-হীনতা জন্ত হইলে সেই রোগের ঔষধ দিবা।

বেল—বদনের আক্ষেপ, মাথা ধরা, তোতলা কথা, হাত পা কাঁপার দরুণ চলিতে অশক্ত হওয়া।

কাক্কা-কা—শরীরের এক দিকের আক্ষেপ, দাঁত উঠা কালীন রোগ, বিশেষ গণ্ডমালা ধাতুর।

কাষ্টিক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেড়া বাঁকা হওয়া, রাত্রে তজ্জন্ত ঘুমের ব্যাধাত।

সিনা—ক্রমি জন্ত।

ককু—ডান বাহ ও ডান পায়ে অনিচ্ছাধীন গতি; বদন ক্ষীত, নীলাভ, হৃৎ সেন শীতে তোবুডান।

হাইয়স—হাত ছোড়া, টলে টলে চলা, হাতের বস্ত্র আপনি পড়িয়া যাওয়া—ধরিতে গেলে ফস্কান; খুব বকা।

ইয়েসা—মানসিক উত্তেজনাজনিত রোগে—আহারে বৃদ্ধি ও চিত শয়নে সমতা। নূতন নূতন রোগে গাঁল কপাল চক্ষু-গোলক নড়া ও আপেক্ষযুক্ত হওয়া; বাতের উৎক্ষেপণ ও অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব।

আকন—বাহ ও হাত কাঁপা, বাম হাত বা উরুর খজতা ও অসাড়তা, উভয় পা কাঁপা, টলটল করা, শিশুর ভয় পাওয়া জন্ত ও ক্ষীণা যুবতীর অধিক শ্রম, রাত্রি জগরণ ও গুশ্রাবা বা অধিক স্তনপান করান জন্ত ও অতিরিক্ত শ্রম জন্ত।

পল্‌স—নব্রপ্রকৃতি যুবতী ও বিলম্বে ও কষ্টে যাহার প্রথম রক্ত প্রকাশ হয়।

ষ্ট্রাম—সর্ক্সাঙ্গে বা এডোএডি আক্ষেপ ; স্মরণশক্তি যাওয়া ; ভয় বা ভাবনা  
জন্ম রোগ ও রাত্রের আলোক বা আয়না বা জল দেখিলে রোগ প্রকাশ ;  
সর্বদা হাত ও বাহু নাড়া, হাত ও পায়ের আক্ষেপ ।

কুপ্রম—এক দিকের কোরিয়া ।

আলুমি—যথায় ঘুমাইলে উপসর্গ থাকে না ।

নক্স—সমস্ত বা এক এক পেশীর নড়ন—মেরুদণ্ডের উপদাহ ।

কালোন—অল্প বয়স্কার ঋতু অনিয়মাবধীন ও কষ্টজনক হওয়া জন্ম রোগে ।

ভেরাট-ভে—পেশীর গোলমেলে গতি, বদনের ভয়ানক বিকৃতি, মাথা  
উৎক্ষেপণ, ধড় বাঁকা হওয়া, কথা স্পষ্ট না করা ।

জিঙ্ক—শরীর ও বদনের অনেক পেশীর কাঁপনি ।

ওপি—বদনের পেশীর আক্ষেপ, ঠোঁঠ ও জিভের কাঁপনি, ঘুমন্ত থাকা,  
বদন পাঙ্গাশ ও রক্তহীন ।

সিলিসা—শরীরের এক দিকে কাঁপনি ও চিড়িক মারা—নিদ্রাকালীন  
বন্ধ থাকা । ঠাণ্ডার দ্রুণ রোগ ।

স্পাইজি—হৃৎকম্প, বুকে চাপুনি, হাত ঠাণ্ডা, চেটোয় ঠাণ্ডা ঘান ।

### পক্ষাবাত ।

পক্ষাবাত দুই প্রকারের হয়—একে সাড়ন্ত-শক্তি, অপরে গতি-শক্তি থাকে  
না । কেচিং উভয় শক্তি হীন হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গ জীবিত-মৃতবৎ সম্পূর্ণ  
অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । শিশুর এ উভয়বিধ রোগ এককালে হইতে দেখা যায়  
না । পূর্বে কোন উপসর্গ ভিন্ন ব্যাধি হঠাৎ প্রকাশ পায় । শরীরের মুড়ার  
দুর্লভতা প্রধান লক্ষণ এবং অনেক সময় উহা এক দিকে মাত্র হইয়া থাকে ।  
কখন কখন ঘণ্টা কতক পূর্বে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, বাদিকের সাড়া-  
ধিক্য, বা ঝিঁ ঝিঁ লাগা ও ঠাণ্ডা হওয়া । মাথা ধরাও দেখা দেয় । ইহার পর  
ঐ অঙ্গের উন্নতি বা বৃদ্ধি হয় না, দিন দিন ক্রম ও শীর্ণ হইয়া পড়ে । প্রথম  
রোগ ভৈষজ্য-সাধ্য । যতই দীর্ঘকালের হয়, ততই নিরাময়ের আশা কমে ।  
কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসকের এলে দেওয়ার কথা নহে । ভগবানের অসীম  
ভাণ্ডারের বিবিধ উপায় আছে, চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া পড়ুন । ( এ সম্বন্ধে সবি-

রীম জর চিকিৎসার উপক্রমণিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি ) অর্দ্ধ অঙ্গে বা এক দিকে বা অঙ্গ বিশেষে রোগ হইয়া থাকে ।

এক দিকের পক্ষাঘাত—আলাকাডা, আলুমি, এস্কুলস, ককু, নক্স, নেট্রম, ফস, রস, লাকাসি, মার্ক, সল্ফর, সেপি ।

উপর অঙ্গের পক্ষাঘাত—আকন, ককু, কল্চিকম, কাক্সা, কাষ্টিক, চিন, টাট-এ, ডাক্সা, নক্স, নাইট্রম, মার্ক, রস, লাইক, সেপি, ভেরাট ।

নিম্ন বা অধঃ অঙ্গের—আলুমি, আর্গিকা, ককু, কল্চি, কালী-কা, চিন, ডক্সা, নক্স, প্রথম, ফস, বেল, ব্রাই, ভেরাট, মার্ক, রস, সল্ফর, সিকেল ।

চক্ষু পাতার—ওপি, জেল্স, ভেরাট, সেপি, স্পাইজি ।

জিভের—গ্রাফাইট, ককু, কাষ্টিক, ডক্সা, লাকাসি, হাইয়স ।

বাক্ যন্ত্রের—কাস্থ, কাষ্টিক, ষ্ট্রাম ।

বৃদনের—কাষ্টিক, ওপি, ককু, গ্রাফাইট, নক্স ।

চোয়ালের—আর্স, ডক্সা, লাকাসি ।

গল-নলি বৎ গিলবার যন্ত্রের—ককু, কুপ্রম, জেল্স, কাষ্টিক, প্রথম, বেল, লাকাসি, ষ্ট্রাম, সিকুটা, সিলিসা ।

হাতের—আর্স, কাষ্টিক, কুপ্রম, জিক্স, নেট্রম, ফেরম, রস, কুটা, সিলিসা ।

আঙ্গুলের—আস্থ্রা, কাক্সা, কুপ্রম, নেট্রম, ফস, মাগ্নিসা, সিকেল, সিলিসা ।

মূত্রস্থলির—আর্স, ওপি, ডাক্সা, কাস্থ, নেট্রম-ফস, ফস, লারো, লাইক, লাকাসি, সিকুটা, হাইয়স ।

মলাশয়ের—আলুমি, ফস ।

মলদ্বারের—কলসি, হাইয়স, আকন, ফস, বেল, লারো ।

পায়ের পাতার—গুলিয়াণ্ডর, প্রথম, বেল, রস, সল্ফর, চিন, ককু, নক্স, আর্স ।

পায়ের—ককু, ওপি, নক্স, বেল ।

আক্ষেপ জন্ত—আর্স, ককু, কাষ্টিক, কুপ্রম, নক্স, প্রথম, রস, সল্ফর, সিকেল, ষ্ট্রাম, হাইয়স ।

আত্মমৈথুন বা অধিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্ত পক্ষাঘাত—নক্স, নেট্রম, ফেরম,  
ককু, চিন, সল্ফর ।

ওলাউঠার—কু প্রম, ভেরাট, সল্ফর, সিকেল ।

ঘাম বন্ধ জন্ত—কল্চিকম ।

ঠাণ্ডী লাগা—আর্গিকা, কল্চি, কাষ্টিক, ডক্কা, মার্ক, রস ।

ডিপথিরিয়া জন্ত—আর্স, জেল্‌স, নেট্রম, লাকাসি ।

ভেজা জন্ত—কাষ্টিক, রস ।

মনের উত্তেজনা জন্ত—আর্গিকা, ইথের, নেট্রম, ষ্টানম ।

রস'রক্ত ক্ষয় জন্ত—চিন, চিন-স, বারাইটা, সল্ফর ।

শ্রম শারীরিক—আর্গিকা, আর্স, রস ।

সংক্রান্ত জন্ত—আর্গিকা, ওপি, আনাকার্ড, কোনাই, কাষ্টিক, কু প্রম, নক্স,  
প্লম্বম, বারাইটা, লাকাসি, লারো, ষ্টানম, সিকেল ।

সবিরাম ( পালাজর )—আর্গিকা, আর্স, নক্স, নেট্রম, রস, লাকাসি ।

জ্বর—টাইফস্—ককু, কু প্রম, রস, সল্ফর ।

ফোটক বন্ধ জন্ত—কাষ্টিক, ডাক্কা, সল্ফর, হিপার ।

শিষা বিষ জন্ত—আর্স, ওপি, কু প্রম, প্লাটিনা ( বেল, সিকেল, কালী হা,  
( মাড়িতে নীল দাগ শিষাবিষের বিশেষ লক্ষণ )

সৈকো বিষ জন্ত—গ্রাফাইট, চিন, ফেরম, হিপার ।

হিষ্টিরিয়ার পক্ষাঘাত—রোগীর পা টেনে চলা—আকন, ইথের, নক্স, জেল্‌স,  
সিমিসা ।

কেরাণির ও বাদ্যকরের পক্ষাঘাত—হাতে খাণ লাগা, বাহুতে ঝি ঝি  
এবং ঐ সঙ্গে হয়তো বাড় ব্যথা, তোলতা কথা ও হৃৎপ্রদেশে অম্লথ—ইথের,  
এস্কুলস-গ্লা, অলাট্রিস, আর্গিকা ।

পারা ব্যবহার জন্ত—নাইট্রু-আ, ষ্ট্রাম, ষ্টাফিস, সল্ফর, হিপার ।

আইওডিন—হিম ঠাণ্ডী লাগা, অপুষ্টিকর আহার এবং বাহাতে জীবন  
শক্তির হ্রাসতা হয়, একরূপ কারণ হইতে পক্ষাঘাত রোপে ।

আকন—পক্ষাঘাত সহ অঙ্গের শীতলতা ও সাড়হ কম ও শুড়শুড়নি হওয়া । স্থানীয় রোগ, যথা বদনের পক্ষাঘাত, বিশেষতঃ শুষ্ক শীতল বাতাস লাগা জন্ম রোগ । পা ( উভয় ) ভার, যেন তাহাতে পোকা মাকড় উঠিয়াছে বোধ হওয়া ; খুব ঠাণ্ডা, এককালে সাড়হ হীন হওয়া ।

আর্গিকা—আঘাতাদি লাগা, পুরাতন সবিরাম জ্বর, সংশ্রাস বা দুর্বলকারী পীড়ার পর পক্ষাঘাত ।

আনাকার্ড—সংশ্রাসের পর রোগে, স্মরণ শক্তির অভাবে, মনের দুর্বলতায়, ইচ্ছা-শক্তির ধ্বংসে ।

আর্স—শিষার বিষনাশক—ঐ বিষ হইতে রোগে ইহা উপকারী । পক্ষাঘাত সহ অতিশয় বলক্ষয়ে ।

আলুমিন—দাঁড়ার রোগ জন্ম পক্ষাঘাত, পায়ের পাতা অসাড়, এবং বেড়াইতে অসক্ত ; তবে দিনের বেলা কতক পায়ের, এবং তৎকালে ফেল-ফেলে চাহনি ।

ইগ্নেসা—শোকাদি মনের উত্তেজনা অথবা রোগীর শুশ্রূষাদি জন্ম রাত্রি অঙ্গগণ কারণে পীড়া ।

এস্কুলস-লা—পায়ের পক্ষাঘাত ।

— হি—বাহ ও হাতের পক্ষাঘাত ।

— মা—এক পা ও এক দিকের পক্ষাঘাত, বাক্য জড়তা, মাথাভার ও ঘোরা, খাদ্যে ঘ্রণা, দৃষ্টি মালিহ ।

ওপি—সংশ্রাসের পর পক্ষাঘাত ও অসাড়তা ; মাতালের ও প্রাচীরের রোগ, শৌচ প্রস্রাব বন্ধ ।

ওলিয়গার—অঙ্গ শক্ত ও পক্ষাঘাত ; সর্ব শরীর অসাড় ; দাঁড়ালে হাঁটু এবং লিখিলে হাত কাঁপা । পক্ষাঘাত আক্রমণের বহু পূর্বে মাথা ঘোরা ।

ককু—পায়ের পাতা, জিত, অন্ননলীর উদ্ধাংশ (হাত ও বাহর) এবং অধঃ-অঙ্গের, বিশেষ মূত্রস্থলি প্রদেশের পক্ষাঘাত । বাতের খঞ্জতা । বাহাদের দুর্বলতা জন্ম বৃক ধড়কড়ানি ও মূর্ছা হয় । যখন পীড়া কোমরে আরম্ভ হয় । সর্দির পর, সহ পায়ের পাতা ফুলা ও ঠাণ্ডা বোধ । সংশ্রাসের পর রোগ



প্রকাশ। চক্ষু সম্মুখে নানা কাল্পনিক দৃশ্য, পুস্তকের বিস্তৃতি, কাগ মध्ये গুণ গুণ ভন ভন শব্দ ।

কল্‌চিকম—সর্ব শরীরের ঘাম হঠাৎ বন্ধ অথবা পায়ের পাতা ভিজা জন্ত পক্ষাঘাত ।

কালী-কা—ঢাক ও উরু প্রদেশের দুর্বলতা ও সাড়হীনতা; হাত ও আঙ্গুলের আক্ষেপ ।

কাষ্টিক—পক্ষাঘাত, বিশেষ এক দিকের, সহ মাথা ঘোরা, দৃষ্টির ক্ষীণতা, নৈরাশ্র, মৃত্যু ভয়, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় বদন বা জিভের পীড়া এবং কষ্টে গেগা বা কথা কথা । সংন্যাস বা দীর্ঘকালের চর্ম-রোগের বন্ধ জন্ত পক্ষাঘাত ।

কালোফিলম—প্রসবের পর বা জরায়ু স্থল দ্রষ্ট দরুণ সাড়হ ও গতি-শক্তি উভয়ের নাশ ।

কুপ্রম—স্ফোটকাদি রোগ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় এবং সংন্যাসের পর অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি, ওলাউঠা ও টাইকস জ্বরের পর পক্ষাঘাত । চক্ষুপাতা মুদ্রিত, খুলিলে গোলক দোরা—শরীর শীর্ণ, দুর্বল ও ঠাণ্ডা ।

কোনিয়ম—সংন্যাসের পর পক্ষাঘাত, হাত পায়ের সাড়হ কমা ও ভাব বোধ ।

চিন—অধিক রস রক্ত ক্ষয়, অধিক ভেদ, বমি, ঘাম অথবা পুতি জনিত দুর্বলকারী পীড়া জন্ত পক্ষাঘাত ।

জিঙ্ক—স্বরাপানে রোগ বৃদ্ধি ।

জেলস—সাড় থাকা, কিন্তু গতি শক্তি-রাহিত্য, চক্ষুর পাতা ফুলা, গিলিতে কষ্ট । বিশেষ ডিপথিরিয়ার পর পক্ষাঘাত । রোগ প্রকাশের পূর্বে মাথা ভেঁা ভেঁা করা ও পাতার ।

ডকা—ঠাণ্ডা বাতাস, হিম, জল লাগা জন্য স্ফোটক বা গুটী বসা—বিশেষ একটা রোগ ছাড়িয়া পক্ষাঘাত হওয়া পক্ষে । দীর্ঘকাল আর্দ্র স্থানে বাস জন্ত পীড়া বৃদ্ধিতে । হাত, পা ও জিভের পীড়ায় । যথা অসাড় বাহ, বরফবৎ ঠাণ্ডা ।

নেটম—অধ অঙ্গের পক্ষাঘাত, পাছার সংকোচন । সবিরাম জ্বর বা

ডিপ্‌থিরিয়া অথবা অতিরিক্ত কাম-চরিতার্থতা বা রাগ নিমিত্ত রোগে অতিশয় শীর্ণতা, সর্কদা অঙ্গ নড়া, সামান্য শ্রমে চৰ্কল হওয়া ।

নক্স—অপূর্ণ পক্ষাঘাত—বদন, বাহু বা পায়ের । তৎসহ মাথা ঘোরা, অরণ শক্তির দৌরঙ্গতা, চক্ষু সম্মুখে আঁধার, কাণ মধ্যে শব্দ, অক্ষুধা, পাকাল জালা, পেটে অধিক বায়ু সঞ্চয় এবং আহাৰ ও পানের পর বমন । কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষ মাতাল পক্ষে । উৰ্দ্ধ বা অধঃ অঙ্গের বা এক দিকের অথবা হাত বা পায়ের এবং মেরুদণ্ডের চৰ্কি বা মৰ্জ্জার পীড়া জন্ম রোগ । অধিক পারা ব্যবহার বা শিষাবিষ শরীরস্থ হওনের দরুণ পক্ষাঘাত ।

পল্‌সম—সকল অঙ্গের পক্ষাঘাত ; উৰ্দ্ধ অঙ্গের রোগ সহ স্বরবদ্ধতা ও অক্ষুট বাক্য ; কাঁধ, বাহু, কজা, হাত ও আঙ্গুল, সকলের বা একটা মাত্রের ঐক্য ও অধঃঅঙ্গের ও ধড়েরও রোগে । পীড়িত অঙ্গ রক্তহীন হওয়া ; রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে ও তাহার সাড় কমে । মানসিক ব্যতিরিক্ত গোল ও অতিরিক্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, ইহার বিশেষ লক্ষণ । শীতাপেক্ষা বসন্তকালের রোগে অধিক ফল-দায়ী । শিষা-বাবসায়ীর রোগে ।

ফেরম—অধিক রসরক্তক্ষয় জন্ম পক্ষাঘাত । চৰ্কল পাকালশবর্ণ শিশুর পক্ষে ।

ফস্—দাঁড়ার পীড়া জন্ম, অধিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা জন্ম অথবা প্রসবের পর পক্ষাঘাত । পীঠ হইতে পায়ের শুষ্কতা ও ছেঁড়া ।

বেল—সংক্রাস—মাথায় রক্ত সঞ্চয়—একদিকে পক্ষাঘাত, অপর দিকের আক্ষেপ, বদনের আক্ষেপ ।

বারাইটা—অল্প বয়স্কের মুখ হা করে থাকা ও তথা হইতে থুথু গড়ান, জড়ের চেহারা ; প্রাণীনের, বিশেষ সংক্রাস পরে, বালকবৎ হওয়া, অরণ শক্তি যাওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপা, বিশেষ জিহ্বার পক্ষাঘাত ।

মার্ক—হাত পা সৰ্ব্ব শরীর শক্ত ও অনড় হওয়া ও কাঁপা, শরীর ও মনের অতিরিক্ত শ্রানি ।

রস—জলে ভেজা, অতিরিক্ত শ্রম জন্ম মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত ; সৰ্ব্বশরীর শক্ত হওয়া, টানা ছেঁড়া কামড়ান, পায়ের পাতা দীর্ঘকাল ঠাণ্ডা থাকা । স্থির থাকার বৃদ্ধি, আঙনের কাছে থাকা, আঙুলে আঙুল নড়ায় ও হাত পা ছড়ান ভাল থাকা ।

লাকাসি—সংক্রান্তের পর রোগ; বিশেষ বান দিকের পীড়া, কদম্বা কাঁপুনি, হুন্ডি খাওয়ার স্থায় গতি।

ষ্টানম—এক দিকের, বিশেষ বান দিকের পক্ষাঘাত এবং সেই পার্শ্বের বাহ ও বৃকে প্রকাণ্ড তার থাকা এবং রাত্রে পুনঃ পুনঃ ঘাম।

ষ্ট্রাম—দড়কার পর পক্ষাঘাত। অথবা এক দিকে আক্ষেপ, অপর দিকে পক্ষাঘাত।

সল্ফর—টাইফস, স্ফোটক জ্বর, পাচড়াদি চর্মরোগ বন্ধের পর পক্ষাঘাত অথবা ধাতু-বিকৃতি জন্ম অথবা ঔষধে প্রতিকার হইতেছে না বুঝিলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

সিলিসা—বান হাতের পক্ষাঘাত সহ অঙ্গুলির শীর্ণতা ও সাড়হীনতা, পায়ের পক্ষাঘাত, সকালে বুদ্ধি সহ মাথা ভার ও কাণ মধ্যে শব্দ।

সিকেল—আক্ষেপ ও সংক্রান্তের পর রোগ এবং সেই অঙ্গ শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইতে থাকি, অনিচ্ছাধীন অসামান্য শোচ প্রস্রাব।

হিপার—অধিক পুরা ব্যবহারের পর পক্ষাঘাত।

### দাঁতকপাটি—টঙ্কার।

ভূমিষ্ঠের ১২ বর্গটা পরে কখন কখন রোগ প্রকাশ পায়। শিশু কাদিতে থাকে, মাই খায় না, কিছুক্ষণ পরে দড়কী উপস্থিত হয়, হাত মুঠা বাঁধ, খড়ের টঙ্কার, চোয়াল বন্ধ, পা ও অঙ্গুলি তেড়াবাঁকা, নিলবর্ণ ঠোঁঠ, মাড়িতে লাগা, কিছু গিলিতে গেলেই আক্ষেপ এবং আহার অভাবে এককালে বলক্ষয় হইয়া অচেতন প্রায় অথবা অঙ্গ-খঁচুনি হইয়া মৃত্যু।

আবুঠরা—দুইটা ঠোঁঠ উন্টান ও দাঁত বা মাড়ি বেরিয়া পড়া—ঠোঁঠ ও গাল নীল, আক্ষেপযুক্ত নিশ্বাস।

নক্স—থেকে থেকে পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ, খঁচুনি বৃদ্ধি হইয়া পেছন দিকের টঙ্কার, গলা সংকোচন, গিলিতে কষ্ট—নেসাখোর ও বড় চটা ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে। পুনঃ পুনঃ ও অল্পক্ষণ স্থায়ী, এবং পাকাশয়ের খাল লাগা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

কাইটো—মুড়া শক্ত, হাত দৃঢ় মুষ্টি, পায়ের পাতা বিস্তৃত ও আঙ্গুল তেড়াঝাকা। ঠোঁঠ ওল্টান ও পেণী শক্ত, বদন ও ঘাড়ের পেশীর খেঁচুনি, পরে গরম হইয়া পুনর্বার খেঁচুনি। ইহা পুনঃ পুনঃ হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী ; এবং পাকাশয়ে খাল লাগা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে।

বেল—স্বনন্তুত পীড়া—চাবালি বন্ধ হওয়া, মুখে গাঁজা ভাঙ্গা, বিকৃত চেহারা, পীঠ শক্ত হওয়া ও তথায় বাথা, পান করাতে রোগ বৃদ্ধি। পুস্তগী বিস্তৃত, তাকানে দৃষ্টি, অনিচ্ছাধীন শোচ প্রস্রাব।

ষ্ট্রাম—হাত-খেঁচুনি, হঠাৎ ঘুমন্ত চম্কান, কান্না এবং উজ্জল বা চকচকে পদার্থ দর্শনে পুনর্বার দড়কা।

সিকুটা—শরীর হঠাৎ টক্কার ছায়া শক্ত ও অনড় হওয়া, বদন ক্ষীত ও নীলাভ, নির্দিষ্ট স্থানে তাকান বা স্থির দৃষ্টি। সামান্য স্পর্শে বা কথা কহাতে পুনর্বার আক্ষেপ।

হাইড্র-আ—শরীর নীল, বিশেষ পীঠ, চোয়াল ও বদনের পেশীর পীড়া।

ইয়ে—ঘাড় ও পীঠ বাথায়ুক্ত ও শক্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়ান, চোয়ালের সন্ধি-স্থানে গাল লাগা—জন্তুনে সর্বদা ইচ্ছা, কিন্তু মুখ-ব্যান্ধান অশক্ত। গলা মধ্যে পদার্থ থাকা বোধ—যেন পোকাপূর্ণ। স্পর্শ করায় বৃদ্ধি।

হাইয়স—পীঠের দিকে টক্কার। মুখে গাঁজা ভাঙ্গা ও ভয়ঙ্কর চেহারা, গলা সঙ্কোচন, কিছু বিশেষ তরল পদার্থ গিলিতে অসক্ত, (ষ্ট্রাম) পা ও পায়ের পাতা ছট্‌কানো ও ছোড়া। সন্ধা এবং আহার ও পানে বৃদ্ধি।

## দাঁতকপাটি ।

নব প্রসূতের প্রথম কয়েক দিন মধ্যে হইতে দেখা যায়। মাই টানিতে পারেন না, যদি কথঞ্চিৎ টানে ত উঠে পড়ে। ২৪ দিন মধ্যে সাংঘাতিক হয়। ঠাণ্ডী লাগা খাবার দুধ, কুংসিত বায়ু অথবা স্থানীয় উত্তেজনা জন্ত রোগ প্রকাশ পায়। সর্বপ্রথমে, কারণটা বা কারণগুলি দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবা।

আর্গিকা—স্থানীয় উপদাহ জন্ত রোগে (এক ছটাক জলে ১০ ফোটা

আদত আরক)। ঐ জল দিয়া ব্যাথিত স্থান এক বা দুইবার করিয়া ধোত করা।

কামো—ঠাণ্ডী জন্ম রোগে—ইহাতে ফল না দর্শিলে বেল।

বেল—যে স্থানে রোগের কারণ নিশ্চিত করা যায় না। এবং ইহাতে উপকার না হইলে লাকাসি ও হাইয়স পর পর।

নক্স—সর্দি উপসর্গ থাকিলে।

ওপি—খুব কঠিন রোগ, ঠাণ্ডী হইতে রোগ, পেছন টকার। অথবা আঘাতের পর দাতকপাটি। আণিকা দিয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ফল না হইলে। ভয় ( আকঙ্ক ) হইতে রোগ। ৬ ঘণ্টায় উপকার না হইলে হাইয়স।

রস ও ইয়ে—ইহাদের একক বা পর পর দেওয়া হয়—ধড় খিলানের মত হওয়া এবং ( Tendon ) কণ্ডার বা সন্ধিতে আঘাত জন্ম বা মর্মান্থর পেছন শুড়মুড়ায় ঠেকা—ইহা ভয় হইতে হইলে।

অন্ধকর্ণ গৃহে স্থিরভাবে রাখিয়া, নিকটে গোল হইতে দিবা না। দাঁড়ায় এক এক বার ৫৬ ঘণ্টা বরফ লাগাইবা।

### স্নায়বিক শূল—পায়ের।

উক্ত দেশের পশ্চাৎ পদতল পর্যন্ত সিয়াটিকা ( Sciatica ) নামক ভয়ানক ও দীর্ঘস্থায়ী স্নায়ু-শূল রূপ বেদনাক্রম হয়। অনেক সময় থেকে থেকে ধরে। প্রায়ই এক, কেচিৎ উভয় পায়ে আক্রমণ করে। অধিকাংশ সময় ভাল জীর্ণতা অভাব জন্ম; তন্নিম্ন ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, জলে ভেজা, ঠাণ্ডী লাগা, আর্দ্র গৃহে বাস, রাত্রি জাগরণ, কসা জুতা ব্যবহার, জরায়ুর গর্ভাবস্থায় চাপ বা যন্ত্র দ্বারা প্রসব করান, যে কোন কারণে ঐ স্নায়ু চাপিত হয়, তাহা হইতেই রোগের উৎপত্তি। ব্যথা অল্পে অল্পে ও আস্তে আস্তে এবং সন্ধ্যা ও রাত্রে অধিক বাড়ে। স্পর্শে বাতনাদিক্য, কিন্তু কসিয়া চাপায় স্থিতি। কাহারও কাহারও নিয়ত নড়ায় আরাম; কাহারও বা সামান্য গতি, কাশি, হাঁচি বা বাহ্যের বেগে মৃত্যুবৎ হওয়া। কখন কখন পীড়িত পা ঠাণ্ডা, পরে গরম বোধ; কোথাও বা সেই দিকের পায়ের ডিঙ্গে বা

পায় তলায় খাল লাগে। অতিরিক্ত যন্ত্রণা কালীন বেদনা উর্দ্ধ পাছার দিকে উঠে।

স্নায়বিক—আর্স, কামো, জেল্‌স, সিমিসি।

বাতের—আকন, কালী-আ, গোয়াকম, নক্স, পল্‌স, মার্ক, রস।

ডান পায়ের—কল্‌সি।

আলা—আকন, আক্‌।

কনকনানি—ইগ্লে, জেল্‌স।

সেঁটে ধরা—জেল্‌স।

অতিরিক্ত—কামো, জেল্‌স, সিমিসি।

নিয়মিত সময়ে ধরা (Peaiodical)—আর্স, সিমিসি।

তীক্ষ্ণ (Sharp)—আকন, ইগ্লে, জেল্‌স।

বেদা (Shooting)—জেল্‌স।

বৃদ্ধি, রাত্রে—কামো, সিমিসি, পল্‌স, আর্স, আকন, রস, বিশেষ ১২টার পর।

সঙ্কায়—পল্‌স।

— প্রাতে—নক্স, পল্‌স। বৈকালে—বেল।

— বিরামে (Rest)—রস। বসায় বৃদ্ধি পক্ষে পল্‌স।

স্বস্তি—ঠাণ্ডায় ও বাহিরের বাতাসে—পল্‌স। উত্তাপে—আর্গিকা। ঐ সঙ্গে

অঙ্গ সংকোচন—নক্স। শক্ত ইঁওয়া—নক্স, সিমিসি।

— অঙ্গ সর হওন—আর্স, কামো, মার্ক। নাড়ায় সমতা—রস।

— অনিদ্রা—আকন, জেল্‌স, সিমিসি।

— চটা স্বভাব—কল্‌সি, কামো।

আকন—ডান পায় Sciatica।

কলসিহু—অধিকাংশ সময়ে বাম পদে ছেঁড়া, বোঁকা, কড়া, নড়া বা স্পর্শে বা রাগে বৃদ্ধি, অস্থিরতা, উদ্বেগ।

ইগ্লে—কনকনানি, বিশেষ সেই পা নড়ায়, বিশেষ কোমল ও খেদায়িত স্বভাব অথবা খুব উল্লাসায়িত, আবার সেইরূপ নিরাশায়িত স্বভাব। পাছার

শুশ্রূষাপুনি, যেন তথাকার গাঁইট (Hip) ফেটে পড়িবেক। প্রথম এক দিন অন্তর, পরে প্রত্যাহ, সহ শীত ও তৃষ্ণা, ( তাপ ও ঘাম অভাব )। গর্শ্মিতে অদৃশ্য, শীতে পুনর্বার দেখা দেওয়া।

নক্ষ—প্রাতে বৃদ্ধি এবং অঙ্গ যেন শক্ত ও সঙ্কোচিত হওন জন্ত অঙ্গ সকল ভাল না খেলান এবং শীত শীত ও পক্ষাঘাতের ভায়ে হওয়ায় বিশেষ চটা। নীচে হইতে উর্দ্ধ দিকে টানা ছেঁড়া, কোষ্টবদ্ধতা, বাহ্যে কালে সমস্ত পার পাতা পর্য্যন্ত যাতনা।

সিমিসি—হ্রস্বলতা, কঁাপুনি, নড়ায় যাতনা, পেশী শক্ত, সড় সড়ানে শীত। আতশয়, আতঙ্ক, মাড়ী দ্রুত, হ্রস্ব এবং কখন কখন অসম স্পন্দন, বাতিক বৃদ্ধি, অনিদ্রা, থেকে থেকে বা যথানিয়মিত সময়ে যাতনা। ইহাতে ব্যথা না সারিলে—বিশেষ কেবল রাত্রিকালে যাতনা উপস্থিত বা বৃদ্ধি হইলে—কালী, আই, কিন্তু ইহা দিবার পূর্বে এক মাত্রা সলফর দিবা।

গোমাকম—বিশেষ বাত বা gout প্রস্তু রোগীর বুক জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশেষতঃ রোগ যদি বড় জ্বর হয়।

আকন, রস, ব্রাই বা সিমিসি, ইহার মলম করিয়া সকাল ও রাত্রে গরম গরম লাগানয় এবং অন্তরস্থ করিলে, অর্থাৎ খাইলে উপকার হয়। বাহির প্রদেশে গরম বস্ত্র দিয়া ফোমেন্ট।

ব্রাই—নড়ায় কষ্ট, স্থির থাকিলে ভাল থাকে।

কাক্স—জলে (দোড়াইয়া) কাজ করায়, অথবা মেরুদণ্ডের হাড়ের পীড়া সহ রোগ। বেদনা কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ে নামা এবং নিয়ত তথা অস্থির।

কফি—অনিয়মিত কালে সিয়াটিক স্নায়ু শূলুনি। রাত্রে বৃদ্ধি সহ অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

ককু—পাছাপ্রদেশ কমিয়া স্থূল করা হইতেছে। বেদনা তাড়িতবৎ পায়ে গতিবিধি, নড়ায় বৃদ্ধি। পা ঠাণ্ডা, শীত সহ ঘাম, শীত ও তাপ পর পর, অনিদ্রা, শীর্ণতা, ঐ স্থানে কিঁ কিঁ লাগার ন্যায়, কষ্টের চেহারা।

ফেরম—অঙ্গ বিরামে বেদনা, রাত্রে বাতের দরুণ শয্যা হইতে উঠা—প্রথমে দে পায়ে দাঁড়াইতে অশক্ত, কিন্তু নিয়ত নড়ায় ও বেড়ানয় (দোড়াদোড়িতে) কমা। বাম কাঁধে বেদনা।

জাফালস—পায়ের স্নায়ুর ভয়ানক যাতনা এবং উহার বড় শাখার বিস্তৃতি, কখন কখন ঐ যাতনার পরিবর্তনে অসাড়ত্ব ও তৎকালে বেড়ানয় কষ্ট ।

লাকাসি—বেদনা সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে, কখন মাথায়, কখন দাঁতে, কখন পায়ের স্নায়ুতে, সহ বাতিকেব উপসর্গ, বুক ধড়্‌ফড়্‌, পেট জালা ( অগ্নিশিখার ন্যায় ) ও বামার রক্তঃ বন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা ।

লেডম—( Hip joint ) খজ্ঞতা, শয্যায় গরম হইলে বৃদ্ধি ; ঐ অঙ্গ ঠাণ্ডা, শীত নীচে আরম্ভ হইয়া উদ্ধে উঠা ।

লাইক—পাছার বেদনা ; শক্ত, দুর্বল ও সড়নড়ানি ; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠ ও বায়ু বদ্ধ, প্রস্রাব লাল ও ঘোলাটে ।

প্রথম—উরুর পেছনের স্নায়ুর বেদনা জন্তু কষ্টে বেড়ান, পরে বলক্ষয়, কাশি ।

ফাইটো—উরুর বাহির দিকে চাপা, বেঁদা, টানা, কামড়ান, নড়া, চাপাও রাত্রে বৃদ্ধি ।

সেপি—গর্ভাবস্থায় রাত্র ৩টা হইতে ৫টা থেকে ধরা—সেই পার শিরা ফোলা । পুরাতন রোগে বেদনা গুড়মুড়ায়, স্থির থাকিবে ভাল থাকা ।

সল্‌ফর—পুরাতন রোগ, আর উহাতে প্রতিকার না হইলে, বিশেষ চর্মরোগ বন্ধ জন্তু পীড়ায় ।

Teller—ব্যথিত পাশ্বে শয়নে যাতনা বৃদ্ধি ।

• ভেলথিয়জ—দাঁড়ালে বেদনা অসহ্যকর, যেন উরু ভেঙ্গে যাবে ।

## স্নায়ু শূল ।

### NEURALGIA—TIC.

প্রায়ই বদন, রগ বা মস্তকের কোন স্নায়ুর মুড়ামুড়ি কন্‌কনানি, জালা, বেঁদার ভ্রায় অসহ্যকর যাতনা । থেকে থেকে ধরে । অধিকাংশ সময় চক্ষের নিম্নে বা কাণের সম্মুখে আরম্ভ হয় । ক্রমে মুখমণ্ডলের ও মাথার এক দিকে বা চক্ষুর খোঁদল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি পায় । আলোক, শব্দ, স্পর্শ, নড়া, কণা কওয়া বা আহারে ইহার বৃদ্ধি এবং ঘাড় শক্ত হওয়া ও বদনের পেশীর চিড়িক্‌মারা । রোগ বড় ক্রুর এবং অনেক সময় ঔষধ মানে না ।



কখন কখন রোগ অল্প সময়, কখন বা বহু দিন অবস্থান করে। ইহা দুই প্রকারের, এক কোন স্নায়ুর প্রদাহ বশতঃ (তখন ইহাকে টিক Tic বলে) কখন বা অপর কোন যন্ত্রের পীড়ার আনুষঙ্গিক, তৎকালে ইহাকে নিউর্যাল্জিয়া (Neuralgia) কহে।

অতিরিক্ত হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, হঠাৎ আব হাওয়ার পরিবর্তন, আঘাত বা চোট লাগা, আব (Tumor) আদির চাপ, ক্ষয়দাঁতের উপদাহ, ইত্যাদি রোগের কারণ।

আকন—যাতনা জন্ত ক্ষিপ্তপ্রায় (কামো); বদন লাল বা পান্ডাশ ও উত্তপ্ত, উদ্বেগ, এক দিকের ব্যথা, ভয়, উঠিলে মাথাঘোরা এবং জ্বর, অস্থিরতা। (পূবে শুষ্ক বাতাসে অনেক সময় হয়)। (পায়ের মাত্র টিক শূল, রাত্রে বৃদ্ধি।)

আস—নিয়মিত এক সময়ে ধরা, বিশেষ রং ও চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে, যেন উত্তপ্ত ছুঁই ফুটুনি বা বিহুনি, রাত্রে বিশেষ ১২টার যাতনা অসহ্য, অত্যন্ত বল-ক্ষয়। নড়াচড়ায় ও বাহিরে তাপ লাগানয় আস্ত প্রতিকার। বহু দিন যাতনা জন্ত নিদ্রা অভাবে বা শীর্ণতা বা উদরের পীড়ার জন্ত রোগ। পায়ের শূলে অসহ্য যাতনা, এমন জালা, যেন উত্তপ্ত ছুঁই দিয়া বিধার স্নায় বোধ হয়। (আকন, কামো)

বেল—চক্ষুর নিম্নে প্রচণ্ড বেদনা এবং তথায় ঘর্ষণে উপস্থিত উপকার। (স্পর্শে উত্তেজিত—কলসি, চিন, কস।) গালের হাড়ের নাকে এবং বদনের ঐক পার্শ্বে বেঁধা। কনকনানি ছেঁড়া সহ ঘাড় শক্ত হওয়া ও চোয়াল ধরা, চক্ষুগোলকে প্রচণ্ড ছেঁড়া বা বেঁধা, বদনের পেশীর আক্ষেপ, আলোক ও শব্দ অসহিষ্ণুতা, (আকন), ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, নিদ্রার পর বা জাগিয়া উঠায় বড়ই বৃদ্ধি। বেদনা খুব বাড়িয়া আবার হঠাৎ বন্ধ হওয়া, অথবা অন্ত্র অঙ্গে প্রকাশ, পাদশূলেও এইরূপ।

কাষ্টিক—বদনের হাড়ে বিশেষ চক্ষুর নীচে সঁটে ধরা বা স্পন্দন। ডান দিকে ঢাকি মালা হইতে রূপ অবধি সঁটে ধরা (চিপার), কাশিতে কাশিতে অসামান্য প্রস্রাব। ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা, আস।

কাশে—ফুঁড়ুনি, চিড়িকমারা, অসহ্যপ্রায় ও তজ্জন্ত এগোড় ওগোড় করা ;

কথার জন্ত চীৎকার ও মাথায় গরম ঘাম; বেদনা অন্য ক্ষিপ্তপ্রায়—যথোচিত ভক্ত জবাব দিতে অশক্ত; এক গাল মাত্র গরম ও লাল। পাদশূলেও ঐরূপ।

চিন—নিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত যাতনা, বেঁদা ছেঁড়া এবং স্বকের সাড়া-ধিকা এবং একটু স্পর্শে বৃদ্ধি। এক দিন অন্তর বৃদ্ধি, বিশেষ দুর্বলতা এবং অধিক রস-রক্তক্ষয় জন্ত; খুব বকা, বড় চটা, বদন কখন পাক্কাশ, কখন বা লাল।

সিমিসি—চক্ষুগোলকে অতিরিক্ত ও এক নাকে বেদনা, সম্মুখের মস্তিষ্ক (Cerebrum) যেন অধিক বলিয়া জ্ঞান এবং উহার উপর দিক দিয়া তাহা যেন ফেটে বাহির হইবে বোধ হওয়া। উত্তেজনা বা স্নায়বিক দুর্বলতা জন্ত রোগ, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

কলসি—বদনের বাম দিকে (সেপি) ব্যথা আরম্ভ হইয়া তথা হইতে রগ, নাক, কাণ, দাঁত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচণ্ড ছেঁড়া ও বেঁদা, এবং স্পর্শে বা নড়ায় বৃদ্ধি। (স্থির থাকায় এবং গরম লাগানয় সমতা) রাখা হইতে রোগ।

জেলস—এত হঠাৎ ব্যথা ধরে যে, তজ্জন্ত চমকান; মস্তিষ্কে দগ্ধপানি আরম্ভ হইয়া কপাল ও চক্ষুতে যাওয়া; চক্ষুর পাতা বড় ভার, চক্ষু খুলিয়া রাখিতে অশক্ত (রস, সেপি); দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও মনের প্লানি। যাতনা গেলেও সেস্থান অত্যন্ত কোমল। (পায়ের শূল—খুব ভিতরে সেন্টে ধরা, বেঁদা সহ অস্থিরতা ও শীত)

হিপার—মালাচালিতে আরম্ভ হইয়া কাণ ও রগ অবধি বিস্তৃত (পলস)। অধিক পান্না ব্যবহার দরুণ রোগে। বাহির বাতাসে বৃদ্ধি ও বদন আবর্তন করায় সমতা। খুব সর্দি বরা, গলাভাঙ্গা ও প্রচুর ঘাম।

মার্ক—করা দাঁতে ছিঁড়া ন্যায় ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইয়া যে দিকে বেদনা, সেই দিকের বদনে বিস্তৃতি (টাকিস) ও গলার বীচি আওরান, কখন কখন কাণ অবধি। চক্ষু দিয়া প্রচুর জল বরা ও মুখ আগা, ঘাম অধিক হইয়া সমতা না হওয়া, (সমতা হওয়া স্থলে—ভেরাট) ঠাণ্ডা হইতে রোগ।

নক্স—কপাল, বিশেষ নাকের ঠিক উর্দ্ধভাগে, সেন্টে ধরা, ছেঁড়া বা চাপুনি। বদন ও চক্ষুর নিম্ন প্রদেশের স্নায়ুর বেদনা, ঐ প্রদেশে সাড়র কম

হওয়া, চক্ষু লাল ও জল ঝরা, নাক দিয়াও খুব ঝরা । কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ আসা । চটা ও একা থাকিতে ইচ্ছা । ( See Teeth ) ( পদের ও উহার সাড়ি কম ) । প্রথমে ফোঁপলা দাঁতে, পরে উভয় চোয়ালে এবং বদন ও রগের হাড়ে । গরম ঢাকা ও নিদ্রায় সমতা—ঠাণ্ডা বাতাসে বা দাঁত মধ্যে অন্ন প্রবেশে অথবা গরম পানে বা গরম ঘরে বৃদ্ধি । দাঁত ঢকা, মাড়ি ফুলা ।

ফস—চোয়াল, নাকের গোড়া, চক্ষু ও রগ টেনে ধরা ও ছেঁড়া, বিশেষ বাম দিকের । বদন ফুলা ও পাক্সাশ হওয়া ও চুল্কুনি, মাথাঘোরা, কাণের ~~কণ্ঠ~~ শব্দ, ব্যথা ও শব্দধ্বনি । পেট খালি বোধ ও উহার দুর্বলতা ; মল কঠিন, সর ও লম্বা ও কষ্টে ত্যাগ ( কাষ্টিক ) ।

পল্স—অধিকাংশ সময় বদন ও মাথার ডান দিকেই হয় ; চোয়াল হইতে চক্ষু ও রগ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ও সেই চক্ষু দিয়া প্রচুর জল ঝরে ( মার্ক, নল ) । গরম ঘরেও শীতাল্পভব ; কাঁদা ও কষ্ট জানানর ধাতু ( ইগ্রে, সেপি ) ; অজীর্ণতা গা বমি বমি, ঋতুর গোল ।

রস—মালাটাকির হুঁহুড়, কাণ ও নাকের গোড়ায় টেনে ধরা, জ্বালা, ছেঁড়া, স্থির থাকায় বৃদ্ধি, সর্বদা নড়ায় কঠিন সমতা । বিশেষ ভেজার পর বা বাদলার পর, যেন দাঁত গুলা খুব লম্বা বোধ, ছট্‌ফট, আইচাই ।

### মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল ।

Neuralgia Tic douloureux.

কোন বিশেষ স্নায়ুর রোগে ইহাকে Tic বলে ; অথবা কোন ঘন্থের পীড়া সহ (sympathy) সহানুভূতি থাকা দরুণ রোগে Neuralgia কহে ।

Debility—দুর্বলতা—জ্ঞা—আস', চিন, সিমি, নল্ল, সাইপ্রি ।

Inflammation—প্রদাহ জ্ঞা—আকন, বেল, জেলস ।

Paroxymal—(থেকে থেকে) আকন, আস', মোসিস ।

Periodical—(নিয়মিত সময়ে)—চিন, আস' ।

Rheumatic—বাত জনিত—আকন, সিমিসি, রস, জেল্‌স, ব্রাই ।

Sudden—ইঠাৎ—জেল্‌স, স্মোনিস, সিমিসি, সাইপ্রি ।

WORSE—বৃদ্ধি ।

বৈকালে বৃদ্ধি—বেল ।

তৎস্থান সংস্পর্শে ঐ—ফস ।

মধ্যাহ্ন আহারের পর ঐ—আর্স, নক্স ।

ঠাণ্ডা পানের পর ঐ—কামো, স্পাইজি ।

গরম ঐ ঐ—কামো, মেজের ।

আহারে ঐ ঐ—ফস, মার্ক, সল্‌ফর ।

গরম খাদ্য ঐ ঐ—কামো, মেজের ।

সূক্ষ্মায় বৃদ্ধি—আকন, পল্‌স, প্লাটিনা, পল্‌স ।

বাম দিকে ঐ—সিমিসি, মার্ক, ফস, কলসিষ্ট, সেপি ।

সকালে ঐ—নক্স, পল্‌স, হাইয়স ।

রাত্রে ঐ—বেল, আকন, আর্স, রস, (>২টার পর) কামো, পল্‌স ।

বাহিরের বাতাসে ঐ—পল্‌স, নক্স, মার্ক, স্পাইজি, (হিপার) ।

গরম ঘরে ঐ—পল্‌স ।

চাপায় (or pressure) ঐ—হাইয়স ।

গরম লাগানয় ঐ—পল্‌স ।

স্থির থাকায় (Rest) ঐ—প্লাটিনা ।

নিদ্রার পর ঐ—বেল, নক্স ।

কথা কহায় ঐ—আর্স, নক্স, (ফস) ।

আঘাত বা চোট লাগা জন্ত ঐ—আকন, আণিকা ।

অধিক পারা ব্যবহার জন্ত ঐ—সল্‌ফর, হিপার ।

মানসিক শ্রমে ঐ—নক্স ।

নিদ্রা ভঙ্গে ঐ—বেল ।

গরম বায়ুতে বৃদ্ধি—মার্ক, রস, হিপার ।

আর্দ্র বায়ুতে (Damp weather)—ডব্লী, মার্ক ।

শুক ঠাণ্ডা বাতাসে—আকন, ব্রাই, সিমিসি ।

### সমতা ।

Rest—আরামে colo, Rhus.

ঔত্তাপে—নক্স, কলসি ।

স্নায়ু সমতা—পলস ।

গরম লাগানয়—আর্স ।

আহার কালীন—স্পাইজি ।

শয়নে—স্পাইজি ।

সেপি—বদনের অস্থিতে সেন্টে ধরা বা খাল লাগার ছায়, অধিকাংশ সময় বাম দিকে, বিশেষ গর্ভাবস্থার পীড়া, নাকের উপর এড়এড়ি জর্দা দাগ । মল-দ্বারে ভার বোধ ।

- ষ্টাকিস—করা দাঁতে ব্যথা আরম্ভ হইয়া চক্ষু অবধি বিস্তৃত (মার্ক), গালের হাড়ে টানা ছেঁড়া, হাত ঠাণ্ডা ও বদনে ঠাণ্ডা স্থান, অন্ন চাপে বৃদ্ধি, অধিক চাপায় সমতা, নক্স ।

ট্রাম—ঘাতনা অসহ ও দৌগীর হতাশাস হওয়া, বদনের পেশীর চিড়িক-মারা ও সর্ব শরীরের উৎক্ষেপণ । চক্ষু খোলা ও নিয়ত প্রলাপের বকুনি । অন্ধকারে বেড়ানয় (মাথাধোরা) ঘুরুগী, আপনাকে খুব লম্বা জ্ঞান ।

লক্ষর—পুরাতন রোগ ও অল্প ঔষধে তাদৃশ ফল না হইলে । চর্মরোগ বন্ধের পর ত্বক্ শুষ্ক, ঘর্ম্ অভাব, নিয়ত ব্রহ্মতালু গরম (ঠাণ্ডা—সেপি, ভেরাট) পুনঃ পুনঃ মুচ্ছাবৎ ।

ভেরাট—বদনের ডাইলে ও কাণের উপরিভাগে টানা, ছেঁড়া । চক্ষু বলা ও মুড়া ঠাণ্ডা । ঘাতনা সহ প্রলাপ বা ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়া ; ( এককালে মরিয়াবৎ Desperate—আকন, কামো, ট্রাম ) অল্প প্রত্যঙ্গ কম্পন ও উৎক্ষেপণ, ঠাণ্ডা ঘাম, বিশেষ কপালে ।

সিকুটা—দ্রাব্যিক দন্তশূলুনি, সোণা দিয়া দাঁতের কোঁপুরা বন্ধ করা দক্ষণ ।

স্পাইজিলা—অধঃচোরাগে চাপুনি, ছেঁড়া এবং ঘাড় অবধি বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল মাথা নাড়ায় কষ্ট ; বদন পাক্কাশ ও ক্ষীত, চক্ষুর চতুর্দিকে জর্জর (Rims) দাগ, হৃৎকম্পন, স্পন্দন, শীত, অস্থিরতা । ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা জলে অথবা বাতাস লাগায় বৃদ্ধি, শয়ন করায় ও আহার কালীন যাওয়া ।

ভারবস্কম—বিদ্যাহবৎ হানী, এবং তথায় অতি সামান্য সংস্পর্শে, যথায় কাপড় লাগায়, অথবা হাঁচা কি কথা কওয়ায় বা চিবনয় বৃদ্ধি ।

ব্রাই—বাত জ্বর বদনের দ্রাব্যশূল, বেদনা, টানা ছেঁড়ার স্তায়, নভায় বৃদ্ধি, চটা মেজাজ ও সদা বাতের যাতনা ।

প্লাটিনা—ব্যথিত পার্শ্ব শীতল হওয়া ও তথায় আক্ষেপ বা কাণের সন্নিহিতে হাত চাপুনি, ও তথায় সড়সড় বা সিঁদিসিঁদু করা এবং সন্ধ্যায় ও স্থির থাকে অবস্থার বৃদ্ধি, বদন লাল ও চক্ষুদে জল পড়া ।

আইরিস—যথা শিরঃশীড়ানহ মিষ্ট তারের স্নেহা ও কখন কখন পিত্ত বমন ।

মেজেরস—হঠাৎ জ্বালা ও চাপুনি এবং ঐ অঙ্গে সাড়-নানতা সহ শীত ও কাঁপুনি, গরম গৃহ প্রবেশে, গরম খাদ্য আহারে বৃদ্ধি, অনেক সময় গলা লাল ও জ্বালা ও চোরাগল শক্ত হওয়া । ইহা মার্কেস পর খাটে ।

হাইয়স—উপরের দাঁত টেনে ধরা, ছেঁড়া, দপ্ দপ্ করা, ঐ দপ্‌দপানি কপাল, নাকের গোড়া, ও চক্ষু অবধি বিস্তৃত । তৎসহ বদনের জ্বালাকর তাপ, দাঁত ঢকা, যেন পড়িবে একরূপ বোধ, চাপায় ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি এবং প্রায় সকালে হুহু ।

সাইপ্রিডি—অতিরিক্ত ও ক্লিষ্টকারী বেদনা, অধিক রাত্রি জাগরণ ও রোগীর শুশ্রূষা জন্ত ক্ষতিকূ বৃদ্ধি । খিটখিটে, চটা, অস্থির, কোন কিছুই আপত্তি করিলে সহিতে না পারা, কোন প্রকার উত্তেজনা অসহকর ।

## বয়স-ফোড়া ।

বৌবসিবিহ্বা প্রাপ্ত হইলে যুবক যুবতীর কপাল, গাল, নাক, ও ঘাড়ের কাল কাল কদম্বিকার দাগ এবং উহার মাঝে মাঝে সরস ফুসকুড়ি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ত্রণ দেখা দেয়। ইহা বদনে অধিক হয় এবং সর্বদা টিপিয়া রস নির্গত করায় বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হয় এবং বদন বিশ্রা করে। বিশুদ্ধ বায়ু ও যথোচিত ব্যায়াম আবশ্যক। সূরা, চা, কাওয়া এবং গরম দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। গো বা ছাগ দুগ্ধ, পাকা ফল, টাটকা তরকারী এবং হাল্কা অনায়াস জীর্ণ পথ্য বিধি।

গ্রাফাইট—বহু দিন হইতে শুষ্ক নিরস বা শুষ্ক এবং অস্বাস্থ্যকর হইলে। সামান্য স্ফোটক হওয়া ও পাকা, বদন ও বৃকে বয়স ফোড়া।

নক্স—ত্বকের সাড়াধিক্য, টাটান ও চিচ্চিড় করা, বয়স ফোড়ার সঙ্গে পেটের গোল, প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা; রাত্রে সুনিদ্রার অভাব।

নাইট্রী-আ—ত্বক জর্দা ও শুষ্ক, টক বা দুর্গন্ধ ঘাম, বদনে কাল কাল দাগ, প্রদর।

বোরাক্স—বিশেষ রজঃ বন্ধ দরুণ বয়স ফোড়া। ইহা অল্প ঔষধের ভ্রায় দিবস মধ্যে এক বা দুইবার সেবন করা এবং ১০ সিকি ভরি সোহাগা ঐক ছটাক জলে ফেলিয়া সরু নেকড়ায় ভিজাইয়া বদনে লাগান এবং তথায় শুকাইতে দেওয়া।

স্ফোটকে পুষ্য হইলেই তাহা নির্গত করিবা, এবং সুষোণ অম্লসারে গাত্র মার্জন ও ধোত করা সর্বতোভাবে উচিত।

### উদর বা রজঃ সম্বন্ধীয় স্ফোটক।

পুরাতন পেটের পীড়া, অর্শ, শোণিতাধিক্য বা বাধক ও প্রদর রোগ গ্রস্তের মস্তুরের ভ্রায় লাল লাল স্ফোটক হয় এবং উহা পাকে। বদন ও নাক মাতালদের ভ্রায় সর্বদা আরক্তিম ফুসকুড়ি পূর্ণ রহে। ব্যাধি বড় ক্রুর ও বিরক্তিকর। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সারিতে দেখা যায়।

মার্ক-ক—যথায় ছোট ছোট চুলকনা বিশিষ্ট ফুসকুড়ি, যা হইয়া শুকাইয়া তাহাদের মেড় উঠিয়া যায়।

রস—মস্তুরের ভ্রায় লাল লাল দাগ ও তাহার মাঝাড়ে বিন্দু বিন্দু ফুসকুড়ি—লাল চকচকে ফুলা, উহাতে ব্যথা ও স্পর্শ করিলে অতিশয় লাগা।

সলফর—ত্বক্ সড়সড়ানি, হলকুটুনি ও জাগাকর চুলকুনি, বৃকে পীঠে বিনুকুড়ি বিনুকুড়ি চুলকনা, অতি ক্ষুদ্র পাক ধরা স্ফোটক ।

সেপী—চুলকনা-বিশিষ্ট ফুসকুড়ি, রোগাটে চেহারা ; চক্ষু লাল ; সর্দদা শীত শীত, খেদাষিত, রজঃস্বল্পতা, প্রদর ।

হিপার—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মটরের ন্যায় স্ফোটক ; গাত্রে সামান্ততঃ আঘাত বা ছড় লাগিলে তথা ফুলা বা পাক ধরা ; চক্ষুপাতায় অঞ্জনী রসের আদত আরোক জলসহ মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ । কাঁচা ও অক্লীর্ণ-কারী ফল মূল. ঠাণ্ডা জলীয় বা বরফ অথবা সুরা ও অপর গরম খাদ্য নিষেধ ।

এই রোগ কখন পুরুষানুক্রমে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারা প্রায় অশঙ্ক্য ।

পা, বাহু, হাতের পীঠ, ঘাড়, বগল, পাছা ইত্যাদি স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে । প্রথম প্রথম তৎস্থান ফুলে এবং লাগ ও ব্যথা হয় । ক্রমে ক্রমে পাক ধরে । পরে ত্বক পাতলা হইলে আপনা হইতে ফাটে, পুরু হইলে অস্ত্র করা কখন কখন আবশ্যক হইয়া পড়ে । তৎকালে প্রথম প্রথম রক্ত ও পুষ্টি ঝরে ; কেবলমাত্র পুষ নির্গত হইতে থাকে ; যে পর্য্যন্ত না ক্ষুদ্র ডেলাবৎ একটা দোষিত পদার্থ বাহির হয়, ততক্ষণ নিরাময় হয় না ।

রক্ত খারাপ, আহারের স্বল্পতা, বিপুলবায়ু সেবন না হওয়া, অধিক শ্রম, হর্ডাবনা এবং প্রাচীনাবস্থায়, বিশেষ ধাতুবিশেষে এই রোগ প্রকাশ পায় । কখন কখন জ্বর ও স্ফোটক বা অপর রোগের শেষাংশে বা পরে ইহা হইয়া থাকে ।

গাল ফুলা ও তথায় যেন জলন্ত অঙ্গার থাকা বোধ, জ্বর ও অস্থিরতা থাকিলে—আকন ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মুড়ায় ফোড়া, বগল ও কুচকির গ্রন্থি আওরান, গাত্রতাপ, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া থাকিলে—বেল । ফোড়া গাত্র লাল বর্ণের এবং আঘাত লাগা বা খণ্ডাত্মক হইয়া বেদনা স্থলে আর্গিকা । বেল দিয়া প্রদাহ না কমিলে মার্ক, বিশেষ যথা অধিক ঘাম হইয়া যাতনার সমতা হয় না । বসাইবার উদ্দেশে ঘন ঘন হিপার এবং পাকহইতে হইলে খুব বিলম্বে বিলম্বে ঐ ঔষধ দ্রবী (যথা ২৪ ঘণ্টায় এক বা উর্দ্ধ হইবার) । ফোড়ার সঙ্গে বিসর্প রোগ থাকিলে রস ।

শিশুর ফোড়া বসাইবার নিমিত্ত ডাক্তার তেস্ত প্রত্যহ সিনা ৩৪ বার খাইতে



বলেন। পায়ের পাতা বা অনুলিতে ফোড়ায় লেডন। বড় বড় এবং এক সারে, আবার হয়, এমন স্থলে লাইক এবং কখন কখন ইহার পর সিলিসা আবশ্যক। নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে ও পুনঃ পুনঃ হইলে সল্ফর এবং আবশ্যক মতে উহা ও উক্স পর পর বিধি। ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত আর্গিকা ও সল্ফর দীর্ঘ কাল অন্তর এক এক মাত্রা এবং এরূপ বহু দিবস সেবন বিধি। নক্স, নাইট্-আ, ফস ও লাইকস, আবশ্যক মতে ইহারাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফোড়ার লালবর্ণ, ফুলা ও ব্যথার অবস্থায় প্রথম ক্রমাগত ঠাণ্ডা জলের ও মসিনার পুটী লাগান ভাল; হয় তো ইহাতেই মিলাইয়া যায়। প্রদাহিত অবস্থায় গরম-গরম পুটিসে স্থান নরম করে ও বিলক্ষণ আরাম বোধ হয়। পুষের উপক্রম হইলে বদ্ রসটা টানিয়া ত্বকের উপরে তুলে এবং শেষে আপনিই ফাটে বা আবশ্যক হইলে অস্ত্র করিতে হয়। কৃষ্ণকালীর পাতা বাটিয়া উষ্ণ উষ্ণ লেপ লাগাইলে বসে বা পাকে। হেলাঞ্চার বা কাঁটা ন'টের শিকড় বাটিয়া পাকা ফোড়ার উপর দিলে এক দিবস মধ্যে ফাটে, কাঁচার উপর দিলেও শীঘ্র শীঘ্র পাকায়।

ফোড়া পাকিবার পূর্বে বা প্রদাহিত অবস্থায়—আকন, রেল, মার্ক।

— পাকিবার অবস্থায়—হিপার, সিলিসা, আর্স, চিন।

— পাকিবার পর—কাক্সা, চিন, ফস-আ সল্ফর।

আর্স—অতিরিক্ত জ্বালা ও রোগী বলহীন ও নিস্তেজ। রক্ত-মিশ্রিত পুষ পড়া অথবা পচা ধরা অবস্থায়।

চিন—দীর্ঘস্থায়ী অথবা রস-রক্ত-ক্ষয়কারী রোগের পরে ফোড়া। পাকা-অবস্থায় দুর্বলতা পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্যকারী।

কাক্সা—পুষ পড়া বন্ধের পর ইহাতে ধাতু প্রকৃতিস্থ করে, আর হয় না।

মার্ক—কষ্টকর ফোড়া ও উহাতে অধিক পরিমাণে ঘন পুষ। শীত, তৃষ্ণা ও রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি।

সিলিসা—পুরাতন রোগ ও হাড়ের ফোড়া, পুষ কদম্ব ও দীর্ঘস্থায়ী, ইহাতে অতিরিক্ত পুষ কমায়, নালীঘার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

## পৃষ্ঠ-বণ, উরুস্তম্ভ, ওষ্ঠত্রণ প্রভৃতি ক্রব্য-ক্ষোভক ।

এরূপ রোগে পীঠের দাঁড়ার উপর, কোমর, বাড়, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান প্রদাহিত হওয়া, ক্রমশঃ বাড়, অত্যন্ত জ্বালা, দিন কতক পরে কালচে বর্ণ হওয়া এবং উহার মাথা চেপ্টা হইয়া চারিদিকে অনেক মুখ হইয়া কল্তানি নির্গত হয়। পরে সকল মুখ এক সাংড়া ও কাল বর্ণ হইয়া পচিতে থাকে। ঐ সঙ্গে জ্বর, অক্ষুধা, অনিদ্রা, বলক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্কদের অধিক হয়। রোগ বড় ক্রুর এবং অনেক স্থলে অন্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। মাথা বা বদনের পীড়া অধিক ভয়াবহ। ওষ্ঠত্রণে মুখে পচা ধরাতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ হয়, ইহাতেও তাহা দেওয়া বিধি। (ওষ্ঠত্রণ দেখ)। পচা ধরিলে উহা অধিক না বিস্তৃত হয়, তজ্জন্ত চারি ধারে নাইটি-আ দেওয়া বিধি।

## ওষ্ঠত্রণ ।

• অধরে একটা ক্ষুদ্র ফুস্ফুড়ি হইয়া ক্রমে বাড়ে ও শক্ত হয় এবং ঐ সঙ্গে চুলকুনি, হলফুটুনি জ্বালা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, ভয়, দিন দিন রোগ বৃদ্ধি, চেহারা বিকৃত হওয়া, না পাক্কা; পরে প্রায় অষ্টম দিবসে পচা ধরা এবং এককালে বলক্ষয় হইয়া মৃত্যু।

এই উভয় প্রকার রোগের প্রায় এক প্রকার ঔষধ, তাহা পশ্চাতে দেওয়া হইল। লক্ষণ সদৃশ হইলে তাহা প্রয়োগে ফল পাইবা।

সিলিসা—এক মাত্রা দিয়া তাহার পর দুই ঘণ্টা অন্তর লাকেসিস। অনেক সময় ইহাতেই আরোগ্য হয়। অথবা—

আস্ট্রাসিয়ম—প্রচণ্ড জ্বালা, পুথ বসে যাওয়া, কদর্যা ঘ্রাণের কল্তানি এবং মস্তিষ্কের উপসর্গ।

আপিস—বৈসর্পিক প্রদাহ, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকা, তৎসহ জ্বালা ও হলফুটুনি; গরম ঘরে যাতনা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা প্রয়োগে সমতা।

আর্স—খুব জ্বালা, ত্রণ কাল ও পচা ধরার চেহারা (লাকাসি, কার্বো) ; অতিশয় অস্থিরতা, নিয়ত তৃষ্ণা ও অল্প অল্প পান, বলক্ষয়, রাত্রে যাতনা বৃদ্ধি

এবং গরম গৃহে থাকায় ও বাহিরে তাপ লাগানয় কষ্ট কমা । বিশেষ যোগ সংস্পর্শীয় হইলে ।

কার্বো—গাঢ় কালুচে বর্ণের দুর্গন্ধ বা বর্ণ ত্রণ ; অতিশয় বলকর, মুড়ায় বাম, জ্বালা জন্ত সর্বদা বাতাস করিতে বলা ।

বেল—ত্রণ উজ্জল লাল ও দপ দপ করা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, স্বিম্নন কিং নিদ্রার অভাব । বৈকাল ৩টায় যাতনা বৃদ্ধি ।

রস—যাতনা জন্ত অত্যন্ত অস্থির, নড়াচড়ায় কতক সমতা ।

লাকাসি—কালুচে বা বেগুনে বর্ণের ক্ষত, রোগী গলা স্পর্শ করিতে দেয় না, মুক্তিকের উপসর্গ, নিদ্রার পর যাতনা বৃদ্ধি । যা খুব বিস্তৃত বা গভীর হইতে থাকে ।

সিলিসি—পাক ধরা নিশ্চয় হইলে অথবা দুর্গন্ধ, জলবৎ রস ক্ষয় ও তীব্র বেদনা থাকিলে ।

পৃষ্ঠত্রণ প্রভৃতি রোগেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

## গাত্র চুলকুনি ।

প্রায়ই অল্প রোগের আনুষঙ্গিক গাত্রচুলকুনি দেখা যায়, কখন কখন ইহার সঙ্গে কুস্কুড়ি থাকে । ইহার জন্ত সর্বদা বিরক্ত এবং সময়ে সময়ে অসভ্য ও নির্লজ্জ হইতে হয় । শরীর পরিষ্কার না রাখা, তাপের আধিক্য ও ন্যূনতা, ঘৃত চর্বি খাদ্য অধিক থাওয়া, এই সকল কারণে কাহারো সর্ব-শরীরে কাহারো বা অঙ্গবিশেষে রোগ প্রকাশ পায় ।

প্রত্যহ এক বা দুইবার করিয়া গরম জল দিয়া ঐ স্থান ধোত করা, ক্রেশ বা গাম্ভ্রা দিয়া গা ঘর্ষণ করায় আশু কতক ক্ষয় হয় । কিন্তু আরোগ্য হওন নিমিত্ত নিম্ন ঔষধগুলি অনেক সময় ব্যবহার্য্য ।

অসি—ত্বক শুষ্ক সহ জ্বালা ও চুলকুনি ।

ইয়—ঐষায় শরনে চুলকুনি বৃদ্ধি, মাছি কামড়ানর জ্বার সর্বশরীরে দাগ, ঘ্যাচর ঘ্যাচর করিয়া চুলকাইলে স্বস্তি হয়, কিন্তু চুলকুনি গিয়া অল্প স্থানে ধরে ।

\* ওপি—বহুদিনের আফ্রিকাখোরেরা সদা সর্কদা গা চুলকায় । প্রাচীনের বহু দিনের গা চুলকুনির ইহা বিশেষ উপযোগী ।

নক্স—রাতে শয়ন করিলে গাত্রাবরণাদি খোলার পর সর্ক শরীর চুলকুনি ।

• পল্‌স—গাত্রের হেথাসেথা যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়ানো বোধ, শয্যার উত্তাপে এবং যত ঘ্যাচর ঘ্যাচর কর ততই বৃদ্ধি ।

মার্ক—সারা রাত্রি শয্যার চুলকুনি ও পূর্ক ঔষধে প্রতীকার না হইলে । ঘ্যাচর ঘ্যাচর করার তথ্য দিয়া রক্ত পতিত হওয়া ।

রস—চুলকুনির সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা (আস) । সর্ক শরীরে বিশেষ লোমাবৃত স্থানের পীড়া । ফল না হইলে ইহার পর কখন কখন হিপার দেওয়া বিধি ।

সল্‌ফর—গুড় গুড়ুনি ও চুলকুনি এবং ঘ্যাচর ঘ্যাচর করা বা তাহার পর জ্বালা বা ব্যুথু (টাটিন) । পুরাতন রোগে অধিক ব্যবহার্য এবং ইহার পর কার্বো বেশ খাটে ।

• নুতন রোগে প্রত্যহ ২।৩ বার ; পুরাতনে ৩।৪ দিনে একবার । পরে ৭ দিন বন্ধ দিয়া পুনরায় সেই বা অপর ঔষধ দেওয়া বিধি । উত্তম পরিপাক না হয়, এমত ঔষ্য পরিহার্য ।

## গলগণ্ড ।

• ইহা সাধারণের পরিচিত রোগ । কাহারো এক, কাহারো বা উভয় গুলগ্রন্থি প্রকাশ পায় । আকার বৃদ্ধি হইলে শ্বাসনলীর উপর চাপ পড়ায় বিলক্ষণ নিশ্বাস কষ্ট হয় । পাহাড়িয়া দেশে এবং জীলোকের, বিশেষ যাহারা অধিক প্রসব যন্ত্রণা ভোগিয়াছে, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয় । জলেচ্ছদ্য (যথা অধিক চূণ ও মাগ্নিসা থাকা), অগুপ্তিকর আহার, অর্জ আঁধার গৃহ, বিকৃত ধাতু এবং কখন বা জরায়ুর পীড়া জন্ম এই রোগ দেখা দেয় ।

স্পঞ্জি—উত্তম ঔষধ—সপ্তাহ দুইবার, তাহার পর এক সপ্তাহ বিরাম ।

থুজা—গলগণ্ডের শিরা ক্ষীত, ব্যাধাবিশিষ্ট ।

আইড—স্পঞ্জ দিয়া না কমিলে—এক সপ্তাহ একবার প্রত্যহ ৭ দিন বিরাম ।

কালী-হাই—পূর্ক ঔষধে বৃদ্ধি পাওয়া না কমিলে, বিশেষ বাতগ্রস্তের ।

যে ঔষধ যখন সেবন হয়, তাহার মলম করিয়া তৃতীয় রাতে গলগণ্ডে মালিস করিবা । সমুদ্র ধারে বাস, স্থান পরিবর্তন, জল সিদ্ধ ও ফিল্টার করিয়া ব্যবহার বিধি । এতদ্বিন্ন কার্বো-আ, সেপি, লাইক, ব্রম, কাক্স, নক্স ।

### নাসিকা রোগ—নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

শৈশবাবস্থায় মধ্যে মধ্যে নাসিকা দিয়া রক্তপাত হয়, ইহাতে বিশেষ ভয় নাই ।

সর্দি নিমিত্ত রোগে—পল্‌স, আস ।

কুমি জন্তু হইলে—সিনা, মার্ক ।

অগ্ন্যাত দরুণ রোগে—আর্গিকা, কালেনডুলা ।

অতিরিক্ত শ্রম জন্তু—রস, কার্বো ।

মস্তিষ্কে অধিক রক্তসঞ্চয় দরুণ—আকন ও বেল ।

প্রাতে রক্তপাত পক্ষে—নক্স, ব্রাই, কার্বো ।

রাতে হইলে—রস, বেল, ব্রাই ।

গরম বা রুক্ষবশতঃ রোগে—আকন, ব্রাই ।

হৃৎকল ও ক্ষীণদিগের রক্তপাত পক্ষে—চাইনা, ফেরম ।

পুনঃ পুনঃ নির্দিষ্ট সময়ে রক্তপাত হইলে—আর্গিকা, তাহাতে না সারিলে ফস ; রক্তপাত অতিরিক্ত বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পূর্ব ঔষধদ্বয় পর পর ।

অধিক রক্ত পড়িতে থাকিলে মাথায় উচ্চ করিয়া বালককে শোয়াইয়া রাখিবা, নড়িতে চড়িতে দিবা না, নাকের ডাঁটিতে ঠাণ্ডা জল বা বরফ নিয়ত দিতে থাকিবা, জমাট রক্ত খুঁটিয়া ফেলা অপরাধমর্শ । উপর ঠোঁঠ বা গুঠমধ্যে নেকড়ার পুঁটলি রাখিলে অনেক সময় রক্ত বন্ধ হয় । অল্পপ্রাণ ও ঠাণ্ডা আহাৰ বিধি ।

### নাক ফুলা ।

সর্দি জন্তু নাসিকা ফুলিলে সর্দির ঔষধ প্রয়োগ করিবা ।

প্রদাহ বশতঃ নাক ফুলা, টাটান, প্রভৃতি উপসর্গে বেল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, তাহাতে উপকার না হইলে হিপন, পরে মার্ক, ব্রাই বা রস ।

• অধিক পায় দাঁত ঔষধ ব্যবহার জন্ত রোগ হইলে আরম, বেল, লাক-  
মিস, হিপার, নাইট, -আ, সলফর।

নাকের উপর তিলের তায় কীল দাগ পড়িলে সলফর বা গ্রাফাইটস ;  
লাল দাগে, ফস-আসিড। নাসিকার অগ্রভাগ লাল হইলে রস, কান্ধা ;  
তাম্রবর্ণ হইলে, আস, ভেরাট। নাকে আঁচিল পক্ষে কষ্টিকম। ইহার মধ্যে  
যে সমস্ত রোগ দীর্ঘকালে সারা সম্ভব, তজ্জন্ত সপ্তাহে একমাত্রা উপযুক্ত ঔষধ,  
তরুণ ব্যাধিতে দিবসে ২ মাত্রা, এবং ২১০ দিন খাওয়াইয়া প্রতীকার না  
বুঝিলে, নির্দিষ্ট ভৈষজ্য মধ্যে অপর কোনটা পূর্ব নিয়মে সেবন বিধি।

নাকের আগা লাল ও ছুঁইলে ব্যথা জন্ত—রস।

নাকের উপর চুলকনা কুসকুড়ি ও পাতার গোড়া ব্যথা পক্ষে—আনটিম,  
কষ্টিকম।

• ক্রমি অন্তঃপ্রদাহ প্রভৃতি রোগ জন্ত নাক চুলকুনী ও খুঁটুনি, সেই সেই  
ব্যাদি আরোগ্য করিলেই উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

## • অথবা বা'ড়।

• কখন কখন শিশুরা কেবল ঢ্যান্সা হইতে থাকে। তৎকালে মাংস  
কোমল, মুখমণ্ডল ফেঁকালে, স্থির থাকিতে ও অধিক ঘুমাইতে ভালবাসে।  
প্রাতে অধিক নিদ্রালুতা এবং দিবাভাগে অনেকবার নিদ্রা, ব্যায়ামকালীন  
গাঁইট ব্যথা এবং কখন কখন অসাড়ে শোচ ও প্রস্রাব (এই উপসর্গটা বহুকাল  
থাকে)। বৃদ্ধি ও স্মরণ শক্তির হ্রাস, পাকশক্তির হ্রাসলতা, ক্ষুধামান্দ্য, দিন দিন  
রুগ ও হ্রাস হওয়া, দস্ত উঠা ও জননেন্দ্রিয়ের উন্নতির ব্যাঘাত, বুকের কেবল  
লম্বাদিকে বাড় হওন জন্ত এক ধড়ফড়ানি, নিশ্বাস কষ্ট, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাশ  
প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়। এ রোগ ধরিলে নিতান্ত শিশুরা চলিতে পারে  
না; যাহারা পূর্বে হাঁটিত, রোগবশতঃ তাহারাও তৎকার্যে অশক্তি হয়।

এই ব্যাধির পক্ষে পাইনস সিলভেসট্রিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেল—বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধি অধিক; শরীর দিন দিন লম্বা, কিন্তু পা সক্ষম ও

চেহারা পাকাটে হইলে। ইহাতে না সারিলে সল্ফর; চলিতে না পারা অবস্থার কাঁকা; অঙ্গ ও গাঁইট ব্যথা পক্ষে সিলিসা; পা লটপটানি পক্ষে কাপ্টিকস; হিম লাগাতে রোগ বৃদ্ধি বা প্রকাশ পক্ষে ডক্কা। কখন কখন কাঁকা ও সল্ফরে ফল না দর্শিলে, ফস আসিডে উপকার হয়।

দীর্ঘকাল অন্তর এক এক মাত্রা উপযুক্ত ঔষধ। (গণ্ড-মালা ধাতু অঙ্গ-বন্ধ প্রভৃতি রোগ দেখ)।

### অঙ্গহাজা।

অঙ্গীর্ণতা বশতঃ বা শিশুর দেহের স্থূলতার জন্ত নিকটস্থ অঙ্গের পরস্পর ঘর্ষণ ও অপরিষ্কার থাকা প্রযুক্ত সন্ধিস্থান, যথা, কুচুকি, মলদ্বার, গলা, কাণ ও হাঁটুর পশ্চাদ্দেশ, এবং কেচিং বা সমস্ত শরীর হাজিয়া ও ফাটিয়া যায়। পীড়িত স্থান লাল হয়। কখন কখন অত্যন্ত চুল্কায ও তথা হইতে রস নির্গত হয়। প্রত্যহ ২।৩ বার তৎস্থান ধৌত করিবা (ঐ জলে অত্যন্ত লবণ ফেধিলে রোগ আর বিস্তৃত হইতে পারে না)। হাজা বা লাল হইলে আর্গিকা; এক পোয়া জলে ৩।৪ ফেঁটা আরোক দিয়া ধৌত করিবা বা উহার উপর ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবা।

অনায়াস-জীর্ণ পথ্য ও স্তনপায়ী শিশুর মাতার আহারের কটকেনা বিধি।

কানো—পেটে অম্ল ও উদরাময় রোগ বশতঃ হইলে।

কালেনডুলা—আর্গিকা সহ না হইলে বা উহাতে না সারিলে; বিশেষ তৎস্থান অধিক উত্তপ্ত ও ক্ষীত এবং খাঁজে খাঁজে অধিক দুর্গন্ধ রস নির্গত হইতে থাকিলে।

ইথুসা—বেড়ালে উঁকু হাজা, সামান্য ঘাম হওয়া।

আর্গিকা—অঙ্গ ঘর্ষণ জন্ত রোগে—এই ঔষধদ্বয় পর পর দেওয়াই ভাল।

বেল—হাজা বা দগ্ধগে লাল হইলে।

মার্ক—পিতার গর্ভের পীড়া থাকা বশতঃ সন্তানের এই রোগ হইলে; বহুদূর ব্যাপিরা হাজা ও তথায় কদর্য গন্ধ, টক গন্ধ ভেদ, অক্ষুধা, হাজা স্থান লাল, রাতে যাতনা বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গে; অথবা পূর্বে পূর্বে ঔষধে হাজা সারিয়া থাকায় স্বক্ হ্রিঘর্ষণ থাকিলে।

পূর্বে অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার থাকিলে, লাইকপ ও হিপার ;  
কর্ণের পশ্চাভাগের রোগে গ্রাফাইটস ।

হাজা স্থান অধিক উত্তপ্ত, লাল ও ক্ষীত এবং কখন কখন দুর্গন্ধবিশিষ্ট রস  
নির্গত হইলে রস ; ইহার সঙ্গে চুলকুনি ফুসকুড়ি থাকিলে সলফর ; অল্প  
কিছুতেই না সারিলে লাইকপ বা সেপিয়া, কাক্সা, কার্বো । প্রত্যহ বা এক  
দিন অন্তর এক মাত্রা দিবা, ২। ৩ মাত্রা দিয়া ৩। ৪ দিন বিরাম, পরে সেই  
বা অল্প একটা ঔষধ আবশ্যক বুঝিয়া প্রয়োগ করিবা ।

### শীর্ণ হওয়া—চনামারা ।

• অজীর্ণকারী, গুরু, উত্তেজক বা অতিরিক্ত খাদ্য আহার ; অপটিকর দৃষ্ট  
বা অল্পমাত্রায় স্তনদুগ্ধ পান ; আর্দ্র, নিম্ন, ও অবিশুদ্ধ বায়ু পরিচালিত গৃহে  
বাস ; প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অভাব ; অপরিষ্কার থাকা ; দস্ত উদগমেত উপদাহ ;  
পুরাতন উদরাময় ; কৃমি ; অল্প প্রদাহ ; জনক জননীর কাশ, গরমির পীড়া বা  
অধিক পারা ঘটিত ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তের ফল স্বরূপ এই ব্যাধি হইতে  
দেখা যায় । এক হইতে তিন বৎসরকাল বয়স মধ্যে শিশুর এই রোগ অধিক  
হয় । তদধিক বয়স্কদিগের ইহার সঙ্গে প্রায়ই ক্রোম রোগ থাকে ।

• সর্ব প্রথম অল্প কোন উপসর্গ দেখা যায় না, কেবল রোগী দিন দিন শীর্ণ  
হইতে থাকে ; ক্রমে চক্ষু বসা, নাকি ছুঁচুলা, চিবুক (খুতি) উচ্চ, পেট ডাগরা,  
কখন বা খোলে পড়া, চর্ম শুষ্ক ও তোবড়ান ও রোগীর অতিরিক্ত বলক্ষয় হয় ।  
রাফসবৎ ক্ষুধা, কখন কখন বমন, পেটে অল্প হওয়া, কোষ্ঠ কঠিন বা টক  
হড়হড়ে শাদাটে ভেদ এবং সর্বশেষে ক্ষয়জর প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় ।  
ক্রোমরোগ থাকিলে পেট মধ্যে শক্ত গাঁইটের স্থায় গ্রন্থি ফুলা স্পর্শে জানা যায় ।  
(অল্পপ্রদাহ দেখ) ৪। ৬ সপ্তাহ রোগের অবস্থানকাল । ক্রমে ক্রমে ও  
আন্তে আন্তে স্বাস্থ্য লাভ হয় ।

সর্ব প্রথম রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহার প্রতিকারে যত্নবান  
হইবা ।

সল্ফর—অতিরিক্ত ক্ষুধা, পেট শক্ত ও ফুলা, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ, ফাঁকশে



বর্ণ, চক্ষু বসা, স্বক্ তোবড়ান ও বুড়ার শ্রায় চেহারা, অনিদ্রা, গাত্র চুলকুনি, ফুসকুড়ি, সর্ষদা নাক দিয়া শ্লেষ্মা ঝরা, সর্ষদা স্বাভাবিক অপেক্ষা উষ্ণ ঘর্ম, কুঁচকি ও বগলে বীচি আওরান উপসর্গে ব্যবহার্য্য। পিতার গর্শ্বিরোগ ও অধিক পারা ব্যবহার করা থাকিলে এবং মার্ক ও হিপার স্বেবনে ফল না দর্শিলে ইহা দেওয়া বিধি।

কাঁকা—সর্ষদা খাই খাই, অত্যন্ত শীর্ণ, পেট ডাগরা ও উহার মধ্যস্থিত ক্রোমগ্রস্থি শক্ত হওয়া ও ফুলা, মেটে রঙ্গের ভেদ, স্বক অধিক শুষ্ক, মাথায় খুকি পড়া, এবং চুল নিরান্নি, টানিলে উঠে যাওয়া, ক্রমে বুক ধড়ফড়ানি, কাশি ও শূল্য ঘড়ঘড়ানি এবং মাথার ঘামে বালিস ভেজা ইত্যাদি উপসর্গে।

চনামারা পক্ষে ঐ দুইটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লক্ষণানুযায়ী ইহাদিগের পর পর দিলে অধিক ফল লাভ হয়। একক দিতে হইলে প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া ৮।১০ মাত্রা দিয়া ৪।৫ দিন বিরাম, পুনরায় পূর্বমত দিবা। দুই পালার পর ফল না বুঝিলে অপর ঔষধ ঐ নিয়মে দিবা। পর পর যদি দেও, তবে এক দিন একটা, পর দিন অপরটা এবং এইরূপে পূর্বের শ্রায় সেবন বিধি।

• পূর্ব ঔষধদ্বয়ে প্রতিকার না হইলে, বিশেষ গুণমালা বা ক্রোমরোগগ্রস্তকে বেরাইটা, আসিড নাইট্রিক, কোনিয়ম, ফস, ইহাদিগের মধ্যে সদৃশ লক্ষণানুযায়ী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবা।

ইথুসা—আর্স, কাঁকা, সিলিসা, কিছুতেই উপকার হইতেছে না; শিশু ক্রমশঃই জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, এমন অবস্থায়।

আইড—রদন পাটকিলে বর্ণ ও অধিক পরিমাণে থস্‌থসে মল।

আণ্ট—অপর উপসর্গ সহ বিশেষ লক্ষণ, শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেয় না।

আর্জেন্ট-না—চড় চড় শব্দ বিশিষ্ট মরুৎক্রিয়া সহ সজ্জা হুর্গন্ধ আম বাছে।

আর্স—চর্ম শুষ্ক, চক্ষু বসা ও চক্ষুর ধারে কালশিরা পড়া, সর্ষদা তৃষ্ণা ও অন্ন অন্ন পান, আইটাই, বিশেষ রাত্রে, নিদ্রায় অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, অজীর্ণের ভেদ, বদন ফুলা, হাত পা ঠাণ্ডা, রাত্রে ঘর্ম ও অতিরিক্ত বলক্ষয়।

আলোস—ত্যাগের পর মল জমাট, আমের শ্রায় সজ্জা বা স্বচ্ছ।

ইথুসা—পানের পরই হড়হড়ে করিয়া দুধ তোলা, পরক্ষণে নিদ্রা, ঘুম

ভাঙ্গিলেই ক্ষুধা, দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হওয়া এবং আস', কান্ধা, সিলিসা দিয়া উপকার না হইলে ।

ইপি—প্রচুর পরিমাণে পুনঃ পুনঃ বগন ; সজ্জাটে ও অনেক সময় গাঁজ-লাটে ভেদ হওয়া ।

ওলিগাওয়ার—ঘাহা খায় তাহাই রূপান্তর না হইয়া অসাড়ে বা অনিচ্ছাধীন নির্গত হওয়া ।

কামো—জলবৎ হড়হড়ে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া ডিম-পচা গন্ধের ভেদ, কোলে লইয়া বেড়ানয় ভাল থাকা, চেক্‌ড়ান, পেটের দিকে লা তোলা, পেট ফাঁপা ও অল্প হওয়া, জর, পুনর্বীর চেহারার পরিবর্তন ।

কোনাই—পেট ফুলা ও শক্ত হওয়া ; কখন দুই, কখন এক পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; জলবৎ টকগন্ধের ভেদ বা মাঝে মাঝে অবচার ও পেট কান্ধান এবং কখনও বা কোষ্ঠ কঠিন হওয়া ।

ক্রিয়োস—দুর্গন্ধ মল ও আমাশয়িক ঝিলি হাজা ।

গ্রাফাইট—স্বকে সরস ফোফা ও তথা হইতে আটা আটা রস নির্গত হওয়া ।

চিন—অতিরিক্ত দুর্বলকারী ঘাম, বিশেষ রাত্রে, মুখ টাটানো ও তথায় ক্ষত থাকা ; পেট ফাঁপা ও অল্প হওয়া ; অকষ্টকর অজীর্ণের ভেদ ; রাক্ষসবৎ ক্ষুধা ; বদন পাঙ্গাশ ; যক্ৰুৎ ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি ; হাত ও পায়ের পাতার শীর্ণতা । নক্স । অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ পর পর হওয়া, বেশ ক্ষুধা, কিন্তু আহারে ঘেঘ ও অনেক সময় উহা তুলিয়া ফেলা ; যক্ৰুৎ ফুলা ও শক্ত হওয়া, সর্বদা শয়নে ইচ্ছা, ৩টা রাত্রে পর আর ঘুম না হওয়া ।

নেট্রম—গলা ও ঘাড় শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হওয়া । শিশুর বিলম্বে কথা কহিতে শিখা ।

নাইটি-আ—গাঁইট ও হাড় ফুলা ও ব্যথা, মাড়ি টাটান, গলা ও পেটের গ্রন্থি বড় হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদ, বিশেষ অধিক পারা ব্যবহার থাকিলে ।

পল্‌স—ভেদ, বিশেষ রাত্রে, প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; বাহির বাতাসে যাতনার সমতা, খাম পেয়ালি মেজাজ, উপসম হইতে হইতে

বিশেষ কারণ ভিন্ন রোগের বৃদ্ধি । অস্থিরতা, অরুচি বা রাগসবৎ ক্ষুধা, টক জল উঠা ।

পিট্রোল—চনামারা ; কেবল মাত্র দিবসে ভেদ, রাত্রে নয় ।

পড—শীর্ণতা, অনেক বার সহজ বাহ্যে, প্রাতে ভেদ, মাথা এ দিক ও দিক গড়ান ।

ফস—দীর্ঘকালের ও দুর্বলকারী উদরাময় এবং ক্রোমের পীড়া থাকিলে হুড়হুড় করিয়া ভেদ যেন নর্দমা দিয়া জলপড়া এবং পরক্ষণেই রোগীর নেতিয়া পড়া, উৎকাশি, চক্ষু বস্মা ও পার্শ্ব কালশিরা, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ ও ক্ষীত । লম্বা একহারার পক্ষে অধিক খাটে, বিশেষ যথা ক্রোম গ্রন্থির পীড়া থাকে ।

ফস-আ—জর্দাটে কদর্যা গন্ধের ভেদ, ঔদাস্য ।

ফেরম—বদন লাল, খাদ্য বমন ও অজীর্ণের ভেদ ।

বেঙ্গ-আ—বিশেষ যথা নিষাদল বা ঘোড়ার চোনার ছায় প্রস্তাবের ঝাঁঝ থাকে ।

বেল—গলার বীচি আওরান বা পাকা, চক্ষু-পাতার প্রদাহ বা যা হওয়া, ঘুম ঘুম কিন্তু নিদ্রা না হওয়া, ঘুমন্ত চমকান, কাশি, গলা ঝড়ঘড়ানি, শিশুর বয়স অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি ।

বারাইটা—গলার বীচি আওরান, পেট ভাগর ও শক্ত, ছুঁইলে ব্যথা, সর্বদা নিদ্রার ইচ্ছা, শ্রমে ঘেষ, ভেদ ও ঐ সঙ্গে ক্ষুদে ক্রমি । অনিদ্রা, ক্ষুধা, কিন্তু অধিক খাইতে না পারা এবং টক ও মিষ্টে ঘেষ, জ্বাহারে বসিলে বাহ্যের বেগ ও কোমর ব্যথা, মাথায় খুঁকি পড়া, এবং চুল এবং নাক ও গালের চামড়া উঠা ।

ব্রাই—থাওয়ার পরই তুলে ফেলা ; মুখ কৌষ্ঠ শুষ্ক ; অধিক তৃষ্ণা ; পোড়ার ছায় মল ; স্থির থাকিতে ইচ্ছা ; চটা ।

মাগিসা-কা—অতিশয় শীর্ণ হওয়া, সজ্জা জলবৎ খুব টক গন্ধের ভেদ ।

মার্ক—পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত হুড়হুড়ে সজ্জাটে টক বা দুর্গন্ধ মল, অতিশয় কৌত পাড়া বর্ষায় বৃদ্ধি ; অথবা ঠোঁঠ জিত ও গালের ভিতর ঘা, পেট ফাঁপা, গ্রন্থি ও গাঁইট বড় হওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হওয়া, গ্রন্থি পাকা, রাত্রে অধিক ঘাম ও রোগ বৃদ্ধি । শিশুর মাথা বড় ও বহুদিনে ব্রহ্মরন্ধ্র ঘোড়া লাগা ।

রস—লাল আম ভেদ, বড় অস্থির, দুর্বল, সর্বদা শয়নে ইচ্ছা, বদনে স্ফোটক । রাত্রে পেট ব্যথা, ভেদ ও অস্থিরতার বৃদ্ধি ।

লাইক—সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরই একগুঁয়ে ও চটা, খুব পেট ডাক, বৈকাল ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত যাতনার বৃদ্ধি ।

ষ্টানম—পেট খুব কসিয়া চাপিলে ব্যাথার সমতা ।

ষ্টাফিস—ভেদ বন্ধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ভরা থাকিলেও ক্ষুধা বোধ, গলার বীচি আওরান, নাক দে জল ঝরা, রক্ত, হাজা ও টাটান, ঠোঁঠের কোনে ঘা, রাত্রে দুর্গন্ধ ঘান । চক্ষু বসি ও সজল হওয়া ।

সিনা—অস্থির, চটা, নাক খোঁটা, রাক্ষসবৎক্ষুধা, শয্যায় মোতা । (ইহাতে না সারিলে কাক্স বা সল্ফর ।

হিপার—শরীরে টক গন্ধ এবং দুর্গন্ধ শাদা বাহ্যে ।

আহারাদির ব্যতিক্রম বশতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় বা অন্ত অন্ত ঔষধ ব্যবহার কালীন উদরাময়ের দমন নিমিত্ত মাঝে মাঝে লক্ষণানুযায়ী হইলে—পলস, আণ্ট, ইপি, দেওয়া যাইতে পারে । আহার করিলেই বমন ও কোষ্ঠ কঠিন হওয়া পক্ষে—ব্রাই, নক্স, সল্ফর । বমন ও ভেদ পক্ষে—পলস । দুধ তোলা পক্ষে—ইথুসা, ইপি, ফেরমু । শিশুর নিকে তাকাইলে কেঁদে ফেলা পক্ষে—আণ্ট । পেট ফাঁপা এবং দুর্গন্ধ ও অকষ্টকর ভেদ পক্ষে—চিন । আমেশা ও বৃষ্টিতে রোগ বৃদ্ধি পক্ষে—মার্ক । কিছুমাত্র জীর্ণ না হইয়া আহার মলদ্বার দিয়া অজানত ত্যাগে—ওলিয়াভার । প্রস্রাব ঝাঁঝাল হইলে—বেজ-আ । বৈকালে ৪টা হইতে রাত্র ৮টা পেট হড়মুড়—লাইক । গাত্রে বোট্কা গন্ধ ও শাদা দুর্গন্ধ ভেদ—হিপার । দুর্গন্ধ ভেদ ও নাক মুখ মলদ্বার হাজায়—ক্রিয়োস । ত্বকে ফোকা ও তথা হইতে আঁটা আঁটা রস নির্গত হওন পক্ষে—গ্রাফাইট । সজাটে টক জলবৎ ভেদ ও অত্যন্ত শীর্ণতা—মাগ্নিসা । কৃমি জন্য রোগ, সেজে মোতা, অতিরিক্ত ক্ষুধা থাকিলে—সিনা । কখন অধিক কখন মন্দা ক্ষুধা, হড় হড়ে বা রক্তযুক্ত ভেদ, পেট ব্যথা, দুই প্রহর রাত্রের পর বৃদ্ধি ও ক্রোমগছির পীড়া পক্ষে—রস ।

ক্রোম রোগে গ্রন্থি আওরান পক্ষে বেল, মার্ক, সল্ফর, কাক্স, নাইট্র-আ ;

উদরাময় ও জীর্ণ শীর্ণতা নিমিত্ত—চিন, আর্স, ফস, আইড, বারাইটা, হিপর, সিনা এবং ফুসফুসের পীড়া পক্ষে—ফস, কালী-কা, নাইট্রু-আ। এই রোগে পেট ঘর্ষণ ও উষ্ণ সেক ( ফোমেন্ট ) ব্যবহার সমতা হয়।

দুগ্ধ-পোষ্যের পীড়ায় মাতার দুগ্ধ দূষিত হইলে ভাল ধাত্রী নিযুক্ত করিবা। তদভাবে গর্দভ বা ছাগ দুগ্ধ অথবা নূতন বিয়ানো গাইয়ের দুগ্ধ দেওয়া বিধি। অধিক বয়স্কের অনায়াস-জীর্ণ সবলকারী পথ্য, প্রত্যহু অল্প উষ্ণ জলে স্নান ও বৈকালে গাত্র মার্জনা এবং আবশ্যক বুঝিয়া জল-পাট পেটে বাধা। দুগ্ধের সঙ্গে কডলিভর অয়েল ( Cod-liver-oil ) কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন।

### মেদ-অস্বাস্থ্য—মোটো বা ভুঁড়ে হওয়া।

আনাদিগের দেশস্থ লোক, বিশেষ বামাগণ, ছেলেগুলি তাঁটারি\* জায় নাহসু হুহুস ও গোলাকার এবং যুবক ও বয়স্করা ভুঁড়ে হইলে তাহাদিগকে স্ত্রী ও স্ত্রী বলিয়া গণ্য করেন। বাবুরা তো এককালে শ্রমহীন, প্রত্যহু ভৃত্য দ্বারা দীর্ঘকাল তৈল-মর্দিত, অধিক মাত্রায় ঘৃতাদি ভোক্তা এবং গতি রহিত হইয়া সারা দিন তাকিয়া ঠেগান দিয়া; বিশেষতঃ দিবসে অধিক পরিমাণে নিদ্রা দেবীর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। স্ত্রীরাজ এ সমস্ত মেদ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হয়। ধনীর পক্ষে এ প্রকার সংঘটন সম্ভব—তাঁহাদিগের অনেকেরই এই দশা এবং বহু সম্পত্তি থাকার ইহা একটা বিশেষ লক্ষণ। ভুঁড়ে দেখিলেই লোকে সম্ভ্রান্তিপর অল্পভব করে এবং সেই নিমিত্ত ইহা একটা রোগ হইলেও সাধারণ মধ্যে ইহার এত আদর। ইংলণ্ডের প্রধান পুরুষ প্লাউগ্গেটন স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া প্রত্যহু একটা বড় বৃক্ষ ছেদন এবং কয়েক ক্রোশ পদব্রজে গমনের পর বিবিধ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়েন। পাঁচচৌধুরী মহাশয়েরও সামান্য জমিদার মাত্র, ইহাদের মধ্যে একজন শ্রম-বিমুখতা জন্ত এরূপ মেদগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁহার জলশৌচের নিমিত্ত চারি-পাঁচ জন নিযুক্ত হইত। কেননা, উভয় দিকের পাছা টানিয়া না ধরিলে সে কার্য হইতে পারিত না। শ্রম না করিলে কখনই স্ত্রী কণ্য বায় না। ভদ্রলোক ভাবেন, মেহন্নত করা ছোট লোকের কাজ—ভদ্র পক্ষে ইহা নিম্ননীয়। আনাদিগের জাতীয় হীনাবস্থার পক্ষে এই কুসংস্কারটী একটা প্রধান কারণ। যত কাল এই ভয়ানক ভ্রমটী সংশো-

ধিত না হয়, তত দিন হাজার বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন হউক এবং গণ্য মাত্ৰ বলিয়া আপনারা অহঙ্কার করি, কিছুতেই আমাদের কাপুরুষত্ব সারিবে না। ভূঁড়িই আমাদের সর্বনাশের মূল।

মেদ অস্বস্তি প্রতিকারের প্রধান উপায় শারীরিক শ্রম। কোদাল পাড়া, সঁতারকাটা, দৌড়ান, কুস্তি ও অপরাপর ব্যায়াম এবং ঘৃত-তৈলাক্ত ও স্বেতসার পদার্থ, যথা গুড় প্রভৃতি মিষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলু, সালগাম, মূলা, গাজর, ছোলা অড়হর ডাউল এবং সুরা, এসকল খাদ্য হইতে বিরতি বড় দরকার। এক বৎসর কাল এইরূপে চলিলে, ওজনে ১০ মণ ও বেড়ে মুটন হাত কমার সম্ভব। এই সঙ্গে ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত মিশ্র ঔষধগুলি ব্যবহার্য। সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত একটা ঔষধ কিছু দিন প্রয়োগ, পরে অপর কোনটা।

কান্সা ২০০ ও সল্ফর ২০০ মাসে এক বা দুইবার; তন্নিম্ন আণ্ট, কান্স, কঁদিবী, কোনাট, পড, পলস, ফেরম, লাইক ব্যবহার্য।

## MILK CRUST.

শিশুর হৃদে দাঁত সমস্ত বৃহির্গত হওনকালীন সর্ব প্রথমে কপাল, পরে মুখমণ্ডল এবং কখন বা সমস্ত শরীরে শাদা শাদা ফুস্ফুড়ি হয়, তাহার পার্শ্বস্থান লাল হয় ও ফুলে; মাথা পর্য্যন্ত ঝুলিলে গলায় বীচি আওরায় ও পাকে। অতিরিক্ত চুলকুনি হওয়ায় অত্যন্ত অস্থির হয় এবং ঐ রস যথায় লাগে, তথায় ঐরূপ হওয়ায় কখন কখন সমস্ত বদনমণ্ডল যেন পাচড়া দ্বারা আবৃত দেখায়।

আকন—গীড়িত স্থান লাল, ফুলা, অত্যন্ত চুলকুনি ও অতিরিক্ত অস্থিরতা। ইহাতে কতক সমতী হইলে।

ভাইওলাটিকলর—বিশেষতঃ রাত্রে চুলকুনি, কাশি ও প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকিলে, গ্রন্থি শক্ত ও ফুলা হইলে।

রস—বিশেষতঃ মাথার খুলির রোগে চাপ চাপ মেড় পড় ও অতিরিক্ত চুলকুনি পক্ষে। ইহার পর সেপিয়া।

সল্ফর—বিশেষতঃ চক্ষের পাতার রোগ পক্ষে। পুরাতন রোগে ইহা ও

রস পর পর বিধি ; অধিক রস নির্গত হওন পক্ষে লাইকপ ও পলস, বিশেষ দুর্বলী পক্ষে । অত্যন্ত রস নির্গত পক্ষে কাক্সা ; কুসকৃড়র রস বথায় লাগে, তথায় ঐরূপ হওন পক্ষে মেজেরম ।

পূর্ব ঔষধে না সারিলে ও রোগ বড় জ্বর হইলে, বিশেষ কদর্যা রস-শ্রাব থাকিলে গ্রাফাইট তিন দিন, বিরাম ৪ দিন, তাতে না সারিলে সেপি ঐরূপ, শেষ ষ্টাফিস ।

অল্প ও গরম দ্রব্য আহার নিষেধ, প্রত্যহ দুই তিন বার গরম জলে পীড়িত স্থান ধৌত করিবা এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা ঔষধ দিবা ।

ভূমিষ্ঠ হওনের তিন চারি দিন পরে কখন মুখমণ্ডল, গলা ও হাতে লাল লাল দাগ দেখা যায় । ইহা আপনা হইতেই সারে ; অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিলে দুই তিন দিন কামো দিবা । গরমের জন্ত অধিক বয়স্কের ঐরূপ হ্রস্ব, ইহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে আকন ও কাসো ; অতিরিক্ত চুলকুনি থাকিলে বা বহুদূর ব্যাপিলে রস ; তাহাতে না সারিলে আস বা সলফর দিবা ।

### বিসর্প ।

( Erysipelas or St. Anthony's Fire. )

ভূমিষ্ঠ হওনের পর তৃতীয় হইতে দশম দিবস মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায় ; তৎপরে এক বৎসর বর্ধকর্ম পর্য্যন্ত অল্পই হয় ।

সর্ব প্রথম অস্থিরতা, অনিদ্রা, পিপাসা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা স্কাটে ভেদ, অল্প হৃদে প্রস্রাব এবং কখন বা সমস্ত ত্বক্ হরিদ্রা বর্ণের হয় ; প্রায়ই নাভির নিকট, কেচিং জননোদ্ভয়ে বা বৃকে একটা লাল দাগ হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া পড়ে ; তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে বিসর্প পাকে বা পচা ধরে ; এবং সপ্তম দিবসে মৃত্যু হয় । এ রোগকে কেহ কেহ বাঙ্গালায় নারাদা বলেন, কিন্তু এ সংজ্ঞা ঠিক খাটে না, বরং “বিসর্প” নামটা অধিক সঙ্গত বলিয়া আমরা তাহাই দিলাম । আরোগ্য হওয়া দুষ্কর । পুতিবিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ অথবা হিম ও আঘাত লাগা, অপরিষ্কার থাকা, বা মাতার অতিরিক্ত রাগ, ভয়, অথবা আহার, সুরাপানাদি অত্যাচার বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে ।

আকন—মাতার রাগ বা হঠাৎ ভয় জ্ঞান সন্তানের রোগে ।

আর্নিকা—আঘাত, বিশেষতঃ ছেদিত নাড়ীতে লাগা বশতঃ রোগে । ইহা প্রথম প্রথম দেওয়া বিধি । তৎপরে বেল এই রোগের সদৃশ ঔষধ ।

লাকেসিস—ব্যাদি প্রবল হইলে, পীড়িত স্থানের পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি ফুলা, সমুদয় ত্বকের টাটানি, শরীর লাল বা বেগুণে বর্ণ এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে কাল-চিটে পড়া থাকিলে । নিদ্রায় প্রলাপ । বাম হইতে ডাইনে পীড়ার বিস্তৃতি ।

মার্ক—কুচকি, অণ্ডকোষ ও মলদ্বারের উপর লাল দুর্গন্ধ ফুস্কুড়ি হইয়া শীঘ্র পাকে, পরে নাভির উপর পেটে ঐরূপ হওয়া পক্ষে । তৃষ্ণা, লাল ভাঙ্গা, গর্ম্মির পীড়া হইতে রোগে ।

এক সপ্তাহে নারাক্ষ হইলে ও ইহার সঙ্গে গাঁজলাটে ভেদ ও কম বেশী জ্বর থাকিলে মার্ক-সল ও সল্ফর পর পর বিধি । রস, গ্রাফাটিস. তিপার, অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে ফল লভ্য হয় । ডাক্তার ওয়ার্ডলর এই রোগে ট্যান্ডিস বকাটা প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থলে কৃতকার্য হইয়াছেন ।

## INDURATION OF CELLULAR TISSUE.

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর খোলস বদলাইয়া নূতন ত্বক হয় । আটাসে ও দুর্বল-কায় সদ্যপ্রসূতের গায় হিম ঐ শীত লাগায় পূর্বোক্ত কার্য্য না হইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় দিবসে পায়ের ডিম লাল, ঠাণ্ডা, কিঞ্চিৎ স্ফীত ও কাষ্ঠবৎ শক্ত হয়, 'ক্রমশঃ বুক পীঠ ভিন্ন সকল অঙ্গ ঐরূপ হইয়া পড়ে । শিশু নিতান্ত বিশ্রী হইয়া স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে, কেচিৎ মাথা এদিক ওদিক নাড়ে । শরীর পাথরবৎ ঠাণ্ডা হয়, গিলিতে পারে না, স্বর বন্ধ বা চিংকার করিয়া কান্না, কখন কখন নিশ্বাস অল্পভূত হয় না, কখন স্বল্প স্বল্প শ্বাসের পর দীর্ঘ প্রশ্বাস, অত্যন্ন শৌচ প্রস্রাব, নাড়ী প্রথমে ক্ষুদ্র ও মৃদু, পরে এক কালেই অপ্রাপ্য । কখন কখন রোগের দুই তিন দিন পরে ফুসফুস প্রদাহ হয় । তৎকালে নাড়ী ও নিশ্বাস অধিক দ্রুত, মুখলওল অধিকতর পাণ্ডাশ বর্ণ ও শিশু অধিক ক্রন্দন করিতে থাকে । অভিষাতন ও আকর্ণনে ঐ রোগ বিশিষ্টরূপে নিরূপণ করা যায় । এই ব্যাধিতে প্রথম কোষ্ঠবদ্ধতা পরে উদরাময়, ফুলা, শুথান, শরীর অধিক জীর্ণ ও শীর্ণ হওয়া, গাত্রে সজ্জা সজ্জা দাগ হওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে ইহার



সহিত অল্পপ্রদাহ হইয়াছে বুঝিবা। কখন বা ইহার সঙ্গে চক্ষু ও মুখ-রোগ থাকে। অনেকেরই সপ্তম দিবস মধ্যেই আহার না করিতে পারা জন্ম মৃত্যু হয়, এবং তৎকালে নাক মুখ দিয়া রক্ত-কল্‌ভানীর গাঁজলা ভাঙ্গে। আরোগ্য হইলেও নিশ্বাস কষ্ট, অসমান নাড়ী এবং ফুলা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, কখন বা এ অবস্থায় পাল্টে পড়ে।

শিশুকে গরম রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অল্প উষ্ণোদকে স্নান ও গাত্র ঘর্ষণ ও উত্তম স্তন দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ডক্কা—হিমলাগা জন্ম-রোগে। মুখমণ্ডল ছাড়া সর্বত্র ফুলা, গাঁঙান, হড়হড়ে বাহে, এমন অবস্থায় ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এক শুষ্ক অণুবটিকা। ২৪ ঘণ্টায় উপকার না হইলে।

চাইনা—ফুলা, বরফবৎ ঠাণ্ডা ও তাহার উপর লাল লাল দাগ; অথবা ফুলে পড়ার দরুণ শিশু নির্জীব প্রায় হইলে। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে এক দুই মাত্রা ফেরম দিলে অধিক উপকার সম্ভাবনা।

আর্স। এককালে বলক্ষয়, নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, মুখে ঘা, বিশ্রী হওয়া প্রভৃতি উপসর্গে। ইহা সেবন করিয়াও কোন উপকার না হইয়া মুখ নাকে গাঁজলা ভাঙ্গিলে লাকেসিস দিবা।

এই রোগের সঙ্গে ফুসফুস বা অল্পপ্রদাহ প্রভৃতি থাকিলে তত্তৎ পীড়ার ঔষধ ব্যবহার করিবা।

### চক্ষুর পাতায় আঁজনী।

কখন কখন ইহা স্নাত্ত টাটায়। প্রদাহিত স্থান দিবসে ৩৪ বার গরম জল দিয়া ধৌত করিবা, ও রাত্রে তথায় ময়দা বা স্নজির পুলটিস দিবা, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক মাত্রা পলস খাওয়াইবা। এক সারিয়া আর এক হওয়া, ক্রমান্বয়ে এইরূপ হইতে থাকিলে প্রাতে একমাত্রা করিয়া সল্‌ফর বা হিপার সল্‌ফেট দিবা। আঁজনী সারিয়া সেই স্থানে শক্ত ঘুঁটি থাকিলে ষ্টাফিস। ধাতু সোধনের জন্ম কখন কখন কিছু দিন সিলিস।

### দক্ষ-দাদ ।

মাথা, মৃণ্মণ্ডল, গলা, হাত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে হইয়া থাকে । এক-কালে নিরাময় হওয়া সূকঠিন । সারিয়া আবার পুনরায় হয় । প্রত্যাহ পীড়িত স্থানে ২৩ বার মূড়া মাখন মাথাইবা এবং এক দিন অন্তর প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেপিয়া দিবা । ইহাতে না সারিলে রস, সল্ফর, কাক্কা, নৌম ব্যবহার্য্য । ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত দীর্ঘকাল অন্তর সল্ফর ও সেপিয়া বিধি ।

### আমবাত ।

অধিক বয়স্কের মত শিশুর ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না । ক্রোমিন টিগ্‌লম একমাত্রা দিলে অনেক সময় আরোগ্য হয় । ইহার সঙ্গে অধিক জব থাকিলে আকন । অবগা আহার দরুণ রোগে ও রাঁত্রে ঘ্রুণা বৃদ্ধি পক্ষে আর্স । অতিশয় লাল ও চাপ চাপ আমবাত, ও তথায় অত্যন্ত জ্বালা ও বেঁধার জ্বর ব্যথায়, এপিস । রোগের সঙ্গে মূখ মণ্ডল ও চক্ষু লাল, মাথা গরম, ঘুমন্ত চম্‌কান ও আমবাত অত্যন্ত লাল পক্ষে, বেল । উহার কিয়দংশ অন্তর্হিত হওয়ায় বক্রী ফেঁকাশে, বুক ভাৱ এবং দ্রুত ও কষ্টকর নিশ্বাস পক্ষে রাই । পীড়িত স্থান শক্ত হওন ও অত্যন্ত চুলকুনির পক্ষে কাক্কা । ঠাণ্ডা লাগার দরুণ রোগ প্রকাশে ও অতিশয় জ্বরে ডক্কা । ইহার সঙ্গে সর্দি থাকিলে তিপর । রোগসহ অজীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যে, নম্ব । উহার সঙ্গে ভেদ হইতে থাকিলে, পলস বা আন্ট । পীড়িত স্থান ঘর্ষণ করিলে অধিক বেরণো পক্ষে, রস । অন্য চর্ম‌রোগ অন্তর্হিত হইয়া আমবাত হইলে, সল্ফর বিধি । একটা প্রাচীন ব্যক্তির পীড়িত স্থান বিচুটীর পাতা দিয়া ঘর্ষণ করাতে এককালে আরোগ্য হইয়াছে ।

### PEMPHIGUS. ( বিস্মিকা )

ভূমিষ্ঠ হওনের কিছুদিন পরে বুক, পীঠ, কর্ণের পশ্চাৎভাগ, হাত, পা, ঘাড়, ক্‌চ্‌কিতে এবং হাতের চোট ও পায়ের তলায় এক প্রকার ফোকা হয়,

ইহার ভিতর রস প্রথম জর্দাটে, পরে লালচে হইয়া সমুদায় গুথাইয়া কিম্বা ফাটিয়া যায়, পরে উহার উপর মেড় পড়ে। ফোঙ্কার অধিক ব্যথা থাকিলে খুজা, এটি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফোঙ্কার গোড়া লাল ও প্রদাহিত থাকিলে রস; তাহাতে না সারিলে আস।

### হাম।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সচরাচর হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহা সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে। 'সামান্যতঃ একবারের অধিক এক ব্যক্তি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কিন্তু এক মাসের মধ্যে কখন কখন দুইবার আক্রমণও দেখা গিয়াছে।

সর্বপ্রথম বামরাণো সূর্দি; আলোক অসহিষ্ণুতা; চক্ষু, মুখ ফুঁলা; ইঁচি; লাথাধরা; উৎকাশি; গলা, বুক, কোমর ব্যথা; শীত ও গাত্রতাপ এবং কখন বা ইহার সহিত বমন, উদরাময়, সর্বদা কিমন, অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণ সমস্ত দেখা যায়। চতুর্থ দিবসে বদনমণ্ডলে, পরে গলা, বুক, পেট এবং সর্বশেষে পায়ে গুটি বাহির হয়। ষষ্ঠ দিবসে উহার পূর্ব পর্যায়ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। আমাদিগের দেশে এপীড়া বিশেষ ভয়াবহ হয় না। ইহার নিমিত্ত কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয় না, কেবল গৃহিণীরা কখন কখন দুই একটা জাড়ী থাওয়াইয়া দেন। তবে পেট না ভাঙ্গে, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধান হন। অজীর্ণকারী দ্রব্য এককালে আহার করিতে নিষেধ করেন। “উঠুঁতে ঝোল, বস্তুতে ঝোল” এই বচনে পথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সজরি বা জর হইলে সর্বাপ্রাণে জোলাপ দেওয়া পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। জীলোকেরা ও মুটে মজুরও ঐ বিষয়ে উপদেশের অপেক্ষা করে না। রোগী হাত ছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কবিরাজ মহাশয়েরাও ডাক্তর দিগের অনুকরণ করেন। কিন্তু হাম বসন্তাদি স্ফোটক রোগের প্রথমাবস্থায় রেচক ঔষধ বিষ তুল্য হইয়া পড়ে। শরীর রসহীন হওয়ায় গুটি বাহির হইতে পারে না। এবং তজ্জন্ত রোগী বিলক্ষণ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং কাহার কাহারও বা অকালে মৃত্যু হয়। প্রাচীন বৈদ্যেরা তরুণ জরে ডাক্তর দিগের ভায় রক্তমোক্ষক, রেচক ও বমনকারী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিতেন।

কিন্তু ইহার মন্দ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহা-  
দিগের বহুদর্শন এককালে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিয়া পরস্পর খরচ করিয়া  
যন্ত্রণা কেনা কোনমতে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বসন্ত হামে জ্বালাপ দেওয়া  
ও বিষ খাওয়ান দুইই প্রায় তুল্য।

ব্যাদি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিলে সৌদাদিগের পূর্ব্বাহ্নে আকন  
ও পলস দিলে রোগ না হওয়াই সম্ভব।

আকন—জ্বর কালে সর্ব্ব প্রথম ঔষধ, পরে ইহা ও পলস পর পর দিবা।  
অন্ত ঔষধ প্রয়োগ কালেও অধিক জ্বর থাকিলে মধ্যে মধ্যে ইহার দুই এক  
মাত্রা দিলে অধিক ফল লাভ সম্ভাবনা।

পলস—সর্দির অবস্থায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে, এই ঔষধ  
সেবনে গুটি শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয়। হাম দেখা দিলে অস্ত্র উপদ্রব না হয়  
এবং শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় হওয়ার নিমিত্ত ইহা দেওয়া বিধি। এই রোগসহ  
উদকাময়, কাশি, গলা ঘড়্‌ঘড়ানী, নাক মুখ দিয়া প্লেয়া উঠা, বমন, দম-  
আটকান থাকিলে ইহা দেওয়া বিধি। সামান্য রোগে পূর্ব্ব ভেষজঘরের  
অতিরিক্ত অস্ত্র ঔষধের প্রয়োজনাতার। আলোক অসহ্য হইলে।

ইপিকা—গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বে বৃক্ক অতিরিক্ত চাপ বোধ, অতি-  
রিক্ত গা বমি বমি ও বমন, ঘন ঘন নিশ্বাস, প্রতি শ্বাস গ্রহণ কালে অতিশয়  
কর্শ থাকিলে।

হউকোসয়া—হাম বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, আলোক  
অসহিষ্ণুতা ও চক্ষু ও নাক দিয়া জল ঝরা, কাশি, কোমর ব্যথা থাকিলে।

কফি—বাতিক বৃদ্ধি জন্ম সমুদয় ইন্দ্రిয়ের উত্তেজনা হইলে; অনিদ্রা,  
কান্না, অনবরত কাশি, দাঁত কিড়মিড়ি প্রভৃতি উপসর্গে।

নক্স—রাত্রি কষ্টকর ঘ্যাঙানি বা গম্ভাতাঙ্গা, উৎকাশি, ও বক্ষস্থলের  
পেশীর সংকোচন বশতঃ বৃক্ক সঁটে ধরা পক্ষে।

ক্যাম্ফর—গুটি বাহির না হওন জন্ম স্বক্ নীলবর্ণ ও ঠাণ্ডা, গাত্র শিঙ্ক-  
শিঙ্কানী, শীত, কম্প ও দাঁতে দাঁত লাগা, ঠাণ্ডা ঘর্ষ, অঙ্গ শক্ত হওয়া। অন্ত-  
দাঁহ নিমিত্ত গায়ে কাপড় রাখিতে না পারা, এ অবস্থায়, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবা  
এবং আদত আরোক কোটাকত কথলে বা ফেলানলে ফেলিয়া হাত পায়ে ঘর্ষণ

করিবা । ইহাতে না সারিলে ইহার পর আর্স, ফস, সল্ফর বা কাষ্টিকম দেওয়া বিধি ।

বেল—কর্ণ প্রদাহের উপসর্গে । গিলিতে গলায় ব্যথা, পিপাসা, অস্থিরতা, শ্লেষ্মা, ঘড়ঘড়ানী, কাশি, অথবা গুটি বাহির না হইয়া সর্দি, মাথা ব্যথা, চক্ষু লাল, আইচাই, প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্ক উত্তেজনার লক্ষণ দেখিলে । হাম না বাহির হওন জন্ত হইলে ইহা ও ত্রাই পর পর বিধি ।

মার্ক—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, হৃৎকণ্ডে বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ, গলায় বীচি আওরান ও গিলিবার কষ্ট, অথবা চক্ষুর কোণে ঘা থাকিলে ।

উউফ্লোসয়—চক্ষু কন বেশি লাল, জল ঝরা, পিচুটি পড়া, আলোক অসহিষ্ণুতা, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, সর্দির জ্বর, অস্থিতে ( বিশেষতঃ হাত পা কোমরের ) ব্যথা উপসর্গে ।

ব্রাই—বিগষে বা অল্প পরিমাণে গুটি বাহির হওন জন্ত নিশ্বাস কষ্ট, গা হাত ব্যথা, উৎকাশি, শ্বাস গ্রহণ কালে বৃকে ফোড়ার শ্বাস ব্যথা । হিম জল লাগা ; রেচক, বমনকারী বা ঘর্ম্মকারী ঔষধ ব্যবহার জন্ত গুটি এককালে বাহির না হওয়া, বা হইয়া বসিয়া যাওয়া অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী ।

ডক্সা—হিম লাগা জন্ত হাম না বেরণো বা বুসা পক্ষে ।

বসা বা না বেরণো অবস্থায় আনাশয় বা ভেদ পক্ষে পল্স ও মার্ক ; বমন, ও বৃক ভার পক্ষে ইপিকা, আর্স ; অল্প ও ফেঁকাশে বর্গের গুটি ও নিশ্বাস কষ্ট, পেট ব্যথা, ভেদ, বমন পক্ষে, কামো ; মস্তিষ্কের উত্তেজনা থাকিলে বেল, কু প্রন, ষ্ট্রামোনিয়ন, বেল, আর্স, সল্ফর ; কুসকুস প্রদাহে ফস, ব্রাই, বেল, সল্ফর ; উপশ্বাসনাণার প্রদাহে ব্রাই, ফস, ইপিকা, পল্স ; বলক্ষয়কারী কাশি পক্ষে ফস ; সারিপাতক ( টাইফয়েড ) জ্বর পক্ষে ব্রাই, আর্স, ফস ; হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ জন্ত ঘর্ম্ম নিমিত্ত ককুলস বা নক্স ; কোষ্ঠবদ্ধ হইলে নক্স বা ব্রাই ; হৃৎকণ্ড, ইপিকা, টেমোস, ষ্ট্রাম, হাইয়স, বেল । বিশেষ উপসর্গ সম্বন্ধে তত্ততঃ রোগ দেখ ।

কক্ষার্ণব বা কাগ হানে অত্যন্ত গাত্রতাপ, পিপাসা, সর্কদা পানের ইচ্ছা

কিন্তু এককালে অধিক পানে অশক্ত, অতিরিক্ত বলক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গে আর্স, পল্‌স, রস উত্তম ঔষধ; লক্ষণানুযায়ী দিবা।

সল্‌ফর—অল্প ঔষধে উপসর্গের সমতার পর ধাতু বিকৃতি প্রভৃতি অপর কোন পুরাতন ব্যাধি না হয়, সেই নিমিত্ত প্রত্যহ এক সপ্তাহ প্রাতে এক এক মাত্রা বিধি।

সামান্যতঃ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ বিধি। নিত্যান্ত আবশ্যক ভিন্ন কোন ক্রমে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ খাওয়ান অপরাধ। সেই প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে দিন মধ্যে ৩৪ বার মাত্র খাওয়ান হয়।

হাম সারিয়া সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ পক্ষে সিলিসা, ইথের, কামো, কার্বো, কোনাই, নক্স-ম, ব্রাই, সেপি, সল্‌ফর।

আক্ষেপযুক্ত হাঁপানের ছায় কাশিতে ডোসিরা, ইপিকা, সিনা, হাইয়স, কুপ্রম, বেল, কার্বো, রুমেক্স, সাংগুই।

উৎকাশি পক্ষে আণিকা, কামো, নক্স।

কণ্ঠনাশীল, প্রদাহে আকন, হিপার, স্পঞ্জিয়া, ল্যাকেসিন, বা আর্স, বেল, মার্ক।

উদরাময় পক্ষে, সল্‌ফর, চাইনা, পল্‌স, মার্ক।

কণ প্রদাহ বা কাণ হইতে পু্য, রস ঝরা পক্ষে সল্‌ফর, পল্‌স, কার্বো, মার্ক, হিপার। কাষ্ট্রস, কল্‌চি, লাইক, মেনি, নাইট্রো-আ।

কণমূল ফুলা পক্ষে, আণিকা বা ডক্সা ও রস।

ত্বক্‌ টাটান পক্ষে, মার্ক।

চুলকনা, শাদা বিণ্ডুড়ি রিংকুড়ি কুস্কুড়ি পক্ষে, নক্স।

লাল দাগ ও অত্যন্ত চুল্কুনি এমন কি তাহার দরুণ রক্তপাত পক্ষে আর্স, সল্‌ফর।

থুক্‌থুকে উৎকাশি পক্ষে, কফি।

থুক্‌থুকে উৎকাশি ইথে, কামো, নক্স।

## পানবসন্ত ।

অনেক সময় সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করে । এক দুই দিন জ্বর হইয়া গুটি বাহির হয়, তৃতীয় দিবসে পরিণত হয় এবং ৪র্থ বা ৫ম দিবসে মিলাইয়া যায় । পলস এই রোগের প্রতিষেধক । গুটি বাহির হইতে বিলম্ব ও তৎকালে দড়কা হইলে আনটিমটার্ট ; জ্বর প্রবল হইলে আকন ; মস্তিষ্কের উত্তেজনার উপসর্গে বেল ; (গুটির রস জলবৎ না হইয়া, ঘন ও জর্দাটে ও মুখ দিয়া লাল পড়া পক্ষে মার্ক) ; বেলেস্তারার ফোকার ত্রায় গুটি হইলে রস ; জ্বরের সূত্রে অত্যন্ত অস্থিরতা, অনিদ্রা, ঘুমন্ত চমকান পক্ষে কাফি ; দন্তোদগম-কালে রোগ হওয়ার দড়কা উপস্থিত হইলে, কামো, ইয়েসা, ষ্ট্রামোনিয়ন, জিঙ্ক ; অত্যন্ত চুলকুনির দরুন দাগ না মিলাইয়া, যা হওয়া পক্ষে সল্কর । গুটি বাহির না হওয়া ও ফেঁচান পক্ষে টার্ট-এ ।

## ইচ্ছা বসন্ত বা মসূরিক ও গোবীজটিকা—

( VACCINATION. )

এই ব্যাধি অতি ভয়াবহ । আক্রান্ত হইলে যন্ত্রণার এক শেষ হয়, অনেকেই মারা পড়ে । কষ্টে আরোগ্য হইলেও, কেহ-কেহ বিকলাঙ্গ এবং কাহার বা শ্রীহীনতা দেখিয়া ভয় পাইতে হয় । বসন্তের বীজ দ্বারা টিকা দিলে অত অধিক প্রাণ নাশ হয় না নটে, কিন্তু ইহাতেও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে । গোবীজের টিকায় কোন ভয় নাই । সদা-প্রস্তুতকেও এ টিকা দেওয়া যায় । ভ্যাক্সিনেশন হোমিওপেথিক চিকিৎসার সত্যতা পক্ষে একটি জাজ্জল্য প্রমাণ । একটি ভয়ানক বিষ দূরীকরণ উদ্দেশে অপর একটি সদুশ ও অপেক্ষাকৃত মৃদু বিষ প্রয়োগ করা হয় । ‘অনেকে এই চিকিৎসার অত্যন্ত মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ লইয়া পরিহাস করেন । গো বসন্তের এক কোটার কোটি অংশের একাংশ সেবন করায় গায় গো বসন্ত বাহির হওয়ার সত্যতা বিষয় আলোপেথিক ডাক্তরের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহার পরও যে লোকে মাত্রার স্বল্পতা লইয়া গোল করেন, ইহা কম ভ্রমের বিষয় নহে । গোবীজের কম তেজঃ থাকা বিধায় সাত বৎসর অন্তর পুনর্বার টিকা দেওয়া কখন কখন আবশ্যক হয় ।

বসন্ত সাংক্রামিক রূপে দেশমধ্যে অবস্থান করিলে একটুকু ভেক্সাইন রস পাत्रে লাগাইলে আশঙ্কা দূর হয় ।

বসন্তবিষ শরীর অভ্যন্তরস্থ হইলে এক পক্ষ মধ্যে জ্বর প্রকাশ পায় । মাথা ব্যথা, মুখমণ্ডল ফুলা, বমন, পীঠ কোমর ব্যথা, অবসন্নতা, বুকভার, উপর পেট ব্যথা, হাঁচি, কাশি, নিশ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে গুটি দেখা দেয় । ক্রমশঃ সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পরে জ্বর কমিতে থাকে । ৬৭৮ দিবসে পূর্ণ সঞ্চার হয় । পরিণত হইয়া ফাটিতে, রস নির্গত হইতে থাকে, এবং চতুর্দশ দিবসে খোলস লইয়া উঠে । এ রোগ কিঞ্চিৎ কঠিনতর হইলে, অনেক দিন ঘা ও তৎস্থানে দাগ ও গর্ত থাকে । এ সমস্ত সুবসন্তের লক্ষণ ।

কখন কখন বসন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র না হইয়া এক লাগাড়ি হয় । ইহাকে খুঁকড়ে বা চামদল বসন্ত কহে । গুটি বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বাঙ্কে প্রলাপ ও দড়কা অনেক সময় হইতে দেখা যায় । বসন্ত প্রকাশ হইলেও জ্বরের লাঘব হয় না । পেট ব্যথা ও নিশ্বাস-কষ্ট বাড়ে । লালভাঙ্গা ; মুখ, জিহ্বা ও গলকোষে ঘা ; উদরাময় ; উভয় প্রকারই থাকে ; বিশেষতঃ লেপ্টা বসন্তের সঙ্গে দেখা যায় । ইহার সঙ্গে মস্তিষ্কের ও শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হইলে রোগ সাংঘাতিক হওন বিলক্ষণ সম্ভাবনা । বসন্তের লক্ষণ অনেক প্রবীণেরা অবগত আছেন, এ জন্ত বাহুল্য লেখা অনাবশ্যক ।

• যাহাদিগের কোন প্রকার টিকা হয় নাই, স্বপল্লীতে সাংক্রামিক রোগ উপস্থিত হইলে ভেক্সাইন বা আন্টিমটার্ট বা থুজা এবং ম্যুরীপেক্স সেরাসিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বর্ণিত । পুনর্বার টিকা না দিয়া ইহা সেবনে ভোগ কন্মায় ও শীঘ্র শীঘ্র শুকায় । প্রথম মাত্রা খাওয়ার কাহারও কাহারও গুটি বাহির হয় এবং প্রথম ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে গুটি সব শীঘ্র শীঘ্র শুকায়, চুলকুনি হয় না ; কাজেই বদনে দাগ পড়ে না । এক দিন অন্তর এক এক মাত্রা খাওয়া বিধি । ইহা ব্যবহারে ব্যাধি না হওয়ারই সম্ভাবনা, হইলেও সামান্যতর হইবে । সুবসন্তে নিম্ন ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য ।

কাফি—রোগ প্রকাশ হইবার পূর্বাঙ্কে অস্থিরতা, অনিদ্রা, প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ।

আকন—জ্বরের অবস্থায় । অল্প সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ প্রয়োগকালে



গাত্র-তাপ ; পিপাসা ; নাড়ী মোটা, কঠিন ও দ্রুত এবং নিশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর থাকিলে, মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা আকন দেওয়ায় অধিক ফললাভ সম্ভব।

ওপিয়ম—কখন অঘোর অবস্থা, কখন প্রলাপ, নিদ্রাবেশ, অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু, হা করিয়া নিদ্রা ও নাক ডাকা, কিম্বা প্রবল প্রলাপ ও হাত ছোড়া এবং মস্তিষ্কের শক্তির এককালে নাশের আশঙ্কা হইলে, ইহার পর কখন কখন বেল খাটে।

আন্টিম-টার্ট। গুটি-বাহির হওনের পূর্বে বুক এঁটে ধরা ও তথায় অতিরিক্ত চাপ বোধ, কাশি, গলা ঘড়্‌ঘড়ানী এবং ইহার সঙ্গে গা বমি বমি ও বমন থাকিলে।

ইপিকা—বমন, উপর পেট ব্যথা ও চাপিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি ; অথবা এককালে থাইতে অনিচ্ছারূপ উপসর্গ থাকিলে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না সারিলে এবং বমকে শিশু নিতান্ত দুর্বল হইলে আর্স ; ইহার সহ ভেদ ও বুক ভার থাকিলে চাইনা ; বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাঠিজে, নক্স, ব্রাই ; ভেদ ও পেট ব্যথায়, কামো, পল্স, আন্টিনফড।

ব্রাই—ইহা সেবনে গুটি শীঘ্র শীঘ্র বাহির হয়। তন্নিম্ন তিক্ত তার, জিভে ছাতা, কোষ্ঠ কঠিন, শিরঃপীড়া, গা হাত কামড়ান ও নড়া চড়ায় ইহার বৃদ্ধি, উগ্রস্বভাব, এবং বক্ষস্থলের প্রদাহের লক্ষণ ; শ্বাসগ্রহণ কালে বুক ফুটনির স্থায় ব্যথা থাকিলে।

রস—মাথা, পীঠ, কোমর ব্যথা, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি, নড়ায় কতক স্থিতি ; অথবা বলক্ষয়কারী ভিড়ভিড়ে অর পক্ষে ইহা ও ব্রাই পর পর দেওয়া বিধি।

কামো—নিশ্বাস-কষ্ট, উদরাময়, সজ্জা ভেদ, অত্যন্ত পেট ব্যথা, বমন ; অথবা পাকিবার অবস্থায় অত্যন্ত অন্তরতা ও কান্না, বিশেষতঃ রাত্রে।

বেল—মস্তিষ্কের উপসর্গ থাকিলে। মুখমণ্ডল লালবর্ণ, আলোক অসহিষ্ণুতা, মাথা ব্যথা ও প্রলাপ, অত্যন্ত পিপাসা, গা বমি বমি ও বমন ; অথবা জিভের ধার ও অগ্রভাগ লাল, উপর পেট ফুলা ও ব্যথা ও টিপিলে লাগা, বলক্ষয়, অঘোর অবস্থা। ( আকন, কামো বা ওপিয়মের পর )।

লেপা বসন্ত অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহাতে সর্বপ্রথম আকন ও সলফর পর পর বিধি।

মার্ক—পাকধরার অবস্থায় চক্ষুপ্রদাহ; নাসিকা ও গলা টাটান; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; লাল ভাঙ্গা; কাশি; স্বর ভঙ্গ; স্বক কুলা ও সেন্টেধরা; অত্যন্ত পাতলা বাহে, বা রক্ত ভেদ ও অনবরত কৌত পাড়া পক্ষে।

ইহার পর চিপার বিলক্ষণ খাটে। এই অবস্থার অধিক পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং অল্প উষ্ণ দুধ ও জল দিয়া স্নীত চক্ষু ধোয়াইয়া দেওয়া বিধি। অত্যন্ত গাত্র চুল্কুনি থাকিলে উষ্ণজলে কলার বাসনায়ু ছাই দিয়া ঐ স্থান মধ্যে মধ্যে ধৌত করিলে কতক স্বস্তি হইয়া নিদ্রা হয়। মেডো উঠার সময় চুল্কুনি নিবারণ ও মেডো নরম করা নিমিত্ত ননী লাগান কৰ্ত্তব্য।

রোগ প্রারম্ভে বা প্রবল অবস্থায় শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ হয়। কঠিনালীর বা কুসকুস প্রদাহে মার্ক, পরে চিপার উত্তম ঔষধ; প্লুরাইটিস পক্ষে ফস; হুল কুটানস্থায় বক্ষস্থলের বিধুনিতে আণিকা; এবং মস্তিষ্কের প্রদাহে বেল, পরে সলফর।

কখন কখন প্রথম অবস্থায়, কখন বা পাকধরা কালে, টাইফয়েড জ্বর হয়, রোগ প্রারম্ভে এ অবস্থা ঘটিলে আর্সে অধিক উপকার হয়, বিশেষ নিম্ন লিখিত উপসর্গ থাকিলে, যথা—এককালে নির্বলী হওয়া, অনিবার্য ও অতিশয় গাত্র তাপ, নাড়ীর ঘন ঘন স্পন্দন, পিপাসা, জ্বরকালীন আক্ষেপ বা গুটি বাহির হওনের পূর্বে দড়ক। বসন্ত দেখা দিবার পূর্বে গায়ে দাগ, রক্তস্রাব, বা বেলেস্তারার স্থায় লাল ও কাল রক্ত পূর্ণিত ফোঁসা থাকিলে ও আর্সে প্রতিকার না হইলে লাকেসিস বিধি। পূষ হওয়া কালে পূর্বপ্রকার জ্বর হইলে রস ও ব্রাই ব্যবহার্য।

রস—বলক্ষয়কারী জ্বর, অঙ্গ অসাড় বা শক্ত হওয়া ও কামড়ান, অতিশয় দুর্বলতা, বুক পীঠে আমবাতের স্থায় বিজকুড়ি বিজকুড়ি দাগ ও তাহার ভিতর শাদা রস, রাত্রি জ্বর বৃদ্ধি ও তৎকালে চম্‌কান, চীৎকার করা, ভেদ, পেট ব্যথা ও পিপাসা।

ব্রাই—পূর্ব উপসর্গ ভিন্ন নাক দিয়া রক্ত পড়া ও গুটি কৃষ্ণবর্ণের হইলে। (কাল গুটি হইলে আর্স ও কার্বোও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফস—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর সতত গড়িয়া গড়িয়া পাছতলার দিকে পড়া উপসর্গ থাকিলে।

পুনঃ পুনঃ বা দীর্ঘকাল স্থায়ী দড়কা, অথবা উদরাময় ও কুমি রোগ পক্ষে, কামো, ষ্ট্রামোনিয়ম, হাইয়স, বেল, ইয়ে; কোষ্ঠবদ্ধতা জন্ম দড়কা হইলে পিচকারী দিবা বা নল্ল, ব্রাই; অঘোর, মুখমণ্ডল লাল ও ফুলা পক্ষে ওপিয়ম; বলক্ষয়কারী উদরাময়ে কামো, ফস, টার্ট-এ, পলস, আস', ডক্কা, চিন; ইহার সঙ্গে হামের ছায় গুটি দেখা দিলে, পলস ব্যবহার্য্য; গুটি হঠাৎ অন্তর্ধান ও মস্তিস্কের উপসর্গে কুপ্রম; নিশ্বাস কষ্ট প্রভৃতি শ্বাসের উপসর্গে ব্রাই, টার্ট-এ।

বসন্ত সারিয়া চক্ষুর পীড়া হইলে বেল, মার্ক, সল্ফর, হিপার, ব্রাই, নাই-ট্রিক-আসিড, কাষ্টিক; কাণ দিয়া পূব পড়া হইলে সল্ফর, হিপার, পলস, লাইক; এবং কর্ণ-অস্থির ক্ষয় হইতে থাকিলে আরম, আসাফেটিডা, সিলিসা, শ্বাসনালীর প্রদাহে আকন, হিপার, স্পঞ্জিয়া, বা বেল, লাকেসি, মার্ক, আস'। কাশি পক্ষে বেল, মার্ক, আস'; হাঁপানি পক্ষে টার্ট-এ; উদরাময় পক্ষে চিন, ফস; গোড়-নামা পক্ষে আণিকু, থুজা, আস'; ইহাতে উপকার না হইলে ফস; ক্ষুদ্র ক্ষোটক নিমিত্ত কাক্কা।

ডাক্তার তেস্ত বসন্ত রোগে নিম্নস্থ কয়েকটা মাত্র ঔষধ দিতে কহেন।

জিহ্বা—রোগ প্রতিনিবেদক। ব্যাধি সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিলে ৩৪ বার করিয়া ২ দিবস ঔষধ সেবন বিধি।

কাষ্টিকম—প্রাতে মার্ক-কর, বৈকালে ২ মাত্রা করিয়া দিবা; বসন্ত বসিবার উপক্রম হইলে বা গুটি সজা, বেগুণে বা কৃষ্ণবর্ণের হইলে প্রাতে কাষ্টিকম ও বৈকালে সল্ফর পূর্ব নিয়মে প্রয়োগ করিবা, এবং মস্তিস্কের উপসর্গে বেল দিবা।

গোবীজ-টিকা-সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম জানা নিতান্ত আবশ্যক। আদত গোবীজ বা Vaccine লইয়া টিকা দেওয়াই শ্রেষ্ঠকল্প; তদভাবে সুস্থ সবলকায়, চর্মরোগযুক্ত বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত নয়, জনক জননীর গর্ভির পীড়া বা অধিক পান্না ব্যবহার করা না হইয়া থাকে, এবম্বিধ লক্ষণযুক্ত শিশুর ৭ম। ৮ম দিনের বীজ লইয়াও শিশুর টিকা দিবা। ধাতু-বিকৃত বা রোগগ্রস্তের বীজ শরীরস্থ

হইলে শিশুর ধাতু বিকৃত হয়। মাঘ, ফাল্গুন মাস টিকা দিবার উত্তম সময়। গায়ে থোস পাচড়া থাকিলে বা দস্তোদগমকালে টিকা দেওয়া অবিধি। বসন্ত প্রবল রূপে পল্লীতে হইতে থাকিলে সকল ঋতু ও সকল অবস্থায় টিকা দেওয়া বিহিত। কোন কোন গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের টিকা দেওয়ায় হাত ফুলে ও অধিক জ্বর হয়, তৎকালে ২।৪ মাত্রা আকন এবং কখন ১।২ বার বেলে দেওয়া আবশ্যক। মাড় উঠিবার পূর্বে এক মাত্রা সল্ফর পরে এক পক্ষ অন্তর উহা ২।৩বার দিলে ভাল হয়। সুপথ্য দিবা এবং ঠাণ্ডী না লাগে বা অধিক গরম না হয়, তদ্বিধয়ে যত্নবান হইবা। অথ কোন প্রকার স্ফোটক দেখা দিলে সিলিসা উচ্চ ক্রমের দেওয়াই বিধি।

### পাচড়া।

শিশুদিগের পাচড়া নিমিত্ত ডাক্তার তেস্ত নিম্নস্থ ঔষধ ব্যবহার করেন।

লবেলা—প্রথম দিন, ক্রোটন; দ্বিতীয় দিন ইহা; এইরূপ অষ্টাহ ব্যবহার করিবা। মধ্যে ৪ দিন বিরাম, পুনরায় পূর্বমত। ছই পালা সেবনে উপকার না বুঝিলে আদত সল্ফরের আরোক কিছুদিন দিবা। অঙ্গ পরিষ্কার রাখিবা এবং ঘর উপর নারিকেল তৈল বিধি। প্রত্যহ একবার করিয়া অল্প উষ্ণ জলে স্নান এবং বৈকালে অন্ততঃ পীড়িত স্থান ধোত করিবা। ড্যাভডেবে পাচড়া শুলা বড় টাটায়, ঘূণের ছই অল্প ভিজাইয়া উহার উপর দিলে অল্পক্ষণে উহা ফাটে এবং আড়ষ্টতা যায়।

মার্ক—পাচড়াতে রক্তপড়া, ঘা, চুল্কুনি এবং জ্বালা হইলে এই ঔষধ খাটে, বিশেষ রাত্রি ঐ সব উপদর্গ থাকিলে।

সল্ফর—বিশেষ হাতের কঁজা ও আঙুলের পাচড়া-পক্ষে, নারিকেল তৈল এক ছটাকে ১২ গ্রেণ গন্ধক দিয়া খুব মাড়িয়া, তাহাই উহার উপর লাগাইবা। প্রলেপাদি লাগাইয়া হঠাৎ বন্ধ করা গর্হিত। ইহাতে ভয়ঙ্কর রোগ হইতে পারে। তৎকালে জলের পটি লাগাইয়া আবার পাচড়া বহ্যতে আইসে, তাহা করিয়া সল্ফর খাইতে দেওয়া বিধি।

### আঘাত।

পড়া, লাগা, চোট খাওয়া, অল্প খ্যাখলান পক্ষে প্রত্যহ দুই তিন মাত্রা আর্গিকা খাইতে দিবা ও ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে উহাতে নেকড়া ভিজাইয়া পটি লাগাইবা এবং উহা শুকাইতে দিবা না, অথবা আদত আর্গিকা আরোক বিংশতি গুণ জলে ফেলিয়া সেই জল দিয়া ব্যথিত স্থান ধৌত করিবা। মাথায় লাগা জন্ত মাস্তকের প্রদাহ হইলে আকন ও বেল দেওয়া বিধি; আঘাত নিমিত্ত বমি করিতে থাকিলে আর্গিকা; ঐ উপলক্ষে জ্বর, বা দড়কা হইলে বেল; এবং তাহাতে উপকার না হইলে ও সর্বদা নাক খুঁটুনি থাকিলে চাইনা; বৃকে অধিক আঘাত লাগা জন্ত তৎস্থান অধিক টাটান, লাল ও উত্তপ্ত হইলে ও উহার সঙ্গে জ্বর, অনিদ্রা, কাশি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে সর্ব প্রথম আর্গিকা ও আকন ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবা। এক দিবস মধ্যে উপকার না বুঝিলে পল্স বা নার্ক ও চাইনাদি তৎকালোচিত ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আঘাত জন্ত পরে কুসকূসের রোগ জন্মাইলে ফস, লাইকপ, কান্কা, সল্ফর, অথবা প্রথম যত্র না করায়, কালবিলম্বে ইহার দরুণ ক্ষয়রোগ (Consumption) হইলে ষ্টানম, আসিড নাইট্রিক, সিলিসা, কালিকার্বো।

আঘাত বা পতন জন্ত মূর্ছা হইতে থাকিলে—আকন; অতিরিক্ত ব্যথা জন্ত দড়কা পক্ষে—কামো, ইগ্নেসা ও বেল; কষ্টকর ছট্ফটানি পক্ষে—কার্বি; শিরঃপীড়ায় বেল, ককুলস, সিকুটা, আসিড ফস দেওয়া বিধি।

সন্ধি বিতানে (Sprains) (মোছড়ানো) পক্ষে সর্ব প্রথম রস, ইহা ৩। ৪ দিবস সেবন করিয়া ও নড়িতে অতিরিক্ত ব্যথা এবং স্থান শক্ত বা হুর্দল থাকিলে ব্রাই পূর্বমত দিবা, পরে ৪ দিবস বিরাম দিয়া সল্ফর এবং সর্বশেষে পূর্ব নিয়মে কান্কা। উহাতেও না সারিলে কখন কখন সেপিয়া ও কাষ্টিকম দেওয়া আবশ্যক। জ্বর ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা আকন দেওয়া বিধি। আর্গিকা, কালেনডুলা বা রসের আদত আরোক ফোটাক্তক এক পোয়া জলে ফেলিয়া ঐ জল দিয়া সন্ধিবিতান ধৌত করা আবশ্যক; সন্ধিস্থান কুলা, লাল বা রক্ত জমাট হইয়া কাল হইলে ও নড়িলে লাগে, এমন উপসর্গ থাকিলে, আর্গিকা বিধি। বাহাদিগের আর্গিকা লাগাইলে

স্থান অত্যন্ত লাল ও চর্মরোগ হয়, তাহাদিগের পক্ষে কালেনডুলা বিশেষ উপকারী ।

কাটিয়া গেলে সর্ব প্রথম রক্ত বন্ধ করিবা । একত্ৰ ঠাণ্ডা জল বা বরফ অনবরত লাগাইবা ; অথবা তথায় চাপ দিয়া রাখিলে, রক্ত জমাট ও ধমনী সংকোচিত হইয়া শোণিতপাত বন্ধ করে । বড় ধমনীচ্ছেদ হইলে যোগ্য ব্যক্তি আনাইয়া শক্ত সূতা দ্বারা বন্ধন করাইবা । উহা না হওয়া পর্য্যন্ত কাটার মুখে চাপ দিয়া উহার উর্দ্ধভাগে বন্ধন দিয়া রাখিবা ; রক্ত বন্ধ হইলে তথায় ঠাণ্ডা জলের বা আর্নিকা বা কালেনডুলা জলমিশ্রিত স্নারোকের পটি লাগাইবা ।

খ্যাখলিয়া যাওয়া পক্ষে সর্ব প্রথম স্থান পরিষ্কার করিয়া মুখে বোড় লাগাইয়া তত্পরি ঠাণ্ডা জলপটি দিতে থাকিবে । অতিরিক্ত ব্যথা ও পাক-ধরার অবস্থা হইলে জল দেওয়া বন্ধ করিয়া কামো ২।৩ দিবস খাইতে দিবা, তাহাতে বিশেষ ফল না দর্শিলে হিপার । পূর্বমত ঔষধ দিয়া যা শুকাইবার উপক্রম না হইলে সিলিসা এবং সর্বশেষে সল্ফর ও সিলিসা ৩ । ৬ দিন অন্তর পর পর দিবা ।

অস্থি, স্থানভ্রষ্ট হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা উহা যথা স্থানে সন্নিবেশিত করাইবা । ব্যথা সারা নিমিত্ত ঠাণ্ডা জল বা আর্নিকা যুক্ত জলের পটি তথায় লাগাইবা এবং আর্নিকা ও আঁকন সেবন করিতে দিবা । অস্থিভগ্ন হইলে, ডাক্তার দ্বারা তথায় বাড় বাধাইয়া লইবা, এবং নাড়া পাইয়া উহা কোন মতে স্থানভ্রষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবা । ব্যথার নিমিত্ত আর্নিকা এবং শীঘ্র শীঘ্র হাড় বোড়া লাগা নিমিত্ত সিমফেসিস সেবন বিধি । হাড় ভাঙ্গার গাছ, ছোট গোয়ালের পাতা ইত্যাদির প্রলেপে ব্যথা সারিতে দেখা গিয়াছে ।

সকল প্রকার আঘাতে অঁর থাকিলে লঘু বা অনান্দ্রাস-জীর্ণ পথ্য ব্যবস্থা ।

### পোকা মাকড় কামড়ান ।

বোলতা কামড়ান পক্ষে কেঁচোর মাটি, হঁকার জল বা তৈল দেওয়া হয় । ভেরাণ্ডার কচুর আটায় আলা নিবারণ হয় । •

আদত ক্যাম্ফর আরোকের ঘ্রাণ লইলে পোকা মাকড় কামড়ানর আলা

নিবারণ হয়। ইহা প্রয়োগ করিয়াও প্রদাহ না কমিলে আকন ও তৎপরে আণিকা। জিহ্বা বা মুখে কামড়ানয় সর্ব প্রথম আণিকায়ুক্ত জলের কুন্নি, তাহাতে না সারিলে, এবং ব্যথা, ফুলা, ও লাল ভাঙ্গা পক্ষে বেল ও মার্ক পর পর বিধি। পেঁয়াজের রসও ব্যবহৃত হয়। অথবা বোলতা মোমাছি কামড়াইলে ছলটা বাহির করিয়া ফেলাইয়া, লিডম পেলুটার খাইতে দিবা। চক্ষু ও মুখে কামড়ানয় মধু লাগাইবে।

বিছা কামড়াইলে তথায় নীলবড়ি ঘষিয়া দিবা। আড়রাপাতার বা আমরুলের রস, টাটকা গুড়ুক তামাক বা আকনের আদত আরোক দংশিত স্থানে দিগে উপকার সম্ভব। দেশী অনেক গাছ গাছড়ায় আন্ত ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

পতন জন্ত কখন কখন শিশুকে সংজ্ঞাশূন্য মৃতবৎ দেখায়। তৎকালে ক্লেগীর মস্তক উচ্চ রাখিয়া শয়ান করাইবা, এবং মুখ মধ্যে আণিকা ২৩ অঙ্গুষ্ঠ দিবা। এ অবস্থায় আণিকা-জলের পিচকারী দিলেও ফল দর্শে। অধিক রক্তপাত হইলে আণিকা এবং ৩৪ ঘণ্টার পর চাইনা দেওয়া বিধি।

### দহন ও ঝলসান।

অগ্নি সংস্পর্শে পোড়ার নাম দহন, গরম জব্য সংস্পর্শে পোড়ার নাম ঝলসান। সামান্যতর হইলে পোড়া স্থানে আগুনের আঁচ লাগাইবা; ইহাতে তৎকালে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা বাড়ে বটে, কিন্তু পরে ফোঁকা প্রভৃতি উপদ্রব হয় না। অধিক জখম হইলে অবস্থানুযায়ী নিম্ন ঔষধ মধ্যে সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত প্রয়োগ বিধি। পোড়ায় ঠাণ্ডা জল লাগান নিতান্ত অপরাধ। তাহা করিলে অনতিবিলম্বে ফোঁকা হয়। “বিষমস্তবিষমৌষধম্” এটি যে স্বভাবের নিয়ম, তাহা কেবল হানিমানের ক্ষমতা নয়—দহন তাহার একটি উদাহরণ স্থল।

আণিকার আদত আরোক জল মিশ্রিত করিয়া দিলে সামান্যতর পোড়া বা ঝলসানর ব্যথা ও অপর যন্ত্রণা দূর হয়।

কাঁহারিস ৪ক্রমের আরোক জলে ফেলিয়া ঐ জলে একখানি পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া দক্ষ স্থানে একরূপ করিয়া লাগাইবা যেন ঐ স্থানে বাতাস

না লাগে । নেকড়া কোন মতে শুকাইতে দিবে না । ইহাতে বেলেস্তারার ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা পড়িবে না । পোড়ার পরক্ষণেই এই রূপ ব্যবহার করা আবশ্যিক । দীর্ঘকাল বিলম্ব হইলে তাদৃশ ফল হয় না ।

আটিকা-অরেন্স—আদত আরোক জলে ফেলিয়া পূৰ্ব্বমত নেকড়ায় ভিজাইয়া পোড়া স্থানে দিবা । প্রকাণ্ড ফোঁকা পড়িলে এই ঔষধ দেওয়া বিধি ।

সূরা—সূরা নেকড়ায় ভিজাইয়া গরম করিয়া দধি স্থানোপরি দিয়া, তদুপরি কলার পাত দিয়া জড়াইয়া রাখিলে, পরে কোন কষ্ট হয় না । বেলেস্তারার ত্রায় ফোঁকা পড়ার পূর্বে দিবে ।

কাষ্টিকম—৬ ক্রমের এক ছটাক জলে ২।৩ ফোটা ফেলিয়া পূৰ্ব্বমত দিবা । পোড়ার ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে অত্র ঔষধ না দেওয়া হইলে এবং অধিক দূর ভিতর পর্য্যন্ত দহন হইয়াছে এমত স্থলে বিশেষ উপকারী ।

• বা সারিবার নিমিত্ত ক্রিয়োসোট বা ক্রোকস সাটাইবাসের আদত আরোক জলে ফেলিয়া পূৰ্ব্বমত ব্যবহারে ফল লাভ হয় ।

বা পচিতে থাকিলে ক্যালেনডুলা বা চাইনা আদত আরোক পূৰ্ব্বমত দেওয়া বিধি ।

নারিকেল তৈল ও চুণের জল একত্র ফেনাইয়া নেকড়ায় লাগাইয়া দধি-স্থানের উপর দিয়া জড়াইয়া দিবা । ২ । ৪ ঘণ্টা পরে ঐরূপ পুনর্ব্বার অপর একটি পটি লাগাইবা ।

কামো—অধিক পোড়ার দরুণ দড়কা । যাতনা জত্র ক্ষিপ্তপ্রায় । বড় অধৈর্য্য, ভদ্ররূপে কথার উত্তর দিতে অশক্ত । বদন ও মাথায় গরম ঘাম ।

চিন—বা হইতে অতিরিক্ত পুষ পড়ার দরুণ অতিশয় দুর্ব্বলতা । অকষ্টকর জলবৎ ভেদ, বিশেষ রাত্রে ।

সিলিসা—অতি আস্তে আস্তে বা সারা বা fleshly disposed to shoot up পক্ষে ।

সলফর—ঘার পাশে চুলকুনি, জালা, প্রদাহ ।

অথবা ফোঁকাগুলি কাঁচিতে কাঁটিয়া ও তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া তদুপরি তুলা পাঁজিয়া দিবা । তুলা বা তৈল নিকটে কিছুই না থাকিলে, দধি



স্থানোপরি পুরু করিয়া ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবা এবং উহা তুলিবার নিমিত্ত পরে ঐ স্থানে পুল্টিস দেওয়া আবশ্যক।

খাইবার ঔষধ সামান্যতর পোড়া পক্ষে ও'সর্ক প্রথম আর্গিকা ; ব্যথা ও জ্বালা অধিক হইলে কার্বো ; ইহা সেবনের ৩ ঘণ্টা মধ্যে যন্ত্রণার লাঘব না হইলে কফি ; এবং জ্বর ও নাড়ী ঘোটা ও দ্রুত পক্ষে—আকন। এ সমস্ত সামান্যতর পোড়ার পক্ষে ; অধিকতর ও ভয়াবহ হইলে, অঘোর, নাড়ী দুর্বল, অপ্রাপ্যপ্রায় ও শীত, এ অবস্থায় গরম জলে স্নান ও ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর ওপিয়ম বিধি। ইহা খাইতে খাইতে জ্বর উপস্থিত হইলে আকন দিবা, কিন্তু দুর্বলতা ও নাড়ীর ক্ষুণ্ণতা না কমিলে, আর্স ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবা, বিশেষতঃ অনেক খানি স্থান ব্যপিয়া পচা ধরার আশঙ্কা থাকিলে। ভিদ ভিদে বলক্ষয়-কারী জ্বর থাকিলে রস।

• কাহারিস—আরোক বাহিরে লাগানর দরুণ অধিক প্রস্রাব হইলে ক্যান্ফরের আরোক তিন ঘণ্টা অন্তর। জ্বর কালে লঘু পথ্য, অল্প সময় অনুভেজক খাদ্য এবং আরোগ্য হুওন কালে দুর্বল থাকিলে মাংসের রুচ।

ধাতু পরিবর্তন নিমিত্ত আর্গিকা, সল্ফর, দীর্ঘকাল অন্তর বহুদিন সেবন বিধি। নক্স, লাইকপ, ফস, আসিড, নাইট্রিক, ইহারাও ধাতু পরিবর্তনে সক্ষম।

### গর্শ্মির পীড়া ও অধিক পারা ব্যবহার জন্য রোগ !

পিতার বা মাতার পূর্ব পীড়া থাকা বশতঃ সন্তানের নানা রোগ হয়। আহা ! কোন দোষে দোষী নয়, অথচ পৈতৃক ও মাতৃক রোগে কত সন্তান যে যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা ভাবিলে বড়ই কষ্ট হয়। যে স্নেহময় পিতা মাতা, সন্তানের নিশ্চিন্ত প্রাণ দিতে পারেন, তাঁহাদের অবিবেচনা দোষে সেই প্রাণতুল্য অপত্যের যে কত বিপত্তি ঘটে, তাহা কি তাঁহারা ভাবেন ? কিন্তু ভাব্য উচিত। সে যাহা হউক, মুখ, ওষ্ঠ বা জননেন্দ্রিয়ের যা পক্ষে—মার্কসল, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক মাত্রা করিয়া ৮।১০ দিন দিবা। মধ্যে এক বা দুই দিবস এক মাত্রা করিয়া সল্ফর কখন কখন আবশ্যক হয়, সে দিন

অল্প ঔষধ দিবে না । কিন্তু এ রোগ নিমিত্ত ডাক্তারি মতের চিকিৎসায় অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকিলে, হিপার দেওয়া বিধি । ইহাতে উপকার না বুঝিলে এবং পারা বশতঃ মুখ আসার উপসর্গ হইলে, নাইট্রিক আসিড; এবং পারা দরুণ সমস্ত অস্ত্র মধ্যে ক্ষত হওয়া বুঝিলে আন্টমর্টার; অথবা চর্ম মাংস ভেদ করিয়া নাসিকা ও তালুর অস্থি ক্ষয় হইতে থাকিলে, আরমমেটাল বা ফস-আসিড; অপর কোন ভাড়ে পারা বা গর্শ্বির ঘা আক্রমণ করিলে আসাকেটিডা ও ফস-আসিড । অধিক পারা ব্যবহার জন্ত মুখে ঘা, মাড়ি ফুলা ও দাঁত হইতে ঘোড় খোলা এবং গেলার কণ্ঠ পক্ষে, বেল, ডক্কা, কার্বো, সল্ফর, আসিডসল্ফর ।

গর্শ্বির রোগ জন্ত বিবিধ চর্মরোগ পক্ষে আসিড নাইট্রিক, হিপার, আসিড-ফস, ডক্কা, থুজা, সল্ফর ।

এই জন্ত ওষ্ঠ, মলদ্বার বা অন্ত্র অন্ত্র কোমল স্থানে ক্ষত হইলে মার্ক বা থুজা; ঘা দগদগে, ও আব বা আঁচিল হইতে পূর্ববৎ রস নির্গত হইলে নাইট্রিক আসিড । ইহার সঙ্গে অক্ষুধা, অনিদ্রা, মধ্যে মধ্যে গল্লি কাঁটা দেওয়া, মুখমণ্ডল লাল, নাসিকা ছুঁচলা, ওষ্ঠ শুষ্ক, পিপাসা, বলক্ষয়কারী অপ্রকাশ্য জ্বর থাকিলে চাইনা; রাত্রে অধিক ঘর্ম হইতে থাকিলে ফস-আসিড দিবা ।

ইহার দরুণ চক্ষু প্রদাহ হইলে মার্কসল উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহাতে উপকার না হইলে কার্বো, আলিড নাইট্রিক, ফাইটো, কাক্কা, কখন কখন থুজা ব্যবহার আবশ্যক ।

## ক্ষত বা ঘা ।

শরীর সুস্থ থাকিলে, দৈবাধীন আঘাত লাগিয়া ঘা হইলে অল্প দিন মধ্যে তাহা সারিয়া যায় । কিন্তু ধাতু বিকৃত থাকিলে, আপনা হইতে ক্ষত শুকায় না । তৎকালোচিত ও লক্ষণানুযায়ী ভৈষজ্য প্রয়োগ করিয়া ধাতু প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবান হইবা । মলম প্রলেপাদি ব্যবহার করিয়া নিরাময় হইতে চেষ্টা পাইবা না । উহাতে ঘা শুকাইতে পারে, কিন্তু রোগের মূল কারণ

দুরীভূত না হওন জন্য অল্প কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র আক্রান্ত হওয়াতে হয় তো রোগ অধিক ভয়াবহ ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ।

ক্ষত গভীর হইলে প্রত্যাহ দুই এক বার গরম জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক লিণ্ট বা তুলা, নারিকেল তৈল বা লুচী-ভাজা ঘূতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে দিবা । এবং লাকেসিস, হিপার বা সিলিসা ; ইহার মধ্যে এক একটা ঔষধ প্রত্যাহ একবার করিয়া ৪ । ৫ দিন দিয়া পরে ১২ দিন বিরাম দিয়া প্রতিকার বুঝ তো পুনরায় ঐরূপ দিবা, ডাক্তার এক সাহেব তিনটা ঔষধ পর পর চারি পাঁচ পালা খাইতে কহেন, অর্থাৎ প্রথম দিন লাকেসিস, দ্বিতীয় দিনে হিপার, তৃতীয় দিনে সিলিসা, পুনরায় ঐরূপ ।

ঘার উপর ঠাণ্ডা জলের পটি ও তাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করা উচিত । এবং পিটেলিয়ম, লাইকপ, সিলিসা পূর্বমত সেবন বিধি ।

নাগী ঘা ( fistulous ulcer ) অর্থাৎ মুখ স্রব, কিন্তু ভিতরে বিস্তৃত ক্ষত থাকিলে ভিতরে শুষ্ক লি-ট দিলে ভিতর থেকে শীঘ্র শীঘ্র ঘা পূরে । আন্টিম-ক্রড, কান্ধা, সিলিসা, সল্ফর সেবন বিধি ।

ক্ষতের পার্শ্বস্থান অর্থাৎ কিনারী পুরু, শক্ত ও অসমান থাকিলে পূর্বের ঞ্চায় লিণ্ট দিবা ও আর্স, পলস, লাইকপ, সল্ফর পূর্ব মত খাওয়াইবা । অস্থিতে ক্ষত হইয়া উপরে ঘা থাকিলে মার্ক, সল্ফর, কালিকা, লাইকপ, লাকেসিস, সল্ফর ।

যে ক্ষতে জালা বা সেন্টে ধরা থাকে, তাহার পক্ষে, আর্স, রস, সল্ফর ; যাতে দপ্ধপানি বা কামড়ানি ছায় ব্যথা থাকিলে, মার্ক, লাকেসিস, লাইকপ ও সল্ফর পূর্বমত ।

ক্ষতসঙ্গে চুলকুনি থাকিলে হিপার, পলস, সল্ফর ।

যে ঘায় কোন প্রকার ব্যথা না থাকে, তাহার পক্ষে, ফস, আসিড, কার্বো সেপিয়া ও সল্ফর ।

ক্ষত অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইলে, কার্বো, আর্স, পলস ও সল্ফর পূর্ব মত । দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এরূপ ঘা পক্ষে মার্ক, লাকেসিস, হিপার, সিলিসা, সল্ফর ।

## চুল উঠিয়া যাওয়া ।

অবিবাহিতা কন্যার চুল উঠি ৥ গেলে সকলেই উদ্ভিগ্ন হয়। নিম্নে এই রোগের দস্তকগুলি ঔষধ লেখা হইল ।

তরুণ কটিন রোগ আরোগ্যের পর চুল উঠিয়া গেলে, লাইকপ, হিপার, সিলিস, কাক্স, কাফো, ফাফাফিন, সলফর ।

পুনঃ পুনঃ ঘানের জন্ত চুল উঠা পক্ষে মার্ক ; অধিক পরিমাণে উঠাতে রস ; রক্তক্ষয় দূরণ চায়না, ফেরম ; অধিক পারাঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্ত রোগে হিপার, নাইট্র-আ বা কার্বো , অধিক কুইনাইন খাওয়ার নিমিত্ত হইলে পলুস, দেল, বা হিপার । পুনঃ পুনঃ মাথাধরা জন্ত রোগে, ফস, সিলিসা, সেপি হিপার । অক্লিষ্ট শোক বা উদ্ভিগ্নতা ও মনস্তাপ জন্ত রোগে ইগ্নে, ফস । মাথায় অধিক মরামাস (Scurf) হইলে কাক্স, গ্রাফাইট । ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটরা, তোলা ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর শক্ত তোয়ালে বা বুরুষ দিয়া খানিকটা করিয়া উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিবা । ২।৪ ফোটা কাস্থ আরোক জলে ফেলিয়া সপ্তাহ অন্তর ঐ জল স্পঞ্জ দিয়া চুলের গোড়ায় লাগাইবা বা পেঁয়াজের রসে চিনি মিশাইয়া তাহা দিয়া মাথা ঘষিবে ।

॥ মাথার সম্মুখের চুল উঠিলে আর্স, নেট্রম, ফস ; ব্রহ্মতালুর চুল উঠা পক্ষে বারাইট, গ্রাফাইটিস, লাইকপ, সেপিরা, জিক্স ; মাথার পশ্চাভাগে হইলে কাস্থ, ফস, সিলিসা ; পার্শ্বে উঠিলে গ্রাফাইটিস, ফস, কালী, জিক্স ; রংগের চুল উঠায়, কাক্স, লাইকপ, নেট্রম ; এবং ক্রুর হইলে, বেল, কাষ্ট, আগর, কালী ।

টাকপড়া পক্ষে কাস্থ, ফস, আইওডাইন । কর্ণের পশ্চাভাগের টাকপড়ায় ফস । চর্মরোগ অন্তর্হিত হওয়ার অত্যন্ত মাথা চুল্কনি পক্ষে গ্রাফাইটিস, কালী, লাইকপ, সিলিসা, সলফর । মাথায় খুঁকি উঠা পক্ষে কাক্স, গ্রাফাইটিস, মায়িসা, ষ্টাফিসিগ্রিয়া ।

কাক্স—যে সকল বামার অধিক রক্ত ভাজে বা প্রসবের পর বাহাদেয় প্রচুর ও দীর্ঘ (Lochia) জরায়ু-মল বা কল্তানি ক্ষরিতে থাকে ।

লাইক—বিশেষ যাহাদের রক্ত উর্দ্ধগ হয় বা মাথায় উঠে।

সল্ফর—রক্ত উর্দ্ধগ, অর্শগ্রস্ত ও ধাতুবিকৃতি পক্ষে।

চুলে সর্বদা চটচটে ঘাম পক্ষে চাইনা, মার্ক ; চুল পাকা পক্ষে গ্রাফাইটিস, লাইকপ, ফস-আসিড, সল্ফর আসিড।

২। ৩ দিন এক মাত্রা করিয়া ঔষধ সেবনের পর ৪। ৫ দিন বিরাম, পরে উপকার বুঝিলে দীর্ঘকাল অন্তর এক এক মাত্রা, নতুবা অপর ঔষধ বিধি।

### খুঁড়িয়া হাঁটা, তোতলা কথা।

‘আঘাত অথবা হৌচট ভিন্ন শিশুর হঠাৎ খুঁড়িয়া হাঁটা পক্ষে মার্ক ; পরে বেল ; ইহাতে না সারিলে রস এবং তাহাতেও ফল না দর্শিলে কলসিস্ত।

শিশুর তোতলা কথা নিম্নস্ত্রোমনিয়ম ২। ৩ মাস খাওয়া আবশ্যক। পরে বেল, ইউফ্রে, প্লাটিনা, সল্ফর, ভেরাট, হিপার ; শরীরের সর্বোপরি ছাল উঠা পক্ষে এক সপ্তাহকাল কাষ্টিকম ; মাথায় ঐ রোগ শীঘ্র সারে না। কুস্কুড়ী দেখা যায় না, অথচ অতিরিক্ত চুল্কনা পক্ষে প্রাতে কাষ্টিকম ও রাত্রে মাক বিধি।

### জ্বর।

“জ্বর ছাড়া রোগ নাই” একথাটা সত্য না হউক, হাম, বসন্ত প্রভৃতির গুটি বাহির হওনের পূর্বাঙ্কে, কুসকুস ও শ্বাসনলী প্রদাহ, অগ্রমাস প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যাধির সমভিব্যাহারে যে ইহা অবস্থান করে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত পীড়ার বিষয় ইতিপূর্বে লেখা হইয়াছে। এস্থলে অসঙ্কর বা শুদ্ধ জ্বরের বিশেষরূপে বর্ণনা করা যাইবে। অজ্ঞেরা জ্বরাস্থরকে উপদেবতা বলিয়া জানেন। শরীর-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে শৈশবের বিষ বিশেষ সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করেন। মস্তিষ্ক ও রক্তের স্বাভাবিক ভ্রাস বিকৃত হইয়া কতকগুলি উপসর্গ হওয়ার নাম জ্বর। নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। অযথা, গুরু বা অতিরিক্ত আহার ; জলে ভেজা ; ক্র্যাসা

বা হিম লাগা ; নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে বাস ; রাত্রি জাগরণ ; অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম ; অধিক নেসা ; পুতি শরীরস্থ হওয়া ; শোক, ভয়, রাগাদির জ্ঞাত মনের বিশৃঙ্খলতা হওয়া ; ঋতু পরিবর্তন ; অতিরিক্ত তাপ বা শীত ; ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া ; তাপের হঠাৎ ন্যূনাতিরিক্ততা হওয়া ইত্যাদি উপলক্ষে রোগ জন্মে । ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে ইহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয়, তাহা বর্ণনা না করিয়া এস্থলে অরুকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা হইল ।

প্রথম, সামান্য জ্বর । ঋতু পরিবর্তন বা অনিয়ম জ্ঞাত শীত, অল্প গাত্র তাপ, নাড়ী মেটা ও বেগবতী কিন্তু তাদৃশ দ্রুত নহে, জরাস্ত্রে প্রস্রাব অল্প লাল ও ধরিয়া রাখিলে খাঁকরি পড়া ইত্যাদি উপসর্গ বিশিষ্ট হয় ।

দ্বিতীয়, প্রদাহিক জ্বর । সর্ব প্রথম অবসন্নতা, পরে অল্পক্ষণ স্থায়ী প্রবল শীত, কখন বা শীত অভাব, শীতের অবসানে অত্যন্ত গাত্রতাপ, ত্বক্ খস্খসে, চক্ষু ছলছলে, জিহ্বা শুষ্ক, অতিরিক্ত পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, কঠিন ও মোটা, প্রস্রাব অত্যন্ত লাল । উপযুক্ত ঔষধ ও সুপথ্য না পড়িলে রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিকার ও দোষ প্রাপ্ত হয় ।

তৃতীয় প্রকারকে বলক্ষয়কারী বা সন্নিপাতের জ্বর কহা যায় ।

জ্বর কালে অতিরিক্ত অবসন্নতা ; দৌর্বল্য ; কখন অধিক, কখন অল্প গাত্র তাপ ; ত্বক্ কখন শুষ্ক, কখন চট্চটে ঘর্ম্ম বিশিষ্ট ; জিহ্বা আর্দ্র থাকে ও কখন অত্যন্ত পিপাসা এবং শুষ্ক থাকে ; কখন বা তৃষ্ণার অভাব ; ত্বক্ স্বাভাবিক অপেক্ষা ঠাণ্ডা হওয়া ও নাড়ী মেটা ; কখন বা অত্যন্ত গরম হওয়া ও নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্বল ; এই সমস্ত রোগের প্রধান উপসর্গ । এই প্রকার জ্বরের সঙ্গে অত্র অত্র আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পীড়া অনেক সময় অবস্থান করে ।

কারণ নির্ণয় কবিত্তে পারিলে, নিম্ন ঔষধ মধ্যে যথাযোগ্য প্রয়োগ করিলে অধিক ও আশু উপকার সম্ভব ।

হঠাৎ ঘর্ম্মবন্ধ হওয়া জ্ঞাত পীড়া পক্ষে কামো । .

জলে ভেজা জ্ঞাত রোগে রস ।

হিম কুয়াসা লাগা পক্ষে ডক্কা ।

অতিরিক্ত কায়িক ও মানসিক শ্রম জ্ঞাত পীড়ায় নক্স, রস ।

তাড়াতাড়ি না চিবাইয়া গেলা জ্ঞাত রোগে ইপিকা । .

স্থত বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারে পল্স ।

অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য আহার নিমিত্ত পীড়ায় ইপিকা, পল্স, আন্-টিম, ব্রাই, নক্স, আন্টিমটার্ট, সল্ফর ।

রাত্রি জাগরণে নক্স ।

পুতি জন্তু পীড়ায় আর্স, চাইনা, ইপিকা, ব্রাই, রস ।

রাগ জন্তু কামো, কলসিস্, নক্স, ব্রাই, কোনিয়ম, চাইনা ; ভয়ে আকন, ওপিয়ম ; শোকে ইয়েলা, ফস, আসিড ; বিরক্তিতে কামো, কাঙ্কা ।

তাপের হঠাৎ পরিবর্তন জন্তু রোগে ব্রাই ।

অধিক বরফ, ঠাণ্ডা জল বা টক সামগ্রী খাওয়া জন্তু রোগে আর্স, পল্স ।

সামান্য জ্বরে দুই এক দিবস লজ্বন দিলেই অনেক সময় সারিয়া যায় । নিত্যন্ত আবশ্যক বুঝিলে ২।৫ মাত্রা আকন দিলে যথেষ্ট হয় । অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করাইলে ও গরম বস্ত্রদ্বারা সর্বাত্ম আবৃত রাখিলে, ঘর্ম হইয়া বিজরি হওন সম্ভব । গরম জলে পা ৪।৫ মিনিট ডুবাইয়া তৎ বস্ত্র দ্বারা উহা ঘর্ষণ করিয়া ঠাকিয়া রাখিলেও ঐ ফল হয় ।

সদিজ্বরে বয়স্ক্রম অনুসারে, আদিত ক্যাম্ফরের আরোক ২।৩ বার ঘন ঘন দিলে ঘর্ম হইয়া রোগ আরোগ্য হয় । তৎকালে রোগীকে আবৃত রাখিবা । (সদি দেখ)

প্রদাহিক জ্বরে আকন, বেল, ব্রাই, কামো, পল্স, রস, মার্ক, আর্স, হাইয়স, সল্ফর ; বিকারে বেল, ব্রাই, রস, হাইয়স, ওপিয়ম, কার্বো, ককুলস, নক্স, ফস-আসিড, ট্রোমোনিয়ম ।

ক্ষয়জ্বরে আর্স, ফস, ফস-আসিড, সিলিসা, সল্ফর, কাঙ্কা, চাইনা, ইপিকা, ককুলস ।

সন্নিপাতের লক্ষণে বেয়া, ব্রাই, রস, ওপিয়ম, লাকেসিস, লাটকপ, ফস-আসিড, আর্স ; ককুলস, ভেরাট, আর্স, চাইনা, হাইয়স, ট্রোমোনিয়ম ।

জ্বর অতিসারে ইপিকা, নক্স, পল্স, আন্টিম, ব্রাই, রস, কামো, আন্টিমটার্ট, ককুলস, ভিজিট, সুইল, বেল, ভেরাট ।

পৈত্তিকের অরে আকন, ব্রাই, কামো, নক্স, পলস, চাইনা, ককুস,  
আর্স, কাল্লা, ডিজিট, ইপিকা, সল্ফর

কামজরে সিনা, সিকুটা, স্পাইঞ্জল, মার্ক, সিলিসা, আকন, সল্ফর, নক্স,  
হাইড্রস, ষ্টানম, ষ্ট্রোফোনিয়ম।

আঘাত ও পতনের অরে আর্নিকা, ব্রাই, আকন, রস।

আইরিস—অর অতিশয়, পরিপাক কার্যের গোল, অধিক নেতান।

আকন—যে অরের ভোগ স্বল্প কাল, খুব গাত্র তাপ এবং নাড়া কঠিন ও  
 শীত, কম্প, স্বক শব্দ ও গরম, অতিশয় তৃষ্ণা, নাড়া দ্রুত ও কঠিন এবং  
 শেষ বর্ষা। বিশেষতঃ ছটকট, আইটাই, উদ্বেগ ও অধৈর্য্য এবং এই সঙ্গে  
 কোন স্বস্তি বা (Tissue) প্রদাহ। তদবস্থার কেবল ইহা ২৩ মাত্রা দিলে  
 শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রথম প্রথম গা খসখসে, পরে অল্প বা অধিক  
 তাপ; নাড়া মোটা ও দ্রুত; অনিদ্রা, অস্থিরতা; জিভে হলুদে ছাত্ত বা  
 উহা শুষ্ক ও লাগ বা খেত ক্রেদে আবৃত; মুখে জল ভিন্ন সকল দ্রব্যের  
 তিক্ত তার, বমন, তিক্ত উল্কার; সজাটে হড়হড়ে ভেদ; কখন ঐ সঙ্গে ক্ষুদে  
 কুমি; অতিরিক্ত তৃষ্ণা; কোষ্ঠবদ্ধতা বা অল্প অল্প ভেদ ও বেগ; যক্ৰুৎ প্রদেশে  
 ব্যথা, ভার ও ফুঁড়নি; প্রস্রাব অল্প লাল; রাগ বৃদ্ধি। এতদ্বিন্ন  
 বদন ও চক্ষু সরস ও আরক্ত; ছটকটানি; মূত্ৰাভয়; চীৎকার; অথবা দীর্ঘ  
 নিশ্বাস ত্যাগ; মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক; মাথা কামড়ানি দপদপানি ও উহা তুলিলে  
 (উর্দ্ধ করিলে) ঘোরা; কপাল ও ষাড় ভার; রাত্রে প্রলাপ; বুক ভার;  
 শ্বাস কষ্ট; কাশি; বুক ধড়ফড়ানি; গা হাত ব্যথা। প্রদাহিক অবস্থার  
 উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং প্রথম প্রথম ব্যবহার্য্য। লক্ষণানুযায়ী হইলে ইহা বেল  
 বা ব্রাই সহ পর পর দেওয়া আবশ্যিক। পিত্তশ্লেষ্মা বিকারাবস্থায়—অতিশয়  
 মূত্ৰাভয় এবং অমুক দিন মরিব বলা (আর্স), মগজ যেন চক্ষুদ্বয় দিয়া ঠেলিয়া  
 বাহির হইবে, মাথা মধ্যে যেন গরম জল ফুটিতেছে ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে  
 ইহা দিবা। ডেঙ্গু অরের প্রথম প্রথম, বিশেষ গাঁহট ফুলা থাকিলে।

আগারি—উত্তর দিতে অনিচ্ছুক (ফস-আ), ভ্রাণের সাড়ীধকা, জিভ  
 শুষ্ক, পেট ডাকা ও অধিক দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, সর্বদা ক্লিপ্তপ্রায়, শয্যা হইতে



উঠিতে উদ্যত ( হাইয়স ), পুতলি সংকোচিত, জিভ শুষ্ক ও কম্পাষিত, নাড়ী দ্রুত, হাত কাঁপা, পায়ে ব্যথা, হাত ও পায়ের পাতায় খাল লাগা।

অণ্টিম-ক্র—জিভ শাদা, আহারে বিদেহ, গা বমি বমি ও বমন ইচ্ছা, কখন কখন পুনঃ পুনঃ বমন ও জলবৎ ও ভুক্ত খাদ্য ভেদ। ইপি ও পলস দিয়া না সারিলে ইহা দেওয়া বিধি।

আপিস—জিভ ব্যাথাযুক্ত ফাটা বা ফুস্‌কুড়ি বিশিষ্ট; মুখ ও গলা শুষ্ক এবং গিলিতে কষ্ট, পেট টাটান, স্পর্শে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পুনঃ পুনঃ কদর্য্য রক্ত সংবৃত্ত আম ও অনিচ্ছাধীন মলত্যাগ, অতিশয় দুর্বলতা। সর্কাসে, বিশেষ বুক ও পেটে, মসুরীর ন্যায় (Millet) লাল লাল দাগ ও পিপাদার অভাব। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ, অচেতন, থেকে থেকে চিড়কে উঠা, জিভ কুলা, শুষ্ক, ফাটা, ক্ষত বিশিষ্ট, কষ্টে বাহির হয় ( আস, রস ) এবং স্পর্শ করিলে লাগা ( লাকাসি ); শরীর নাড়াচাড়াতে ভেদ ( ফস ), প্রস্রাব বন্ধ ( হাইয়স ), পেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটক, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথা ( রস ), আলাকর ও হল ফুটানর স্থার ক্রব্য ব্রণ ( Carbuncle ) ( আস ), অতিশয় দুর্বল ও গড়িয়ে পাস্তলার দিকে পড়া।

আরম-টী—ঠোঁঠ ও কসে ঘা, জিভ লাল ও টাটান ও ফাটা বিশিষ্ট, নাক ও হাতের আঙ্গুলের মাথা খুঁটা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস এবং গলা ও ঘাড়ের বাঁচি আওরান, মুখ আসা, পলাইবার ইচ্ছা, আইটাই।

আণিকা—বিকারে জড়ের স্থায়, কথা কুহিতে কি বলিবেন ভুল হওয়া; কথার উত্তর দিতে অনিচ্ছা ( ফস-আ ), প্রলাপ, বিড়বিড় বকা, আকাশ হাতড়ান, অচেতন, অত্যন্ত বলক্ষয়, মাথার মধ্যে কিভূত প্রকার জড়তা ও জ্বর উপর ( বিশেষ ডাইনের ) চাপুনি, নাক দিয়া রক্ত পড়া, জিভে শাদা লেপ অথবা জিভ ও ঠোঁঠ শুষ্ক ও মাঝাড়ে পাটকিলা রেখা ( বাস্টিসা ), মুখের তার, নিশ্বাস ও ঘর্ম্ম কদর্য্য, জোরে শব্দ বিশিষ্ট প্রশ্বাস ত্যাগ, পেট কুলা, অনিচ্ছাধীন শৌচ ও প্রস্রাব, বকের বর্ম্মদিকে প্রচণ্ড ফুঁড়ুনি ( ব্রাই ), গাত্রে কালশিরা ও স্থানে স্থানে বড় বড় জর্দাটে সজ্জা দাগ ( Pellicle ), সর্কশরীরে ব্যথা, নাড়াচাড়াতে ভাল থাকা, অধঃ-অঙ্গ কাঁপা, শব্দ অতিশয় শব্দ বোধ হওয়া ও সর্কদা পাশফেরা, অতৃপ্তিকর ও স্বপ্নবিশিষ্ট নিদ্রা।

আস—কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বদন পাঙ্গাশ বর্ণ, তোবড়ান, মূতুর চেহারা (কার্বো); অত্যন্ত তাপ, অন্তর্দাহ; সর্ষদা ঠোঁঠ চাটা, ঠোঁঠ ময়লা, শুক ও ফাটা; জিত শুক, লাল ও চক্চকে ও ফাটা (ব্রাই, রস) বা মাঝাড়ে পাটকিলে ছাতা, অথবা জিত, মাড়ি ও দাঁতে দুর্গন্ধ, কাল, পরস্পর্শ ময়লা পড়া; দন্তশর্করা; অতিশয় তৃষ্ণা; পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় পানে তৃপ্তি. ক্ষুধা মান্দ্য, আহার বা পান করিলেই তুলিয়া ফেলা, পেট টনটনে শক্ত, অঙ্গীর্ণের পচা গন্ধের ভেদ, অতিরিক্ত অস্থিরতা ও নেতিয়া পড়া; বৃদ্ধির অবস্থার অতিরিক্ত ঘর্ম, অতৃপ্ত নিদ্রা, ঘুমন্ত চম্‌কান, অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, বিড়বিড় করিয়া বকা, জ্ঞানশূন্য ভাবে অচেতন, থামথ্যালি, অল্পে বিরক্ত; নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও কম্পান্বিত, অথবা সর্ষদা, মাথা ও হাত পা চালা, চক্ষু বসা, চক্‌চকে বা জ্যোতিঃশূন্য হওয়া, অস্পষ্ট ক্ষীণস্বর বাক্য (কার্বো)। কড়ার নিম্নে ও পাকাশয়ে অতিরিক্ত জালা (ফস, ভেরাট), প্রচণ্ড ও নিয়ত বমন, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব, গাত্রে শাদা বা বেগুনে বিন্‌কুড়ি বিন্‌কুড়ি স্ফোটক (মর-আ, লাকাসি), কোড়া ও অতিরিক্ত জালা, (কাষ্টিক, মার্ক, সিলিসা), গঙ্গী ঘড়ঘড়ানি, ঠাণ্ডা ঘাম ও নাড়ী অপ্রাপ্যপ্রায়, এমন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ বিধি।

আস—আকন ত্রায়, হৃৎউত্তপ্ত, নাড়ী লক্ষবান্, অস্থিরতা, উষ্ণেগ, ইহা ভিন্ন একলাগাড়ে—বিরাম অভাব, বা সামান্য স্বল্প বিরাম। তাপ বৃদ্ধি, অধিকতর আইটাই ও অধিকতর দুর্বল, জ্বিত পাটকিলে এবং টাইফয়েড উপসর্গ প্রকাশ।

ইউপার্ট—গ্রীষ্ম ও বর্ষার জ্বর, পৈত্তিকের উপসর্গের আধিক্য, বিপর্যয় কপাল ব্যাথা, জ্বিতে পুরু জর্দা লেপ, পানে বমন, বক্ষুৎ প্রদেশের পূর্ণতা এবং নড়ায় ফুঁড়ুনি ও বেদনা অমুভব করা, অত্যন্ত ও রঞ্জাল প্রস্রাব, পেশী ও হাড় পর্য্যন্ত কামড়ান। ডেঙ্গুজ্বরে নিম্নক্রমের ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়। পূর্ব লক্ষণ বিশিষ্ট—বিলক্ষণ তৃষ্ণা ও পান করিলে তুলিয়া ফেলা; হাড়, বিশেষ কঙ্কা ভাঙ্গার ত্রায় শরীর টাটান, প্রচুর ঘাম, সর্ষদা গা বমি বমি ও বমন, কাঁঝাল তাপ ও গাত্রে ঘাম, মাথা অত্যন্ত ভার, এমন কি হাত দিয়া ধরিতে বাধ্য হওয়া, জ্বিতে জর্দা বা শাদা লেপ।

ইথে—চক্ষুর সম্মুখে চিক্‌চিকুনি, পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস, মুখে টক্‌ তার, বদন ও হাত পায় খেঁচুনি, ঘুমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিড়িক্‌মারা, হৃৎকম্প, নারী-কাতরে—( কফি ) ; অতিশয় অধৈর্য্য হওয়া ; কাল্পনিক অমঙ্গল চিন্তা করা, সমস্ত রাত্রি স্বপ্নবিশিষ্ট নিদ্রা যাওয়া ।

ইপি—অধিক তাপসহ অত্যন্ত কম্প বা অল্প কম্প সহ অধিক তাপ, জিহ্বা পুরু ও তাহাতে জর্দাটে ছাতা, মুখ শুষ্ক ও দুর্গন্ধ, তিক্ত তার, আহায়ে ঘৃণা, গা বমি বমি অথচ বমন না হওয়া, উকি উঠা, অথবা অজীর্ণ খাদ্য ( রোমন্থ পদার্থের ত্রায় ) মাঝে মাঝে উঠা, পেট ভার ও ব্যথা, সম্ভ্র বা জর্দাটে জলবৎ ভেদ, ত্বক্‌ ফেঁকেশ বা জর্দা ও শুষ্ক ; গাত্র তাপ, বিশেষ সন্ধ্যায় ; কপাল ব্যথা, পিপাসা, অত্যন্ত অস্থিরতা, হাতের তালু জ্বালা, রাত্রে ঘর্ম্ম, নিশ্বাস ঘন ঘন ও ফেলিতে কষ্টবোধ ।

ইহার অনেক লক্ষণ টার্ট-এ ত্রায় ; কিন্তু শিশুর পক্ষে ইপি অধিক ফল-দায়ী, বিশেষ ভেদ হইতে থাকিলে ।

বেল—জিভে জর্দাটে বা পুরু ছাতা, পানে বিদ্রোহ অথবা নিম্নত পিপাসা ; কিন্তু পানে অশক্ত ; টক্‌, তিক্ত বা হড়ু হড়ে বমন ; সন্ধ্যায়, বিশেষ মাথা অধিক গরম, দাহ অতিরিক্ত, বেন ফাটিয়া যাওয়ার ত্রায় ব্যথা ; দিবসে তন্দ্রা, রাত্রে অনিদ্রা, মুখ শুষ্ক, গিলিতে কষ্ট, অস্থিরতা, মর্দদা সন্দিগ্‌হন বা খামখেয়ালি মেজাজ ; ঘুমিয়া ঘুমিয়া চমকনি, অঙ্গ চিড়িক্‌মারা, অজ্ঞান হইয়া বিভ্রিভ্‌ করা, শয্যা হাতড়ান বা চীৎকার ও দড়কাই, গৈঙানি, ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা কিম্বা প্রবল ও প্রচণ্ড বিকার ; অন্তর্দাহ ; ভূত প্রেতাদি ভয়ঙ্কর খেয়াল দেখা । শয্যা হইতে পলাইতে উদ্যত, চক্ষু-পুত্তলি অতিরিক্ত বিস্তৃত ; চক্ষু লাল, অত্যন্ত ক্রোধের অথচ অস্থির দৃষ্টি, একবারে আনোেক অসহিষ্ণুতা, কসে যা, অত্যন্ত গলা ব্যথা ও গিলিতে কষ্ট ; অতি দ্রুত ও অস্পষ্ট বাক্য, অল্প লাল প্রস্রাব, গাত্রে লাল দাগ, জরের প্রথমে অত্যন্ত শিরঃপীড়া, অথবা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় অথবা ঘোর বিকার, এই উভয় অবস্থায় প্রয়োগ বিধি ।

ককু—অতিশয় দুর্বল, শ্রান্ত ও ম্লান ; অল্প শ্রমে কাঁপুনি ও ঘর্ম্ম, ফ্যাল-ফেলে দৃষ্টি, গা বমি বমি, আহায়ে ঘৃণা, পেট ফুলা, জিহ্বায় জর্দা ছাতা, মুখ শুষ্ক, দুর্গন্ধ নিশ্বাস ও বমন ইচ্ছা, শ্বাস কষ্ট, কোষ্ঠ-কাঠিখ বা মলদ্বার জ্বালা,

নিম্নেজ হইয়া পড়িয়া থাকে। জড়তা—দেহিতে বুঝা ( *slowness of comprehension* ), সাড়াধিক্য, উঠিতে গেলে মাথা ঘোরা ( *ব্রাই* ), জল উদরস্থ কালীন শব্দ অনুভব করা, অর্চৈতন্ত, নিদ্রার বুঝা চেষ্টা, চক্ষুর পাতা ভারি বোধ, কর্ণ মধ্যে শৌ শৌ শব্দ হওয়া, মুখে তামার তার সহ অকুচি ( *ars. & Rhus.* ); গা বমি বমি ও মূর্ছা হইবার উপক্রম, ফুলা ও পান কালে শব্দ শুনা যাওয়া; প্লেট ডাকা; হাত ও পায়ের পাতা পর্যায়ক্রমে অসাড় হওয়া, অত্যন্ত দুর্বলতা, শ্রান্তি, গলায় পেশীর দুর্বলতা।

কফি—বাতিক বৃদ্ধি উপসর্গে অস্থিরতা, ছটফটানি, চীৎকার, কান্না।

কলচিকম—পৈত্তিকের জ্বর, থেকে থেকে অত্যন্ত পেট ব্যথার দৃকুণ পা উচ্চ করিয়া কান্না ও হাতনার জন্ত অঙ্গ ভঙ্গ করা, ভেদ ( বিশেষত: কিছু খাইলেই ) ও পায়ের ডিম্বে খাল লাগা। উগ্র ঘ্রাণে অস্থব, জড়তা, প্রলাপ সহ শিরঃপীড়া, হঠাৎ জীবনী-শক্তির হ্রাসতা, মূতুর চেহারা, চক্ষু বসু ও ফ্যাম্লেফেলে দৃষ্টি; ঠোঁঠ, দাঁত, জিভে ময়লা পড়া; ত্বক শুষ্ক, নাক দিয়া রক্ত পড়া, ধড় গরম, হাত ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, জিভ ভারি শক্ত ও সাড়হীন ও উহা অতি কষ্টে বাহির করা, দাঁত কিড়িমিড় ( *বেল, হাইয়স* ); উপর পেট চাপিলে লাগা ( *বেল* ), পাকাশয়ে অতিরিক্ত-জালা বা বরফবৎ শীতল হওয়া ( *ars.* ), অতিরিক্ত তৃষ্ণা, পেট ফুলা, জলবৎ ভেদ, কখন কখন অনিচ্ছাধীন কদর্যা গন্ধের বাহ্যে, প্রস্রাব বন্ধ অথবা অনিচ্ছাধীন; শ্বাস অসম, ক্ষণলুপ্ত; নাড়ীক্রত ও ক্ষুদ্র, অপ্রাপ্যপ্রায়; পা ও পায়ের পাতা ফুলা, অতিশয় ভ্রাস্ত ও দুর্বল ( *ars.* ), বর্ষায়।

কামো—একবার শীত একবার তাপ এরূপ পুনঃ পুনঃ হইলে, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকিলে।

কামো—মাথা গরম ও ভার, তুলিলেই ঘোরা ও অধার দেখা, মুখমণ্ডল আরক্ত, ত্বক গরম ও শুষ্ক, নাড়ীক্রত, জিভ ফাটা ও লাল বা তহুপরি জর্দা ছাতা, পিপাসা, মুখে দুর্গন্ধ ও তিক্ত তার, অক্ষুধা, লইয়া বেড়ানয় শাস্ত থাকে, এবং এক গাল অপেক্ষা অপর গালের গাঢ় বর্ণ ইহার বিশেষ লক্ষণ; গা বমি বমি, তিক্ত ও টক উদগার ও বমন, কোষ্ঠরুদ্ধতা বা পুনঃ পুনঃ সজ্ঞাটে টক বা ডিম পচা গন্ধের ছ্যাক্কা ছ্যাক্কা ভেদ, ঘোলাটে লাল বা জর্দা

প্রস্রাব, শ্বাস কষ্ট, গা হাত ব্যথা, অনিদ্রা বা অতৃপ্তিকর ঘুম ও মধ্যে মধ্যে চমকান ও অঙ্গ চিড়িক্কারা, অস্থিরতা ও গের্গেঙান এবং অত্যন্ত চটা ও উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট পক্ষে।

ক্যাম্ফর—ত্বক্ অতিশয় ঠাণ্ডা ; বলক্ষয়কারী চটুচটে ঘাম ; মাথা গরম ; প্রলাপ ; উদরাময়। ইঠাৎ এককালে বলক্ষয় (*Ars.*), অতিরিক্ত অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন (*Ars.*), সর্বদা ঠাণ্ডা ঘাম (*Verat. p.*), শীতল ও ছুঁচল নাক, বদন ফেঁকশে, উদ্বিগ্নময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল (*Ars. verat.*), পায়ের ডিমে খাল লাগা (*sul.*), নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল, অপ্রাপ্যপ্রায় (কার্বো), মাথা গরম, সর্বদা ত্বকে চটুচটে ঠাণ্ডা ঘাম, জিভ ঠাণ্ডা (কার্বো, ভেরাট), অত্যন্ত তৃষ্ণা, পেট ডাকা ও অনিচ্ছাধীন ভেদ, গলা ঘড় ঘড় করা।

কার্বো—মূতুর চেহারা, অঘোর, চক্ষু-পুতুলি সাদৃশ্য, গলা ঘড়ঘড়ানি, নাড়ী ক্ষুদ্র বা অপ্রাপ্যপ্রায়; প্রচুর ঘাম, বিশেষ মুখ, হাত ও পায়ে; অসাড়ে শৌচ ত্যাগ; প্রস্রাব লাল; বদন, ঠোঁঠ, জিভ নীল; অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা, বদন সজাটে বা পাক্কাশ (আর্স), মূতুর চেহারা (ভেরাট), দিবা মধ্যে নাক দিয়া অনেক বৃষ্ণ ভয়ানক রক্ত পড়া, চক্ষু নিস্তেজ, পুতুলি আলোক অনুভবে অশক্ত, বধিরতা, চিবুলে মাড়িতে খুব লাগা, শ্বাস ও জিভ ঠাণ্ডা, জিভ কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক ও ফাটা, উপর পেট ক্ষীত, পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন, পেট ফাঁপা, কদর্যা মরুত, ক্ষয়কারী ভেদ—পচা গন্ধের ও অনিচ্ছাধীন (আর্স); আরোগ্য কালে উদ্বিগ্নময়, উপশ্বাস-নালীর সর্দি ও কঠে না-ছোড় গয়ার তুলা, বুক ঘড়ঘড় করা, নাড়ী স্বভাব ও অপ্রাপ্যপ্রায়, গা ঠাণ্ডা, অজস্র ঠাণ্ডা ঘাম, ঠাণ্ডা নিশ্বাস, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে পক্ষাঘাতের আশঙ্কা, শয্যায় বহু দিন থাকে জন্তু স্থানে স্থানে ক্ষত (আর্স, সিকেল, ক্রর A.)

হাইয়স—বদন মুখ লাল ও উত্তপ্ত, চক্ষু উজ্জল লাল এবং এক দৃষ্টি, অনিদ্রা, প্রচণ্ড প্রলাপ, শয্যা হাতড়ান, পলাইবার ইচ্ছা, নিকটস্থকে জড়িয়া ধরা, অসাড়ে শৌচ প্রস্রাব।

Typh.—এককালে হতচেতন (*Bell. Op.*), বিড়বিড় করা ও শয্যা খুঁটা, (ওগি), বাচলামো (আপিস), ঠিক জবাব দেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুনঃ প্রলাপ (আর্স, বেল), অথবা ঘুমন্ত নিয়ত বিড়বিড়, নিয়ত প্রলাপ সহ অতিশয় অস্থিরতা,

শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠা—যেন অযথা স্থানে রহিয়াছে এমন বোধ, দৌড়ানর চেষ্টা (বেল, ব্রাই), বিবস্ত্র থাকিবার ইচ্ছা, বদন আরক্তিম, জড় শ্বাস (Baft.), চক্ষু লাল, চক্চকে ও এক দৃষ্টি চাহনি (বেল). পুত্তলি বিস্তৃত (বেল), পদার্থ সকল অগ্নির শ্বাস লাল বা খুব বড় বোধ (Platt.opp.), বধিরতা, গলা সঙ্কোচিত ও গিলিতে অশক্ত (Belt. sloam.), জিহ্বা পরিষ্কার, শুষ্ক, কাটা; অধিক তৃষ্ণা, হিকা, নিশ্বাস দুর্গন্ধ, রাত্রে অনিচ্ছাধীন শোচ (আস', রস), প্রস্রাব আটকানো, অনিচ্ছাধীন প্রস্রাব এবং কাপড়ে লাল লাল দাগ পড়া (Lyc.), দাঁত কিড়মিড়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপা, বুক ও পেটে গোলাপি ফটকা ফটকা দাগ।

রস-ডেনা—অনেক সময় আকনের পর, গলার বীচি, বিশেষ বামদিকের ও বগলের বীচি আওরণ, গাত্রে ঘোরাল লাল বর্ণের স্ফটিক, বিশেষ গাঁইট, কজা ও কঁহুয়ের টানা, ছেঁড়া ও শুড় শুড়ুনি; স্থির থাকা বা নড়ার উপক্রমে বেদনা বৃদ্ধি, কিন্তু ক্রমাগত নড়িলে ও উত্তাপে সমতা, অধঃ মুড়ার পক্ষাবর্ত।

• সল্ফর—তাপ, বিশেষ সন্ধ্যায়; মুখ মণ্ডল ক্ষণিক লাল, ক্ষণিক পাক্কাশ; ত্বক্ শুষ্ক; নিশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর; বুক ধড়ফড়ানি; রাত্রে ঘর্ষ, অবসন্নতা ও দুর্বলতা, বিশেষ অধঃ অঙ্গের; পেট ব্যথা ও দমদমে ফুলা, শুষ্ক ও শক্ত বা পাতলা হড়হড়ে বাহ্যে অথবা অস্থি ও বধে প্রতিকার হইলে রোগ নিঃশেষ নিমিত্ত প্রত্যহ এক বা দুই কার করিয়া দিবা।

Typh.—উদ্বিগ্নতা, বিশেষ সন্ধ্যায় ও রাত্রে ঘুগাইতে না পারা (উদ্বিগ্নতা জন্ম রাত্রে ঘুম না হওয়া), স্মরণ শক্তির হ্রাস, বিশেষ নামস্মরণে না পড়া, তাপ, কপালে পূর্ণতা ও চাপ, ভাল শুনিতে না পাওয়া, কথা কহায় বৃকের দুর্বলতা, (Phos. Slan.), শ্বাস কষ্ট এবং রাত্রে উৎকাশি, বা বায়সবৎ ক্ষুধা, বিশেষ সকালে ১১টায়, পেট স্পর্শে বিলক্ষণ ক্রেশ অল্পভব (বেল), শেষ রাত্রে বা ভোরে ভেদ, কদর্যা ঘোলাটে প্রস্রাব।

সল্ফ-আ—চটা, ভাল শুনিতে না পাওয়া (Calc.sul.), বদন ফেঁকাশে, জিহ্বা শুষ্ক, লাল বা পাটকিলে; মুখে ঘা, গলার বীচি আওরণ, প্রচণ্ড হিকা, ক্রমাগত কাল রক্ত পাত, নীল নীল দাগ (কার্বো, নয়), শ্বাস দুর্বলতা, অতিশয় দুর্বলতা ও নেতান।

সিনা—কুঁমি রোগের উপসর্গ থাকিলে—নাক জালা, নাক ও ঠোঁঠ খোঁটা,

ঘুমন্ত চক্ষু কান ও চীৎকার, পুত্তলি বিস্তৃত, টেরা চাহনি (আড়দৃষ্টি), পৈত্তিকের ভেদ বা থস্‌থস্‌ মল, কুমি ত্যাগ ও জ্বর। অত্যন্ত আবদার, কোন দ্রব্য পাইলে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া, বদন আরক্তিম ও পান্সাশ বর্ণ।

স্কুইল—জ্বরের সঙ্গে বৃকে হল ফুটুনির স্থায় বেদনা এবং আকন ও ব্রাই সেবনে প্রতিকার না হইলে ইহা দেওয়া বিধি।

জিঙ্ক—স্মরণ শক্তির দুর্বলতা, অচেতত্ত্ব, মস্তিষ্ক শক্তিহীন, প্রলাপ ও শয্যা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা (হাইয়স), ঘুমন্ত সমস্ত শরীরে চিড়িক্‌মারা, মাথাধরা, শয্যায় পাছতলার দিকে গড়ান (Mur. A.), অনিচ্ছাধীন শৌচ ক্রিয়া, অঙ্গে ক্ষত—অনেক দিন শয়ন করিয়া থাকার জন্ত।

টার্ট-এ (B.)—জ্বরের সঙ্গে সবল কাশি, অধিক শ্লেষ্মা উঠা, নিশ্বাস কষ্ট ও সর্দির লক্ষণ থাকিলে। অত্যন্ত গা বমি বমি, প্রচণ্ড বমন, জ্বিতে শাদা ছাতা, কোষ্ঠবদ্ধতা।

(Ty.)—ঘুম নিবারণ অসাধ্যপ্রায়; সর্ব শরীর কাঁপা, বসা ও পান্সাশ; জ্বিতে শাদা লেপ, লাল লাল দাগ ও মাঝাড় শুষ্ক; একলাগাড়ে গা বমি বমি, প্রচণ্ড ও কষ্টকর প্রস্রাবের বেগ, কিন্তু অত্যন্ত ত্যাগ, বা রক্তমিশ্রিত মূত্র; বৃকে অত্যন্ত শ্লেষ্মা, ঘড়ঘড়ানি (ইপি), ফুস্‌ফুসের মৌতের আশঙ্কা; দম আটকান কাশি, ভোমাকারী মাথাধরা এবং কপাল ও নাকের গোড়ায় চাপুনি।

টেরিবিহ—ভোমামারা তন্ত্রা, নেতান, “জ্বিত শুষ্ক চক্‌চকে, পেট কাঁপা, দুর্গন্ধ মল, (কঠিন ও অল্প); প্রস্রাব অত্যন্ত কখন বা রক্ত প্রস্রাব, নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ অপ্রাপ্যপ্রায়।

ডিজিট—প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে গা বমি বমি, মুখে তিক্ত তার, বমন, ভেদ, অতিশয় দুর্বলতা, জ্বর সহ অতিশয় ছেপ উঠা, নাক হইতে কদর্য গন্ধ, ভাল শুনিতে না পাওয়া।

নক্স-ম—চক্ষুকাইয়া উঠা, স্মরণ শক্তি যাওয়া, (Anul. phat.) কষ্টে ব্রা, (Am. C.), অতিশয় ঝিম, মুখ জ্বিত ও ঠোঁঠ শুষ্ক, তার লোস্তা, পেট খুব ডাকা (Aloes), শূল, গরমজলের সেক সমতা, ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া জর্দা কদর্য বলকীণকারী ভেদ, নাড়ী ক্ষুদ্র ও অদ্রুত (slow), অবসাদ ও অস্থিরতা।

অর সহ পচা গন্ধের বা হ্রস্বলকারী ভেদ, আহ্বারের পরই পেট দমদমে ফুলিয়া উঠা।

নক্স-ভা—জিব শুষ্ক ও অপরিষ্কার, বিশেষতঃ গোড়ার দিকে, অথবা আগা ও ধার ডগডগে লাল, গলা জ্বালা ও অতিরিক্ত তৃষ্ণা, তিক্ত তার, উদগার, গা বমি বমি বিশেষ ঘরের বাহির হইলে, আহ্বারে বিদেহ, অক্ষুধা, পেট ফুলা, ব্যথা, নাইকুণ্ড প্রদেশে খুঁচুনি ও হড় হড় করা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কাঠিঘ, পুনঃ পুনঃ শোচ ইচ্ছা অথবা বেগের পর অল্প জলবৎ আম মিশ্রিত এবং কখন বা রক্ত মিশ্রিত ভেদ, গা হাত ব্যথা, ক্রোধান্বিত, খেঁক্‌খেঁকে ; ও বিমর্ষ প্রাতে বা কখন কখন রাত্রে জ্বরের প্রকোপ ; অথবা অত্যন্ত গাত্রতাপ, নাড়ী কঠিন ও দ্রুত ; দৌর্যল্য ও বুক ধড়ফড়ানি ও মৃত্যুভয়, অনিদ্রা বা অবোর নিদ্রা, মাথা ঘোরা ও ব্যথা, বিশেষ ঘাড় নত করিলে । নিস্তেজ লাল চক্ষু ।

Simple R.—রোগের প্রথম, রক্তাধিক্য-ধাতু, অতিশয় চটা, একা থাকিতে ইচ্ছা, ( পুরুষদের অধিক খাটে ) ; জিভ শুষ্ক বা লেপযুক্ত, তৎসহ কিনারা লাল ।

শয়নে খেয়াল দেখা, নড়ায় শীত, মুখ ও জিভের আগা শুষ্ক, আহ্বারান্তে পেট ক্ষীণ (চিনা, লাইক), চর্কি বিশিষ্ট খাদ্যে প্রয়াস, আহ্বারে ঘৃণা (Op.)—কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভেদের পর পেটে খাল লাগা, বসিতে বা শয়নে ইচ্ছা ; শীর্ণ মেটে পাপুর্বা । অধঃ অঙ্গ অসাড় ও নির্জীব, শরীর ভার (Sep.) ; একহার পক্ষে ।

\*নেট্রম—Perni., অতিশয় শীর্ণ, জীর্ণ, অতিশয় নেতান, হৃক শুষ্ক ও ফিকে জর্দা জলবৎ প্রস্রাব, খেদাঘিষ্ট, বিমর্ষ ।

নাইট্টি-আ—Typh.—অল্পে চটা, মৃত্যু ভয় (আস), ব্যথা হঠাৎ ধরা ও হঠাৎ যাওয়া (বেল), ফেঁকশে, জর্দা মুখ ; মুখ হইতে পচা গন্ধ (mera.) চক খড়ি, চূর্ণ মাটিতে ইচ্ছা, জিবে শাদা লেপ, মুখে ক্ষত, গলায় শ্লেষ্মা, পেট ফুলা ও অত্যন্ত সাড়াধিক্য, অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব, মল সবুজ হড়হড়ে দুর্গন্ধ, ঘড়ঘড়ে কাশি সহ রক্তমাথা পুষের ন্যায় গয়ায় উঠা, নাড়ী অসম, প্রতি চতুর্থ স্পন্দন লুপ্ত, শীর্ণতা, বিশেষ হাত ও পায় চুল উঠে যাওয়া, বিশেষ যথায় অধিক পারা ব্যবহার হইয়াছে ।

পলস—জিভে শাদা ছাতা, জলো বা তিক্ত ভ্রূর, উদগার, জল উঠা, গা বমি বমি, নানা বর্ণের শ্লেষ্মা বা অজীর্ণ আহ্বার বমন, খাইতে অনিচ্ছা, টকে



স্পৃহা, মাই টানিতে না চাওয়া, মাথা ব্যথা, পেট কামড়ান ও ফাঁপা; হৃৎক, শাদাটে পাঁচ রঙ্গা বা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া ভেদ অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা, পুনঃ পুনঃ শীত, পিপাসা অভাব বা অতিরিক্ত, ঘোলাটে লাল্চে প্রস্রাব, বিমর্ষ, খেদাশ্রিত, ইহার সঙ্গে প্রলাপ থাকিলেও ব্যবহার্য্য।

Simple R.—বিশেষ বর্ষা ও শিশুর পক্ষে। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, মৎস্ত মাংসে বিশেষ দ্বেষ, তিক্ত তার, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, জিভে, শাদা লেপ, চাপিলে পাকাশয় ও বন্ধুতে বাজা, রাত্রে ভেদ—জলবৎ বা পিত্তের স্থায় সবুজ। স্নহ কালে অতিরিক্ত ক্ষুধা।

পড়—Simple R.—প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, তৎসহ অতিরিক্ত তৃষ্ণা, কখন কখন শিরঃপীড়া ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হওয়া, পৈত্তিকের ভেদ, যকৃৎ প্রদেশে পূর্ণতা বোধ সহ মোচড়ান, দেহ জর্দাটে বর্ণ।

ফস B.—বহু দিনের জ্বর, সর্বদা অস্থির বা বিমন, কিছুই ভাল না লাগা, পরমাত্মীয়কেও না চিনা, জিজ্ঞাসিলে প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দেওয়া বা উহা বুঝা যায় না। জিভ শুষ্ক বা চট্চটে, রাত্রে অস্থিরতা, আকাশ বা শয্যা হাতড়ান, উপশ্বাসনালী বা ফুসফুস প্রদাহ, উদরাময় (বহু দিনের পীড়ায় বলক্ষয়কারী); প্রস্রাব হ্রদের স্থায় বা ঘোলাটে এবং ধরিলে শাদা খাঁকরি পড়া (ফস-আ)।

ফস (Typh.) নিয়ত ঘুম ঘুম, বিড় বিড় প্রলাপ (Arn. Buft. Rhus) বৃথা নিদ্রার চেষ্টা, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগে অক্ষম, শয্যা হাতড়ান (Arn. Nryos) পুতলি সংকোচিত (Op.) জিভ শুষ্ক ফাটা, নাড়িতে না পারা, দাঁতে ছাতা (Ars. verat.) তৃষ্ণা, পাকাশয়ের জালা (আর্স) জাবর কাটা, পানে পেট ডাকা, পেট হ্রস্ব ও খালি বোধ (Sep.) রোগের ১ম ও ২য় সপ্তাহ জলবৎ পৈত্তিকের হড়হড়ে বমন সহ অধিক কষ্ট, ঠাণ্ডা পানে কঠক সমতা, পেট ফুলা, ডাকা ও কষ্টকর ভেদ (চিন) জলবৎ সজ্ঞাতে সাগুর স্থায় রক্তবিশিষ্ট ভেদ, আহারের পর বৃদ্ধি, (Typh-Pneu.—See Pneu.) উৎকাশি, বুকে খুব ভার, শ্বাসকষ্ট, কষ্টে রক্ত মাথা গয়র, সন্ধ্যা হইতে হ্রপর রাত্রি কালীন বৃদ্ধি (কার্কো) ও কথা কহা কালীন (পলস) নাকদে অধিক রক্ত পড়া—শীর্ণ ও অতি হ্রস্বল। মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ, কাণের ভিতর দপ্‌দপ্‌ (calc.) ও সাঁই সাঁই শব্দ, বিশেষ নরের স্বর ভাল শুনিতে না পাওয়া, অধঃ অঙ্গ ভার, কালশীরা পড়া।



দাঁতে ময়লা ; অতিশয় তৃষ্ণা, বিশেষ ঠাণ্ডা হুঙ্কে ; গা বমি বমি, অধিক পাতলা জর্দা ভেদ, রাত্রে বৃদ্ধি ; ঘুমন্ত অনিচ্ছাধীন ও দুর্গন্ধ ধক্ধকে উৎকাশি—সন্ধ্যা ও হুপের রাত্রে পূর্বে বৃদ্ধি (প্রথম রাত্রে) ; অতিরিক্ত কাশি, রক্তমাখা গয়ার উঠা, কোঁক টাটান, সর্ব শরীর কামড়ান ও তজ্জন্ত সর্বদা পাশফেরা।

T.—আত্মহত্যার ইচ্ছা, (Nux. Sep.), কপাল পূর্ণ ও ভারি, চক্ষু খোলায় ও নড়ায় বৃদ্ধি, Erysepelas সহ অতিশয় জ্বালা, বীচি ফুলা।

লারো—হৃৎপিণ্ডের অসম স্পন্দন সহ নাড়ী মূহ (Digit.), মুড়ায় (Clonic) আক্ষেপ (Canth.), জীবনি-শক্তির হীনতা।

লাইকপ—গওদেশ অতিরিক্ত লাল, জিভ লাল ও শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার অভাব, কোষ্ঠ বদ্ধ, নিদ্রাভঙ্গের পর চীৎকার, একরোখা স্বভাব।

Typh.—দমিয়া পড়া, নেট্রম্, পল্‌স্, একা থাকিতে বড় ভয়, অযথা শব্দ প্রয়োগ (Arn., Anac.), অস্থির নিদ্রা, বদন মেটে, (প্রথম সপ্তাহ পরে হঠাৎ বদন পাক্সাশ বা জর্দা হওয়া কুলক্ষণ) ; মুখে পচা গন্ধ, জিভে শাদা লেপ বা উহা লাল ও শুষ্ক ও উহার উপরে ফুসকুড়ি ; অধঃচোয়াল বুল্লা (ওপি, গ্রন্থ-আ, লাকাসি), নাসিকার পাতা বিস্তারিত ও চোপসান ; বিশেষ মিষ্ট খাইতে ইচ্ছা, অন্ন খাদ্যে পেট ভরা ও পেট ফাঁপা, অন্ন ক্ষীত হওয়া ও বাম কোঁক ডাকা, বাহ্যের পূর্বে মলাশয়ে শীত শীত। প্রস্রাবের তলানিতে লাল বালির দাগ, ক্ষুদ্র শ্বাস, কাশি, অন্ন ধূসর লোস্তা গয়ার, হাত ও পায়ের পাতা শীতল, এক পাতা ঠাণ্ডা অপর পাতা গরম ; চুল উঠে যাওয়া (Graph. Nux., Ph.), চুল শীঘ্র শীঘ্র পাক ধরা, দুর্বলতা, শীর্ণতা।

T.—শয়নে ব্রহ্মতালুতে চাপ, মাথায় পেছন হেঁড়া ; কাণ মধ্যে সৌ সৌ, গুণ গুণ শব্দ (চিন), মিষ্টিতে প্রয়াস, মল অত্যন্ত ও যেন ঝেড়ে হইল না, আঙুড়ি চুল পাকা। (Chr. Mal. J.) যকৃত চাপায় লাগা, অত্যন্ত আহায়ে পেট ভরা, পেট অতিশয় বায়ু জন্ত ক্ষীত।

লাকাসি—বেল বা মার্কের পর ব্যবহার্য। অথবা পেটের একটা নির্দিষ্ট স্থান টাটামি ও তৎ স্থান স্পর্শ করিলে অসহ্যকর কষ্ট, মল ফাঁকশে ও রাত্রে জরের বৃদ্ধি অবস্থায় ইহা সর্ব প্রথম দেওয়া বিধি। অথবা দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রা ও দাঁত

কিউমিডি বা কখন অনিদ্রা কখন অঘোর থাকা, নাড়ী কম্পাষিত, কণ-বিলুপ্ত বা প্রায় হৃৎপ্রাণ অবস্থায় প্রযোজ্য ।

লাকাসি (T.)—কপাল ব্যথা সহ গা বমি বমি ও শীত (পল্‌স), জিভ বাহির করিতে গেলে কাঁপা (বেল, জেল্‌স), জিভ ঠোঁঠ শুষ্ক, ফাটা ও রক্তপড়া, বুকজ্বালা (আর্স), অসম হৃৎস্পন্দন (Dig. carb.) ও চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ও বেগুণে দাগ ।

Typh.—অত্যন্ত বলক্ষয়, ঘুম ঘুম কিন্তু হয় না । নিদ্রা ভঙ্গের পর উপসর্গ বৃদ্ধি । অচেতন (Stupor) ও বিড় বিড় (Apis), বাচলামি, এটা থেকে ওটা নানা বিষয়ে বকা, (ঘন ঘন বদলান), মরিয়াছেন বোধ, বদন বসা, অধঃচোয়াল পতন (Lyc. Op.) ; জিভ শুষ্ক, লাল বা কাল, ফাটা ও উহা হইতে রক্ত পড়া (আর্স), ক্ষুধা (কচি) পরিবর্তনীয় । কঁকড়া গুলি (Oyster) খাইবার ইচ্ছা (Lyc.) । ভেদে রক্ত থাকা, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, টেনে গয়ার তুলা, উপর উপর ঘা (নক্স, নাইট্র-আ), কালবর্ণের চুল উঠা (মার্ক, নাইট্র-আ, ফস), বসন্ত রোগ ।

কাক্স-কা—মাংস লোল, চক্ষু নিরস, তাপ বা ঝাঝে মাঝে তাপ, পরে সন্ধায় কমা, কথা কহিতে ক্লেশ, অকচি, অক্ষুধা ও অজীর্ণতা, অথবা রাক্সসবৎ ক্ষুধা, প্রাতে ঘর্ম্ম, পেট শক্ত হওয়া ও ঠোস মারা—পাকাশয় মধ্যে যেন কিছু ঠেলে উঠিতেছে বোধ হওয়া । কফাংশ-ধাতু-বিশিষ্ট ও দীর্ঘকালে ব্রহ্মরন্ধ্র যোড়া লাগা ও মাথায় অধিক ঘাম, একপ শিশুর বিশেষ ফলদায়ী ।

(Typhoid)—উদ্বেগ, হৃৎকম্প (caet, spig), মাথা ঘোরা, কপাল ভার, ভাল শুনিতে না পাওয়া, নাক দে রক্তপড়া বিশেষ প্রাতে (ব্রাই), জিভে শাদা লেপ (Merc.), অনিদ্রা, পেট শক্ত ও ক্ষীত, শ্বাস গ্রহণে বৃকে ব্যথা অনুভব, খক খকে কাশি, অতিরিক্ত ভেদ, অক্ষুধা বা বায়সবৎ ক্ষুধা । প্রাতে ও অল্প শ্রমে অধিক ঘাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শান্ত, মোটাসোটা শিশুর ।

গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তের পুরাতন জ্বর—গাঁইট ফুলা (বীচি আওরাণ), গ্ৰীহা বড়, বেড়াতে অশক্ত, অধিক ঘাম, অল্প শ্রমে হৃৎকম্প, শাদা অজীর্ণের মল, থেকে থেকে কখন উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা ।

কুইনাইন-জ্বরের প্রথম বা শেষাংশে, যখন Remission স্পষ্ট লক্ষিত এবং

স্বল্প বিরাম কালীন দিবা । নাতী প্রকোপে পূর্ণ (Compressible) ও কম তেজ কালীন পরিবর্তনীয় (Fluctuating) হয়তো দুর্বল ও হৃৎবৎ ; মাথার উচ্চভাগে (Vertex) থালি থালি বোধ (হাক্কা), অথবা মস্তকের পশ্চা-  
ত্বে গুড় গুড়নি (Rumbling) শব্দ ।

চিনি—প্রদাহিক জরে বদন মণ্ডল আরক্ত, মুখ ও ওষ্ঠ কাটকাটা শুষ্ক, প্রলাপ, গাভ্রাবরণ খুলিলেই শীত, গা হাত ব্যথা ও দুর্বলতা, একদিন অন্তর বোগ বৃদ্ধিতে বিশেষ উপকাৰী । জ্বরের সঙ্গ উদবাস্য থাকিলে ইপি, চিনি ও পলস প্রথম প্রথম ব্যবহার্য্য । ইপি ও পাস (এবনে গা বমি বমি ও বমন, কেবল মূত্র ভেদ পক্ষে চিনি) ।

সজ্জরিভাব—(অন্তবে অস্থ, যেন শীঘ্র বোগাক্রান্ত হইবে) পুনঃ পুনঃ নাক দিয়া বক্ত পড়া, বিশেষ প্রাতে, চেহারা পান্ডাশ ও মেটে বর্ণ (আস), অজপ্রত্যক্ষ আভাতাঙ্গ ও সর্ষদাই এপাশ ওপাশ করা, যক্ণ ও দ্রীহা বৃদ্ধি, তিক্ত বা টক জ্বাব, ফাকা ঢেকুর, দুধ সহ না হওয়া (Sul), পেট কাঁপা, অকষ্ট কর অজীর্ণের ভেদ (পুড), যুমস্ত প্রচুব ঘাম বিশেষ শায়িত পাশে, অতিশয় দুর্বল, ষিকি ষিকি সাবী (Protracted) ।

মাথা কেটে পড়া, চাপায় স্বস্তি, কাণমধ্যে টিস্ টিস শব্দ ও ভাল শুনিত না পাওয়া (Ph, Rhus) ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধতা—ঠাণ্ডী লাগা দকণ, তৎসহ অজিশয় অস্থিরতা এবং নাড়ী দ্রুত, বড় ও কোমল ।

জ্বেলস—প্রথম সপ্তাহে এবং পাঁচ দিন পূর্বে অনেক সময় আবেগ্য হয় । বর্ষায় প্রথম আরোগ্য হয়, (বিশেষ শিশুদের (Remit), পুনঃ বসন্তে দেখা দেয় । দুপর ভ্রাতে বৃদ্ধি এবং সকালে কম ও অনেক সময় তৎকালে ঘাম । প্রথম জ্বড়ে পেশার দুর্বলতা, নাড়ী বড় (Large), পূর্ণ ও দ্রুত কিন্তু বড় কঠিন নহ, যক্ষ্ম লাল, কপাল বা মাথার পেছনে অতিবিক্ত ব্যথা, মাথা যেন তলুয়াব মতন ভার । জ্বিত পাতলা, ফিকে, লাল অথবা তদুপরি জর্দাটে শাদা লেপ, তিক্ত জ্বাউ ।

(Typhoid)—যেদারার, দুর্বলতা অজকাঁপা, মাথা বোবা, অপরিকার (Iris) লাল, যক্ষ্ম, মাথা ভার, অধিক প্রস্রাব হইয়া সমতা (Ph. A), মাথা, পিঠ ও অঙ্গ দুর্বল, অতিশয় জ্বাউ, মাথা খাঁজলান (জেল), মাথার পেছন হইতে মাঝাকৃ দিয়া

কশাল ও চক্ষুগোলক অবধি ব্যথা (aching), চক্ষু পাতায় জল সঞ্চার ও শিচুটি (Crust), জিত কাঁপা, খুব পুরুবোধ, কথা কহিতে অশক্ত; শীত, হাত ও পায় পাতা ঠাণ্ডা। (Typhus) মাথা যেম কিতে দিবা ব্যথা, আলোকে ঘৃণা ও পুতলি বিস্তৃত।

মাঝারি গোছের জ্বর, গা বমি বমি, কশাল ব্যথা, খুব ঘাম, কিন্তু তাপ কমে না, বিশেষ পুষ্টি উদ্ভাবিত জবে। রাতে বৃদ্ধি, ঘাম না হইয়া ভোরে তাপ কমা। বিশেষ লক্ষণ নাড়ী অধিক দ্রুত নহে, পূর্ণ ও কোমল; জ্বিতে আক্ৰান্তা সহ কাঁটা (Itch) ও লেপ, অবসাদ; বদনের বেগুণে বর্ণ। মাথা, পীঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অতীব বেদনা, মাথা বেন বড় ও পূর্ণ বোধ। কোটিক জব, বিশেষ হামে এবং অল্প বিবাম আকাবে প্রকাশ, এমন জরে।

ডেঙ্গু (Dengue) বৃদ্ধির অবস্থার (In Splenic Type) অতিবিক্ত মেতান, অবসন্নতা, কিমন, চক্ষুভাব ও হামের ছায় গুটি; মাথা ঘোবা ও দেখিতে থা পাওয়া, বা পেশির ব্যথা ও বাতের উপসর্গ, জিত শাদাটে বা জন্দিটে ও মুখে চটচটে আটা।

জ্বর হইলে সচরাচর আকন; অত্যন্ত শিবঃপীড়া থাকিলে আকন ও বেল; একদিনে সমতা না বুঝিলে শুদ্ধ ব্রাই বা ব্রাই ও রস; উদবেব পীড়া জন্ত বোগে সর্বপ্রথম ইপিকা, পলস, চাইনা, নল্ল, কামো; বিকার, প্রলাপ ও সুদ্রি-পাতাবস্থায় সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ওষধ। নাড়ী অতিশয় কুণ্ঠ বা অপ্রাপ্য অবস্থায় আর্স, ভেরাট, কার্বো। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত ও প্রথমে যত্ন কবা হয় নাই, এমনত সকলের পীড়া বহুদিনের হইয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিলে কাক্স, সলফর, সিলিসা, সিনা, বারাইট, আর্স, রস, ফস, লাকেসিস বিধি।

পথ্য। অরুচালে, কিছুমাত্র ক্ষুধা থাকে না, বরং আহারে বিদ্রোহ দেখা যায়। তৎকালে কঠিন কোন খাদ্য দেওয়া অবিধি। শিপাসা অধিক থাকে, অল্প অল্প পরিমাণে পরিহার জল পান করিতে দিবা। শুষ্কপারী অধিক হুজ না ধায়, এ জন্ত প্রস্তুতির পক্ষে এক বক্সা নিরামিশ আহার পরামর্শ। শিশুকে হুই একবার জল দেওয়া ত্রিভু আরোরট বা সাণ্ড লিঙ্গ করিয়া ছাঁকিয়া দেওয়া যাইতে পারে; অধিক বয়সকে তদতিরিক্ত খই মিহরি। কিন্তু উত্তরায়ণ থাকিলে খইয়ের মত, আরোরট, লাণ্ড। কোটিবজ্জার নারিকেলের জলে

বাহ্যে হয়। দাড়ি, ইক্ষু এবং পেটের ব্যামহ না থাকিলে আকন সেবন কাল ভিন্ন দুই এক কোষা কমলালেবু বা অন্ন অন্ন মাত্রা পাতিলেবুর পান্য খাইতে দিতে পারা যায়। ৫।৬ দিবস কাটফাটা গাত্র তাপ, এবং কোন ঔষধে না কমিলে, রোগীকে বাতাস কিছুমাত্র না লাগে এমন স্থানে বসাইয়া উষ্ণোদকে পরিষ্কার নেকড়া ভিজাইয়া গাত্র মাত্র মার্জনা করিয়া, মুছাইয়া, সর্বাঙ্গ আবরণ করিলে কখন কখন বিশেষ ফল লাভ হয়। উপকার ও আবশ্যকতা বুঝিলে পুনরায় ঐরূপ করিবা। দিবাভাগে ২।৩ বার এইরূপ গাত্রমার্জনা করা যাইতে পারে। জ্বরে এরূপ জল ব্যবহার যে কিরূপ উপকারী, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু অধিকক্ষণ গাত্র জল বসানো বা তৎকালে বাতাস লাগানো সর্বতোভাবে অপরাধ। অত্যন্ত শিরশীড়া থাকিলে মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটি অনেকে লাগান, কিন্তু গরম জলে গাত্র স্নেহ করার কথা শুনিলে তাঁহারাই আবার কাণে হাত দেন। জ্বরের সঙ্গে পেট ব্যথা থাকিলে সেক বা গরম জল বোতলে পুরিয়া পেটে বুলাইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। রোগ পুরাতন হইলে অনায়াস-জীর্ণ, লঘু ও সবলকারী আহার এবং স্থান পরিবর্তন করা বিধি। নবজ্বরে গা নাড়া দেওয়া অকর্তব্য। গাড়ি, পাকি বা রেল যোগায় বিলক্ষণ অপকার সম্ভব। কিন্তু নোকায় গমনে বরং উপকার হয়। স্থির ও প্রফুল্ল রাখিতে সদত যত্নবান হইবা।

### সবিরাম বা পালা জ্বর।

জ্বর ভোগ হইয়া বিরাম, পুনরায় পূর্বমত উপসর্গ, এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকিলে তাহাকে সবিরাম বা পালাজ্বর কহে। ২৪ ঘণ্টা অন্তর হইলে আর্হিক, ৪৮ ঘণ্টা অন্তর দ্ব্যহিক, ৭২ ঘণ্টায় ত্র্যহিক পালা জ্বর বলে। জ্বরের প্রথম শীত, পরে গাত্র তাপ, এবং সর্ব শেষে ধাম হয়। রোগ আক্রমণের পূর্বাঙ্কে দুর্বলতা, অসুখ, গা হাত ব্যথা, এবং কখন কখন গা শিঁড় শিঁড় করা, অক্ষুণ্ণ, মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা, হাইতোলা ও আড়ামোড়া ভাঙ্গা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। শীতের অবস্থায় হাত পায়ে অগ্রভাগ ঠাণ্ডা ও কখন চূপসান, গীঠের দাঁড়া, বুক ও পেটের ভিতর শীত হইয়া সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কম্প, দাঁত

ঠক্কানি ; নিশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর, ও অসম্পূর্ণ ; হৃৎপ্রদেশে চাপবোধ, চক্ষু বর্ষা ও জ্যোতিঃহীন, মুখ ও ওষ্ঠ পান্নাশ বা নীলবর্ণ, হাত পা ভিন্ন স্বকের স্বাভাবিক তাপ, নাড়ী মৃদু বা বেগবতী বা ক্ষুদ্র বা ক্ষণবিলুপ্ত। ১০ মিনিট হইতে ৪।৫ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল। কখন কখন অত্যন্ত মাত্র শীত হয় এবং কচিং বা তাপের পূর্বে গা হাত ব্যথা বা রোগী অচেতন হয়। শীত অবসানে ত্বক্ খস্খসে ও গরম, বদনমণ্ডল সরস, মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, মাথা ব্যথা, নিশ্বাস ঘন ঘন ও কষ্টকর, আইচাই, গাত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেদনা, মানসিক শক্তির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ী মোটা ও বেগবতী। এই অবস্থা ৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা অবস্থিতি করে। তাপের অবসানে কপালে ও হস্ত পদের অঙ্গুলিতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, পরে অধিক ঘর্ম হইয়া গা জুড়ায়। ধাতু বা রোগ বিশেষে শীত, তাপ, ঘর্ম ইহার এক বা অস্তের নানাতিরেক দেখা যায় এবং কখন কখন বা একের এককালে অসম্ভাব হয়। শিশুর কখন কখন শীত না হইয়া তৎকালে ঋণাত্মক দুর্বলতা (মালিগ্র) হইয়া দড়কা হয়—তাপের অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ও ও তেজের এবং ঘামের অবস্থা তত পরিষ্কার নহে। বিরাম কালেও উপসর্গ থাকে, এমন কি কখন কখন একজরী রূপ হয়। শৈশবকালে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় সহ প্রেলাপ, তন্দ্রা ও দড়কা সর্বদা দেখা যায়। হয়ত খুব জ্বর, ঘাম নাম মাত্র বা অভাব ও অত্যন্ত প্রস্রাব অথবা বড়দের শ্রায় পাকাশয়ের উত্তেজনা। শীতে ও কখন বিরামে গা বমি বমি ও বমন্ত, বদ হজম, জিভে লেপ, অক্ষুধা, ঐ সন্ধে প্রীহা ফুলা, ব্যথা এবং যকৃৎ প্রভৃতি অগ্র অগ্র যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট রোগ হয়।

সর্বপ্রকার অনিয়ম, ঋতু-পরিবর্তনকালীন তাপের ন্যূনাতিরিক্ততা এবং বর্ষা অবসানে ভূগাদি পচিয়া এক প্রকার পুতি উদ্ভব হইয়া এই রোগ দেখা দেয়। যদিও উপসর্গ সফল অনেক সময় ভয়াবহ হয়, কিন্তু সূচিকিংসকেয় হাতে পড়িলে রোগী প্রায় মারা পড়ে না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে আমা-দিগের দেশে যে সবিরাম জ্বর সাংক্রামিক রূপে অবস্থান করিতেছে, ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাওয়া সুদূরক। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ, ধনাঢ্য, হীন এবং জাতি, কাল অবস্থার বিভিন্নতায় কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। দেশ এককালে উজাড় হইয়া গেল। রোগ হঠাৎ সাংঘাতিক হয় না বটে, কিন্তু একবার ধরিলে আর নিষ্কৃতি নাই। পালাজ্বরের মহৌষধ কুইনাইন



টোডা হইয়া পড়িয়াছে। উপকাব দুবে থাকুক, ইহা দীর্ঘকাল অধিক মাগয় ব্যবহার দক্ষণ শিল্পকণ অপকাব সম্ভব এবং কার্যোও তাহা ঘটতেছে। পক্ষী-গ্রামস্থ অনেক ভাদ্ৰৱা কুটীনাইনেব নাম স্থানলে ভব পান। বোগ একপ স্বভাবেব যে, কোন ঔষবে দুৰ্গীকৃত হয় কিনা সন্দেহ। সগৰিব্বারে এই বোগ-গ্রস্ত হইয়া, স্থান পরিবৰ্তন কৰিয়া এবং দীঘকাল স্থানিমে থাকরা ও হোম-প্যাথিক ঔষব সেবন কৰিয়া স্বাস্থ্য লাভ কৰিয়াছি। \* কথান বলে এক-বার-কাব রোগী আৰ বাবকাব বোজা। ভুঙভোগী হইয়া এবং অন্তঃস্থান ধাৰা কতক গুলি নিবম জানা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন কৰিয়া এ ব্যাধিব হাত এড়াইবাব আশা থাকে। শতকে দেশ ১০০ত তাড়ান প্রেস-কল্প। গাছ পাশ কাটা, জল পৰিষ্কাৰ বাখা, ইত্যাদি উপাব অবাসনেব ত কিছু মাংস ফল হহব না। খাদ্য বিল বাটাইবা ভূমি অনাদৰ্শকা ও বহুব্যয় সাধ্য এবং তাহা কৰিলেই যে উপকাব হহবে, তাহাব নিশ্চয়তা কি? এই দুঃসময়ে বাজপুকবেবা অনিশ্চিত বিষয়ে যে অধিক টাকা লাভ কৰিবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই। দেশ বন্ধাব কি গতান্তব নাই? ওলন্দাজেবা অতি নিম্ন দেশে বাস কৰে। তাহাদিগেব দেশে ইতিপূৰ্বে সাংঘাতিক পাণাজব হৈত। দেশ মৰ্যে অধিক পৰিমাণে সূৰ্য্যমুখী ফুলেব আবাদ কৰাত তথান একপ পাড়া হওয়া বন্ধ হইয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ স্ববাসিনস সেই মান্দ কহিষাছেন যে, সূৰ্য্যমুখীৰ গাছ ও ফুল এবং পাণাজব কপন এক স্থানে অবস্থান কৰে না। বৃক্ষ, বায়ুৰ সূক্ষ্ম বিষভাগ বা জলায় অংশ আকষণ বা গ্রহণ কৰায় অথবা পুষ্প হইতে অমৃত স্বরূপ কোন পদার্থ নিঃসরণ হইয়া বায়ু পৰিস্কৃত হওয়াব বা অপৰ কোন কাৰণে বোগ নিবাবণ ভব, পণ্ডিতেবা তাহা পিয়া বিচাৰ কৰুন, আমবা কল লাভ হইলোহ তৃপ্ত থাকিব। শত বপনে কিছু

\* যত মহাত্মা তমাস বেবিণী ও শ্রীযুগ বাকেন্দ্র দত্ত মহাশয়ৰ যত্নে আবাগ্য হইয়াছি। কৃতজ্ঞতার উপচৌকন স্বরূপ এই পুস্তক খানি উক্ত মহাদয়দয়কে অর্পণ করিলাম। বেবিণী নাহেব্ প্রবৃত্ত ধর্মপূরণ ও লোকের মঙ্গলাকাজী ছিলেন, এক্ষণে স্বর্গের অধিবাসী হইয়াছেন, তথায় অবস্থাই কর্ণেব ও জ্ঞানেব কল বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন।-লৌকিক যশঃ-শানে আর শ্রীশ নাই বাটে, কিন্তু উজ্জ্বলিত অস্তরের ভক্তি উপহারে নিঃসন্দেহে ভক্তি লাভ কৰিবেন।

যায় বার নাই, বরং বাটার শোভা বৃদ্ধি করিবে। এটি পরিষ্কার করিয়া দেখা একান্ত কর্তব্য। জানিতে পারিলেই, আপন ও প্রতিবাসীর মঙ্গলাকাজী অনেক মহাশয় আগামী বৎসরে ইহা বাটার চতুর্পার্শ্বে যে রোপণ করিবেন, ভবিষ্যে আমরা সন্দেহ করি না। যে স্থলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোকের রাত্রি, বিশেষ নিদ্রাবস্থায় বাতাস লাগান অপরাধ। দরজা জানালা বন্ধ রাখা উচিত; গৃহস্থ এক পার্শ্বে অগ্নি রাখিলে ভাল হয়। সহ্য হয় ত প্রাতঃ-স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার পরে আপন আপন কর্ণে প্রবৃত্ত হইবা। অতিরিক্ত আহার (বিশেষ দ্রুত, তৈলাক্ত দ্রব্য, মদ্য মাংস বা ফল, ), আগ্রহ এবং সকল প্রকার অনিয়ম পরিহার করিবা। অধিক সূর্যাতাপ, ঠাণ্ডা ও আর্দ্র বায়ু লাগাইবা না। সন্ধ্যায়, প্রাতে ও বৃষ্টি কালে গরম বস্ত্রদ্বারা গাত্রাবরণ রাখা বিধি। রোগ দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অল্প অল্প আহার এবং সন্ধ্যার পর জল ভিন্ন কোন সামগ্রী উদরস্থ করিবা না। অন্ন আশিবার অন্যান্য দুই ঘণ্টা পূর্বে বা পরে ভিন্ন আহার দেওয়া পরীক্ষা নহে।

শরীর মধ্যে এই রোগের বিষ একবার প্রবেশ করিলে, উহা স্বর্কপাত হয়। ঔষধে কিছু দিনের নিমিত্ত মাত্র বিজ্ঞর করে। কিন্তু রোগী পাল্টে পাল্টে পড়ে, দিন দিন ক্রীর্ণ ও শীর্ণ হয়, প্রীহা পেট ফুড়িয়া বাড়ে, কাহারও বা অগ্রমাসের আকার বৃদ্ধি হয়, স্বর্কশেবে গায় চুলকনা, মুখে গলার বা, আল-জিভ মাড়ি-চোয়াল খসিকা মুক্ত হয়। কাহারও বা পুনঃ পুনঃ পীড়া জন্ম বলশূন্য হওয়ার্তে একবারের জ্বরে প্রথম ২১ দিনের সামান্য পীড়ার পর রক্ত অন্তরস্থ বর্জ্য সমূহে গিয়া সংগৃহীত হইতে থাকে; অল্প সময় মধ্যে প্রীহা দ্বিগুণ হইয়া উঠে; বক্তৃৎও বিলক্ষণ বাড়ে; ফুসফুসে কথির সঞ্চয় হওয়ার নিবাস-কষ্ট এবং মস্তিষ্কে হইলে অচেতন হইয়া বিড় বিড় করিয়া বকা, মাথা এ পাশ ও পাশ করা ও পিঠের দিকে ফেলা, পুত্তলিকার বিস্তৃতি, অপ্রাকৃতিক দৃঢ় দেহা, কখন শীত, কখন কল্ম, মাত্রাতাপ অর্ভাব, ক্রমে অধিক ঠাণ্ডা বর্ষ, অন্তদাহ, গা জালা, অতিরিক্ত পিপাসা, গা বমি বমি, বমন, হিচ্কা, শরীর নীলবর্ণ, সাড়ের নৃত্যতা, ক্রমবর্ধী ভ্রম, সর্বদা ক্রীর্ণ নিশ্বাস; শুষ্কোচাপা দক্ষণ কণিক সম অন্তকাল, পরে প্রাণি প্রাণের, জ্বরশব্দই বলকর এবং অল্প কাল মধ্যে মৃত্যু। (অন্তরস্থ যন্ত্রে অধিক রক্ত সঞ্চয়বস্থার কামো, আর্স. নক্স, ওপিয়ম)।

পালাজরের চিকিৎসা অতিশয় কঠিন, উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে কুইনাইনের জ্বাৰ একদিনে জ্বর বন্ধ হয়, কিন্তু ঔষধ ও রোগের উপসর্গ মিলাইয়া দেওয়া সহজ নহে এবং তাহা না করিতে পারিলেও কিছুমাত্র ফল হয় না। সর্বপ্রথম রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবা এবং তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে তদুপযুক্ত ঔষধ বিধি ; ( একেজর দেখ )। শীত, তাপ, ঘর্ম, ইহার যে অবস্থায় যে ঔষধ বিশেষ খাটে, নিয়ে লেখা হইল।

শীত, তাপ ও ঘর্ম তুল্য রূপে থাকিলে আর্স, ইপিকা, নক্স, আকন, বেল, ব্রাই, কামো, চাইনা, পল্‌স, রস, ভেরাট, ক্যাম্প, ইগ্লেসা, গ্রাফাইটিস, সাবাডিলা।

শীত ও তাপ, কিন্তু ঘর্ম অভাব অবস্থায়, প্রথমে তাপ পরে শীত পক্ষে, নক্স, কাক্সা, ব্রাই, কাপ্‌স ; প্রথমে শীত পরে তাপ পক্ষে, আকন, ইপিকা, নেট্রম, নক্স, পল্‌স, ব্রাই, আর্গিকা, কার্কো, চাইনা, ইগ্লেসা, রস, ভেরাট, সল্‌ফর।

একবার শীত একবার তাপ, এরূপ একবারের অধিক হইলে, লাইকপ, মার্ক, নেট্রম, নক্স, বেল, কাক্সা, সিলিসা, স্পাইজিলা, ভেরাট, সল্‌ফর।

সঙ্গে তাপে, আকন, আর্স, কামো, ইপিকা, নক্স, রিয়ম, রস, ইগ্লেসা, লাইকপ, সল্‌ফর। বাহিরে তাপ অন্তরে শীত পক্ষে, আকন, আর্স, বেল, নক্স, কফি, ইগ্লেসা, কাক্সা, লাকেসিস, ফস, সেপিয়া, সল্‌ফর, সিলিসা। বাহিরে শীত ভিতরে তাপ পক্ষে, ব্রাই, মার্ক, চাইনা, পল্‌স, ফস-আসিড, রস, সাবাডিলা, আর্গিকা, ভেরাট, সল্‌ফর, স্পাইজিয়া, ষ্টাননা, মফস।

তাপ ও ঘর্ম, কিন্তু শীতের অভাব হইলে ; এককালে তাপ ও ঘর্মপক্ষে, সিনা, মার্ক, হিপর, পল্‌স, রস, ব্রাই, কামো, বেল, নক্স, ইগ্লেসা, ওপিয়ম। তাপ, পরে ঘর্ম পক্ষে, আর্স, চাইনা, ভেরাট, পল্‌স, লাইকপ, সল্‌ফর, থুস্কা।

শীত ও ঘর্ম, কিন্তু অভাব অবস্থায় ; এককালে শীত ও ঘর্ম পক্ষে, পল্‌স, লাইকপ, সল্‌ফর। শীতের পর ঘর্মে কার্কো, ভেরাট, নেট্রম, রস।

বর্ষার জ্বরে, ব্রাই, রস, নক্স, চাইনা, ভেরাট ; শীতের রোগে কার্কো, রস, পল্‌স, চাইনা, ভেরাট, সল্‌ফর, লাকেসিস, মফস। বসন্ত ও গ্রীষ্মে, আর্স, ব্রাই, কাপ্‌স, ইপিকা, সিনা, বেল, কাক্সা, হেলিবোর, নক্স, পল্‌স, সল্‌ফর, লাকেসিস।

২৪ ঘণ্টা অন্তর জ্বর হইলে, ইপিকা, পলস, নক্স, কাক্সা, আর্স, কাপ্স  
নক্স, চাইনা, ইউপেটোরিয়ম, ইপিকা, ইথেসা, নেট্রম, রস, কার্কো,  
গ্রাফাইটিস, ওপিয়ম, নাইট্রিক অসিড, সাবাডিলা, স্পাইজিলা, ফেরাট, ষ্টাফি-  
সিগ্রিয়া, ষ্ট্রানম, সল্ফর, কার্কো ।

একদিন অন্তর জরে, কাক্সা, কামো, আণ্টিমম, লাইকপ, ষ্টাফিসিগ্রিয়া,  
ড্রোসিবা, আর্স, বেল, ব্রাই, কাপ্স, কার্কো, চাইনা, সিনা, ইউপেটোরিয়ম,  
ইথেসা, ইপিকা, নক্স, নেট্রম, পলস, ভেরাট, ফেরম ।

দুই দিবস অন্তর রোগে, আর্স, আকন, লাইকপ, কার্কো, পলস, রক্স, সাবা-  
ডিলা, হাইয়স, চাইনা, সিমেক্স, ইউপেটোরিয়ম ।

• দ্ব্যোকালীন জরে, চাইনা, ষ্ট্রামনিয়ম, বেল ; গ্রাফাইটিস, ইউপেটোরিয়ম,  
পলস ।

ঐতাহ জর, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে এক প্রকার  
জর হইলে, নক্স, রস, চাইনা, আর্স ।

প্রতিবার জর পেছিয়া পড়িলে বা •বিলম্বে আসিলে, চাইনা, সিনা ।  
প্রতিবার জর আগাড়ি হইলে বা পূর্কাক্সে আসিলে, আর্স, চাইনা, নেট্রম,  
ইথেসা ।

এক পক্ষ অন্তর জরে, আর্স ।

বর্ষ অন্তর জরে, আর্স, কার্কো, লাকেসিস ।

প্রাত্যহিক জর প্রায় প্রাতে ; এক দিন অন্তর জর প্রায় মধ্যাহ্নে ; এবং  
দুই দিন অন্তর জর প্রায় বৈকালে হয় ।

## Typhoid জ্বর ।

এই রোগে Peyer's গ্রন্থি প্রদাহ এবং রোগ কঠিন হইলে অস্ত্রে মৃত ও  
ফুটা হয় । সকল প্রকার রোগে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ পায় । প্রথমতঃ, প্রথমে  
শিশুর ক্ষুধা যায়, অকচি, অক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয় ; দিবসে খেঁতখেঁতে, সন্ধ্যাকালে

ঝিমন, রাত্রে স্ননিদ্রা না হওয়া, ত্বক্ স্বাভাবিক অপেক্ষা শুষ্ক ও গরম এবং মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম, প্রায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কখন কখন ভেদ, জ্বিত শুষ্ক ও শাদা লেপ বিশিষ্ট, নাড়ী দ্রুত । প্রাতে কতক নরম, যত বেলা বাড়িতে থাকে, ততই রোগের বৃদ্ধি হয় । পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে রাত্রে অধিক বৃদ্ধি ; ত্বক্ শুষ্ক ও গরম, অর্ধ-মুদ্রিত চক্ষে ঘুম এবং পানের ইচ্ছা জন্ম পুনঃ পুনঃ ঘুম ভাঙ্গা ও কখন কখন অল্প প্রলাপ । সকালে শয্যা হইতে অভ্যস্তকর ভাবে উত্থান ; যত বেলা হয়, ক্রমশঃ তাজা বোধ ; পরে সন্ধ্যা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি । কখন কখন সকালেও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় । দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগের বিশেষ চিহ্ন গোলাপী বর্ণের দাগ দেখা দেয়, কখন বা দেখা দেয়ও না, বা অত্যন্ত মাত্র দেখা যায় । দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে বা তৃতীয় সপ্তাহের প্রথমে অল্পেই উপসর্গ কমিতে থাকে । রোগ কঠিনতর হইলে প্রথমেই মাথা ব্যথা, ঝিমন ও বমন, জ্বর প্রবলতর, ঝিমন, কখন ঘোর নিদ্রা (coma), কৃশি, মস্তিষ্কের উপসর্গ, তন্দ্রাসহ প্রলাপ বা দড়কা, আরোগ্য আরম্ভ হইয়াও অচেতন থাকে । এককালে বলক্ষয় হইয়া ২য় বা ৩য় সপ্তাহে মৃত্যু । ইহার সহিত অল্প রোগ মিশ্রিত হয়, বিশেষ ন্যায়বিক উপদাহ ২য় সপ্তাহে হইয়া থাকে ।

পথ্য—কঠিন পদার্থ নিষেধ, হালকা অনায়াসজীর্ণ সবলকারী খাদ্য, যাগাতে পেটে ভার না হয় । ঠাণ্ডা জল যাহা চায় দিবা । ঘর দ্বার বিছানা পরিষ্কার রাখিবা, বায়ু পরিচালিত ঘরে থাকিতে দিয়া স্থির রাখিবা । শৌচ প্রশ্রাবাদি কোন স্থানে রাখিয়া জ্বালাইয়া দিবা । উহার বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে ধুইয়া জল দূষিত যেন কোনমতে করা না হয় ।

অল্প অল্প জল পান করিতে দেওয়া বিধি, মুখের শুষ্কতা ও জ্বালা জন্ম মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা জলের কুলি বা মাথা ও পেটে জলপটী দিতে আশঙ্কা নাই । মধ্যে মধ্যে শরীর স্পঞ্জ করিলে রোগীর শক্তি হয় ও তাপেরও হ্রাসতা হইতে পারে । দেশস্থদের জলের প্রতি বড় ভয়, কিন্তু এখন অনেকটা কমিয়াছে । জ্বর হইলে মুণা, মরিচ, লবঙ্গ সিদ্ধ ডগডগে লাল জল ঝিঝুকে করিয়া আর খাইতে হয় না । আর কিছু হউক না হউক, ইংরাজী ডাক্তারির আধীক্ষাদে আমরা অল্পে ঠাণ্ডা জল খাইয়া জুড়াইতে ও জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছি । কোষ্ঠ-

বদ্ধতা পক্ষে গরম জলের পিচকারী এবং ভেদের অবস্থায় প্রত্যেক বার বাহ্যের পর এক ছটাক শ্বেতসারের জলের পিচকারী দিতে কহেন।

রোগের সকল অবস্থায় টাটকা দুগ্ধ অল্প অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। টাটকা মাখন-তোলা (Butter-milk) অর্থাৎ মেটেতোলা দুগ্ধও সুখাদ্য। অতিশয় দৌর্কলাবস্থায় মাংসের (অথবা মাংসের কি শিঙ্গি মাছের) ঝোল ব্যবস্থা। কঠিন পদার্থ থাইতে এককালে নিষিদ্ধ।

বায়ু পরিচালিত বড় ঘরে বাস বিহিত। নেসা (মূত্র) কোনমতেই দিবা না।

### পিপাসা।

শীতের পূর্বে পিপাসা। আণিকা, পল্স, চাইনা, ইউপাট।

শীতের অরস্থায় পিপাসা। কাম্প, কার্কো, ইপিকা, ভেরাট, আস', বেল, ব্রাই, কামো, ইগ্নেসা, ফস, রস, চাইনা।

শীত অবসানে বা তাপের পূর্ব কালীন তৃষ্ণা পক্ষে। চাইনা, সাবডিলা; পল্স, আস', থুজা, ড্রোসিরা।

তাপকালীন পিপাসা। কামো, নক্স, রস, ভেরাট, আকন, বেল, ব্রাই, কলসিস, হিপর, হাইয়স, মার্ক, নেট্রম, লাকেসিস, সল্ফর।

তাপের পরে পিপাসা। চাইনা, নক্স, কফি, ষ্টানম, ট্রিমোনিয়ম। ঘর্মের পূর্ব পিপাসা। কফি, থুজা।

ঘর্মকালীন তৃষ্ণা। আস', চাইনা, কামো, কফি, রস, মার্ক, সাবডিলা।

ঘর্মের পরে তৃষ্ণা। লাইকপ, সাইসেক্স, নক্স, সাবডিলা।

পিপাসার এককালে অভাব বা যৎসামান্য তৃষ্ণা পক্ষে পল্স, চাইনা, সাবডিলা, ইগ্নেসা, ভেরাট, ইপিকা, কার্কো, আস', রস। জরকালীন অধিক জলপান পক্ষে ব্রাই। অল্প অল্প অধিকবার পান পক্ষে আস', লাইকপ।

### ঘর্ম।

বলক্ষয়কারী ঘর্ম পক্ষে, আস', চাইনা, মার্ক, ফস, সাইসেক্স, কাক্স, ষ্টানম, সেপিয়া, গ্রাফাইটস। হৃদে ঘামে, মার্ক, গ্রাফাইটস, আস'। ঠাণ্ডা ঘর্মে, ভেরাট, আস', সিনা, কাম্প, চাইনা, মার্ক, সেপিয়া, সল্ফর, ডিজিটে-

লিস ; দুর্গন্ধ ঘর্ষে নক্স, ফস, মার্ক, নাইট্রিক অসিড, স্পাইজিলা, সিলিসা, ষ্টাকিসিগ্রা ; টক ঘর্ষে, ব্রাই, কার্কো, মার্ক, নাইট্রিক অসিড, রস, ভেরাট, আকন, অর্গিকা, সাইমেক্স, গ্রাফাটিস, হিপার, ইপিকা।

অন্ন আক্রমণ কালীন, পূর্বে ও পরে কতকগুলি বিশেষ উপসর্গ ও তাহার ঔষধ নিয়ে প্রকাশ করা গেল। রোগের সকল অবস্থায় সকল বা অধিকাংশ উপসর্গ গুলি যে ঔষধে প্রতিকার করিতে পারে, তাহা প্রয়োগে নিঃসন্দেহে কৃতকার্য্য হইতে পারিবা।

### জ্বরের পূর্বাহ্নে।

চক্ষু অলা, রস ; তিক্ততার, হিপার, ফেরম ; শীত, পল্‌স, গমি ; পা ঠাণ্ডা, কার্কো ; কালী, ইউপাট ; ভেদ, রস, পল্‌স ; ঝিমন, পল্‌স ; মুচ্ছা, আর্স ; হাইতোলা ইলাট, আর্স ; হাত পা ভার, কান্কা, সাইমেক্স ; মাথা ভার, কাল্‌কা ; মাথা ব্যথা, আর্স, ব্রাই, চাইনা, কার্কো, নেট্রম, পল্‌স, রস, ইলাট, ইউপাট, লাকেসিস ; শয়নে ইচ্ছা, আর্স ; গা বমি বমি, সিনা, পল্‌স ; চাইনা, লাইকপ ; হাড় ব্যথা, কার্কো, অর্গিকা, ইউপাট ; বুকে ব্যথা, আর্স, ইলাট ; গাঁইট ব্যথা, কান্কা, ইউপাট, পডফলম্ ; পেটে ব্যথা, আর্স, ইলাট ; বুক ধড়ফড়ানি, চাইনা ; হাত পা ছেঁড়ার ঞায় ব্যথা, আর্স, সিনা, ইউপাট ; রাক্ষস ঞায় ক্ষুধা, চাইনা, ফস ; পীঠে ব্যথা, আর্স, ইপিকা, ইউপাট, পডফলম্ ; গা আড়ামোড়া ভান্কা, আর্স, কার্কো, ইউপাট, কাল্‌কা, ইলাট ; ঘর্ম্ম, সাইমেক্স ; পিপাসা, কার্কো, ইউপাট, ইকোট, সাইমেক্স ; বমন, সিনা, পল্‌স, লাইকপ ; অক্ষুধা, পল্‌স ; অবসন্নতা ও ঝিমন, রস, সাইমেক্স ; দস্তশূলুনি, কার্কো ; মাথাঘোরা, পল্‌স, ব্রাই, আর্স।

### জ্বরের অবস্থায়।

বক্ষ গহ্বরের উপসর্গ থাকিলে (খাসকষ্ট প্রভৃতি) ব্রাই, ইপিকা, আর্স, চাইনা, লোবেলা, ডাকনি ; সংশ্রাস (মূচ্ছা ও গাঁজলাভান্কা) নক্স ; অক্ষুধা, আনটিম, চাইনা, কান্ধারিস, কোনিয়ম ; সর্ক প্রকার আহায়ে ঘেঘ, আর্স, কালী ; পৈত্তিকের উপসর্গ, আনটিম, কামো, পল্‌স, নক্স ; মূখ তিক্ত, আনটিম, আর্স, ফস, আলম, সেপিয়া ; মাড়ি দিয়া রক্ত পড়া, কার্কো, নাইট্রিক অসিড, সল্‌ফর, ফস অসিড ; চক্ষু ফুলা, ফেরম ; মস্তিষ্ক উত্তেজনার উপসর্গ বেল,

ওপিয়ম, ষ্ট্রামোনিয়ম, লাকেসিস ; জিহ্বায় ছাতা, আনটিম, নক্স, ফস ; পেট ব্যথা, আস', চাইনা, রস, ফেরম, সেপিয়া, ফস, সল্ফর ; মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চয়, আস', চাইনা, ফেরম, ফস ; কোষ্ঠবদ্ধ নক্স, বেল, ভেরাট, চাইনা, সাইমেক্স ; কাশি, ইপিকা, আস', চাইনা, ফস, কাল্কা, সল্ফর ; উৎকাশি ব্রাই ; রাত্রে কাশি, হাইয়স ; প্রলাপ, নক্স ; ভেদ, আস', চাইনা, রস, ফস, সল্ফর ; পেট ফুলা, ফেরম ; উদগার, আনটিম, নক্স, চাইনা, কার্কো ; জ্বরহুঁঠা আস', নক্স, নেট্রম ; নড়িতে মুচ্ছা, ইউপাট ; পা লটপটানি, আস', চাইনা ; গা বমি বমি, আনটিম, ইপিকা, আস', ফস, বুক ধড়ফড়ানি, রস, সেপিয়া, সল্ফর ; রাক্সবৎ ক্ষুধা, ওপিয়ম ; নিশ্বাসের খর্ব্বতা, ফেরম, ফস, সেপিয়া ; বরুৎ ব্যথা, চাইনা ; গাঁইট ব্যথা, আস', কাল্কা, কার্কো, চাইনা, ফস, সল্ফর ; পীঠ ব্যথা, আস', কাল্কা, ইউপাট, নেট্রম ; পাকশয় ব্যথা, আস', চাইনা, নক্স, সেপিয়া, সিলিসা ; শরীরে বাতের স্থায় ব্যথা, আস', লেডম, লাইকপ ; ব্যথা অসহ্যকর, আস', কফি, কামো ; আক্ষেপ, ককুলস ; অনিদ্রা, চাইনা ; নিদ্রাতুরতা, নেট্রম, রস, সেপিয়া ; পেট ও পার্শ্বে ফুটুনি, ব্রাই, নক্স ; উপর পেট ঠোসমারা, রস ; অঙ্গ চিড়িকমারা, ওপিয়ম ; দন্ত শূলুনি গ্রাফাইটিস ; বমন, আনটিম, সিনা, চাইনা, ইপিকা, আস', ইউপাট, ফেরম ; পিত্তবমন, কামো, আনটিম, নক্স, পলস ; টক বমন, লাইকপ ; অঙ্গ কাঁপুনি, আস', নেট্রম, কাল্কা, কোনিয়ম, সেপিয়া ; কষ্টে মূত্র ত্যাগ, কাঙ্ক ; ঘোলাটে প্রস্রাব, ফস ; দুর্গন্ধ প্রস্রাব, সেপিয়া ; দুর্গন্ধ ও গুরুম প্রস্রাব, সাইমেক্স ; মাথাঘোরা ব্রাই, আস', নক্স, ফস, ভেরাট, আলম ।

### জ্বরমগ্ন কালীন ।

অক্ষুধা, আস', নক্স, ইপিকা, চাইনা, পলস, কাপ্স, কার্কো, নেট্রম, সাবাডিলা ; নিশ্বাস কষ্ট, বিশেষতঃ রাত্রে, আস', নক্স, ওপিয়ম, মার্ক, ইয়েসা ; শীত, কাপ্স ; ব্রাই, নেট্রম, রস, ভেরাট, সিলিসা, সাবাডিলা ; কোষ্ঠবদ্ধ, ব্রাই, নক্স, চাইনা ওপিয়ম, ভেরাট, কার্কো, কাক্স ; ভেদ, কামো, পলস, চাইনা, আনটিমটার্ট, মার্ক, নাইট্রিক আসিড, ফসফস আসিড, রস, ইলাট ; তিক্ত উদগার, ব্রাই, পলস, কাক্স, আর্গিকা ; টক উদগার, নক্স, ফস, নেট্রম, লাইকপ সাইমেক্স, সল্ফর ; পচাগন্ধের উদগার, নক্স, পলস, চাইনা, আর্গিকা, সল্ফর



পা ফুলা, আস', ব্রাই, কাপ্প, চাইনা, নেট্রম, নক্স, পলস, রস, ফস, ভেরাট, সিলিসা, ইউপাট ; পা ঠাণ্ডা, কার্কো, কাক্স, ফস, সিলিসা, বেল, নেট্রম, সল্ফর ; হাত ফুলা, কাক্স, লাইকপ, ষ্টানম, ডিজিটালিস ; হাত ঠাণ্ডা, কার্কো, পলস, রস, বেল, নেট্রম, ফস, স্পাইজিলা, সল্ফর ; অতিরিক্ত ক্ষুধা, সিনা, চায়না, কার্কো, সাইমেক্স, ভেরাট, গ্রাফাইটিস, সল্ফর ; আহারে ঘৃণা, পলস, ফস, আসিড, বেল, আর্গিকা ; গা বমি বমি, ইপিকা, আস', নক্স, রস, সিলিসা, সাবাডিলা ; পিত্ত বমন, কামো, আস', ইপিকা, মার্ক, নক্স, পলস, ভেরাট, ফস, সল্ফর ; শ্লেষ্মা বমন কামো, চাইনা, আস', বেল, ইপিকা, নক্স, পলস, মার্ক, ভেরাট ; আহার বমন, আন্টিম, ব্রাই, ফেরম, কাক্স ও পূর্ব পূর্ব ওষধ ; অঙ্গ কম্পন, ব্রাই, চাইনা, নক্স, পলস, ওপিয়ম, রস, ইগ্লেসা, সাবাডিলা ; অধিক প্রস্রাব, আনটিমটার্ট, বেল, রস, নেট্রম, স্পাইজিলা, আলম, লাকেসিস ; অল্প প্রস্রাব, ব্রাই, কার্কো, ইপিকা, পলস, রস, ভেরাট, সল্ফর ; প্রস্রাব কষ্টে তাগ, আস', কাপ্প, কোনিয়ম, ষ্টাকিসেগ্রিয়া ; গলা ব্যথা, বেল, মার্ক, কাপ্প, নক্স, ফসফস আসিড, নাইট্রিক আসিড ; গলা ফুলা, কামো, রস ; জিহ্বা ফুলা আস', চাইনা, বেল, মার্ক, নাইট্রিক আসিড ; প্লীহা প্রদেশ ফুলা, আস', নক্স, চাইনা, ইগ্লেসা, নাইট্রিক আসিড, সল্ফর ; উপর পেট ঠোসমারা, ব্রাই, কামো, নক্স, পলস, ওপিয়ম, কার্কো, কফি, লাইকপ ; মংখা ফুলা, ক্রোটালস ; মুখে পচা ভার, বেল, মার্ক, নক্স, পলস, ফেরম ; লোস্তা তার, আস', কার্কো, চাইনা, মার্ক, নক্স ; টক তার, নেট্রম, ফস, আস', কাক্স, ইগ্লেসা, মার্ক, ফস আসিড, নক্স, পলস ; তিক্ত তার, ব্রাই, কার্কো, কামো, পলস, ফস আসিড, কাক্স ; মুখে ধাতুর তার, মার্ক, নক্স, রস ; মুখ বেতার, ব্রাই, চাইনা, নক্স, ইউপাট ; টকে প্রয়াস, আস', ব্রাই, ইপিকা, পলস, আনটিমটার্ট, আর্গিকা ; তিক্ত প্রয়াস, নেট্রম ; লবণাশু দ্রব্যে প্রয়াস, কার্কো, কাক্স ; ঝালে প্রয়াস, পলস, হিপার ; মিষ্টে প্রয়াস, কার্কো, ইপিকা, সাবাডিলা, সল্ফর ; অথাদ্যে প্রয়াস, ব্রাই ; মাঝে মাঝে মুচ্ছা, নক্স, কামো, চাইনা, পলস, কার্কো, ভেরাট ; উদরী, আস', চাইনা, হেলিবোর, রস, মার্ক, ফস, সল্ফর ; দড়কা, আস', কামো, নক্স, ওপিয়ম, ভেরাট, ইগ্লেসা, ইপিকা, রস, সিলিসা, সিনা, ষ্ট্রামনিয়ম ; হাত পা ছিঁড়েফেলার ভায় ব্যথা, কাপ্প, কার্কো, চাইনা, পলস, কাক্স, ইউপাট, লাই-

কপ ; হাত পা শক্ত হওয়া, রস, সাবাডিলা, লাইকপ, ইউপাট ; স্তন দুলা, ব্রাই, পলস, কাক্স।

## চিকিৎসা।

জ্বরের প্রথম অথবা প্রবলবস্থার মধ্যে মধ্যে আকন দেওয়া যায়। জ্বর আসিবার কিছুক্ষণ পূর্বে এক মাত্রা দিলে জ্বরের কম ভোগ হওন সম্ভব।

শিশুদিগের প্রাতে ইপিকা ও বৈকালে নক্স বা অশ্রু কোন উপযুক্ত ঔষধে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়। দশমী হইতে পূর্ণমা বা অমাবস্যা তিথি মধ্যে জ্বর হইতে থাকিলে সিলিসা, সল্ফর, কাক্স, রস ; নির্দিষ্ট এক সময় জ্বর পক্ষে সাবাডিলা বিধি। প্রাতের জ্বরে, নক্স ; ১০ ঘণ্টা বেলায় হইলে নেট্রম ; বৈকালে, আপিস, লাকেসিস, কাক্স ; নাইট্রিক আসিড ; বৈকালে চার্লিটার পর লাইকপ বিশেষ ব্যবহার্য। অধিক কুইনাইন, থাইয়া জ্বর আটকাইলে, আস', পলস, বেল, ইপিকা, ফেরম, কাক্স, সল্ফর প্রয়োগ করিবা।

আকন—কেবল জ্বর কালীন। আস', চাইনা বিরামকালীন এবং অশ্রু সকল ঔষধ জ্বর ও বিজরী উভয় অবস্থায় ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য।

পানাজ্বরের দরুণ প্লীহা রোগে, আস', নক্স, কাক্স, কাম্প, মেজেরম, সিলিসা, লাইকপ, কামো, চাইনা। ইহার দরুণ অগ্রমাস হইলে, আস', নক্স, চাইনা, মাক, কাক্স ; বস্তুতঃ যে ঔষধে জ্বর সারে, তাহাতেই উহার আনুষঙ্গিক রোগও যায়। দেশমধ্যে প্রচলিত জ্বর-প্লীহায় পিশু পক্ষে কাক্স বিশেষ উপকারী। মুখে ঘা, আলজিহ্বা থমা পক্ষে নাইট্রিক আসিড, মার্ক, বেল, প্লম্বম ; প্লীহা ও অগ্রমাস পক্ষে জলপটি বাঁধায় বিশেষ ফল লাভ হয়।

ইপিকা—অল্প শীত ও পিপাসা এবং অত্যন্ত তাপ ও তৃষ্ণার অভাব ; অথবা অত্যন্ত কাঁপুনি এবং অগ্নি তাপ লাগাইলে উহার বৃদ্ধি ; কখন কখন শীতের অবস্থায় অল্প কিন্তু তাপকালীন অতিশয় পিপাসা ; ঘর্ম প্রচুর বা এককালে অভাব ; জ্বরকালীন গা বমি বমি, বমন এবং বৃক ভার ও স্টেটে ধবা ;

জিহ্বা পরিষ্কার বা ছাতাপড়া; বিরামকালীন মুখের বদ তার, খাদ্য তিক্ত লাগা, ছেপ উঠা, অক্ষুধা, দুর্বলতা ও অবসন্নতা এবং অনিদ্রা। ইহার পর নক্স, আর্স, চাইনা, আর্গিকা খাটে।

নক্স—বৈকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে বা প্রাতের জ্বর পক্ষে, সর্ব প্রথম দুর্বল ও নিম্নীক হইয়া শীত, পরে তাপ বা অগ্রে তাপ পরে শীত, কিম্বা বাহিরে তাপ অন্তরে শীত বা অন্তরে তাপ বাহিরে ঠাণ্ডা; কখন দীর্ঘকাল শীতের দরুণ দাঁতেদাঁত ঠকঠকানি, হাত পা বরফবৎ ঠাণ্ডা, নখ নীলবর্ণ; পীঠ, কোমর, উরু, পায় ছেঁড়ার স্থায় ব্যথা, বুকে ও পেটে ফুটুনি; তাপকালীন মাথা ও কপাল ব্যথা, গায়ের কাপড় খুলিলে বা নড়িলেই শীত, পিপাসা, গা বমি বমি ও বমন, কাণ ভৌঁ ভৌঁ করা, বুকে ব্যথা, কটু প্রস্রাব এবং ইহার পর ঘর্ম বা কখন কখন উহার অভাব। জ্বরকালীন পেট ব্যথা, তিক্ত তার ও উদগার, জিহ্বা শাদা বা জর্দা লেপনুক্ত, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় জলবৎ আম,তাগ। বিরামকালীনও কপাল ও রগ কামড়ান, দগ্ধপানি, মাথা ভার ও ঘোরা, মুখে পচা তার, পেট ঠোস মারা, যকৃৎপ্রদেশ ফুঁড়ুনি, গ্লীহা প্রদেশ ফুলা, অল্পে বিরক্তি, নিরাশ হইয়া কান্না প্রভৃতি নানা উপসর্গ থাকে। তরুণ কিম্বা পুরাতন উভয় প্রকার রোগে অনেক সময় ব্যবহার্য।

আর্স—সর্ব প্রথম অবসন্নতা, গা আড়ামোড় ভাঙ্গা, হাই তোলা, শয়নে ইচ্ছা, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, পরে শীত ও তাপ, সমকালে বা একের পর অপর; কিম্বা অন্তরে শীত ও উপরে তাপ বা ইহার বিপরীত ভাব; কাটফাটা তাপ, অস্থিরতা, অতিরিক্ত পিপাসা; বিরাম কালে হিক্কা, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, গা হাত পড়িয়া যাওয়ার স্থায় ব্যথা; অথবা বৈকালে বা সন্ধ্যায় জ্বর, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাপ, পরে ঘর্ম; কিম্বা শীতাবস্থায় মুখ তিক্ত বা গা বমি বমি, এককালে বলক্ষয়, পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় জল পান, ঘর্ম এককালে অভাব বা তাপের অনেক পর ও নৈদ্রাবস্থায় হয়। জ্বর কালীন নূতন নূতন উপসর্গ হইলে ইহা বিশেষ খাটে, যথা কাণ ভৌঁ ভৌঁ, হাত পা ছেঁড়ার স্থায় ব্যথা ও সাড়শু হওয়া, মুর্ছা। জ্বর কালীন বা পরে মাথা ঘোরা, গ্লীহা বা যকৃৎ প্রদেশ ব্যথা, গা বমি বমি, পাকাশয়ে অতিরিক্ত ব্যথা, মুখে তিক্ত তার ও কমে ঘা, হাত পা অত্যন্ত ব্যথা বা অসাড়প্রায় হওয়া, শিরঃপীড়া, ফুসফুসের

আক্ষেপ এবং উদরী বা সোঁতের লক্ষণ থাকিলে । পালাজ্বর ও উহার আত্ম-  
বঙ্গিক রোগের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বাই—সকল সময় বিশেষ প্রাতে জ্বর, মাথা ঘোরা ও মাথা ফেটে পড়ার  
শ্রায় বোধ ও অঙ্গ আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া অতিশয় শীত, মুখ লাল ও পিপাসা,  
জিভ শুষ্ক ও চটচটে, আহারে ঘৃণা, গা বমি বমি ও বমন, তাপ কালীন মাথা  
ব্যথা বৃদ্ধি, উৎকাশি, হাঁপানি, বুক ফুঁড়ুনি ।

চাইনা—জ্বরের পূর্বে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, বুক ধড়ফড়ানি, গা বমি বমি, অত্যন্ত  
পিপাসা ও ক্ষুধা, মাথা ও পেটে ব্যথা ; শীতের সময় মাথা ব্যথা ও ঘোরা ও  
তথায় রক্ত সঞ্চয়, মুখমণ্ডল পাক্ষাশ বর্ণ, হাত পা ঠাণ্ডা, গা বমি বমি ও শ্লেষ্মা  
বমন ; শীত ও তাপ, মধ্যকালে পিপাসা, তাপ কালীন ওষ্ঠ ও মুখ শুষ্ক ও  
উত্তপ্ত, মুখমণ্ডল লাল ও মাথা ব্যথা, রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, স্থানে স্থানে হল ফুটুনির  
শ্রায় যন্ত্রণা, গার জ্বালা বা গাত্রাবরণ খুলিলেই শীত ; তাপের পর বা ঘর্ষ-  
কালীন পিপাসা ও তালু শুষ্ক । বিরাম কালীন দৌর্বল্য, অতৃপ্তিকর নিদ্রা ;  
স্বপ্ন হরিদ্বর্ণ, আহারান্তে ঝিমুনি, যকৃৎ ও প্লীহা প্রদেশ ফুলা ও ব্যথা । অথবা  
জ্বর অবসানে এক বা দুইবার বমন হইলে । অথবা যে জ্বরে প্রচুর ঘর্ষ হওয়াই  
প্রধান উপসর্গ, তথায় ইহা বিধি ।

কামো—পৈত্তিকের ভেদ, বমন, পেট ব্যথা, অতিরিক্ত পিপাসা ; সন্ধ্যায়  
শীত, রাত্রি অধিক তাপ ও ঘর্ষ, ঘুমন্ত চম্‌কান, জ্বর অবসানে কপালে গম্‌ম  
ঘর্ষ, আইচাই ও নৈরাশ্র পক্ষে ।

পল্‌স—বৈকাল বা সন্ধ্যায় জ্বর ; পিপাসা এককালে অভাব বা তাপকালীন  
প্রকাশ ; শীতের অবস্থায় মাথা ভার ও ঘোরা, বুক ভার বা শ্লেষ্মা বমন ;  
তাপের সময় মাথা ব্যথা, মুখ লাল ও সরস, মুখমণ্ডলে ঘর্ষ, গায়ের বস্ত্র খুলিলে  
শীত, নিশ্বাস ঘন ঘন, ভেদ হড়হড়ে, পৈত্তিকের বা টক বমন । তাপের সঙ্গে  
বা পরে ঘর্ষ । বিরাম কালে মাথা ব্যথা, বুক ভার, সরল কাশি, মুখের  
তিক্ত তার, আহার তিক্ত লাগা, উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা প্রাতে জ্বর,  
গা বমি বমি ও বমন, মাথা ব্যথা ও ঘোরা, এবং শীত, তাপ ও ঘর্ষের অবস্থায়  
অতিশয় পিপাসা । অথবা যথায় কিঞ্চিৎ অধিক আহারেই পাণ্টে জ্বর ।

সিডন—শীত, কপাল ও মাথা ব্যথা, চক্ষু লাল ও চুলকুনি, পুতুলি বিস্তীর্ণ,

সকল পদার্থ লাল দেখা, মুখমণ্ডল লাল, উত্তপ্ত ও ক্লিষ্ট ক্ষীত, কিন্তু নাকের  
উঁটির অগ্রভাগ অতিশয় ঠাণ্ডা, হাত ও পা শীতল, প্রস্রাব লাল, মুখ ও ওষ্ঠ  
শুক, গলা সঙ্কোচন বশতঃ ঢোক গিলিতে কষ্ট, রাত্রি অনিদ্রা, প্রাতে বিরাম  
কালীন পেট ফাঁপা ও ভাকা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, বুক ও পীঠ পর্য্যন্ত ব্যথা,  
গুড়মুড়া টাটান ।

অপরূহে ৫৬ টার সময় জ্বর, বিশেষ এক দিন অন্তর বৃদ্ধি, এবং মস্তিষ্কের  
উপসর্গ থাকিলে ইহা বিলক্ষণ খাটে । অথবা জ্বরের পূর্বে বিমর্ষ, মান্দামারা ও  
মাথা ধরা উপসর্গ থাকিলে । পুতি উদ্ভাবিত সংক্রামিক জ্বরে ব্যবহার করায়  
কখন বিশেষ ফল লাভ হইতে দেখা গিয়াছে ।

সিড্রন এক প্রকার মার্কিন গাছের ফল । তথায় করাল নামক এক  
প্রকার সর্প আছে । তাহার বিষ কেউটে অপেক্ষা তীব্র । দংশন করিলে  
দুই তিন মিনিট মধ্যে গলা ধরে এবং পাঁচ মিনিটে ভয়ানক অঙ্গ খেঁচুনি হইয়া  
রোগী পঞ্চত্ব পায় । ঐ দেশের লোক এই ফল গলায় ধারণ করে এবং  
থাইবা মাত্রেরই যন্ত্রণা দূর ও শরীর নির্বিষ হয় । কেউটে সাপে কামড়াইলে  
ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যিক ।

বেল—সন্ধ্যা বা রাত্রি কখন কখন প্রাতে জ্বর । শীত পরে তাপ অথবা  
উত্তয়ের এককালে অবস্থান, এবং সর্বশেষে ঘর্ম্ম বা উহার এককালে অভাব ।  
শীতাবস্থায় হাত শিঁড়িশিঁড় করিয়া সর্কাস্ক ব্যাপিয়া পড়ে, মুখ লাল বা ফেঁকাগে,  
গা বমি বমি বা ঐ সুময় অত্যন্ত গাত্র তাপ, তাপ কালীন অত্যন্ত পিপাসা বা  
উহার অভাব, শিরা দপ্‌দপানি, প্রলাপ, মুখমণ্ডল লাল ও ফুলা । জ্বর কালীন  
দুর্বলতা, বিমূনি, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব । পুনঃ পুনঃ পাটে পড়া এবং প্লীহা ও  
যকৃৎ প্রদেশ ক্ষীত থাকা, অত্যন্ত শিরঃপীড়া, জীর্ণতরে ব্যাঘাত ও উদরীর  
পূর্ক লক্ষণে ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হয় ।

কাপ্প—অতিরিক্ত শীত এবং তৎকালে পিপাসা, অস্থিরতা, মাথা-ব্যথা, শব্দ-  
অসহিষ্ণুতা, মুখ আসার ঝায় ছেপ উঠা, শ্লেষ্মা বমন, প্লীহা অধিক ক্ষীত হওয়া,  
হাত পা ও পীঠ কানড়ান ও ব্যথা, তাপ কালীন মুখে মন্দ তার, অত্যন্ত  
পেট ব্যাধি ও বৃথা বেগ বা হড়হড়ে জালাকর ভেদ, বুক পীঠ পা হাত ব্যথা,  
পিপাসা এবং তৎকালে ঘর্ম্ম ।

ক্যাথারিস—অতিরিক্ত শীত ও প্রস্রাবের কষ্ট থাকিলে । সমকালে শীত ও তাপ, পা ভারি এবং হাত পা নাড়িতে অশক্ত, শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা এবং চক্ষু ব্যথা ।

ইন্ফেসা—শীতের সময় মাত্র পিপাসা, অগ্নি তাপে শীতের সমতা, বাহিরে তাপ ভিতরে শীত, শরীরের এক স্থান গরম অপর স্থান শীতল । শীতের অবস্থায় গা বমি বমি, পিত্ত শ্লেষ্মা বা আহার বমন, পীঠ ব্যথা, পায়ের দুর্বলতা, তাপের সময় পিপাসার অভাব, অন্তর শিড়শিড় করা, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, অঙ্গে হল ফুটুনি, পীঠ ব্যথা, প্রলাপ, মাথা ঘোরা ও ব্যথা, হাতছেঁড়ার শ্রায় ব্যথা ও নিদ্রা । ঘর্ম্ম কালীন কাণে ভৌ ভৌ শব্দ । অথবা বৈকালে জ্বর, গা শিড়শিড় ও পেট ব্যথা, পরে ক্ষীণ হইয়া নিদ্রা ও অতিরিক্ত গাত্রতাপ বা পেট হইতে শ্বিত্ত হইয়া সর্কাসে শীত ব্যাপিয়া পড়া, পরে তাপ ও পা ঠাণ্ডা ।

নেট্রম—দীর্ঘকালস্থায়ী শীত ; পূর্বাহ্নে অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় কখন বা শিড়-শিড়িনি করিয়া সর্কাসে শীত, কখন কখন তৎকালে পিপাসা, শিরঃপীড়া ও হাড় ব্যথা, পরে তাপ, মাথা দপ্‌দপানি, ব্যথা ও ফেটে পড়ার শ্রায়, ত্বক্‌ হরিদ্বর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা, অজ্ঞান হইয়া থাকা, পরে অল্প ঘর্ম্ম । জ্বর কালীন অরুচী, মুখে ঘা, উপর পেট ছুঁইলে ব্যথা, অক্ষুধা ও তিক্ত তার । এই ঔষধে অনেককে সাংক্রামিক প্লীহা জ্বর হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে ।

রস—দিবসে বুক ধড়ফড়ানি, দুপ্রহর রাত্রে জ্বর ও উপর পেট ঠোস মারা ; অথবা সন্ধ্যায় শীত, পরে দীর্ঘকাল তাপ এবং সর্ব শেষে তাপ সহ প্রচুর ঘর্ম্ম ; তাপ ও ক্ষয়বস্থায় পিপাসা, পেট ব্যথা ও ভেদ, পরে নিদ্রা ও প্রাতে ভেদ ; অথবা জ্বর কালীন মাথা ঘোরা ও ব্যথা, গা হাত কামড়ান, দন্তশূল, অঙ্গ চিড়িক মারা ও গায় স্রাববাত বেরণ, পেট ব্যথা, উদরাময়, অনিদ্রা, ছটফটানি, রাত্রে পিপাসা ও ত্রাবার উপসর্গ থাকিলে ।

লাকেসিস—আহারান্তে বা বৈকালে শীত, গা হাত ব্যথা, বৃকে চাপ ও ফুটুনি এবং তজ্জন্ত কাতরাগি, তাপ কালীন অতিরিক্ত মাথার পীড়া, অতিশয় পিপাসা, প্রলাপ, অস্থিরতা ও আইটাই ; অথবা তাপের সময় অন্তরে শীত, দুর্বলতা, পরে ঘর্ম্ম । কখন কখন তাপ অবসানে বমন ও হিক্কী, টক দ্রব্য খাইলেই পাণ্টে পড়ার পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ ।

কার্কো—রগ দপদপানি, দস্ত ও শরীরের অস্থি ব্যথা, পার পাতা ঠাণ্ডা, আড়ানোড়া ভাঙ্গিয়া শীত, অবসন্নতা ও পিপাসা; তাপের সময় মাথা ঘোরা ও ব্যথা, মুখমণ্ডল লাল, ক্ষীণ-দৃষ্টি, গা বমি বমি, পেট বা বুক ব্যথা, পা কামড়ান; কখন প্রচুর ঘর্ম এবং তৎপরে শীত। জ্বর বিরাম কালেও শিরঃপীড়া থাকিলে।

ওপিয়ম—কম্প পরে তাপ ও নিদ্রা এবং তৎকালে পিপাসা ও প্রচুর ঘর্ম। জ্বর কালীন হা করিয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা, অঙ্গ চিড়িক মারা, গরম ঘর্ম এবং শৌচ প্রস্রাব বন্ধ। বালক ও প্রাচীনদিগের পাঁজাজরে অনেক সময় বিশেষ খাটে।

ভেরট্র—অন্তরের তাপ, লাল প্রস্রাব, মুখ লাল ও প্রলাপ, অথবা শীত, গা বমি বমি, মাথা ঘোরা, কোমর ও পীঠ ব্যথা বা একবার শীত একবার তাপ পর পর হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ বা বমন ও ভেদ বা বাহিরে শীত ও ঠাণ্ডা ঘর্ম, শীত ও তাপ কালীন ঘর্ম।

সিনা—জ্বর আরম্ভে, মধ্যে বা অবসানে বমন, পরে রাফসবৎ ক্ষুধা। শীত বা তাপের অবস্থায় পিপাসা, মুখ ফেঁকাশে, সর্বদা নাক খুঁটান, পুত্তলি বিস্তীর্ণ, দিন দিন ক্ষীণ হওয়া, মাথা ব্যথা, প্রলাপ, কখন কখন হাত পা ঠাণ্ডা ও পেট ব্যথা এবং ঘর্ম সহ নিদ্রা।

আন্টিম ক্রুড—অক্ষুধা, উদগার, গা বমি বমি, বমন, জিহ্বায় ছাতা, মুখে তিক্ত তার। পাকাশয়ে চাপ ও বুকে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ বা ভেদ। বিশেষ তাপের সময় ঘর্ম হইয়া গা না জুড়াইলে ইহা সেবনে ফল লাভ হয়।

আন্টিমটার্ট—অল্প শীত, অধিক তাপ, প্রচুর ঘর্ম, নিদ্রাবল্য, অধিক প্রস্রাব; ইহার সঙ্গে জিভ লাল, গুগু বা কাঁটা দেওয়া, অত্যন্ত পিপাসা, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা থাকিলেও ইহা দৈওয়া বিধি।

আর্গিকা—প্রাতে ও বৈকালে, বিশেষ সন্ধ্যায় জ্বর; শীতের পূর্বে জ্বন্তণ ও অত্যন্ত পিপাসা ও সমস্ত অস্থি ব্যথা, জ্বর কালীন স্থির থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় সর্বদা পাশ ফেরা, অক্ষুধা, পেট ব্যথা, বিরামের অবস্থায় তিক্ত তার, স্বক হরিদ্বর্ণ এবং কিছুই ভাল না লাগা।

ইউপেট্রিয়ম—শীতের পূর্বে পিপাসা, কাশি এবং মস্তক, পীঠ ও শরীরের সমস্ত হাড় ব্যথা, শীতের অবস্থায় কম্প, গা বমি বমি, বিশেষ নড়িলে চড়িলে;

পায়ের ডিম্ব, কোমর ও হাত টাটান এবং ইহার অবসানে কাঠনেকার ও পিত্ত বমন; তাপ কালীন ত্বক্ উত্তপ্ত, মাথা ব্যথা ও দন্দপানি। তাপ ও শীতের অবস্থায় পিপাসা, অন্তবে কম্প বাহিরে তাপ, উপর পেট ব্যথা, অল্প ঘর্ম। পাল্টে পাল্টে পড়ার পক্ষে উত্তম ঔষধ।

ইলেটরিয়ম—সর্বপ্রকার ও বহুদিনের জরে উপকারী। প্রাত্যহিক জ্বর, মাথা ব্যথা, গা হাত টাটান, অল্প ব্যথা, হাই তোলা ও আড়ামোড়া ভাঙ্গার পর শীত এবং তৎকালে প্রথম উপসর্গদ্বয়ের বৃদ্ধি। তাপ কালীন অত্যন্ত পিপাসা; মাথা, বিশেষ ব্রহ্মতালু প্রদেশ ছিঁড়ে পড়ার স্থায় বস্ত্রণা, অস্ত্রের কষ্টের আধিক্য এবং হাত পায়ের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বেঁধার স্থায় ব্যথা এবং তৃণী হইতে বেদনা পুনরায় উক্কে উঠা, ঘর্মাবস্থায় ক্রমে ক্রমে উপসর্গের সমতা। অথবা তৃতীয় দিবসে ঘোকারীন জ্বর, শীত; মাথা, পাকুরের নিম্নদেশ ও কোমর বেদনা, হাই তোলা কালীন ঘোড়াডাকার স্থায় শব্দ হওয়া, নাক দিয়া জল ঝরা, পা ও পাতায় খিল লাগা, পরে অতিশয় গাত্র তাপ এবং সর্বশেষে প্রচুর ঘর্ম। ক্টিয়া হাই উঠিয়া জ্বর এবং তৎকালে অতিশয় পিপাসা, পেট ব্যথা এবং হাত পায়ের অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বেঁধা। অথবা জ্বর কালীন জলবৎ গঁজলাটে ভেদ, বদন ও পেট ব্যথা থাকিলে।

ফেরমমেটাল—চক্ষু ফুল, মাথার শির উঠা, আহার বমন, নিশ্বাসের খর্বতা ও পায়ের দুর্বলতা জন্তু চলিতে অশক্ত। মুখমণ্ডল শীতের সময় গরম এবং তাপ কালীন অত্যন্ত লাল, ঘর্মের পূর্বে মাথা ধরা।

ফেরম আসিটার্ট—এক দিন অন্তর জ্বর, অল্প শিরঃস্রাব হইয়া প্রবল শীত, অধিক মাথা ব্যথা, অতিশয় পিপাসা, পরে তাপ ও ঘর্ম। তিক্ত তার, অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ, ত্বক্ হরিৎ ইত্যাদি উপসর্গ সঙ্গে থাকিলে। বিরাম কালীন অবসন্নতা ও শিরঃস্রাব।

কনোনিয়ম—প্রবল তাপ ও অধিক ঘর্ম ও পিপাসা এবং ইহার সঙ্গে ভেদ, বমন ও অক্ষুধা।

ককুলস—জ্বর কালীন কেবল শীত বা একবার শীত একবার তাপ, কিন্তু ঘর্ম বা পিপাসার অভাব। বিশেষ অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, সর্বদা পাকাশয়ে খাল লাগা ও কোমরের দুর্বলতা থাকিলে।



ড্রোসিরা—আক্ৰিক জ্বর, প্রাতে অত্যন্ত শীত, হাত বরফবৎ ঠাণ্ডা, নখ নীলবর্ণ, শীত অবসানে তৃষ্ণা, মধ্যাহ্নে মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, মাথা ভার ও উচ্চারণ পশ্চাত্তাগের দপ্‌দপানি, গা বমি বমি, আক্কেপযুক্ত কাশি, রাত্রে প্রচুর ঘর্ম, বিশেষ পেটে ; অথবা দিবসে শীত ও রাত্রে তাপ ।

কফি—জ্বর কালীন ভয়ানক পেট ব্যথা, গা সড়সড়ানি, আইচাই ; অথবা শীত না হইয়া তাপ, অতিশয় পিপাসা, পরে সর্কান্ধে ঘর্ম ; কিম্বা অল্প শীত ও অল্প তাপ, পিপাসা এককালে অভাব ।

সাইমেন্ড—গা শিঁড়িশিঁড় করিয়া পা ঠাণ্ডা, পরে শীত, তৎসময়ে সন্ধি সমস্ত, বিশেষ হাঁটু ও উরু ব্যথা, বৃকে চাপ জন্ত দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ, তাপ কালীন গলার নালী সঙ্কোচ হওয়া ও নিশ্বাস কষ্ট, তাপ অবসানে অতিশয় ক্ষুধা । শীতের ৫৬ ঘণ্টা পূর্বে পা ভার ও যথেষ্ট তৃষ্ণা । তথবা এক দিন অন্তর জ্বরের শীতাবস্থায় জ্বন্তণ, আড়ামোড়া ভান্সা, কিমন, হাত পা অসাড়, অল্পস্থায়ী তাপ এবং সেই সময় বৃকে চাপ বোধ, দীর্ঘকাল ঘর্ম ও তৎকালে ক্ষুধা । বিরাম অবস্থায় বিলক্ষণ পিপাসা । কিম্বা মাঝে মাঝে শীত হইয়া তাপ, পরে ঘর্ম, হাই তোলা, নাকী দুর্বল, অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু গলা শুষ্ক 'খাকা' নিমিত্ত সর্বদা পানি ইচ্ছা । শীতারম্ভে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হওয়া এবং রাগাশক্ত হইয়া দ্রব্যাদি নষ্ট করিবার ইচ্ছারূপ উপসর্গ থাকিলে ইহা প্রয়োগে ফল লাভ সম্ভব ।

মশাটা—এক দিন বা দুই দিন অন্তর জ্বর, শীতের আধিক্য, তাপ কালীন কক্ষিৎ পিপাসা, নিদ্রার ইচ্ছা, জিহ্বা শাদা, গলা ঘড়ঘড়ানি ও রক্ত উঠা ।

মেজেরিয়ম—অত্যন্ত শীত, গা ঠাণ্ডা, হাত পা মৃত ব্যক্তির স্থায় শীতল, শীতাবসানে ঘর্ম, অক্ষুধা, শ্লীহা ক্ষীত ও শক্ত এবং মাঝে মাঝে কামড়ান, বা মুখ ও অন্তর শুষ্ক, অগচ পিপাসা অভাব ও উদরাময় ।

ডিজিটালিস—শীত, তাপ, পরে প্রচুর ঘর্ম । অন্তর বা পীঠের দিকে শীত এবং মুখ লাল ও উত্তপ্ত 'টকপানীয়' ও তিক্ত আহার ইচ্ছা, অক্ষুধা বা অতিরিক্ত ক্ষুধা ।

সাবাডিলা—নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী । অক্ষুধা, পাকাশয়ে ভার ও ফ্লা, বৃক ব্যথা, কাশি, দুর্বলতা এবং শীত ও তাপের মধ্যকালে তৃষ্ণা ।

শীতাবস্থায় উর্দ্ধপঙ্ক্তর ব্যথা, কাশি এবং সর্কান্ধ ও অস্থি পর্য্যন্ত কামড়ান, তাপ

কালীন আড়ামোড়া ভাঙ্গা, জ্বন্তন ও প্রলাপ এবং ঘর্মের সময় ও নিদ্রার সময় ও বিরাম কালীনও সর্বদা ব্যথা।

ষ্টাকিসিগ্রিয়া—সন্ধ্যায়, রাত্রে বা প্রাতে অধিক শীত মাত্র, তাপ, ঘর্ম, পিপাসার অভাব; অথবা বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অত্যন্ত শিউঁশিউঁনি ও অতিরিক্ত পিপাসা, কখন বা প্রাতঃকালে শীতের পর অল্প তাপ। এক দিন অন্তর জ্বর, মুখের পচা, তার, দাঁতের গোড়া গিয়া রক্ত পড়া, অক্ষুধা ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপসর্গ।

ষ্টানম—সর্বদা তাপ ও ঘর্ম, পরে অল্প শীত, পিপাসা।

সিলিসা—পুনঃ পুনঃ শীত, পরে অল্প তাপ ও পিপাসা; অথবা সন্ধ্যায় অতিশয় শীত ও তজ্জন্তু পাকায় ব্যথা, পরে সমস্ত রাত্রি তাপে অতিরিক্ত পিপাসা ও হাঁসফাসাঁনি। অতিশয় বলক্ষয়কারী ঘর্ম ও পিপাসা। কোড়া পাকার অবস্থায় ক্ষয়জ্বর এবং জ্বরকালীন পেটকাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এবং ক্রমি জ্বর ও দন্ত উঠা কালীন জ্বরেও বিশেষ উপকারী। পুরাতন রোগে একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা, ইহার মধ্যে কোন তিথিতে জ্বর হইলে ইহা প্রয়োগে ফল লাভের বিলক্ষণ সম্ভব।

সামবেদন—হাত পা ঠাণ্ডা; শীত, পরে তাপ, কিন্তু পিপাসার অভাব এবং গাত্রাবরণ খুলিতে ভয়, সর্বদা প্রচুর ঘর্ম। জ্বর বিরামাবস্থায় বলক্ষয়কারী অধিক ঘর্ম হওয়া উপসর্গ থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে।

সেপিয়া—শীত ও পিপাসা, গাত্র ঠাণ্ডা ব্যথা, হাত পা বরফবৎ ঠাণ্ডা, অঙ্গুলী অসাড় হওয়া পক্ষে।

নাইট্রিক অসিড—বৈকালে শীত, রাত্রে তাপ, প্রলাপ, অনিদ্রা, শেষ রাত্রে ঘর্ম ও নিদ্রা এবং মাড়ি ভিত্তিভেদে; পুরাতন উদরাময় বা পূর্নাক্ষে অধিক পারা ব্যবহার হইয়া থাকিলে ইহা বিশেষ খাটে।

পডফাইলম—প্রথমে পীঠ কামড়ানো, শীতের সময়ে কঁক ও সন্ধি স্থান, যথা হাঁটু, কনুই, হাতের কজা ব্যথা, অল্প পিপাসা, জ্ঞান স্বেপ্ত ও কথা বোঝনা করিতে না পারা, এজন্ত চুপ করিয়া থাকা; তাপের অবস্থায় প্রলাপ, অধিক বকা, পরে এ সমস্ত বিস্মরণ হওয়া; জ্বর-কালে অতিরিক্ত পিপাসা ও অত্যন্ত শিরঃপীড়া; ঘর্মকালে নিদ্রা, জ্বর বিশ্রামে অক্ষুধা।

ফস-আসিড—কম্প, অঙ্গুলী বরফবৎ ঠাণ্ডা, পরে তাপ, কখন ইহার আতিশয়া ইহা অজ্ঞান থাকা, পিপাসা অভাব, মুখ শুষ্ক ও গিলিতে গলায় বাজা।

ফস—রাত্রি তাপ, ঘর্ম ও রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, পরে শীত, গা ঠাণ্ডা, কম্পের দরুন দাঁত ঠক্ঠকানি, পরে অন্তর্দাহ, বিশেষ হস্তের জ্বালা, কিন্তু শরীরের উপরে ঠাণ্ডা ; অথবা রাত্রি অত্যন্ত কম্প ও জলবৎ ভেদ, পরে খুব গাত্রতাপ ও ঘর্ম ।

কাঁকা—গণ্ডমালা ও কফজ ধাতুবিশিষ্ট এবং শিশু ও বামাগণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । পুরাতন রোগ, বিশেষ সাংক্রামিক পালাজ্বর, প্রীহা অগ্রমাসের পক্ষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ । সন্ধ্যায় জ্বর, বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ও অতিশয় পিপাসা ; শয্যায় শয়ন করিয়া শীত ও অল্প ঘর্ম, পরে প্রচুর ঘর্ম । পূর্কাক্ষে শিরঃপীড়া ও দুর্বলতা ; কপাল হাত উত্তপ্ত ; টক পানে প্রয়াস ; তৎপরে হাত বরফবৎ ঠাণ্ডা ও নাড়ী দ্রুত । প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত মাথা ভার, সন্ধিগ্রহি ছেঁড়ার তায় ব্যথা, পরে অবসন্নতা, এমন কি উঠিয়া বসিতে অক্ষম ; গা হাত ভার ও ব্যথা, ঐকান্ত আড়ামোড়া ভাঙ্গা ; গাত্রতাপ, অন্তরে অতিশয় শীত ও উহার সঙ্গে কখন খুব পিপাসা, গাত্র হরিদ্বর্ণ ও ক্ষীত ।

সল্ফর—পাচড়া বা চুল্কনা হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়া জন্ম জ্বর, সন্ধ্যায় শীত, প্রাতে তাপ ও ঘর্ম । প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় জ্বর, শীত, (অগ্নিতাপেও সে শীত ভাঙ্গে না), অধিক গাত্রতাপ এবং টকগন্ধ ঘর্ম ; গা হাত ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা, বুক ধড়ফড়ানি । রোগ গুরুতর হইলে এই ঔষধ বিশেষ খাটে । প্রীহা অগ্রমাস ও অপর রোগ সম্বলিত জ্বর পক্ষে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয় । রোগের উপসর্গ সদৃশ অল্প ঔষধ দিয়া উপকার না হইলেও ইহা দেওয়া আবশ্যিক । মুখ ফুলা বা বমি, শিথিল মাংস, চুল্কনা, পাঁচড়া, সামান্য কারণে সন্ধি, নাক কান দিয়া রস বরা, বুক ও পাশ ফুঁড়ুনি, নিশ্বাস কষ্ট, পেট শক্ত ও ক্ষীত, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট বাগু ও ভেদ, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, গা হাত ভার ; জ্বর, বিশেষ অপরোক্ষ পিপাসা, হঠাৎ তাপ, হঠাৎ শীত, হঠাৎ অগ্নি-আওয়াণো ও বাকবদ্ধ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ।

খুজা—অতিশয় কম্প ও পিপাসা, পরে মাথা ভিন্ন সর্বত্র প্রচুর ঘর্ম ।

টারাক্কিকম—হাত ও নাক ঠাণ্ডা, পরে নিজা কালীন অতিশয় ঘর্ম,

বিশেষ মন্তকে ; এবং বিরাম কালীন অবসন্নতা ও মাথা ঘোরা । অক্ষুধা, দিনরাত পিপাসা, অতৃপ্তিকর নিদ্রা, রাত্রে প্রচুর ঘর্ম ও দৌর্বল্য পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ ।

প্লব্ধম—শীত, অতিশয় তাপ, ঠাণ্ডা ঘর্ম ; অতিশয় পিপাসা, পুতিজ্বর এবং প্রীহা প্রদেশ ছুইলে ব্যাধি, এরূপ উপসর্গে ইহা বিশেষ খাটে ।

মেনিয়াহিস—শীতের আধিক্য, হাত পা ঠাণ্ডা, কম্প, জ্বন্তন, চুল খাড়া হইয়া উঠা, পীঠ সড়সড়ানি, পরে গাত্র তাপ, নাড়ী মৃদু ; অথবা জ্বর ও সমুদয় গাত্র ঠাণ্ডা ।

মার্ক—শীত, পরে তাপ ও অত্যন্ত পিপাসা ; গরম শয্যায় থাকিলে একবার শীত একবার তাপ, কিন্তু তথা হইতে উঠিলে কেবল শীত ; হৃৎকো অতিশয় প্রয়াস, শীত ও তাপ, কিন্তু পিপাসার অভাব ; প্রাতে পিপাসা, গা বমি বমি, কদর্যা বা টকগন্ধ ঘাম ও তৎকালে অতিশয় বৃক ধড়ফড়ানি ।

রাটানিয়া—সন্ধ্যায় শীত, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাপ । শীত, হাত পা জ্বালা ও তাপ, পরে অনেক রাত্রে হৃৎকো প্রচুর ঘর্ম ।

স্পাইজিলা—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শীত, পরে তাপ, বিশেষ মুখমণ্ডলে । পিপাসা অভাব ; অথবা পীঠের দিকে শীত, মুখমণ্ডল ও হাত উত্তপ্ত ; শয়ন করিলেই শীত, পরে গাত্র প্রচুর কদর্যা ঘাম ; অতিশয় তাপ ও সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ মন্তকে ঘর্ম ।

• লাইকপ্—বৈকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি কেবল শীত, অথবা প্রাতে দুই ঘণ্টা শীত ও গা ঠাণ্ডা—যেন বরফে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এমন বোধ ও সর্বাঙ্গ ব্যথা । নিদ্রাভঙ্গের পর সর্বাঙ্গে ঘর্ম এবং পরে অতিশয় পিপাসা । প্রাতে শীত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ, পরে অতিশয় তাপ এবং মাথার পেছন ব্যথা । প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শীত, পরে তাপ এবং প্রাতে টক ঘর্ম । সন্ধ্যায় একবার শীত, একবার তাপ ; সমুদয় মাথা কামড়ানি ও সর্দি, গা বমি বমি ও বমনের পর শীত এবং তাপ না হইয়া ঘর্ম । এক দিন অন্তর জ্বর, শীতের পর টক বমন, মুখমণ্ডল ও হস্ত সরস ( ফুলা ) । অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রবল তাপ, পরে শীত । ক্ষয়জ্বর ও রাত্রে চট্‌চটে ঘর্ম । সান্নিপাতের জ্বর, ঘুমিয়া চমকানো, নিদ্রাভঙ্গের পর চীৎকার, ধমকান, খ্যাক্‌খ্যেঁকে হওয়া ।

হাইয়স—বৈকালে জ্বর, শীত, ঘাড় ব্যথা ; অথবা সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ও

বহুক্ষণ-স্থায়ী শীত, অতৃপ্তকর নিদ্রা, পরে প্রচুর ঘর্ম বিশেষ উরুদেশে, সন্ধ্যায় তাপ ও পিপাসা, মুখে পচা তার, অথবা এক বা দুই দিন অন্তর জ্বর ও রাতে উৎকাশি, জ্বর কালীন মুচ্ছা, মধ্যাহ্নে পায়ের ডিম্বে এবং কিছুক্ষণ পরে পাক-শয়ে খাললাগা, তাহার পর অজ্ঞান হইয়া অন্ধর্থেচুনি; তাপ ও অল্প ঘর্ম হইয়া জ্বরমগ্ন; বিরাম কালীন অতিশয় দুর্বলতা; চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্কুলিঙ্গ ছোট্টা; মুখশুষ্ক, পুনঃ পুনঃ হিকা ।

হেল—অত্যন্ত মাথা গরম, হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, পরে অল্প ঘর্ম । শীত, হাতের চেটো ঠাণ্ডা, অন্তর্দাহ, ঝিমানো, পার পাতা ভার, পবে তাপ ও ঘর্ম, কিন্তু পিপাসা অভাব; সর্কাস্কে বিশেষ মন্তকে তাপ, ভিতরে শীত, পিপাসা অভাব ।

গমিগটি—অত্যন্ত শীত, দাঁত ঠক্ঠকানি, অতিশয় পিপাসা, অল্প ঘাত তাপ, প্রতি পালায় বিলম্বে জ্বর আসা অথবা শীতের সময় উদ্গার, জ্বন্তন, পিপাসা, পৃষ্ঠদেশে বেদনা এবং সর্কাস্কে পিপিড়া কামড়ানো ছায় বোধ অথবা জ্বর আরম্ভে কানে ফুঁড়নির ছায় ব্যথা ।

ভেলিরিয়ান—শীত অভাব, অতিরিক্ত তাপ, পিপাসা ও ভোলামারি বৎ :

হিপার—হাতের চেটো ও পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; অতিশয় শীত, দন্ত ঠক্-ঠকানি; পরে তাপ ও ঘর্ম, বিশেষ বুক ও কপালে; অত্যন্ত পিপাসা; অথবা অতিশয় তাপ ও পিপাসা; মুখমণ্ডল লাল; মাথা ব্যথা; বিড়বিড় করিয়া গলাপ । মুখে তিক্ত তার, কিছুক্ষণ পরে শীত ও পিপাসা ।

লারেসিরেসস—শীত পরে তাপ, মাথা ঘোরা ও অবোর থাকা, পরে অঙ্গের অবসন্নতা । বার ঘণ্টাহিত জ্বর, মুখ শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা ।

লেডম—শীত ও পিপাসা, তাপের সময় তৃষ্ণা না থাক্কা, পরে নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম ও সন্ধ্যাে চুলকুনি । জ্বর কালীন গা হাত কামড়ানো ।

লোবেলা—অতিশয় শীত, মাঝে মাঝে তাপ, দুই ঘণ্টা পরে অধিক তাপ, মাঝে মাঝে অল্প শীত, পরে প্রচুর ঘর্ম হইয়া সুনিদ্রা । প্রথম হইতে পিপাসা, শীতের সময় অধিক; বুক সঁটে ধরা বোধ; সাঁই সাঁই শব্দ বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ও কষ্ট-কর শ্বাস; গলা সড়সড়ানি ও কাশি, কপাল ব্যথা, অক্ষুধা, জিভের ডাইনে ছাঁক পড়া, গানে পরিষ্কার, অতিশয় দৌর্ভাগ্য ।

• কাষ্টিকম—শীত, ঘর্ম ও পিপাসা ; অথবা তাপ, হাইতোলা ও গা হাত মোড়া ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ সর্বাপ শীতল হয়। প্রথম রাত্রে শীত, পরে তাপ ও প্রাতে ঘর্ম।

লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দেওয়া সূকঠিন, এই নিমিত্ত সাংক্রামিক জ্বর না হইলে কখন কখন তরুণ জ্বর কুইনাইন দিয়া বন্ধ করিতে হয়। ১২ কুচ কুইনাইন লইয়া ১০ গুণ মিছরির সঙ্গে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মাড়িয়া উহা ৮ বা ১৬ পুরিয়া করিবা এবং জ্বর বিচ্ছেদ কালে বয়ঃক্রম বুঝিয়া ৩৬৮ মাত্রা খাওয়াইবা এবং পর দিবস ২৩ মাত্রা আর্স দিবা। ইহার পরও জ্বর হইতে থাকিলে, পলস, নেট্রম, নল প্রভৃতি লক্ষণানুযায়িক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

জ্বর সম্বন্ধে যে সকল ঔষধ সচরার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যাশ্রমে লেখা হইল। আক্ষেপের বিষয় যে, ইহার মধ্যে দেশী ভৈষজ্যের প্রায় নামই নাই। আমাদিগের দেশে জ্বর ও উদরাময়, ইহারাই প্রধান ও প্রবল পীড়া। এই সমস্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ যে এই স্থলেই আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সামান্য কথায় বলে, যেখানে বুনোওল সেইখানেই বর্ষা তেঁতুল। কত শত শত পীড়িত ব্যক্তি সামান্য গাছড়া ব্যবহারে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত অপরিচিত ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া বেক্রপ পরামর্শসিদ্ধ নয়, সেইরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে অজানিত ঔষধ সেবন অকর্তব্য। হাতুড়ে ভৈষজ্য ব্যবহার করিয়া •দেহ নাশ হইলে শাস্ত্রকারেরা তাহাকে অপমৃত্যু বলিয়া গুণ্য করেন, এই জ্ঞত বিজ্ঞ লোকেরা ইহা সেবনে এত অনিচ্ছুক। যাহার পরীক্ষা হয় নাই, তাহাকেই হাতুড়ে ঔষধ কথা যায়। এই নিমিত্ত দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ জানা নিতান্ত আবশ্যক। কুঁচলে আমাদিগের দেশীয় একটি গাছের বীচি। কিন্তু এদেশের রোগ সম্বন্ধে ইহার তুল্য অপর একটা ঔষধ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এখানে যে ইহার ঞ্চ অথ রোগের ঔষধ নাই, ইহা কলা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য। খুঁজিলে এইরূপ আরও ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। যে কেহ ইহার ঘোড়া মিলাইয়া দিবেন, তিনি চিরস্মরণীয় ও দেশের প্রকৃত হিতসাধক হইবেন। দুই এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ও জনকতক বিষয়ীরা মনযোগী হইলে এ কর্ম সাধিত হইতে পারে। আমেরিকার হোমিওপ্যাথিকেরা সতত পরীক্ষা দ্বারা ব্যাধি নিরাময়ের

উপায় বৃদ্ধি করিতেছেন। আমাদিগের এখানে ঐ মতাবলম্বী চিকিৎসকের সংখ্যা অত্যন্ত বটে, কিন্তু “একা মহেন্দ্র বাবু এক সহস্র তুল্য।” \* হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং এই মতের প্রচলন ও ইহার উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ আগ্রহ, সাধারণের হিত সাধন করিয়া দেশের লোকের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হওনের যেরূপ স্নস্কল্প এবং কোন প্রকার আবিস্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্যার উন্নতি সম্পাদন ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করণার্থ তাঁহার যেরূপ চেষ্টা, তাহাতে কিছুকাল জীবিত থাকিলে তিনি যে দেশীয় গাছড়া প্রভৃতি হইতে অনেক রোগের ( বিশেষতঃ ভারতবাসীর শারীরিক পীড়ার ) উপযোগী ঔষধ বাহির করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অমূলক বা অসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রায় শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ গত হইল, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। তৎকালে এদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বীজ রোপিত হইতেছিল মাত্র। এক্ষণে সেই বীজ হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষ সমগ্র দেশের রোগীকে শান্তি ও ছায়া দান করিতেছে। অতঃপর ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানানুযায়ী আয়ুর্বেদের বহুল প্রচার স্থির ও অনিবার্য্য।

### সর্দি জ্বর।

( Catarrhal Fever—Influenza. )

হাম জরের ত্রায় ইহার সমস্ত লক্ষণ, কেবল গায়ে গুটি নাহির হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। প্রথমে শীত শীত, তাপ ভাল লাগা, পরে গা থস্‌থসে, কাশি, গলা ব্যথা, জিভে শাদা ছাতা, বৃকে চাপুনি ও ব্যথা, অক্ষুধা, কখন কখন বমন, দুর্গন্ধ শ্বাস, জ্বর অধিক হইলে প্রলাপ, তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থি ( tonsils ) ফুলা, গিলিতে কষ্ট, চক্ষু লাল ও জল ঝরা, আলোকে আতঙ্ক এবং পুনঃ পুনঃ হাঁচি, বিশেষ প্রথম প্রপম।

\* ডাক্তার বেরিগী স্বদেশ যাত্রা করিবার কিছু পূর্বে কোন আত্মীয়ের নিকট এইরূপ কহেন, অহৃদ্যতা বশতঃ আমি এদেশ পরিত্যাগ করিতেছি, কিন্তু অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী প্রচার হওয়ার নিমিত্ত আর আমার ভাবনা নাই, কারণ মহেন্দ্র এই মনস্থ করিয়াছেন এবং তিনি একাই এক দল বিশেষ।”

নিদান—ধাতু ও আবহাওয়ার তাপের পরিবর্তন, আর্দ্র স্থানে শয়ন, দম্কা বাঁতাস লাগা ইত্যাদি কারণে রোগ প্রকাশ পায়। কাট বা উত্তিজান্ন দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ জন্ম কখন কখন সাংক্রামিকরূপে ব্যাধি দেখা দেয়। এই পীড়ার সূচিকিংসভাবে ফুসফুস ও উপশ্বাস-নালী-প্রদাহ হওন সম্ভব।

জেল্‌স—এ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং সর্ব প্রথমে দিলে প্রায়ই ইহাতে আরোগ্য হয়। শীত, তাপ ও ঘাম এবং বিরামকাল সামান্য বা নাম মাত্র, এমত স্থলে বিশেষ খাটে।

ইপি—জ্বরের সঙ্গে অধিক কাশি, গা বমি বমি ও ভেদ।

মার্ক—বদন তম্‌তমে ( ক্ষীত ), গলা ফুলা, ভিতর ও বাহির গাঁইট ব্যথা, শ্বস্বের তাপে উহার বৃদ্ধি ও ঘর্ষে সমতা না হওয়া ; এবং ঐ সঙ্গে উদরের পীড়া, বেগ সই আম নির্গত হওয়া। ইহা ঔদারিক জ্বরেও ব্যবহার্য।

টার্ট-এ—সরল কাশি, গম্বার উঠা, গলা ব্যথা, শ্বাস কষ্ট, গা বমিবমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর।

ভেরাট-ভে—প্রচণ্ড জ্বর, প্রলাপ, অঙ্গ খেঁচুনি।

তোয়ালে\*গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া নিয়ত বুকে লাগাইলে জ্বর ও যাতনার হ্রাস হয়।

## মস্তিষ্কের জ্বর ।

( Brain Fever. )

রোগ হঠাৎ হয়, পূর্ব ইহাতে অবসন্নতা, হাত পা ঠাণ্ডা, হাই উঠা, খাঁত-খেঁতে হওয়া, ঘুমিয়া পড়া, ঘুমন্ত খুব জ্বর, চক্ষু লাল, তৃষ্ণা, চম্‌কানো, ভয়, চক্ষু পুত্তলি সংকোচিত বা বিস্তীর্ণ হওয়া, প্রলাপ ও কোন কোন স্থলে দড়কা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, প্রস্রাব অত্যন্ত ও খুব লাল। মাথায় অধিক রক্ত সঞ্চয় সহিত হইলে শির দপ্‌দপ করা, আলোকে বিরক্তি ও আতঙ্ক, দস্ত কিড়মিড়ি, চম্‌কানো, হাতের বুড়া আঙ্গুল চেটোর দিকে ঢোকা ; অথবা অচেতনে নিদ্রা, নাকি ডাকা, মাথা ও বদনে গরম ঘাম, চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত, পুত্তলি বিস্তৃত, আলোক বা শব্দে আতঙ্ক, উভয় প্রকার অবস্থাতেই নাজী স্পন্দন অগণনীয় ও শ্বাস ঘন ঘন।



আকন—খুব তাপ, গাত্র শুষ্ক, নাড়ী মোটা ।

বেল—প্রচণ্ড প্রলাপ, আলোক ও শব্দে কষ্ট, মুখ চক্ষু লাল ।

জেলস—আকন ও বেল দিয়া প্রতীকার না হইলে, বিশেষ মাথার পশ্চাৎ ভাগ খুব গরম ও ব্যথায়ুক্ত থাকিলে ।

ভেরাট-ভে—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ; উভয় প্রকার উপসর্গ পক্ষে, বিশেষতঃ নাড়ী খুব দ্রুত হইলে ও দড়কার উপক্রমে (কোন কোন ডাক্তার আদত আরক ব্যবস্থা করেন) । প্রতি ঘণ্টায় দুই মিনিট কালব্যাপী জলের ধারাপি দেওয়া বিহিত । ঘাম হইতে থাকিলে গরম জলের ২।১ হাত উচ্চ হইতে ধারাপি ( যদি সুস্থ হয় ) এবং স্বল্প বিরামকালে জেলস, কুইনাইন ।

### - পৈতিক জ্বর ।

( Gastric Fever. )

প্রথমে গা বমি বমি ও বমন, পরে অল্প শীত ও তাপ । জ্বর প্রবল হইলে প্রলাপ, চম্কানো, জিভে লেপ, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা ও পান নাগ্ৰেই তুলিয়া ফেলা, পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত লাল ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব । বমন—প্রথমে আহারীয় পদার্থ ও গাঁজলাটে শ্লেষ্মা, তাহার সঙ্গে রক্তের ছিট । উদরাময় থাকিলে অল্প প্রদাহ বুঝিবে ।

ইপি—জ্বর সহ অধিক গা বমি বমি, বমন, ভেদ, কামি ।

ক্রিয়োস—নিয়ত গা বমি বমি, কাঠনেকার, বমন ও তাহাতে রক্তের ছিটা থাকা ।

জেলস—বিশেষ পুষ্টি উদ্ভাবিত জ্বরে অধিক ব্যবহার্য্য ।

টার্ট-এ—জ্বরের সঙ্গে অতিশয় পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন ; পেট ফাঁপা, ব্যথা ও অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা, কামি ।

বাপ্টিসা—জ্বর, জিতে ছাতা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পেট ব্যথা, ভেদ ।

ব্রাই—তাপ মাঝারি, জিতে পুরু লেপ, জিভের ধার ও আগা লাল, পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা ।

ভেরাট—জ্বর, প্রলাপ, দড়কা ও হৃৎকম্প ।

• কার্স। রোগীর গাত্রে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধমল, হস্তপদের শীতলতা, স্বশ্বনিঃসরণ ও বলহানি। ঔষধের চূর্ণ প্রথম দশমিক ক্রম ব্যবহার্য।

মার্ক। পীতভ বা হরিদ্রাভ মল, কিন্তু অধিক উদরাময় নহে, ঘন আবরণবিশিষ্ট জিহ্বা, প্রচুর স্বশ্ব।

বেল ইত্যাদি। মস্তকের পীড়া থাকিলে বেল, হাইয়স বা ওপি দেওয়া বিধি (টাইফয়েড জ্বর দেখ)।

টেরি। অল্প হইতে রক্ত নির্গমন, মূত্রাবরোধ।

এসিড ফস। রোগ অপেক্ষাকৃত হীনভেজ হইলে ও দ্বায় দুর্বলতা থাকিলে বা অত্যন্ত ঔষধ সেবনে রোগের প্রবলতা কমিয়া আসিলে।

পরিণাম। রোগ আরোগ্য হইবার সময় কষ্টকর কাশ, অজীর্ণ, শিরঃ-পীড়া, বধিরতা ইত্যাদি রোগ হইবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটি রোগের উপক্রম হইলে শীঘ্র উহা উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করা কর্তব্য। মস্তকের রোগের জন্ম বেল, হাইয়স, জিন্স, ওপি বারস; বক্ষঃ রোগের জন্ম ফস, ব্রাই বা আইয়ড এবং অজীর্ণ রোগের জন্ম সলফ, কার্স, ইগ্নিসিয়া বা মার্কুরিয়স ব্যবহৃত হয়। এসিড ফস, চায়না বা চিনি-সলফ সেবনে দৌন্দল্য ও বধিরতা দোষ বিনষ্ট হয়। রোগের পর অত্যন্ত বলবতী ক্ষুধা নিবারণ ও দেহ ক্লান্তির পুষ্টিসাধন করিবার জন্ম চায়না আবশ্যিক। অত্যন্ত ঔষধ সেবনের পর সলফর ব্যবহার করিলে শীঘ্র রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

### সরল একজ্বর ।

সংজ্ঞা। এই জ্বরে অধিক গাত্রোত্তাপ, দ্রুত নাড়ীস্পন্দন, পেশীর দৌন্দল্য, আলস্য এবং দেহের বিবিধ ঘন্ত্রের কার্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

এই রোগ কখন কখন অত্যন্ত রোগের সহিত দেখা দেয়। তখন ইহা উক্ত রোগের অঙ্গ স্বরূপ গণ্য করা উচিত। ইহা কখন একদিন এবং কখনও বা এককালে অধিক দিন স্থায়ী হয়।

উপসর্গ। প্রথমে শীত বা পর্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা অনুভব, পরে গাত্রোত্তাপ ও সজ্ঞতা; পূর্বে ও দ্রুত নাড়ীস্পন্দন; মুখবিরল, ওষ্ঠাধর ও

জিহ্বার শুষ্ক ভাব; জিহ্বা রক্তবর্ণ বা খেতাবরণবিশিষ্ট; পিপাসা; অঙ্গ ও রক্তবর্ণ মূত্র ও কোষ্ঠবদ্ধ। উপরোক্ত উপসর্গের সহিত কখন কখন কটিদেশে বেদনা, শিরঃপীড়া, অরুচি, দ্রুত শ্বাস, প্রলাপ, প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। রাত্রে উপসর্গগুলি বাড়ে। জ্বর কমিয়া আসিলে প্রচুর ঘর্ম নিঃসরণ, নাসিকা হইতে রক্তপাত, উদরাময় ও চর্মরোগ দেখা দেয় এবং রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রোগীর শরীরে অত্র কোন প্রকার গ্লানি অনুভূত হয় না।

ভোগকাল। এই রোগ কখন কখন এক হইতে তিন বা অধিক দিন স্থায়ী হয়। যখন উপসর্গগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্হিত হয় তখন এই জ্বরকে একাধি জ্বর বলা যায়। অনেক স্থলে এই রোগ প্রবল হইলে টাইফস (জ্বর বিকার), নিউমোনিয়া, বাত ইত্যাদি রোগের সূত্রপাত হয়।

কারণ।—হঠাৎ ঋতু পরিবর্তন, আর্দ্র বস্ত্র বা আবাস ভূমি, নিকৃষ্ট বা অল্প খাদ্য বা অতিরিক্ত ভোজন, মদ্যপান, আঘাত, জ্বরবিকারের মূল বীজ সঞ্চার, মানসিক বা শারীরিক ক্লান্তি বা উত্তেজনা।

চিকিৎসা।—ক্যাম্ফর—হঠাৎ শীতানুভব, কশ্ম, আলস্য, এবং শরীরের অসুস্থতা। দুই ফোটা ক্যাম্ফর অল্প চিনির সহিত ১৫ মিনিট অন্তর তিন বা চারি বার।

একোনাইট—পর্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতা অনুভব, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র, হাঁচি ইত্যাদি। একমাত্রা দুই ষণ্টা অন্তর, কিন্তু রোগ কঠিন হইলে বে পর্য্যন্ত গাত্র আর্দ্র ও নাড়ীস্পন্দন অপেক্ষাকৃত মন্দ না হয়, সে পর্য্যন্ত ৩০ বা ৪০ মিনিট অন্তর।

বেলেডোনা—যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখ, চিত্ত বিভ্রম, চক্ষু ভয়জনক ও ফিপের ন্যায়; শব্দে (রগে) রক্তাশয়ের স্পন্দন, অনিদ্রা, রাত্রে প্রলাপ বা অন্য প্রকার মস্তক রোগের উপসর্গ। এই ঔষধ একোনাইটের পর বা উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া ঘাইতে পারে।

‘আসেনিনক’—কঠিন ও বহুক্ষণ স্থায়ী জ্বর ও অত্যন্ত দৌর্বল্য, বিশেষতঃ যখন এই সকল উপসর্গ সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয় কিম্বা যখন দুর্বল রোগীর এই পীড়া হয়।

যদি উপরোক্ত চিকিৎসায় রোগের প্রবলতা কমিয়া না আসিয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে ।

আনুষঙ্গিক ব্যাধি ।—বাহাতে অধিক আলোক, উত্তাপ, শব্দ, জনত অধিক বা পুরু বিছানার চাদর ইত্যাদি নিবন্ধন রোগী বিরক্ত না হয় বা বাহাতে রোগীর উত্তেজনা ও অনিদ্রা উপস্থিত হয় তাহা যত্নের সহিত পরিহার করা কৰ্ত্তব্য । ঘ্রোগের প্রারম্ভে দুটবাথ লইলে দেহ যত্নের কার্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভ হয় । শীতল জল অল্প পরিমাণে ও বারম্বার রোগীকে দেওয়া ভাল ।

## বিবিধ রোগ ।

অস্ত্রের ক্ষয়রোগ । .

• সংজ্ঞা ।—ক্ষয় কাশে যেরূপ কুস্মুসের মধ্যে পদার্থ বিশেষের সঞ্চায় হইয়া কুস্মুস বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পদার্থ অস্ত্রে সঞ্চিত হইয়া অস্ত্রক্ষয় রোগ উপস্থিত হয় । এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মাজনিত গ্রন্থি রোগ দেখা দেয় । সময়ে চিকিৎসা না হইলে অস্ত্র বিনষ্ট হইয়া রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয় ।

• উপসর্গ । ক্ষীত ও বিস্তার বিশিষ্ট উদর, অস্ত্রের শিথিলতা বা অনিয়মিত কার্য্য ; অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধ মল, অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মলের সহিত ত্যাপ, অস্ত্রে বেদনা নিবন্ধন রোগী পদদ্বয় উদরের দিকে আকৃষ্ট করে ; অন্নভাব ও আলস্য, পাণ্ডু ও শিথিল গাত্র, মুখের চিহ্নাবৃদ্ধ ও বুদ্ধভাব ; অনিয়মিত শ্রুধা, ক্ষয় জ্বর উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসাধ্য উদরাময়, অসহনীয় গিপাসা, অস্থিরতা ও অনিদ্রা দেখা দেয় । শরীর ভাঙ্গন্ত শীর্ণ হয় এবং রোগী অনেক স্থলে অনাহারে মৃত্যুপ্রাপ্তি পতিত হয় ।

চিকিৎসা ।—গণ্ডমালা রোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে এই রোগে সেই সকল ঔষধ বিশেষতঃ আইওডিয়ম, আমোনিয়াক, ক্যালকোপিয়াক্সা-কাস ও মনফর উপসর্গ দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত । .

চিকিৎসা প্রথমে আরম্ভ হইলে এবং বিজ্ঞতার সহিত চালাইলে আরোগ্যের আশা থাকে। এই রোগের চিকিৎসা ভার কেবল মাত্র একটী বিদ্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত করা কর্তব্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—খাদ্য পুষ্টিকর ও লঘুপাক হওয়া আবশ্যিক। টাটকা মাংস, ছাগীদুগ্ধ, সোডা ওয়াটার বা দুধের সহিত চুণের জল ও কডলিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। গরম কাপড় এবং উদরের চুর্দ্দিকে একখানি ফ্যানেল ব্যবহার করা আবশ্যিক।

—:~:~:~:—

### বোলাস্থি বিকৃতি। (Rickets.)

সংজ্ঞা।—এই রোগ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে উপস্থিত হয়। ইহাতে অস্থি বক্র ও উহার প্রান্ত ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, চাপ দিলে নড়ে এবং অবশেষে কঠিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হয় এবং অস্থি বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

উপসর্গ।—মস্তক, স্তন্য ও বক্ষের উপরিভাগে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং উদর ও নিম্নাস্ত্রের উত্তাপ ও শুষ্কভাব। শরীরের উপরিভাগে অধিক পরিমাণে রস সঞ্চার হয় এবং সামান্য পরিশ্রম করিলে বা অল্প উত্তাপ লাগিলে উহার এওঁদূর বৃদ্ধি হয় যে উহা দ্বারা উপাধান (বালিশ) ভিজিয়া যায়। শিশু রাত্রে ঠাণ্ডায় থাকিতে ভাল বাসে এবং স্নীত অধিক হইলেও গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। এই সকল উপসর্গ থাকিলে অস্থির বিকৃতির সূত্রপাত হয়। গাত্রের উপরিভাগে বেদনা নিবন্ধন নড়িতে অনিচ্ছা এই রোগের আর একটী উপসর্গ। শিশু একাকী থাকিতে ভাল বাসে, কেহ উহাকে স্পর্শ করিলে বা কোলে করিয়া নাচাইলে বিরক্ত হয় এবং স্থির হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে। রোগের বৃদ্ধি হইলে শিশু স্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং কেহ তাহাকে কোলে করিয়া লইতে আসিতেছে দেখিতে পাইলে কাঁদিতে থাকে। অত্যন্ত বলবতী ক্ষুধা উপস্থিত হয়, আহারের অব্যবহিত পরেই ভোজনেচ্ছা প্রবল হয় এবং অনেক সময় ভুক্ত দ্রব্য অজীর্ণবস্থায় মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কোষ্ঠ-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কখনও উহার শৈথিল্য এবং কখনও বা

উহার অবরোধ উপস্থিত হয়, বেগ দিয়া মলত্যাগ করিতে হয় এবং মল ভয়ানক চূর্ণক বিশিষ্ট হয় ও উহাতে আম দেখা দেয়। শিশু নিশ্বেজ হইয়া পড়ে, কৃশ হয় এবং খেলার জিনিষে মনোযোগ দেয় না। দিবসে তন্দ্রা এবং রাত্রে অস্থিরতা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

সচরাচর এই রোগ শিশুর বয়সের প্রথম বৎসরে দেখা দেয়। যে শিশুর কোন কঠিন রোগ হয় নাই বা বাহ্যতে কোন প্রকার ভ্রূত্বকৃতির (Idiocy) চিহ্ন লক্ষিত হয় না সেই শিশু যদি ১৮ মাস বয়সে হাঁটিয়া না বেড়ায় তাহা হইলে তাহার বালাস্থি বিকৃতি বা পক্ষাঘাত রোগ হইয়াছে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কারণ।—মাতার অসুস্থ ও দুর্বল দেহ এবং তন্নিবন্ধন স্তন্যদুগ্ধের দোষ, অনুপযুক্ত বা অনিয়মিত ভোজন, যে গৃহে ভালরূপ বায়ু চলাচল হয় না এরূপ গৃহে বাস, অর্জিতা, শীত, মলা, অল্প রোজ এবং ব্যায়ামাভাব।

ফল।—অস্থি কোমল ও বিকৃত হইলে শিশু অঙ্গ চালনা করিতে পারে না, বক্ষোদেশে অস্থি বিকৃতি থাকিলে শ্বাস-কৃচ্ছ উপস্থিত হয় এবং নিয়ত বসিয়া থাকে বলিয়া শিশুর উদর বিশেষতঃ যকৃত আকৃষ্ট হয়। কখন কখন প্রদাহ বিশিষ্ট অস্থি-কীর্ণি হয় ও উহাতে পু্র বা ক্ষয় দৃষ্ট হয়। পরিপাকশক্তি নিশ্বেজ হইয়া আইসে, কৃশতা এবং পরে ক্ষয় জর দেখা দেয়। ভাল চিকিৎসা হইলে যৌবনে অস্থিদোষ কাটিয়া যায়।

চিকিৎসা।—রোগের সমূলে উচ্ছেদ হওয়া আবশ্যিক। এই রোগ কঠিন হইলেও হুচিকিৎসা নিবন্ধন শীঘ্র ও সহজে আরোগ্য হইয়া যায়।

ফস্ফরিক এসিড।—অস্থি বিকৃতি, অঙ্গে বেদনা এবং অন্যান্য ক্ষয় প্রাপ্তির লক্ষণ।

সাইলিসিয়া।—ইহাতে মস্তকে ও বক্ষের উপরিভাগে রস সঞ্চার নিবারিত ও বেদনা দূরীভূত করে এবং কোমলাস্থি-বৃদ্ধির উপক্রম বিনষ্ট করিয়া দেয়।

কেল্‌ফস্‌।—এই ঔষধ শিশুকে ও তাহার মাতাকে খাওয়াইলে ক্ষয় ফল পাওয়া যায়। ইহাতে কেবল যে অস্থির কার্য নিয়মিত হয় তাহা নহে, দেহের বিভিন্ন উপর ইহার ক্রিয়া অতি চমৎকার।

এসাফিটেড।—অস্থির বিবৃদ্ধি, দেহক্ষীতি, গ্রন্থি-রোগ, গ্রন্থিক্ষীতি-নিবন্ধন শিশুর কদাকার, পীড়িতস্থানে ভয়ানক বেদনা ও পরে অবশ্যভাবে, বস্ত্রপরিধান করিতে হইবে বুঝিতে পারিলে শিশু কাঁদিয়া উঠে, ক্ষত ডব্বণ ও কষ্টদায়ক, রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ।

ফস্ফরস।—মেরুদণ্ডের বিকৃতির পর পক্ষাঘাত, উরু সন্ধির রোগ ও উহা হইতে জলবৎ পুয়শ্রাব, রাত্রে বা সামান্য স্পর্শ করিলে মস্তকে অস্থিবেদনা, নিষ্পিষ্ট হইবার পর গ্রন্থির বৃদ্ধি, হস্তপদ অবশ্য ও বিকৃত, পাবরকের ন্যায় ঠাণ্ডা, সহজে মুছা।

সলফর।—কপাল সহজে ও শীঘ্র সমতল হয় না; পাণ্ডুবর্ণ ও কৃষ্ণবদন, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট ও উহার চতুর্পার্শ্বে নীলিমা; গ্রন্থি-রোগ বিশিষ্ট শিশুর উদরাময়; অস্ত্রের ভিতর কিছু থাকেনা বলিয়া বোধ; পার্শ্বপরিবর্তন করিবার সময় মেরুদণ্ডের একখানি ক্ষুদ্র অস্থির উপর দিয়া আর একখানি ক্ষুদ্র অস্থি চলিয়া যাইতেছে বলিয়া অনুভব; পৃষ্ঠদেশে দেহ অবনত করিলে মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্রাস্থিতে শব্দ; মেরুদণ্ড বক্রতা ও উহার ক্ষুদ্রাস্থির কোমলতা; গ্রন্থি ক্ষীতি, কাঠিন্য বা পুয় সঞ্চার।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—শিশুর পল্লীগ্রামে থাকা উচিত। কেন না তথার বায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর এবং রৌদ্র অধিক। শিশুকে বাহিরে ভ্রমণ করান ভাল। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগের শীঘ্র প্রতিকার হয়। রোগী বেড়াইতে অশক্তি হইলে উহাকে গরম কাপড় পরাইয়া দিবসের উপযুক্ত সময়ে বাহিরে বসাইয়া বা ভ্রমাইয়া রাখা আবশ্যিক। রোগী গৃহের আবদ্ধ বায়ু অস্বাস্থ্যকর। লবনাক্ত উষ্ণ বা শীতলজলে হইতে ১০ মিনিট কাল প্রতিদিন স্নান করান ভাল। আবশ্যিক বোধ হইলে সন্ধ্যাকালে ও স্নান করান যাইতে পারে। স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দিয়া ভর্জ করিয়া গাত্রমর্দন করা আবশ্যিক। উত্তম বায়ু চলাচল বিশিষ্ট শয্যাগৃহ, পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যিক। খাদ্য হৃদয়রূপে, চর্বিতে হওয়া কদব্য। শিশু চর্জন করিতে অশক্তি হইলে খাদ্য খণ্ডে ফেলিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খাওয়ান উচিত। দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল ব্যবস্থের। কডলিভার তেল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। কডলিভার তেল প্রথমে

৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া পরে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করি দিবে। মলে কডলিভার অয়েলের বর্ণ বা গন্ধ থাকিলে উহার মাত্রা কম করিয়া দেওয়া উচিত

## উরুসন্ধির গ্রন্থি রোগ ।

### (Scrofulous disease of the hip joint)

সংজ্ঞা।—উরুসন্ধির নিঃস্থিত শৈথিল্যিক বিল্লী, পেশী ও অস্থির আবরণের রোগ নিবন্ধন উরুসন্ধির বা উরুসন্ধির গ্রন্থি প্রদাহ ।

উপসর্গ।—বেড়াইতে গেলে অল্প বেদনা বোধ ও খুঁড়াইয়া হাঁটা এবং পীড়িত অস্থির উপর সমস্ত দেহের চাপ রাখিতে অনিচ্ছা। এই অবস্থায় সচরাচর জানুদেশে বেদনা অনুভূত হয়। কখন কখন জানু অল্প ক্ষীত হয় এবং প্রকৃত রোগ সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। জানুর নমনীয়তা উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকালে জ্বরভাব ও অস্থিরতা এবং রাত্রে উরুদেশে টান অনুভূত হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থঞ্জতা স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং পীড়িত পদ শু নীতস্থ ক্লশ ও শিথিল হইয়া পড়ে। উরু সন্ধিস্থ পেশীর ক্ষত স্কার ও বিনাশ বা উহাতে অস্থিময় নিবন্ধন পদের দৈর্ঘ্য কমিয়া আইসে এবং অবশেষে উরুসন্ধির বিচ্যুতি ঘটে রাত্রে পীড়িত অঙ্গে ভার বোধ ও বেদনা এবং নিদ্রাকালে পদের সহসা বেগে কম্পন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্ফোটক আবির্ভূত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং কখন কখন পুয় সরলান্ত দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। পীড়িত পার্শ্বের নিত্যস্থের রক্ততা উরুসন্ধি রোগের একটি প্রথম উপসর্গ।

এই রোগ দুই বা তিন মাস কাল হইতে অনেক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু হুচিকিংসা হইলে রোগ আরাম হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

চিকিৎসা।—একোনাইট।—রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়িলে একোনাইটে বিশেষ উপকার হয়। জ্বর থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

বেলেডোনা।—রোগের প্রথম অবস্থায় বেদনা বোধ হইলে।

ক্যালকেরিয়া কাব।—দ্বিতীয়াবস্থায় পুয়স্কারের উপক্রম হইলে।



কলোসিসিস্ ।—রোগের সঙ্গে স্নায়ুবেদনা থাকিলে ।

মাকু'রিয়স কর ।—রোগীর বর্ণ পীতভা হইলে এবং উপদংশ দোষ থাকিলে ।

সাইলিসিয়া ।—অস্থিতে ক্ষয় সঞ্চার উপস্থিত হইলে ।

সলফর ।—বহুদিন স্থায়ী রোগে অশ্রান্ত ঔষধের সহিত এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।

আসেনিক ।—তৃতীয়াবস্থা, বেদনা গুল্ফ সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ।

চায়না ।—প্রচুর পুয় সঞ্চার, বর্ষা, উদরাময় এবং উরুর অভ্যন্তরস্থ অস্থির বেদনা হইলে ।

হিপার সলফর ।—মাকু'রিয়স ব্যবহারে পুয় সঞ্চার নিবারিত না হইলে ।

নাইট্রিক-এসিড ।—পারদ ব্যবহার জনিত বাত বেদনা, অস্থির আব-  
রণের রোগ ও অস্থিক্ষয়, দুর্গন্ধময় ক্ষত ।

ফসফরস ।—নালী ক্ষত এবং উহা হইতে জলবৎ ও দুর্গন্ধ পুয়স্রাব,  
জ্বর, শুষ্ক কাশী ও মূত্র ঘোলা ।

রপ্তজ্ঞ । রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় উরুসন্ধিতে বেদনা উপস্থিত  
হইলে খোঁড়াইয়া হাঁটা, পদবিক্ষেপ করিতে গেলে আকুঞ্চন অনুভব ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ।—বিশ্রাম ; পীড়িত অঙ্গ সরল ভাবে রাখা এবং  
বাহ্যতে সন্ধিতে কোনরূপ চাপ না পড়ে একরূপ করা ; পৃষ্টিকর খাদ্য এবং  
কডলিভার অয়েল ; নিম্নলিখিত বিশেষতঃ সমুদ্র তাঁরবর্তী বায়ু সেবনে রোগের  
শীঘ্র প্রতিকার হয় । স্ফোটক হইতে পুয়স্রাব আরম্ভ হইলে দুর্গন্ধ নিবারণ  
করিবার জন্য কার্বলিক অয়েল ব্যবহার করা উচিত ।

### মেরুদণ্ডের বিদার ।

সংজ্ঞা ।—এই রোগে মেরুদণ্ডের গাত্রে বিদার এবং উহাতে মেরুদণ্ডের  
অভ্যন্তরস্থ স্নায়্বিক ঝিল্লী এক স্থানে অধক পরিমাণে সঞ্চিত হয় ।

উপসর্গ ।—পৃষ্ঠের পীড়িত স্থানে একটী অর্কুদ । অর্কুদ কখন কখন  
একখানি পাতলা চর্মে আবৃত থাকে এবং উহার ভিতরে বাহির হইতে জল-

বৎ পদার্থ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। কখনও বা অর্কুদুটী নীলাভ হয় এবং নিয়ত রক্তাশু ক্ষরণ নিবন্ধন সর্কদা আর্জ থাকে। পরীক্ষা করিলে মেরুদণ্ডের পাত্তের ছিদ্রটী সহজে অনুভব করিতে পারা যায় এবং চাপিলে উহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সরিয়া যায়। এই রোগের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্তের পক্ষাঘাত, মূত্রাবরোধ, অনিচ্ছা প্রবৃত্ত মল নিঃসরণ ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়ই দেখা দেয়।

কারণ।—এই রোগ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ শৈল্পিক ঝিল্লির শোথ (যাহা ভূমিষ্ট হইবার পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে) বা অস্থির বৃদ্ধি নিবারণ নিবন্ধন উপস্থিত হয়। যখন অর্কুদুটী ছোট থাকে ও বাড়ে না কিম্বা যখন ইহার একটী সন্ধ ও পাচলা বোঁটা থাকে তখন ইহা আরোগ্য করা সম্ভব। কখন কখন বৃহৎ ও বন্ধনশীল অর্কুদও আরাম হইয়া যায় কিন্তু সচরাচর এই রোগের ফল মৃত্যু।

চিকিৎসা।—যখন শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অর্কুদে ক্ষত সন্ধার হইবার উপক্রম না হয় তখন উহার উপর একখানি প্যাড (ছোট তুলনার পাদি) এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত যাহাতে অর্কুদের অভ্যন্তরে চাপ না পড়ে, অর্কুদের বোঁটা থাকিলে অর্কুদের চতুঃপাশে আস্তে ও যাহাতে চাপ না পড়ে এইরূপ করিয়া একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিতে হয়। যখন আক্ষেপ বা ক্ষত সন্ধার উপস্থিত হয় তখন চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসকে হস্তে ন্যস্ত করা কর্তব্য। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ও অর্কুদুটীর মধ্যে একটী সন্ধীর্ণ ব্যবধান থাকিলে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা অর্কুদুটী উঠাইয়া লইলে উপকার হয়। কখন কখন অর্কুদের মধ্যস্থিত তন্তুল পদার্থ অস্ত্র সাহায্যে বহিষ্কৃত করিয়া এপিস বা আইওডাইন উহার তিতর প্রক্ষিপ্ত করিলে উপকার হয়।

ঔষধ।—কেলকেরিয়া কার্ব বা কেলকেরিয়া ফস ব্যবহারে অস্থির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

এপিস।—এই ঔষধের অভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে অর্কুদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ অন্তর্হিত হয়।

**মেরুদণ্ডের বক্রতা ( Lateral curvature of the spine )**

সংজ্ঞা।—কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ মেরুদণ্ডের বক্রতা। এই বক্রতা সচরাচর মেরুদণ্ডের বাম পাশে লক্ষিত হয়।

১০ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কাল মধ্যে এই রোগ উপস্থিত হয়। মপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যখন মেরুদণ্ডের কাঠিন্য উপস্থিত হয় তখন এই রোগ আর বৃদ্ধি পায় না। সত্য, কিন্তু এরূপ অবস্থায় চিকিৎসা করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না।

বাল্যস্থিবিকৃতি ও এই রোগের মধ্যে যে যে প্রভেদ তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

### মেরুদণ্ডের বক্রতা।

১। ১০ হইতে ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে এই রোগ উপস্থিত হয়।

২। সচরাচর বালিকার এই পীড়া হয়।

৩। ধনী লোক দিগের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

৪। রোগ হঠাৎ কোন আকস্মিক কারণে উপস্থিত হয় এবং সচরাচর অন্যান্য বিবরে রোগীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। কেবল মেরুদণ্ডের স্থান বিশেষে বক্রতা উপস্থিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পঞ্জর ও ক্ষুদ্রাঙ্গির বিকৃতি দৃষ্ট হয়।

৬। মেরুদণ্ডের দুই দুই অঙ্গির মধ্যে যে সকল কোমলাস্থি থাকে তাহা পীড়িত হয় এবং দেহকাণ্ড (গলদেশ হইতে জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত অংশ) ধর্ম ও প্রশস্ত হয় কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থানে অস্থি পীড়া দৃষ্ট হয় না।

### বাল্যস্থিবিকৃতি।

১। অল্প বয়স্ক শিশুরই এই রোগ হয়।

২। বালক ও বালিকা উভয়েরই এই পীড়া হয়।

৩। দরিদ্র লোক দিগের মধ্যে এই রোগ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

৪। এই রোগের সমস্ত সমস্ত দেহের উপর বিস্তৃত হয় এবং ইহা সচরাচর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে উপস্থিত হয়।

৫। মেরুদণ্ডের সমস্ত অস্থি বক্রতা বা পক্ষাঙ্গ বা রোগাক্রান্ত হয় এবং অধিকাংশ স্থলে মেরুদণ্ডের বক্রতা থাকে না। কেবল মাত্র পদদ্বয়ের বিকৃতি উপস্থিত হয়।

৬। এই রোগগ্রস্ত শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্মাকৃতি হয়, উহার মস্তক ও দেহকাণ্ড বড়, উরুমাংস সংকীর্ণ এবং পদদ্বয় ধর্ম হইয়া আসে।

কারণ। দক্ষিণ পদ সরল ভাবে ও বাম পদ বক্র ভাবে (ক্রীড়াধাক্ষের প্রতিমূর্তির ন্যায়) স্থাপন, যে সকল কার্যে দেহের এক পার্শ্বের নিয়ত অধিক ব্যবহার হয় সেই সকল কার্য, সমগ্র ভাবে শয়ন বা উপবেশন না করা ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। এক পদ অল্প পদ অপেক্ষা বর্ধিত হইলে ক্রমিক পদের সাহায্য ব্যতীত চলন, উত্থান ও বসন, পদের বাত বা পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতেও মোক্ষদণ্ডের বক্রতা উপস্থিত হয়।

উপসর্গ। মোক্ষদণ্ডের বক্রতা, কটদেশ ও দেহকাণ্ডে বর্ধিত ও প্রশস্ত এবং হস্তপদাদির মধ্যে কোনটা দীর্ঘ এবং কোনটা বা বর্ধিত হয়। দেহ সমগ্র ভাবে রাখিলে বক্রাভান কমিয়া যায়, কিন্তু উহা এক পার্শ্ব আনত করিলে বক্রতা বৃদ্ধি পায়। একটী স্বক বা বকের এক পার্শ্ব বাহিব হইয়া আইনী, দক্ষিণ স্বক ও বকের দক্ষিণভাগ উন্নত ও গোলাকার হয় এবং বাম স্বক ও বকের বাম ভাগ বাহিয়া যায়।

চিকিৎসা। যে সকল কারণে এই রোগ উপস্থিত হয় তাহা পরিহার।

অস্থি বিকৃতি, কটিনা বা ক্রান্তি থাকিলে কামো-কাম ; অস্থিতে বেদনা বা পুণ্ড থাকিলে এবং একটী অস্থি দ্বারা সাহিত অপর একটা অস্থি বন্ধ নিমিত্ত না হইলে কাম-কাম অস্থি-কাম থাকিলে বা অস্থি উত্তীর্ণ উপর আঘাত লাগিলে এমিড-কাম ; মোক্ষদণ্ডের বক্রতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্র কামালের অস্থি-অস্থি বিকৃতি, অস্থি-উত্তীর্ণ বেদনা ও শীতল জল লাগিয়া অস্থি-বেদনা হইলে পদ ; অস্থি প্রবাহ, ক্রান্ত, ক্রান্ত বা ক্রান্ত উপস্থিত হইলে সাইনি ; মোক্ষদণ্ডের ক্রান্ত অস্থি-অস্থি থাকিলে এবং মাংস অস্থি হইতে খসিয়া পড়িতেছে বোধ হইলে রদ ও অস্থি বক্রতা লক্ষণে সাহিত পীড়িত অংশ বস্তুর দ্বারা আবৃত করিলে বক্রতা দূর হইলে মলকর ব্যবস্থায়। পীড়িত স্থানের উপর রমটেক বা আর্থিকার লোসন বা লিনিমেন্ট ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

আয়ুর্ষস্কি ব্যবস্থা।—লব্ধপাক পুষ্টিগর খাদ্য, কডলিভার অয়েল, নির্মূল বায়, শীতল (প্রথমে উষ্ণ করিয়া) লবণাক্ত জলে স্থান বা বেগে গাত্রমর্দন, মাহুরের উপর শয়ন, প্রাতঃস্থান এবং অধিক রাত্রে শয়ন না করা, উষ্ণ, সঙ্কটাজনক ও লঘু পরিবেশ এবং কমা জুতা বা পোষাক ব্যবহার না করা।



# হানিম্যান হোম ।

২।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই ঔষধালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন যে, এখানে যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহাদের ন্যায় বিশুদ্ধ ঔষধ ভারতের অন্য কোন ঔষধালয়ে পাওয়া যায় না। কেন না সমস্ত ডাইলিউসনই ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্মানির প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। বিশুদ্ধ প্রণালীতে ডাইলিউসন প্রস্তুত করিতে গেলে যেরূপ বিশেষ আয়োজনের আবশ্যকতা, সেরূপ আয়োজন এখানকার কোন ঔষধালয়ে নাই বলিলেই হয় অথচ বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত ডাইলিউসন না মিলিলে রোগ-চিকিৎসায় পূর্ণ মাত্রায় ফল পাওয়া সম্ভব নহে। একে অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ এক প্রকার, তাহার উপর ঔষধ বিশুদ্ধ না হইলে বা উহার ডাইলিউসন বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত না হইলে যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাহা ভাল চিকিৎসক মাঝেই অবগত জ্ঞাছেন। কিন্তু আজ কাল কতিপয় অশিক্ষিত, কৰ্তব্যজ্ঞানশূন্য ও ধর্মভয় রহিত লোকের হস্তে পড়িয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ দুর্দশা ঘটিয়াছে। আর্ড ও ঔষধকারপূর্ণ ঔষধালয় গৃহে ঔষধ রক্ষা, জল মিশ্রিত বা অপকৃষ্ট এলকোহল, বৃহদিনের পুরাতন ঔষধ বা উপযুক্ত ঔষধের পরিবর্তে অপর একটি ঔষধ লইয়া ডাইলিউসন প্রস্তুত করণ, অশিক্ষিত ও কৰ্তব্যজ্ঞানশূন্য সূত্রাং অজ্ঞবেতন লোকের হস্তে ডাইলিউসন প্রস্তুতকরণের ভারার্পণ, সচ্ছন্দ কর্ক ও নিকট শিশি যাহাতে বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে ইত্যাদি যে সকল কারণে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্রোষ ঘটিতে পারে এই সকল লোকের মিকট তাহা সমস্তই পাওয়া যায়। যাহাদের ঔষধালয়ে শুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় হয় তাহারা সচরাচর প্রায় এই প্রণালীর লোক। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ ঔষধ ব্যবহারেও উপকার হয়। শকি কি কারণে উপকার হয় তাহা না জানিয়া তাঁহার। এরূপ বলেন ইহা অনেকের

বিধাস। ' কেননা তাহা না হইলে হোমিওপ্যাথির ফার্মাকোপিয়াগুলি অধি-  
সংযোগে ভয়সাম্য করিতে হয়।

জগতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রস্তুত ডাইলিউশন আনয়ন  
বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও সাধারণের সুবিধার্থ নিম্নলিখিত হারে ঔষধের মূল্য  
নির্দিষ্ট হইল।

## সাধারণ মূল্য।

ঔষধ	১ ড্রাম	২ ড্রাম	৪ ড্রাম	১ আউন্স
আরক ও বটিকা				
১২শ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত	১/০	৥০	৮০	১/
১২শ ডাইলিউশন (দুপ্রাপ্য)	১/০	৥০	১/	১৥০
৩০শ ডাইলিউশন	৥০	৮০	১/০	১৮০
উচ্চ ডাইলিউশন	১৥০	১/	৩/	৪/
মূল আরক (মাদার টিংচার)	৥০	৮০	১/০	১৮০
১২শ ডাইলিউশন (দুপ্রাপ্য)	৥০	১/	১৥০	২/
চূর্ণ ৬ ক্রম পর্য্যন্ত	৥০	৮০	১/০	১৮০
৩০শ ডাইলিউশন	৥০	১/	১৥০	২/
বাহ্য ঔষধ			১/	১৥০
কপূরের আরক			৮০	১/

## বিশেষ মূল্য।

(চিকিৎসক ও বাহারি পিনামূল্যে ঔষধ দেন তাহারের জন্ত)

ঔষধ	১ ড্রাম	২ ড্রাম	৪ ড্রাম	১ আউন্স
আরক ও বটিকা				
১২শ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত	১/০	১/০	১৥০	১/
১২শ ডাইলিউশন (দুপ্রাপ্য)	১/০	৥০	৮০	১/০
৩০শ ডাইলিউশন	১/০	৥০	৮০	১/০
উচ্চ ডাইলিউশন	১/	১৥০	২৥০	৪/
মূল আরক (মাদার টিংচার)	১/০	১৥০	১/	১৥০
ক্রৈ ক্রৈ (দুপ্রাপ্য)	৥০	৮০	১/০	১৮০
চূর্ণ ৬ষ্ঠ ক্রম পর্য্যন্ত	৥০	৮০	১/০	২/
৩০শ ডাইলিউশন	১/০	৥০	৮০	১/০
বাহ্য ঔষধ			১/	১৥০
কপূরের আরক			৥০	৮০

কতকগুলি ঔষধের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক।

ওলাউঠা চিকিৎসার বাক্স ।

১ নং	১২	১ ড্রাম ঔষধপূর্ণ শিশি ও বাক্স (মেহগ্নি)	৪৥০
২ নং	২৪	" " " "	৭৥০
৩ নং	৩০	" " " "	৯৥০
৪ নং	৬০	" " " "	১৬/

গাংহুয়া চিকিৎসার বাক্স ।

১ নং	১২	১ ড্রাম ঔষধপূর্ণ শিশি ও বাক্স (মেহগ্নি)	৪৥০
২ নং	২৪	" " " "	৭৥০
৩ নং	৬০	" " " "	১৬/
৪ নং	১০৪	" " " ও ৬টা বাহু ঔষধ	৩৭/
৫ নং	১৫০	" " " "	৪৮/

ক্রেতার সুবিধা ও ইচ্ছামত ভিন্ন প্রকারের বাক্সও বিক্রীত হয় ।

পুস্তক ।

গাংহুয়া ব্যাবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা, ডাক্তারীকৃত মিত্র প্রণীত ।

ডিম ই চ পেজী প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । এরূপ উৎকৃষ্ট শিশু-  
চিকিৎসা পুস্তক বঙ্গভাষায় নাই ... ২৥০

হ্যুনিমান-তত্ত্ব বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা । রয়েল ১২ পেজী  
প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সমস্ত  
জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে (যন্ত্রস্থ) ২৥০

ওলাউঠা চিকিৎসা ... ১/০

বিস্ট্রিকা চিকিৎসা, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কৃত ... ১১/০

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা, শ্রীচরিত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কৃত ৫৥০

ডাক্তারী অভিধান, শ্রীচরিত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কৃত ... ১৥০

সর্বপ্রকার দাঙ্গালা ও ইংরাজী হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বিক্রীত হয় ।

বিবিধ দ্রব্য ।

নিম্নলিখিত দ্রব্যের মূল্য বাজারের ভাড়াহুসারে কখন কখন কম বেশী হয়  
রক-টিপি ও টাইপ, কর্কের উপর ঔষধের নাম ছাপিবার জন্ত ২/ হইতে ৬/



বক্স উডকেস—কপূরের আরক. রাখিবার জন্য কাচের ছিপযুক্ত					
শিশির সহিত, অর্ধ আউন্স ১, এক আউন্স	...				২১
হানিমানের মূর্তি	...				৫১
ব্রেস্ট-রিলিভার ( স্তন হইতে দুধ গালিবার জন্য )	...				৫০
ভূমি	...	...		...	।০
কার্ডবোর্ড কেস	১ ড্রাম	ডজন	।০	গ্রোস	২১
	২ ”	”	।/০	”	২১০
	৪ ”	”	।/০	”	৩১
	১ আউন্স	”	।০	”	৪১
কর্ক, উৎকৃষ্ট, ১, ২ ডাম	”	”	২/০	”	১১০
	২, ১, ২ আউন্স	”	।০	”	১৫০
	৪, ৬, ৮ ”	”	।০	”	২১
পাইন্ট বোতল	”	”	।০	”	২১০
ফোয়ার্ট	”	”	।০	”	৩১
কাষ্ঠ নির্মিত কেস, ১ ও ২ ড্রাম	”	”	।০	”	৩১৫
ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ( পরিশ্রুত জল ) বোতল					।০
ড্রপকণ্ডের ( ফোটা ফেলিবার যন্ত্র )	১/০	ডজন			৫০
ড্রপ টিউব ( কাচ ও রবার )	।০	ডজন			২১০
এনিমা সিরিঞ্জ ( রবারের পিচকারী )				”	১৫০
আইবাথ ( চক্ষুতে ঔষধ লাগাইবার জন্য )	...				।০
ফিডিংকপ ( রোগীকে দুগ্ধাদি খাওয়াইবার জন্য )	...				৫০
ফনেল ( কাঁপা ) কাচ নির্মিত	।০, ১০	...			১১
বটিকা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, ১ আউন্স	।০, ২ আ: ১০	৬ আ: ১০	পাউণ্ড		২১০
গ্লিসেরিন, ১ আউন্স	।০, ১ পাউণ্ড	...			১১০
গটাপাচ	১ আউন্স	...			১১
আইস ব্যাগ ( মাথায় ও অন্যান্য স্থানে বরফ বসাইবার জন্য )					৬১
লিফ্ট-প্রতি কুট	।০, গজ	...			১১০
মিনিম গ্লাস, ১ ড্রাম	।০, ২ ড্রাম	...			১০

## বিবিধ দ্রবোর মূল্য ।

মেসার গ্লাস, ১ আউন্স ১০, ২ আউন্স	...	...	১০
খল (কাচ নির্মিত) ১০ হইতে	...	...	৪
মেডিসিন (ঔষধ খাইবার) গ্লাস, মাপ চিহ্নিত, ১০ হইতে	...	...	১০
মেডিসিন বোতল ও গ্লাস (গ্লাস ও বোতল মাপ চিহ্নযুক্ত)	...	...	২
অলিভ অয়েল, ১ আউন্স	...	...	১০
পিলবাক্স, ডজন ১০, গ্রেস	...	...	৫১০
পিল টাইল,	...	...	১
ফেল (নির্মিত), ২ হইতে	...	...	১০
স্প্যাচুলা (ঔষধ মিশ্রিত করিবার দণ্ড)	...	...	১০
চামচ, ছাণ্ডেলযুক্ত, কাচের ১০ হইতে	...	...	১
“ “ টানের ১০	...	...	১০
“ ছাণ্ডেল বিহীন, কাচের, মাপ চিহ্নিত	...	...	১০
“ “ টানের	...	...	১০
“ ডেকট, (হস্তিদস্ত নির্মিত) বটিকা ও চূর্ণ তুলিবার জন্য,	...	...	১
“ “ ধাতু নির্মিত	...	...	১০
ষ্টেখসকোপ (বুক পরীক্ষা করিবার যন্ত্র)	...	...	১
বিবিধ প্রকার ১ হইতে	...	...	৬
দ্রব শর্করা (সুগার অত মিশ্র), ১ আউন্স ১০, ১ পাউণ্ড	...	...	২১০
পিচকারী, স্ত্রী ও পুরুষের উপযোগী, রবারের মুখ (সাধারণ) ১০, উৎকৃষ্ট ১	...	...	১০
“ “ কাচের ১০ হইতে	...	...	১০
“ কান ধুইবার জন্য	...	...	১০
“ চশমার নিম্নে ঔষধ প্রক্ষিপ্ত করিবার জন্য ৪ হইতে	...	...	৮
“ থার্ম মিটার (তাপমান যন্ত্র), হিঙ্গের, সাধারণ	...	...	২
“ “ ম্যাক্সিমফাইং	...	...	৪
“ “ এক মিনিট, সাধারণ	...	...	৩১০
“ “ ম্যাক্সিমফাইং	...	...	৬
“ “ সমস্ত গুল কেবল	...	...	৬
“ “ যে স্থানে পারা উঠে তাহা বর্ণ বিহীন	...	...	৪
“ দেখিতে ষড়ীর ন্যায়, বোপ্য নির্মিত কেস,	...	...	১৮
“ “ স্বর্ণ নির্মিত কেস,	...	...	৪০
ইউরিনোমিটার ও মাপের গ্লাস (মূত্রের ভার পরীক্ষার জন্য)	...	...	৫
পকেট কেস (চন্দ্র নির্মিত)	...	...	৫
১২ টী	১ ড্রাম	শিশির	৪
২৭ টী	“	“	৫১০
৩৬ টী	“	“	৬১০
১২ টী	২ ড্রাম	“	৫
২৪ টী	“	“	৬১০

১২ টী	টিউবের			৩৯০
২৪ টী	"			৪৮
৩৬ টী	"			৪৯০
৩০ টী	"			৬৯০
শিশি মোল্ডেড (সাধারণ)				
১ ও ২	ড্রাম,	ডজন	১/০	গ্রোস ৩৮
৪	"	"	৪/০	" ৫৮
১	অর্ডিনাল	"	৪/০	" ৬৮
২	"	"	৮/০	" ৭৮
৪, ৬ ও ৮ গ্রাঃ	"	"	৮/০	" ৮৮
" মোল্ডেড (উৎকৃষ্ট)				
১	অর্ডিনাল,	ডজন	১/৮	গ্রোস ১০৮
২	"	"	১১/০	" ১৫৮
৪	"	"	২/৮	" ২০৮
৬	"	"	২/১০	" ২৫৮
" আমেরিকান টিউব—				
১	ড্রাম	ডজন	১০/০	গ্রোস ৪৮
২	"	"	১০/০	" ৫৮
" বিলাতী টিউব				
১	ড্রাম	ডজন	১১/০	" ৭৮
২	"	"	৮/০	" ৮৮
" কাচের হিপিস্ক, টিউব—				
১	ড্রাম	১ টী	১০/০	ডজন ৪৯০
২	"	"	১/০	" ৫৯০
৪	"	"	১	" ১০৮
১	অর্ডিনাল	"	১/০	" ১৪৮
" কাচের হিপিস্ক				
১	ড্রাম	১ টী	১/০	" ২১০
২	"	"	১/০	" ২১০
১	"	"	১/৮	" ৩১০
১	অর্ডিনাল	"	১০/০	" ৪৮
" গট্টা পার্চা মিশ্রিত, গ্রেড ১, ১০ গ্রাঃ ১১০, ১৫গ্রাঃ ১১০ ২৫গ্রাঃ ২৮				
টিউব, মবিউল রাখিবার, কর্ক সমেত				
এক্ মার্কা	ডজন	১/০	গ্রোস	৫৮
জি	"	১/০	"	৫৮
এল	"	১/০	"	৩৮
স্মাই	"	১০/০	"	৪৯০
কে	"	১০/০	"	৪৯০
শিশির চর্ক নিশ্চিত কেস—				
২	ড্রামের	১ টী	১০/০	ডজন ৪৮
৪	"	"	১০/০	" ৫৮

## ভূমিকা ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আমি বহু ভ্রমণে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ও গৃহ চিকিৎসাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছি। বহুকাল হইতে দিন দরিদ্র রোগাক্রান্তদিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এবিধ উপায়েও সর্বজননের পথ নিত্যস্ত দুর্গম ভাবিয়া সংপ্রতি গৃহ মুষ্টিযোগ চিকিৎসা সংগ্রহ নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। বঙ্গদেশের লোক যেন রোগে পীড়িত তদ্বিধান জ্ঞাত বনাজি ঔষধাদিতে যদি রোগ দূর হয়, তবে ভিষকের নিশ্চয়ো-জন। এতদ্বারা গৃহী মাত্রের কথঞ্চিৎ ফল লাভ হইলেই নিজকো-কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। আর ইহার আশ্রয়চ বাদে বক্রী ঐশ্বরিক কার্যাদিতে ব্যবহৃত হইবে।

## শ্রীহরিমোহন বসাক।

মুষ্টিযোগ ঔষধ ও পাচনাদির মাত্রা যত রকম হউকনা কেন ৬৮৭২৭৩নং বাতীত সমস্তই পূর্ণ মাত্রা জানিবেন ইহার মধ্যে পাচন মাত্রাই মোট ২ তোলা কুটিয়া নূতন হাড়িতে প্রাষ্ট ১৥ সের জলে জাল দিয়া শেষ ১০ গোয়া নামাইয়া বজ্রদ্বারা ছাকিয়া প্রাতে সেবন, পুনরায় উক্ত ছাকাকে ১ জলে এক ছটাক নামাইয়া বৈকালে সেবন। কোষ্ট পরিকারী না হইলে ঐ পাচন-সহ হরীতকী ১০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত উক্ত পাচনসহ জাল দিয়া সেবা, ইহাতেও যদি ভাঙ্গুপ কোষ্ট না হয় তবে কাষ্ট্রেল ১ তোলা হইতে ১ তোলা উক্ত পাচনসহ সেবন, কোষ্ট পরিকার হইলে আর রেচক না দিয়া রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল মুষ্টিযোগ ঔষধ ও পাচন সেবন করিবেক। আর প্রক্ষেপের মাত্রা সামান্য দিবসে দুইবার, রোগ বিশেষ ৩। ৪ বার। ওলাউঠা রোগে অবস্থা বিশেষ ঘন ঘন সেবন করিবেক। বাহ্য প্রয়োগের মাত্রা লিখা গেল না বেশী কমে কোন ক্ষতিজনক নহে।

## সৃষ্টি পত্র।

১। মেহের অর উৎ- পত্তির কারণ।	৩৩। বাতরক্ত।	৬৪। বাধকবন্ধা, মৃত- বংগা অকালে এসব না হওয়া। [রণ।
২। অর হইবার পূর্বে কিভাবে হইয়া থাকে।	৩৪। হাত পা জ্বালা।	৬৫। গর্ভদোষ নিবা- ৬৬। গর্ভিণীর অর।
৩। বাতঅর।	৩৫। কুষ্ঠ।	৬৭। এসব বেদনা।
৪। পিত্তঅর।	৩৬। দাউদ, বিখাউজ।	৬৮। শিশুর অশোচ যেরে রং ধরা।
৫। কফঅর।	৩৭। আমবাত।	৬৯। সৃতিক। রোগা- ধিকার।
৬। বাতপিত্তঅর।	৩৮। অম্লপিত্ত।	৭০। স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইলে।
৭। পিত্তশ্লেষ্মাঅর।	৩৯। পিত্তশূল।	৭১। স্তনের দুগ্ধ জো- রারিলে। [তাগ।
৮। বাতশ্লেষ্মাঅর।	৪০। হৃদরোগ।	৭২। শিশুর শয্যার মূত্র ৭৩। শিশুর দস্ত উঠার সময় পেটের পীড়া ও অর।
৯। সন্নিপাতঅর।	৪১। প্রমেহ।	৭৪। সর্প প্রকার কীট- দি দংশন।
১০। বিষমূত্র।	৪২। স্বপ্নদোষ।	৭৫। সর্প, শিয়াল ও কু- কুর দংশন। [বারণ।
১১। গালাঅর।	৪৩। ধ্বজভঙ্গ।	৭৬। পারার দোষ নি- ৭৭। হাম।
১২। ত্রাহিকঅর।	৪৪। বহুমূত্র।	৭৮। জগবসল।
১৩। প্রীহা ও যকৃৎ অর।	৪৫। পাথরি।	৭৯। বসন্ত।
১৪। জরাতিশার।	৪৬। শোথ ও জলাউদরি।	৮০। বিষ সেবনে বি- বাক্ত হইলে।
১৫। মলাগি।	৪৭। অণ্ডকোনের জল ভার।	৮১। পথ্যাপথ্য।
১৬। গৃহিণী।	৪৮। কর্ণরোগ।	৮২। ঋতু হরীতকী, দশ মূল, জিকটু, জিকলা এবং মানথও কাহাকে বলে।
১৭। আমরক্ত।	৪৯। গরমি।	৮৩। বরসাহুসারে ওদধ সেবনের মাত্রা।
১৮। ওলাউঠা।	৫০। ত্রণাদি।	
১৯। বিলম্বিকা।	৫১। খুজনি ও পাঁচরা।	
২০। কুনি।	৫২। ক্ষত ও নালী ক্ষত।	
২১। অশ।	৫৩। ভগন্দর।	
২২। কামলা।	৫৪। অগ্নিদগ্ধ।	
২৩। রক্তপিত্ত।	৫৫। আঘাত।	
২৪। যক্ষ্মা।	৫৬। নখের কুনি গাফা।	
২৫। কাশ।	৫৭। হাত ও পায়ের তলা ফাটা।	
২৬। অরভঙ্গ।	৫৮। শির রোগাদি।	
২৭। হাপানি।	৫৯। চক্ষু রোগ।	
২৮। হিকা।	৬০। রাত কাণা।	
২৯। বাতশ্যাধি।	৬১। দস্ত রোগ।	
৩০। ধমুঠকার।	৬২। নাসা রোগ।	
৩১। অপস্রাব।	৬৩। ষ্ঠেত প্রদর ও রক্ত প্রদর।	
৩২। উগাদ।		

# গৃহ-মুষ্টিযোগ গ্রন্থঃ ।

## ১। দেহে জ্বর উৎপত্তির কারণ ।

আহার বিহারাদির ব্যতিক্রমে বাত, পিত্ত ও কফ হ্রষিত হইয়া আমাশয়কে আশ্রয় করত কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্ভাগে নিয়া রসের অহুগত জ্বর উৎপন্ন করে।

## ২। জ্বর হইবার পূর্বের কিভাব হইয়া থাকে

তাহার লক্ষণ ।

কোন পরিশ্রমের কাজ না করিলেও পরিশ্রম বোধ, শরীর বিবর্ণ, আহার করিতে ভাল লাগে না, চক্ষুতে জল পরিপূর্ণ, কখন রোজে, কখন বাতাসে এবং কখন ঠাণ্ডায় বসিতে ইচ্ছা, হাইম, শরীর বেদনা ও ভার, রোমহর্ষ, অরুচি, চক্ষু আধার বোধ, কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

## ৩। বাতজ্বর ।

লক্ষণ—কম্প, উত্তাপ, কখন কম কখন বেশী, কণ্ঠ ও ঠোট শুকাইয়া যায়, অনিদ্রা, হাচি ও রুক্ষহয় এবং মস্তক, বুক এবং শরীর বেদনা অরুচি, বাহ্যিক বা, পেট বেদনা, ফাপা ও হাইম হয়।

মুষ্টিযোগ—বৃহতী নলের ছালের রস ১ তোলা, মধু প্রক্ষেপে বা আদারস ৥০ তোলা সন্নিব লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং শুক্কাদি পাচন—গুলফ, অনন্তমূল, কিসমিস, সলুফা, পুনর্নবা, ইহাদের কাথ ওয় প্রক্ষেপে সেবন বা

কিরতাদি পাচন—চিরতা, মুখা, বালা, বৃহতী, কণ্টিকারী, গন্ধুর, ছাইলানি, পিঠানি, শুটৌ, ইহাদের কাথ সেবন। পিপাসায় বরফ বা মণের জল সেবন, মাথা ধরায়—ঠাণ্ডা জলের পট্টি বা দারচিনি বাটার লেপ। অরুচি থাকিলে আমলকি, চিনি, কিসমিস বাটা সমভাগ অল্প মাত্রা গোলমরিচ চূর্ণ ও সন্ধৈব লবণ মিশাইয়া চাটনি, বৃকে বেদনা থাকিলে পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল কর্পূর সংযোগে মালিস করিয়া আকন্দের পাতা গরম করিয়া সেক বা তুলার গাদি করিয়া বাঁধিবে। পেটবেদনা ও ফাপা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের সেক বা গমের ভূষর পুণটীণ দিবেক।

### ৪। পিত্তজ্বর।

লক্ষণ—জরের বেগ অতি তীক্ষ্ণ, কোষ্ঠ তরল, নিদ্রার অন্ততা, বমি হওয়া কঠ, ঠোট, নাক, মুখ, শুক হওয়া এবং হৃগ্নক বোধ, বায়ু প্রস্রাব হয়, মুখে কালুবোধ, মোহ, শরীর জ্বালা ও মাংসলাহ, পিপাসা, বাহি, প্রস্রাব ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, এবং কখনও ভ্রম হয়।

মুষ্টিযোগ—গুলক, ক্ষেত পাণড়া ও পটলপাতা ইহাদের মধ্যে যে কোন-টাই হউক তাহার রস ১ তোলা মিছরী প্রক্ষেপে সেবন এবং গুঁড়িচাউ পাচন—গুলক, আমলকি ইহাদের কাথ চিনি প্রক্ষেপে বা দ্রাক্ষাদি পাচন—কিসমিস, হরীতকী, মুখা, কটকী, সোণালু, ক্ষেত পাণড়া ইহাদের কাথ সেবন। বমি ও পিপাসায়, বরফ বা মণের জল সেবন। জ্বালা থাকিলে কাসারপাত্রে শীতল জল রাখিয়া নাভির উপরি ভায়ে বসাইতে হইবে, মাথা গরম থাকিলে ঠাণ্ডা জলদ্বারা মাথা ধৌত করাইবে।

### ৫। কফজ্বর।

লক্ষণ—ভিজাবদ্ধ গাত্রে দেওয়ার মত বোধ, জরের অল্প বেগ, আলস্ত, মুখ মিঠা বোধ, বাহি, প্রস্রাব শ্বেতবর্ণ, দেহের জড়তা, ভোজনে অনিচ্ছা, শরীর ভার বোধ শীঘ্র ও বমি হয়, রোমাঞ্চ, অতি নিদ্রা, মুখ ও নাসিকাদ্বারা কফ নির্গত হওয়া, অরুচি ও কাশ হয়।

মুষ্টিযোগ—আদা, তুলসি রস বা দাদা, পানের রস ১০ তোলা করিয়া

১ তোলা মিশ্রি বা সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে বা পিপুল চূর্ণ ও রতি মধুসহ সেবন এবং বাসাদি পাচন—বাসক ছাল, গুলঞ্চ, কণ্টীকারী ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে বা নিষাদি পাচন—নিমছাল, শুঁট, গুলঞ্চ, দেবদারু, শর্টা, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজ পিপুল, কণ্টীকারী ইহাদের কাথ সেবন, বমি থাকিলে বরফ বা সপের জল সেবন, অরুচি ও খুঁকীকাশ থাকিলে আমলকী, কিসমিস, মিশ্রি, সমভাগ বাটা অল্পমাত্রা গোলমরিচ ও সন্ধৈব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চাটনী দিবে, মাথা গরম থাকিলে ঠাণ্ডা জল দিবে।

#### ৬। বাতপিত্তজ্বর।

লক্ষণ—পিপাসা, মুচ্ছা, মাথাবোরা, মাথাবেদনা, মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক ইয়া যাওয়া বমি, ক্ষেমাঞ্চু, অরুচি, চক্ষে আন্ধারের দর্শন, সন্ধিবেদনা ও হাইম হয়।  
মুষ্টিযোগ—গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, বৃহতীর ছাল, ইহাদের মধ্যে বে কান্দিটাই হয় ১ তোলা রস মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন এবং অমৃতাদি পাচন—গুলঞ্চ, মুখা, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া, শুঁট, বালা ইহাদের কাথ বা গুরচাদি পাচন—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ইহাদের কাথ সেবন বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপের জল সেবন। শরীর জ্বালা থাকিলে কাসার পাত্রে ঠাণ্ডাজল রাখিয়া নাভির উপরে বসাইতে হইবে। মাথা ধরায় ঠাণ্ডাজলের গটি বা দারচিনি বাটার লেপ, অরুচি ও খুঁকীকাশে আমলকী, কিসমিস, সমভাগ অল্প গোলমরিচ ও সন্ধৈব লবণ ঠাণ্ডাজলদ্বারা বাটিয়া চাটনী দিবে, সন্ধি বেদনাবশানে আদার রস গরম করিয়া মালিস দিবে।

#### ৭। পিত্ত শ্লেষ্মাজ্বর।

লক্ষণ—ভিত্তাবাদ, মুখ লিপ্তের জ্বাষ বোধ হয়, তর্রা, মোহ, কাশ, অরুচি, পিপাসা, কখন শীত কখন জ্বালা হয়।

মুষ্টিযোগ—আদা, বাসক পাতা ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা রস মিহরি প্রক্ষেপে সেবন। অমৃতাত্তিক পাচন—গুলঞ্চ, ইক্ষুব, নিমছাল, পলতা, কটকী, শুঁট, রক্তচন্দন, মুখা ইহাদের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং ভার্গাদি পাচন—ব্রহ্মযষ্টি, বুচ, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, হিঙ্গ, হরীতকী, মুখা,



গাঙ্গারী, শুট ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। অরুচি ও খুঁকীকাশে আমলকি, কিসমিস, চিনি, সমভাগ অন্ন গোলমরিচ ও মটকৈবলবণ জলদ্বারা পেষণ করিয়া চাটনি দিবে, পিপাসার বরফ বা সপের জল সেবন।

### ৮। বাত শ্লেষ্মাজ্বর।

লক্ষণ—ভিজাবস্ত্র গায়ে দেওয়ার মত বোধ, গ্রন্থিবেদনা, নিজ্রা, শরীর ভার বোধ, মাথাবেদনা, মুখ ও নাসিকাদ্বারা কফ নির্গত হয়, ঘর্ম হয় না, কাশি, শরীর খুব গরম, জ্বরের বেগ মধ্যম রকম।

মুষ্টিঔষ্য—আদা, পানের রস ৥০ তোলা করিয়া ১ তোলা মটকৈবলবণ প্রক্ষেপে বা কারছাল, শুট ও কুড়, সমভাগে চূর্ণ ১০ আনা, মধুসহ সেবন এবং আরুণ্যাদি পাচন—আমলতাস, পিপুলমূল, মুখা, কটকী, হরিতকী ইহাদের কাথ বা কুড়াদি পাচন—কণ্টীকারী, গুলঞ্চ, শুট, কুড় ইহাদের কাথ সেবন। মাথাবেদনায় ঠাণ্ডাজলের পট্টি বা দারচিনি বাটার লেপ। কাশ থাকিলে ত্রিকটুর চূর্ণ সমভাগ, মধু ও মিছরিসহ চাটনি দিবে। গ্রন্থি বেদনায় আদারস বা তারপিন তৈল মালিস।

### ৯। সন্নিপাতজ্বর।

লক্ষণ—কখন দাহ, কখন শীত, শরীরের হাড় গীরাৎ বেদনা, মাথা বেদনা, চক্ষুসহ জল পরিপূর্ণ দেখায়, চক্ষু ঘোলা, রক্তবর্ণ, এই রোগেতে কোনও রোগীর চক্ষু খেচিয়া থাকে ও কাহারও মেলা থাকে, কান বেদনা কানের ভিতর নানা প্রকার শব্দ, চোক গিলিতে যেন কাটাৎ বোধ। নিজ্রা দেখা যায় ফলতঃ নিজ্রা নহে, মোহ, প্রলাপ, কাশ, শ্বাস, অরুচি, মাথাভ্রমি, জিহ্বা যেন গো জিহ্বার ভায়, কাহারও জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মত বাহির হইয়া গরে, কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত পিত্ত নির্গত হয়, মাথা এপাশ ওপাশ লরে, জল পিপাসা হয়, নিজ্রা হয় না, বুক বেদনা, ঘাম, প্রস্রাব, ব্যাধি ২। ৪। ৫ দিবসের পর অন্ন দেখা যায়। শরীর ক্লশ হয় না, সদা সর্বদা কোকানি, শরীরের মধ্যে ঢাকাৎ বোধ হয়, বর্ণটি ধূস্র, কাহারও বা রক্তবর্ণ হয়, বদন্তাৎ দোষ সকল অতিশয় বৃদ্ধি পায় ও অধি নষ্ট হয় তাহা হইলে

এই রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ জানিবে। সম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে অসাধ্য। যদি ঐ সকল লক্ষণের কম থাকে তাহাহইলে সাধ্য। আর ৭। ১০। ১২। ১৪। ১৮। ২২ দিবসে যদি বৃদ্ধি হয় এবং ধাতু ক্ষয় হয় তবে অসাধ্য এবং ঐ উপ-রোক্ত দোষ সকল নিবারণ হয় তবে সাধ্য। কিন্তু বাহার রোগ একবারে কম না হইয়া সমানভাবে থাকে কিম্বা ক্রমে বৃদ্ধি পায় তবে সেই রোগীর ঐ ঐ দিবসের মধ্যে কাহারও সাধ্য কাহার অসাধ্য।

সন্নিপাত জরের শেষ যদি কোন রোগীর কর্ণমূল হয় তাহা হইলে সাধ্য। আর জরের প্রথম বা মধ্যভাগে হইলে কাহারও সাধ্যও কাহারও অসাধ্য।

মুঠীযোগ—আদা পানের রস ॥ তোলা করিয়া মোট ১ তোলা সট্কেব লবণ প্রক্ষেপে বা ত্রিকুটের চূর্ণ ১০ আনা করিয়া মোট ১০ আনা ঐধুসহ সেবন। এবং দশমূল পাচন—বিষছাল, নাওসোনা, গাস্তারী, পাকুল, গনিয়ারী, ছাই-লানি, পিঠানী, বৃক্কী, কটিকারী, গোক্ষুর ইহাদের কাথ পিপুলের চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন—উক্ত দশমূলের ১০ পদ ও শটি, কাকড়াশূদী, কুড়, ছয়ালতা, ব্রহ্মবটী, ইন্দ্রযব, পোলতা, কটকী, ইহাদের কাথ সেবন। গ্রহি বেদনায় ধূতুরা পাতার রস বা আদার রস বা তারপিন তৈল মালিস, গালচাপা বেদনায় ত্রিকুটের কাথের কুলি তাহা করিতে না পারিলে ত্রিকটু আদার রসে বাটিয়া সট্কেব লবণ মিশাইয়া গালচাপার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া বেদনা দমন হয়। মাথা বেদনায় ঠাণ্ডা জলের গড়ি, দারচিনি বাটার লেপ, কাশ থাকিলে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগে গধু, মিছরি সহ চাটনি দিবে। বুক বেদনায় পুরাতন ঘৃত বা আদারস বা তারপিন তৈল ও কর্পূর সংযোগে মালিস করিয়া আকন্দের পাতা গরম করিয়া সেক দিবে বা তিসির পুলটস পুনঃ দিবে। কর্ণ মূলের প্রথম ভাগে পাচন—গনিয়ারি, ব্রহ্মবটী, পুষ্করমূল, কটিকারী, শুঠ, পিপুল, গোলমরিচ, শচ, মুখা, গুলঞ্চ, কাকড়া শূদী, কটকী, ইহাদের কাথ সেবনে সন্নিপাত নষ্ট হয়। কর্ণমূলের লেপ সজিনারছাল, ঐষত সরিষা, একত্র বাটিয়া গরম করিয়া লেপ, বা আফিং, মুসাবর, আদার রসে গুড়িয়া গরম করিয়া লেপ, বা ভাজের সেক দিয়া তুলা বা ক্লানেল দ্বারা বাধিবে ইহাতে বারণ না হইলে তোকমা কি তিসির পুলটস দিবে। শীকিলে ফুটাইবার জন্ত নিমপাতা

বাটা, ঘৃত লবণ সহ পুলটিস দিবে বা অজ্ঞ করিয়া নিমপাতা সিদ্ধকালে দ্বৌত করতঃ নিমপাতা বাটা রুতে ভাজিয়া সেই মলম নেকরায় মাথাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। ফুলা স্থানে ৪ দিগে আফিং বা ধুতুরা পাতা বাটা গরম করিয়া লেপ দিবে। অজ্ঞান থাকিলে গোলমরিচের ধূয়া বা গোল মরিচের চূর্ণ নাসিকার ভিতর দিবে। ঘর্ম্ম হইলে এরাকট বা আবির দ্বারা মালিস করিবে। হাত, পা ঠাণ্ডা হইলে তারপিনটৈল শুটের চূর্ণ মর্দন করিবে।

### ১০। বিষমজ্বর।

লক্ষণ—পূর্বজ্বর ক্ষান্ত হইলে কতক অংশ থাকা সত্ত্বে যদি অহিত সেব-  
নাদি করে তাহা হইলে পুনরায় সপ্ত ধাতুদ্বারা শরীর নির্মিত উহার ১ টি  
ধাতু আশ্রয় করিয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম বিষম জ্বর।

মুষ্টিযোগ—পুরাতন শুড় ১০ আনা, কৃষ্ণজিরা ১০ আনা ও গোলমরিচচূর্ণ  
২ রতি, উষ্ণজল সহ সেবন বা ক্ষেত পাণড়া ও সেকালিকা পত্রের রস  
॥ তোলা করিয়া এক তোলা, মধু প্রক্ষেপে বা তুলসীর পত্র ও দ্রোণ পুষ্পের  
পত্রের রস ॥ তোলা করিয়া ১ তোলা গোলমরিচ চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন  
এবং ভার্গ্যাদি পাচন—ব্রহ্মষষ্টি, ক্ষেত পাণড়া, ধনিয়া, ছরালতা, শুণ্টি,  
চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী, গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ সেবনে সতত, সম্বৃত্তক,  
তৃহীক, চতুর্থক ও পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়। এবং দাস্তাদি পাচন—নীল-  
বিন্ধ্যী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মুজিষ্ঠা, শ্রামলতা, আকম্মাদি, শঠি, শুণ্টি, বেনার  
মূল, গজপিপুল, বলাড়ুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হারভাঙ্গা, ধনিয়া, স্মৃণ্টি, মুখা, সঁরল  
কাষ্ঠ, সজনাছাল, বালা, বৃহতী, হরিতকী, কণ্টাকারি, ক্ষেতপাণড়া, কুড়,  
চিরতা, কটকী, অনন্ত মূল, গুলঞ্চ, পুষ্কর মূল ইহাদের কাথ সেবন।

### ১১। পালাজ্বর।

মুষ্টিযোগ—হিরাকস চূর্ণ ১ রতি বা মাজুফল চূর্ণ ৬ রতি বা চাপাকুলের  
পাতার রস ১ তোলা সহ সেবন এবং ভার্গ্যাদি পাচন—ব্রহ্মষষ্টি, ক্ষেতপাণড়া  
ধনিয়া, ছরালতা, শুণ্টি, চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী, গুলঞ্চ ইহাদের কাথ  
সেবন।

## ১২। ত্র্যাহিকজ্বর ।

মুষ্টিযোগ—আকনের ডোগা ৫টা বাটিয়া ইক্ষু শুভ্র সহ বা মান্দারের ডোগা ৩টা বাটিয়া সৈন্ধব লবণ সহ সেবন এবং ভার্গাদি পাচন যাহা পালা অরে লিখা আছে সেই পাচন সেবন ।

## ১৩। প্রীহা ও যকৃৎ ।

মুষ্টিযোগ—পিপূল চূর্ণ ১০ আনা, পুরাতন গুর ১০ আনা সেবন বা যবক্ষার ২ রতি, পলাসের ক্ষার ২ রতি, উষ্ণজল সহ সেবন বা পাউপার আঠা ১৫ ফোটা চিনি সহ সেবন বা তালজটা ভস্ম ১০ আনা, পুরাতন শুভ্র, ১০ আনা উষ্ণজল সহ সেবন বা সন্ট লবণ ১০ আনা, হিরাকস চূর্ণ ১১ রতি, নিমছাল বা গুলফের রস বা চিরতার জল সহ সেবন, এবং ভার্গাদি ও দাত্তাদি পাচন যাহা বিষমজ্বরে লিখা আছে সেই পাচন সেবন । প্রীহা, যকৃৎ স্থানে মুসাব্বর, করবি ফুলের পাতা বাটিয়া গরম করিয়া বা পাউপার আঠা বা জরপাল গোটা বাটিয়া মধুসহ বা হিঙ্গ, যবক্ষার, সরষু, বাটার লেপ । যদি শোথ হয় তবে পুনঃবার বা মাকর কাথের জল স্নেহন আর যদি পেটের পীড়া ও আমাশয় হয় তবে উক্ত পাচন ও ঔষধ সেবন না করিয়া কুটজছাল, ৫ তোলা, ডালিম ফলের বাকল ১ তোলা, বাবালিয়ার মোথা ১ তোলা, \*বালা ১১ তোলা, সপ ১১ তোলা ইহাদের কাথ সেবন ।

## ১৪। জ্বরাসিসার ।

মুষ্টিযোগ—কুটজ ছালের রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে বা গুলফের রস ১ তোলা বেল শুট চূর্ণ প্রক্ষেপে বা বৃহতী ছালের রস ১ তোলা জিরা ভাজা চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং নাগরাদি পাচন—শুক্রি, অতইস, বাদালিয়ার মুগা, চিরতা, গুলফ, কুরচি ইহাদের কাথ বা বিষাদি পাচন—বেল শুট, বাদালিয়ার মুগা, অতইস, আকনাদি, চিরতা, ইজ্জবব ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। মাথা গরম বা বেদনা থাকিলে ঠাণ্ডাজল দিবেক । বমি ও শিগাসার বরফ বা সপ ও ধনিয়ারজল সেবন । পেটকাপা ও বেদনার থানকুনিপাতা, আদা,

( ৮ )

খানালিয়ার মুখা বাটার পুলটিস নাভীতে দিবে। প্রস্রাব না হইলে  
সোড়ার চূর্ণ ১০ আনা জলদ্বারা সেবন বা সোড়ার জলপট্ট তলগেটে দিবে।

১৫। মন্দাগ্নি।

মুষ্টিযোগ—জৈনবাটা ৮ আনা সৈন্ধবলবণসহ বা ধনিয়া ৮ আনা গোল-  
মরিচ চূর্ণসহ বা হরিতকী বাটা ৮ আনা ইক্ষু শুড়সহ বা সেচি সাকের  
পাতার রস ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং শাস্ত্র নাগরকম পাচন—ধনিয়া,  
শুণ্ঠির কাথ সেবনে অজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয়। অন্নাস্বাদ ও বুক জালা থাকিলে  
চূর্ণের জল সেবন। জিহ্বা অপরিষ্কার ও মুখ বিষাদ থাকিলে আশলি পাতা  
অর্দ্ধ পোড়াকরিয়া কিঞ্চিৎ লবণসহ জিহ্বার ঘর্ষণ করিবেক।

১৬। গ্রহণী।

মুষ্টিযোগ—কুটজ ছালের রস ১ তোলা, শুণ্ঠ ও গোলমরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ  
বা জৈনের চূর্ণ ১০ আনা শুণ্ঠির চূর্ণ ১০ আনা সৈন্ধব লবণসহ বা রান্দনিসজ  
১০ আনা, সপ বাটা ১০ আনা চিনিসহ সেবন এবং সালপর্ণাদি পাচন—  
ছাইলানি, বেড়োলা, বেলশুট, ধনিয়া, শুণ্ঠি ইহাদের কাথ সেবন। ধূয়া  
চেতুর থাকিলে চূর্ণের জল সেবন। পেটফুপা থাকিলে গমের ভূঁসির পুলটিস  
বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলে সেক দিবে।

১৭। আমরক্ত।

মুষ্টিযোগ—কুটজ ছাল বাটা বা বেলশুট বাটা বা আপলেঙ্গর মূলের ছা  
বাটা বা প্যারা গাছের কচি ডোগা বাটা ইহার যে কোনটাই হয় ৮ আনা  
কিঞ্চিৎ চিনিসহ সেবন বা আম ছালের রস ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে সেবন  
এবং দাড়িম স্বরস পাচন—দাড়িম ফলের ছাল, কুম্ভচির ছাল ইহাদের কাথ  
বা শাস্ত্র পঞ্চকম পাচন—ধনিয়া, শুণ্ঠ, মুখা, বালা, বেলশুট, ইহাদের কাথ  
সেবন। পেট বেদনার খানকুঁ পাতা বা সেচি সাগের পাতা, আদা, বাদা-  
লিয়ার মুখা বাটার পুলটিস নাভীর উপরে দিয়া পরে লোহার হাতা গরম  
করিয়া উহা উপর সেক দিবেক, শুষ্কদ্বারে শূলানি থাকিলে তাকের বা  
খানকুনি পাতা আদা বাটার পুটলি বা ইটা গরম করিয়া সেক দিবে।

## ১৮। ওলাউঠা।

মুষ্টিযোগ—হরিদ্রার চূর্ণ ৩ রতি বা কর্পূর ২ রতি বা ভাজ, বড় এলাচি  
সপ, সমভাগে মোট ১০ আনা চূর্ণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা সেবন বা পরিষ্কার  
চূণারজল এককাছা বা খয়ের ও কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ সমভাগে মোট ১৫  
রতি প্রত্যেক দাঁতের পর সেবন এবং হ্রীবেরাদি পাচন—বালা, মুণা, বেলগুট,  
ইহাদের কাথ সেবন। বুক ও পেট বেদনায় আদা ২১ তোলা, সরিসা ২। তোলা  
লঙ্কা বা গোল মরিচ ১০ আনা জল দ্বারা বাটিয়া সেই ২ স্থানে গটি ১ বা  
১১ ঘণ্টা রাখিবে। বমি ও পিপাসায় বরফ বা সপের ও কর্পূরের জল সেবন।  
কৃমি ও হিকার চূর্ণের জল বা কাগজি লেবুর রসে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ  
সেবন। হাত পা খেচনি ও হিমাক্ষে সরসু তৈলে রসুন ভাজিয়া ঐ তৈলে  
কাঁচালা বা শুষ্ক চূর্ণ মিশাইয়া বা আদারসে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া মালিস  
করিবে। পেট ফাণ্ডি তারপিন তৈল পেটে মালিস করিয়া গরম জলের সেক  
বা তিসি বা ভুসির পুগটিস দিবে। প্রস্রাব না হইলে সোড়ার চূর্ণ ১০ আনা  
ঠাণ্ডাজল সহ সেবন বা সোড়ার জলপটি তলপেটে দিবে। আর ওলাউঠার  
প্রারম্ভিক সময় নিরোগীগণ প্রত্যহ আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য সহ কিঞ্চিৎ  
সোহাগা সেবন বা প্রাতে আদা, লবণ, সেবন করিলে তাহাদের রোগ  
হইবার আশঙ্কা থাকে না।

## ১৯। বিলম্বিকা।

লক্ষণ—বাহি, প্রস্রাব ও বমি হয় না।

মুষ্টিযোগ—রেউ চিনি ও যবাকার চূর্ণ সমভাগে ১০ আনা ঠাণ্ডাজল দ্বারা  
বা আপাঙ্গের মূলে রস ও আকান্দি পাতার রস সমভাগে ১ তোলা সৈন্ধব  
লবণ প্রক্ষেপে বা সৈন্ধব লবণ ১০ তোলা গরমজল সহ সেবন। পেট ফাণ্ডা ও  
বেদনায় তারপিন তৈল মালিস করিয়া তিসি বা গুগলের ভুসির পুগটিস বা  
ভেরেণ্ডার তৈলে অর্ধ তারপিন মিশ্রিত করিয়া মালিস করিয়া গরম জলের  
সেক দিবে, নতুবা ১টি মাছি গুড় দ্বারা বাটিয়া খাইবেক বা হিঙ্গ অন্ন নাক্সা  
সেবন বা হিঙ্গ গুড় দ্বারা লাগাইতে হইবে।

## ২০। কুমি।

মুদ্রীযোগ—সুপারির চূর্ণ, পলাসের বীজ চূর্ণ, বিরঙ্গ চূর্ণ, ইহার যে কোন-টাই হউক ১০ আনা মধুসহ বা সঠিক লবণসহ বা ডালিম গাছের মূলের ছাল, সুপারির মূলের ছাল ইহার যে কোনটাই হয় ১০ আনা বাটা চূর্ণায় জলসহ বা তুলসী, শক্তআলু, চাপাকুলের পাতা ইহার যে কোন পাতার রস হউক ১ তোলা, সঠিক লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং মুস্তাদি পাচন—মুখা, ইন্দুর কালী, ত্রিফলা, সজিনার ছাল দেবদারু ইহাদের কাথ পিপুল ও বিরঙ্গ চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। পেট বেদনার মোটখিরা বা জয়ন্তি পাতা চূর্ণায় জলে বাটিয়া নাভিতে দিবে বা ত্তারপিন তৈল মাালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে। ছোট ছোট কুমি দমনার্থ কচি নিমপাতার রস ১ তোলা সঠিক লবণ প্রক্ষেপে সেবন।

## ২১। অর্শ।

মুদ্রীযোগ—কৃকতিল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ১০ আনা চিনি সহ বা ত্রিফলার জল, কুটজ ছালের রস, গেন্দা ফুলের পাতা, সিয়াল মোত্রার পাতা, ইহার যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা, চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং পথ্যামৃতাদি পাচন—হরীতকী, ধনে, গুলঞ্চ ইহাদের কাথ শুড়সহ সেবন; শুদ্ধ্বারে জালা টাটানি থাকিলে ফিটকারীর জলে শৌচকর্ম করিবে, ধূপের বা গন্ধবিরজার ভাপরা লইরে। এবং শীজের আঠাতে অন্ন হরিদার চূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলিতে বিন্দু মাত্রায় দিবে কিম্বা ঘোসা ফলের চূর্ণ বাহির বলিতে ঘর্ষণ করিলে বাল পতিত হয়।

## ২২। কামলা।

মুদ্রীযোগ—দেবদারু চূর্ণ ১০ আনা মধুসহ বা নিশাদল চূর্ণ ৫ রতি বা চিরতার জল বা সিয়াল মোত্রার পাতার রস বা পুনলবার রস বা গুলঞ্চর রস ইহার যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা, চিনি বা মধুসহ সেবন এবং গুরুচন্দ্রাদি পাচন—গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ সেবন। যকৎ হ্রাসে বেদনা থাকিলে ত্তারপিন তৈল মাালিস করিয়া গরম জলের সেক দিবে।

## ২৩। রক্তপিত্ত।

লক্ষণ—নাক, মুখ, শুষ্ক, লিঙ্গ, যোনি এই সকলদ্বারা রক্ত নির্গত হওয়া।

মুষ্টিযোগ—লালকুচের পাতা বা বার্তনের পাতা বা বাসকের পাতা বা ছর্কার বা যজ্ঞভূমরের ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা রস, মধু বা চিনি প্রক্ষেপে সেবন। এবং আটক্রয়কাদি পাচন—বাসক, কিসমিস, হরীতকী, ইহাদের কাথ সেবন। বমি ও পিপাসায় বরফ বা মপের জল সেবন। থুকি-কাশে আমলকী, স্কটী, যষ্টিমধু এ সমস্ত সমভাগ মধুসহ চাটনি। নাসিকা দ্বারা রক্তপাতে মাজুফলের চূর্ণ বা ফিটকারীর চূর্ণ বা ছর্কার রস বা ডালিম ফলের রস বা চিনির জলের নস্ত টানিবেক।

## ২৪। যক্ষা।

মুষ্টিযোগ—লাহার চূর্ণ ১ রতি, কুবাণ্ডের রস ১ তোলা সহ বা বংশলোচন চূর্ণ ২ রতি মিশ্রিত জলসহ বা বাসক পাতার রস ১ তোলা মধুপ্রক্ষেপে বা যষ্টিমধুর চূর্ণ বা গিমুল মূলের চূর্ণ বা ভূমি আমলকীর চূর্ণ ইহাদের যে কোনটাই হয় ৬ রতি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং অশ্বগন্ধাদি পাচন—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েল, বাসক, পুষ্করমূল অতইস, ইহাদের কাথ সেবনান্তে হৃৎ কিসা মাংসের জুস সেবন। বৃকে বা পার্শ্ব বেদনায় পুরাতন স্রুত মালিস করিয়া তুলার গাদি দ্বারা ব্যক্তিবে। থুকীকাশে ত্রিকুটর চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রসহ চাটনি দিব।

## ২৫। কাশ রোগ।

মুষ্টিযোগ—বাসক পাতার রস ও আদার রস সমভাগ মোট ১ তোলা বা তুলসী পাতার রস ও আদার রস সমভাগ মোট ১ তোলা মিশ্রি প্রক্ষেপে বা যষ্টিমধু বা অতইস বা পীপই ইহাদের যে কোনটাই হয় চূর্ণ ৬ রতি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং বনাদি পাচন—বেড়েল, বৃহতী, কটিকারি, কিসমিস, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপে সেবন। বৃকে ও পার্শ্ব বেদনায় পুরাতন স্রুত বা তারপিন তৈল ও কর্পূর একত্র মিশাইয়া মালিস করতঃ আকন্দ্রের পাতা গরম করিয়া দিয়া তাহার উপর তুলার গাদি ব্যক্তিবে নতুবা তিসির



পুলটীশ পুনঃ২ দিবে। থুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রিসহ চাটনি দিবে।

## ২৬। স্বরভঙ্গ্য

মুষ্টিযোগ—ভূমি শাক ঘূতে ভাজিয়া সেবন বা ফুলের ডোঙ্গা ঘূতে ভাজিয়া মধুসহ চাটনি বা আদা ও সঠিক লবণসহ বা বচের চূর্ণ মিশ্রিসহ বা সোহাগার ঠে মিশ্রিসহ পুনঃ২ চুসিয়া সেবন এবং মধুকাদি পাচন—বাসক ছাল, বটমধু, পীপইল, কবাব চিনি, ইহাদের কাণ মিশ্রিসহ অন্ন মাত্রা জ্বলং গরম পাকিতে পুনঃ২ সেবন। বৃকে বেদনা হইলে সরষু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করতঃ তুলার গাদি করিয়া বান্ধিবে। থুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মিশ্রি মধুসহ চাটনি দিবে।

## ২৭। হাঁপানি।

মুষ্টিযোগ—আদা পুরিয়া জলে ফেলিবে পরে উক্ত আদার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে বা কুসারমূল চূর্ণ ও মান্দারের ছালের চূর্ণ সমভাগ মোট ১২ রতি মাত্রা মধুসহ বা ময়ূরপুচ্ছ ভঙ্গ ২ রতি পীপইল চূর্ণ ৪ রতি মধুসহ বা বহেড়ার চূর্ণ ৬ রতি মধুসহ সেবন ও রবে সূত ও মিশ্রি চুসিয়াঃ সেবন এবং পর্ণাস পঞ্চকম পাচন—গুলক, শুষ্ঠী, ব্রহ্মবট, কটিকারি, তুলসী, ইহাদের কাণ পীপইল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। মাথা গরম থাকিলে জ্বনের হুখে তুলা ভিজাইয়া বা লং ও পানি বাটা চান্দীতে দিবে পার্শ্ব ও বৃক বেধা ও শ্বাস কষ্টে পুরান্না ঘৃত বা সরষু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করতঃ তুলার গাদি দ্বারা বান্ধিবে। থুকীকাশে ত্রিকুটের চূর্ণ সমভাগ মধু ও মিশ্রি সহ চাটনি দিবে। অসহ শ্বাস কষ্টে ধূতুরা, পাতা ও ডাটা শুখাইয়া বা তেচ পাতার চূর্ণ হকায় ভামাকের তায় ধূমপান করিবে।

## ২৮। হিকা রোগ।

মুষ্টিযোগ—শশা বিচির শ্বাস বাটা ১/০ আনা মধুসহ বা ময়ূরপুচ্ছ ভঙ্গ ২ রতি বা কুলের বিচির শ্বাস বাটা ১/১

আনা মধুসহ বা মোকস ॥০ রতি মাত্রা কাফুরের জলসহ বা চুণার জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে তাহার ॥ তোলা বা নিমের মূলের ছালের রস ॥ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন বা ডাবের জল সেবন এবং শুখনা হরিত্রা বা ধনিয়া বা মাস কালাই কলকিতে ভরিয়া ধূমপান করিবে কিম্বা গোলমরিচ বা পুরাতন কাগজ আলাইয়া তাহার ধূয়া নাসিকার ভিতরে দিবে বা মক্ষিকার বিটী স্তনের দুন্ধে মিশাইয়া বা আলতা ভিজান জলের নস্ত টানিবে। পেট ফাপা থাকিলে গরম জলের সেক বা গমের ভূসির পুলটীস দিবে।

## ২৯। পক্ষাঘাত ( বাতব্যাধি ) ।

মুষ্টিযোগ—জাতীফলের চূর্ণ ১ রতি মাত্রা মধুসহ বা তেরেণ্ডার মূলের ছালের রস ॥ তৌলা ও আদার রস ॥ তোলা সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে বা পানের রস ॥ তোলা ও আদার রস ॥ তোলা সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে সেবন এবং মাসাদী পাচন—মাষ কালাই, আলকসিরমূল, এরণ্ডেরমূল, বেড়েল, ইহাদের কাথ হিঙ্গ ও সন্ধৈব লবণ প্রক্ষেপে সেবন। জাতীফল চূর্ণ বা রসুন সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবে বা তিল বা কালাই জল দ্বারা সিদ্ধ করতঃ পুটলি করিয়া সেক দিবে বা নিসিন্দা পাতা বা গোময় জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া তাপিতা নিবেক বা কর্পূর ২ ॥ তোলা, তারপিন, তৈল ১০ তোলা ও ত্রাণ্ডী ১। পোয়া ইহা একত্র করিয়া মালিস বা শূকরের চরবি দ্বারা মালিস করিবে।

## ৩০। ধনুর্ফংকার ।

মুষ্টিযোগ—গাঁজা ৩ রতি, চিনি ১০ আনা, ১। পোয়া গাভীর দুন্ধে সিদ্ধ করতঃ ১/১ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ৫ এক কাঁচা মাত্রায় ২। ২ ঘণ্টান্তর কিম্বা কাফুরের জল সেবন বা আফিং বা গাঁজার ধূমপান করাইবে এবং মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগে অনেক সময় উপকার হয় ৪। ৪ ঘণ্টান্তর এরূপ ৫। ৭ দিন পর্যন্ত কেবল দুন্ধ সেবন করাইবে এবং অন্ধকার গৃহে নির্জনে শুইয়া থাকিবেক, কোঠে অপরিস্কার থাকিলে কাট্রেল তৈল অর্দ্ধ ছটাক মধ্যে

১৪ ফুটা ভারপিন তৈল মিশাইয়া সেবন কিম্বা জয় পালের তৈল ১ ফুটা মধুসহ চাটাইতে দিবে।

### ৩১। অপস্মার।

মুষ্টিযোগ—অশ্বগন্ধা চূর্ণ বা আমলকীর চূর্ণ বা পোস্তের দানা বাটা বা বচ চূর্ণ ইহাদের যে কোনটাই হয় ৮ আনা মাত্রা মধুসহ বা নিসাদল ৬ রতি মাত্রা মিশ্রিত জলসহ বা বেড়োলা পাতার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন। এবং মহৌষধাদি পাচন—গুণ্টি, গুলঞ্চ, কণ্টিকারি, পুষ্কর মূল, পিপুল মূল ইহাদের কাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। মাথা ঘুরা ও অনিদ্রায় লজ ও পান বাটা বা পোস্তের দানা বাটা বা বাদামের সাস বাটা তালুতে দিবে এবং রসাজনের অঞ্জন দিবে। অভ্রান থাকিলে গোল মরিচের বা রিঠ'র বা হরিদ্রা বাটা ও সন্ধৈব লবণ নেকড়াতে মাখিয়া ইহার যে কোন টাই হয় পোড়াইয়া নাসিকার দ্বারা দিবে। কিম্বা গোল মরিচ চূর্ণ নাসিকার ভিতর দিবে বা কর্পূরের পুটলী সোদাইবে এবং চক্ষে ও মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিট দিবে।

### ৩২। উন্মাদ।

মুষ্টিযোগ—শিমূল মূল চূর্ণ ৮ আনা, কদলী বিচ ৮ আনা ঠাণ্ডা জলে বাটিয়া বা দেবদারু চূর্ণ ৮ আনা ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি গরম জলসহ বা কুমড়ার বিচির সাস বাটা ১০ আনা মাত্রা মধু সহ সেবন এবং গুলঞ্চ, নিম্ব ছাল, শনিয়া, শোড়াই বিচি, হরীতকী ইহাদের কাথ সেবন। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে মধ্যে ক্যাষ্টেল তৈলের জোলাপ দিবে। মাথা গরম থাকিলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটা দিবে কিম্বা জ্বলন্ত গরম জলে টপে বসাইবে। শত-মূলী বা মেন্দীপাতা বা পোস্তের দানা বাটিয়া তালুতে দিবে। নিদ্রা না থাকিলে স্তমনি শাকের রস ১ তোলা বা পোস্তের দানা বাটা, ১০ আনা চিনি সহ সেবন। অয়ে যদি কীণ্ডাবস্থা হয় তবে চা বা কাকী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## ৩৩। বাতরক্ত ।

মুষ্টিযোগ—কাঁচা হরিদ্রার রস বা নিমহালের রস বা চিরতা ভিজান জল ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং ধাত্রাদি পাচন—আমলকি, হরিদ্রা, মুগা, ইহাদের কাথ বা মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, বহেড়া, নিম-ছাল, বচ, কুটকি, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ সেবন । শরীরে চুলকি ও ক্ষুদ্র গোট থাকিলে নিমপাতা বাটার লেপ বা নিমপাতা বাটা তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবে ।

## ৩৪। হাত পা জ্বালা ।

মুষ্টিযোগ—চাউল বা বুট বা পাট পাতা, ধনে ভিজান জল বা হেলেফার রস বা ক্ষেতপাণড়া বা পটল পাতার রস কিম্বা কাথ ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা চিনি প্রক্ষেপে বা হরীতকী বাটা ১০ আনা চিনি সহ সেবন এবং ছাগছন্ধ কাঁচা বা খেত চন্দন বাটার লেপ হাতে পায়ে দিবেক ।

## ৩৫। কুষ্ঠ রোগ ।

মুষ্টিযোগ—নিশিন্দা পাতার চূর্ণ / আনা; গোমুত্র ১ তোলা সহ বা ছাতি-রান ছাল চূর্ণ ৩ রতি, ত্রিকুট চূর্ণ ৩ রতি বা মান্দারের ছালের চূর্ণ ৬ রতি বা সোমরাজের বিচির চূর্ণ ৬ রতি বা গর্জন তৈল ৫ ফোটা, চূণার জল ১ তোলা বা নিমপাতার রস ১১ তোলা, আমলকি পাতার রস ১১ তোলা সেবন এবং পটলাদি পাচন—পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদির, কুম্ভ বেত ইহাদের কাথ সেবন । যা থাকিলে নিম পাতা সিদ্ধ জলে দৌত করিয়া চূণার জল ৩ ভাগ ও গর্জন তৈল ১ ভাগ একত্র করিয়া মালিস বা চাউল মোগরার বিচির সাগ ও মম ও গন্ধক চূর্ণ একত্র বাটিয়া বা করবি ফুলের গাছের মূলের ছাল বাটা গরম করিয়া লেপ দিবে । খেত কুষ্ঠে—ধাত্রাদি পাচন—আমলকি, খদির কাষ্ঠ ইহাদের কাথ সোমরাজের বিচির চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং মোড়াই বিচি গোমুত্রে বাটিয়া বা বন কাপাসের বিচির চূর্ণ স্বত সহ মিশাইয়া বা সন্ধেব লবণ, আকন্দ্রের আঠা সহ মালিস করিবেক । মুখে হইলে গন্ধক, চিতার মূল, হিরাকস, হরিতাল, ত্রিফলা, একত্র বাটিয়া লেপ দিবে ।

## ৩৬। দাউদ ও বিখাউজ।

মুষ্টিযোগ—ভারপিন তৈল বা মোহাগার তৈ ও খেত চন্দন বাটা সহ বা গর্জন তৈল ও গন্ধক সমভাগ বা করবি ফুলের মূল বা পাতা তৈলে জাজিরা মালিস বা পাউণার আঠার লেপ দিবে এবং অমৃতাদি পাচন—  
 গুলঞ্চ, বাসক, মোথা, পলতা, ছাতিম ছাল, খাদির, কৃষ্ণ বেত, নিম পাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ইহাদের বা নিম ছালের কাথ সেবন এবং গন্ধক চূর্ণ ৬ রতি মাত্র গুড় সহ বা নিম পাতা বা কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা মধু প্রক্ষেপে সেবন।

## ৩৭। আমবাত।

লক্ষণ—কক্ষ ও বায়ু উভয় এককালে কুপিত হইয়া সন্ধি হুলে বেদনা এবং ক্ষীভতা জন্মায়।

মুষ্টিযোগ—ভেরেণ্ডার ছাল ও আদা বা সজনার ছাল ও আদা বা থান-  
 ফুনি পাতা ও আদা ইহাদের যে কোনটাই হয় সমভাগ মোট ১ তোলা রস  
 গোলমরিচ ও সন্ধিব লবণের চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন কিংবা গৈণারির মূল বা  
 ছাতিয়ান ছাল জঙ্গি হরীতকী চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ৬ রতি  
 মাত্রা গুড় ও চিনি সহ সেবন এবং রান্না দশমূল পাচন—দশমূল, গুলঞ্চ,  
 ভেরেণ্ডার মূল, রান্না, শুণ্ঠি, দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন। বেদনা ও  
 ফুলা স্থানে কালজিরা বাটা বা ধূতুরা পাতা ও আদা বাটা বা দুর্কা ও হরিদ্রা  
 বাটার লেপ বা বাণীর পুটলী গরম করিয়া শেক দিবে বা সরিষার ও ভার-  
 পিন তৈল সমভাগ ও আফিং ও কর্পুর উহার ৪ ভাগের ১ ভাগ একত্র ক-  
 রিয়া মালিস করিয়া কদম পাতা বা ভেরেণ্ডা পাতা বা কাঁঠাল পাতা বা তুলা  
 দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে।

## ৩৮। অল্পপিত্ত।

মুষ্টিযোগ—জৈন, আদা বাটা সমভাগ ১০ আনা সন্ধিব লবণ সহ বা  
 আমলকি বাটা ১০ আনা গোল মরিচ চূর্ণ ও মধু সহ বা জঙ্গি হরীতকী পোড়া  
 চূর্ণ ১০ আনা চিনি বা মধু সহ বা জিফলা বা চিরতা ও ধনিয়া বা পাটপাতা

ও ধনিয়া ভিজান জল ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা মধু  
 • প্রক্ষেপে সেবন এবং অল্পপিত্তাস্তক পাচন—গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা, কিষা  
 বাসক, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাণড়া, নিম্ব, চিরতা, ভিমরাজ, ত্রিফলা, ইহাদের কাথ  
 মধু প্রক্ষেপে সেবন। পেট বেদনা থাকিলে আদা ও সরিষা বাটার লেপ বা  
 তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক।

### ৩৯। পিত্তশূল।

মুষ্টিযোগ—কুড়, গুণ্ঠী, আমলকী চূর্ণ সমভাগ ৯ রতি সঠৈব লবণসহ বা  
 সঠৈব লবণ ১০ আনা ইক্ষুগুড়সহ বা কাফুর, সাজিমাটি, গোলমরিচ সমভাগ  
 ৯ রতি বা জৈন, হরীতকী, সঠৈব লবণ চূর্ণ সমভাগ ১০ আনা বা ফুলঝুরিমাটি  
 ১০ আনা বা শিথোর চূর্ণ ১০ আনা ইহাদের যে কোনটাই হয় গরম জলসহ  
 বা হেলেঞ্চার রস ও চুণার জল সমভাগ বা চিরতা ও ধনিয়া ও গোছমরিচ  
 ভিজান জল ইহাদের যে কোনটাই হয় ১ তোলা সেবন এবং জ্বাফা পাচন—  
 কিসমিসের কাথ চিনি প্রক্ষেপে বা পটলাদি পাচন—পটলপাতা, ত্রিফলা,  
 নিমছাল, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন। পেট বেদনা থাকিলে  
 তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবে এবং অহারের পর  
 চুণার জল খাইবে।



### ৪০। হৃদ রোগ।

মুষ্টিযোগ—যষ্টিমধুর চূর্ণ বা অশ্বগন্ধারচূর্ণ বা ত্রিফলার চূর্ণ ইহার যে কোন-  
 টাই হয় ১০ আনা বা পোস্তের দানা বাটা বা তুলসীর মঞ্জির বাটা ইহার  
 যে কোনটাই হয় ১০ আনা মাত্রা মধুসহ সেবন এবং কালী ও অশ্বগন্ধা বা  
 হরীতকী বা কণ্টকারী ইহার যে কোনটাই হয় কাথ মিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন  
 মাথা ঘুরানী থাকিলে পোস্তের দানা বড় তিল বা বাদামের শাশ বা  
 আমলকি বাটা ইহার যে কোনটাই হয় তালুতে দিবে এক সরিষার তৈলে  
 অল্প কর্পূর মিশাইয়া নাগিকায় নস্ত টানিবেক আর হৃদপিণ্ডে বেদনা থাকিলে  
 উক্ত তৈল মালিস করিবেক।

## ৪১। 'প্রসেহ'।

মুষ্টিযোগ—কাটা খুইয়ার মূলের রস বা হেলাঞ্চির রস বা বেড়োলা পাতার রস বা যজ্ঞদুম্বরের রস বা কাটা হরিজ্রার রস বা অরহর ডাইলের পাতার রস বা মেম্বিপাতার রস ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা চিনি প্রক্ষেপে বা কবাবচিনির চূর্ণ ৬ রতি বা খেতচন্দন বাটা ১২ রতি বা আমলকির চূর্ণ ১২ রতি মাত্রা মধুসহ সেবন এবং ত্রিফলাদি পাচন—ত্রিফলা, দেবদারু, মুথা, ইহাদের কাথ হরিজ্রার চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন। তলপেট বেদনা থাকিলে তারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক। প্রস্রাব কম বা জ্বালা থাকিলে গরম জলে টপে বসিবে কিম্বা সোড়া ৯০ আনা ঠাণ্ডা জলসহ সেবন কিম্বা রক্তবর্ণ প্রস্রাব হইলে লালকুঞ্জের বা শিরাল যোজা পাতার বা দুর্বার রস ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা চিনি প্রক্ষেপে সেবন। নাজিরা না থাকিলে ত্রিফলার জলে পিচকারি দিবেক।

## ৪২। স্বপ্নদোষ।

মুষ্টিযোগ—পোস্তের দানা বাটা ১০ আনা বা সালম মিশ্রি ১০ আনা মাত্রা মধুসহ সেবন বা বেড়োলা পাতার রস ১ তোলা বা কেশরছা পাতার রস ১ তোলা, কাঁচা ছদ্ম ২ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র মিশাইয়া প্রাতে সেবন কিম্বা কাকুরের চূর্ণ ২ রতি ও কবাব চিনির চূর্ণ ৪ রতি মাজে শয়ন কালে সেবন এবং হৃদয়গন্ধা পাচন—অর্ধগন্ধা, অনন্তমূল, কুমরিরার মূল, আলকুশীর বীট ইহাদের কাথ চিনি প্রক্ষেপে সেবন। নিদ্রা না হইলে মাথা ধোয়া যাইবে ও অগ্নি শাকের রস ১ তোলা বা কাফি ১/২ রতি সেবন।

## ৪৩। ধ্বজভঙ্গ।

মুষ্টিযোগ—ছোট তাল গাছের মূল বাটা ১০ তোলা বা ভূমি কুয়াণ্ড ১০ তোলা বা অর্ধগন্ধা চূর্ণ ১২ রতি বা শিমূল মূল চূর্ণ ২৪ রতি বা রসগিন্দুর চূর্ণ ১ রতি ও আমলকীর চূর্ণ ২৪ রতি ইহাদের যে কোনটাই হয় মধু সহ সেবন বা সালম মিশ্রি ১০ তোলা বা ইছবগুল ১ তোলা ইহার যে কোনটাই হয় গাভী ছদ্ম ১/২ পোয়াসহ জ্বাল দিয়া ১/২ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ১ তোলা

মিশ্রি সহ সেবন বা নাগেশ্বরের আতর ১ রতি পান সহ সেবন বা হিন্দ  
যতে ভাজিয়া ॥০ রতি মাত্রা ভাতের সুস্বাদু মাখিয়া খাইবেক এবং উক্ত আতর  
লিপের গোড়ায় মালিস করিয়া পান দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবেক ।

### ৪৪ । বহুমূত্র ।

মুষ্টিযোগ—পোস্তের দানা বাটা ১০ আনা বা যজ্ঞদুর্মের চূর্ণ হইলে ১০  
আনা, রস হইলে ১ তোলা বা আমলকির রস ১ তোলা ইহাদের যে কোন  
টাই হয় মধু সহ সেবন বা কৃষ্ণভিল বাটা ১০ আনা পুরাতন শুড় সহ বা মাঝ-  
কালাই ও ষষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগ মোট ১০ আনা ঠাণ্ডা জল সহ বা ফিটকারি  
চূর্ণ ৩ রতি, গাভীর দুগ্ধ ২৥ তোলা সহ সেবন কিম্বা যুবা ও বৃদ্ধ বয়সে ১ রতি  
মাত্রা আফিং ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । অল্প বয়সের ছেলের পক্ষে  
ইহা নিষেধ । খুব পিপাসা থাকিলে ফুটিত গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া অল্প  
করিয়া সেবন ।

### ৪৫ । পাথরি ।

মুষ্টিযোগ—কাটাখুইয়ার বিচির চূর্ণ ৬ রতি ঠাণ্ডা জল সহ বা রুদ্রাক্ষ চূর্ণ  
৬ রতি, খোলসহ বা বরুণ ছাল চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন শুড় সহ বা হেলেফার  
রস ও কাঁচা হরিদ্রার রস সমভাগ মোট ১ তোলা সেবন এবং বরুণাদি  
পাটিন—বরুণ ছাল, শুঁট, গোক্ষর ইহাদের কাথ ববাক্ষার চূর্ণ ও ইক্ষু শুড়  
প্রক্ষেপে সেবন ।

### ৪৬ । শোথ ও জল উদরি ।

মুষ্টিযোগ—পুনন্নবা বা নীলক বা শিয়ালমোড়া বা বিব পত্র বা শুলফ ইহা-  
দের যে কোনটাই হয় রস ১ তোলা মধু কিম্বা চিনি প্রক্ষেপে বা সোড়া চূর্ণ  
১০ আনা, ঠাণ্ডা জল ১ তোলা চিনি সহ স্বেদন এবং কাথান্ধবা পাচন—  
হরীতকী, শুঁটি, দেবদারু, পুনন্নবা, শুলফ ইহাদের কাথ শুগুণ্ডল চূর্ণ ও গোমূত্র  
প্রক্ষেপে বা দশমূল পাচন ইহাদের কাথ গোমূত্র ও এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপে বা  
ত্রিকলা কাথ গোমূত্র প্রক্ষেপে সেবন । ফণা থাকিলে দণ্ডকলসের পাতা



বাটিয়া ঐ সহজ চূণ মিশাইয়া লেপ বা শুইতার তন্ন ও কার্খাল ও শুষ্টির চূর্ণ সমভাগ একত্র করিয়া মালিস করিবেক।

### ৪৭। অণুকোষের জলভার।

মুষ্টিযোগ—খেত আকন্দের মূল কাজির জলে বাটিয়া বা আফিং জল দ্বারা মিশাইয়া লেপ বা আফিং ১ ভাগ, সরিষার তৈল ২ ভাগ একত্র মিশাইয়া মর্দন করিয়া কদম পাতা বা ভেরেণ্ডা পাতা বা কচু পাতা বা ফুলনেল বা তুলার গাদি দিয়া বান্ধিয়া লেঙ্গটী পরিয়া বন্ধিবেক এবং পীতদাক্ষ পাচন—দেবদাক্ষ বা ত্রিফলার কাথ গোমুত্র প্রক্ষেপে বা গোটা পিঙ্গলী, সিজের ক্ষীরে মাখিয়া ২১ দিবস রোজে শুখাইয়া মধু দিয়া খাইবেক।

### ৪৮। কর্ণ রোগ।

মুষ্টিযোগ—টিস বেদনা থাকিলে তুলসী পাতার রস বিনা গরমে বা হু-ইন্টা পাতা বা লাউ পাতা বা মুনসা সিজের পাতা যে কোন পাতা হয় আল শুনে শেকিয়া তাহার রস ২। ৩ ফোটা কাণের ভিতরে দিবেক এবং জৈন বা নিম পাতা ও পেনার মূল ও আদা ও গোমর মাটির ভাঙে ভরিয়া জ দিয়া দিও করতঃ ভাঁপরা লইবেক এবং কাণের বাহিরে চারি দিকে কালি-জিরা বা আফিং বা ধুতুরা পাতা বাটা গরম করিয়া লেপ দিবেক। পিক ও ঘা থাকিলে দুগ্ধ ও জলে একত্র মিশাইয়া কণ খোঁচ করিবেক। নতুন সাবান বা নিম পাতার দিও জলে পিচকারী দিয়া পরে ধুতুরার খসায় সরসু তৈল গরম করিয়া বা গোলাপী আতর বা চূরা বা আফিং জন্মে মিশাইয়া ২। ১ ফোটা দিবে কিম্বা পিচকারী না দিয়া কেবল শিয়ালমোড়ার পাতার রস ৫। ৭ ফোটা কাণের ভিতর দিয়া তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেক। একরূপ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত দিবেক।

—•—

### ৪৯। উপদংশ (গরমী)।

মুষ্টিযোগ—নাড়া সিজের শাখ ও আদা সমভাগ মোট ১০ তোলা বাটিয়া বা ছাতিয়ান ছাল ১০ আনা ও গোল মরিচ ১০ আনা জল দ্বারা বাটিয়া বা

গুলঞ্চ বা নিম ছাল বা উত্তর একত্র রস বা কাথ ১ তোলা মাত্রা মধু প্রক্ষেপে সেবন এবং পটলাদি পাচন—পলতা, নিম পাতা, ত্রিফলা, খঞ্জন, সাইলানি, গুলঞ্চ ইহার কাথ গুল্গুলা বা ত্রিফলার চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন। যা থাকিলে সাবানের বা ত্রিফলার জলে বা ভূঙ্গুরাজের বা নিসিন্দা বা নিম পাতা সিদ্ধ জলে ধৌত করিয়া লোহাগাড়ার কস বা করবি ফুলের গাছের মূল বাটা বা হিরাকস চূর্ণ বা পাকড়া খএরের চূর্ণ বা রেউ চিনি বা হরীতকী চূর্ণ বা পীপা সিন্দূর ঘৃত বা জল দ্বারা মিশাইয়া দিবেক এবং বৃহতী বা প্যাজ ও আদা ও নিম পাতা সিদ্ধ জলে ভাপরা লইবেক।

### ৫০। ত্রণাদি রোগ।

মুষ্টিযোগ—১। প্রথম সময় মিশাইবার হইলে কুচিলা বাটিয়া রাব গুর সহ বামোঙ্গি খএর জলে মিশাইয়া গরম করিয়া বা দেশী সাবান গরম করিয়া বা সাওয়ার কস ইহাদের যে কোনটাই হয় লেপ দিবেক। ২। পুকাইতে হইলে তিসি বা সূজি বা তোকমা বা গরম ভাত কচলাইয়া তাহার পুলটস দিবে। ৩। ফুটাইতে হইলে দেশী সাবান বা কবুতরের বিষ্ঠা বা কাটা খুইয়ার মূল বাটা বা ছিম বিচির শাশ বাটা গরম করিয়া লেপ দিবেক নচেৎ অঙ্গ করাইবেক। ৪। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত খাওয়ার ঔষধ রান্নাদি পাচন—রান্না, গুলঞ্চ, শুটু দেবদারু, এরও মূল ইহাদের কাথ সেবন। ৫। নিম পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবেক। ৬। ক্ষত শুকাইতে হইলে নিম পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ঐ মলম নেকড়ায় রাখিয়া ক্ষতের ভিতরে প্রত্যহ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত দিবেক এবং ব্যায়ের চারি দিকে দাখে গাছের ছাল খএর বাটিয়া বা আফিঃ জল দ্বারা মিশাইয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক।

### ৫১। খুজলি পাচরা।

মুষ্টিযোগ—গন্ধক চূর্ণ বা হরিদ্রা চূর্ণ ইহার যে কোনটাই হয় ৩ রতি মাত্রা বা নিম ছাল নতুবা ঐ পাতা বা কাঁচা হরিদ্রার রস বা চিরতী ভিজান জল

ইহার যে কোনটাই হয় ১ তোলা মাত্রা মধু বা চিনি প্রক্ষেপে সেবন এবং  
অমৃতাদি পাচন—গুগল, বাসক, মোথা, ছাতিয়ান, খৈর, কৃষ্ণবেত, নিম  
পাতা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ইহাদের কাথ সেবন এবং সাবান বা নিম পাতা  
সিদ্ধ জলে ধোত করিয়া মাক পাতার রসে কিঞ্চিৎ লবণ সহ বা বাসক পা-  
তার রসে কিঞ্চিৎ চিনি সহ বা হুঙ্কার জলে মর্দন করিবেক বা গন্ধক ও গাঁজা  
তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল মালিস করিবেক। শুখনা খুঙ্কণ ও চুলকণা থা-  
কিলে নিম পাতা ও হরিদ্রা বাটার লেপ বা উহা তৈলে ভাজিয়া মালিস  
করিবেক।

— . —

### ৫২। ক্ষত, নালীক্ষত।

মুষ্টিবোঁগ—খাওয়ার ঔষধাদি যেক্রপ ৫১নং লিখিত আছে ঐরূপ সেবন ও  
ধোত করিবেক এবং ভূইতা গোড়া বা সোহাগা গোড়া বা হরীতকী গোড়া  
বা মাইট্রা সিন্দুর বা ফিটকারি চূর্ণ বা খেতচন্দন বাটা বা নিসিন্দাপাতা বাটা  
বা কেশরছাপাতা বাটা বা আকিং ইহাদের যে কোনটাই হয় যতসহ মিশা-  
ইয়া নেকড়ায় রাখিয়া ক্ষতে দিবেক। পরে উহার উপর কচু পাতা দিয়া  
চারি দিকে চূর্ণ হরিদ্রার লেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়া তাহার উপর প্যাঁজ  
আদার পুটলি গরম করিয়া শেক দিবেক।

### ৫৩। ভগ্নদ্রব।

লক্ষণ—গুহ্বারের কিনারে ছিদ্র পরিমাণ যা থাকে।

মুষ্টিবোঁগ—গন্ধক ওরতি মাত্রা চিনি সহ এবং খদিরাদ্য পাচন—খদিরকাঠ  
জিফলা, ইহাদের কাথে মহিষ ঘৃত ও বিরজচূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন এবং নিমপাতা  
বা জিফলা বা ফিটকারি সিদ্ধ জলে ধোত করিবেক পরে পুরানাস্বতে সীসা  
ঘসিতে ঘসিতে আঙ্গুলবর্ণ হইলে ক্ষতের উপরে মালিস করিবেক এবং হিঙ্গ  
।০ আনা কুল গাছের ছাল ১ তোলা ইহার ডাণয়া লইবেক। উহার চারি  
দিকে প্যাঁজ আদার পুটলি গরম করিয়া শেক দিবেক।

## ৫৪। অগ্নিদগ্ধ।

মুষ্টিযোগ—বিলাতি আলু বা কুল পাভা বা পুই শাকের পাভা বা কুড়  
কুমারির শাশ ইহার যে কোনটাই হয় বাটিয়া বা তিল তৈল যত তাহার  
অর্ধেক চুণার জল মিশাইয়া দিবেক। যা হইলে খেত ধুনীর চূর্ণ, তিল তৈল  
মধ্যে মিশাইয়া অনেকবার লারিতে লারিতে ঘুতের মত হইবেক পরে ১০০  
বার ঠাণ্ডা জলে ধোত করিয়া ঐ মলম দিবেক।

## ৫৫। আঘাত।

মুষ্টিযোগ—ফিটকারির জল বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিবেক বা আমাণা বা  
চুণ ও হুগিয়া বা আতপ চাউল ও ছর্কা ও রসুন সমভাগ ইহাদের যে কোন-  
টাই হয় বাটিয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক এবং রক্ত পরিলে কিম্বা যা হইলে  
গেদা ফুলের পাতার রস বা খএর ভিজান জল বা শিরাল মোত্ৰা পাতার রস  
পুনঃ পুনঃ দিবেক।

## ৫৬। ক্তথের কুনিপাকা।

মুষ্টিযোগ—ডালিমের ভোগা বাটা বা আকান্দি পাভা বাটার পুশটাস  
ক ভুইতা ভস্ম অন্ন মাত্রা লাগাইয়া বান্ধিয়া রাখিবেক।

## ৫৭। হাত, পায়ের তলা ফাটা।

মুষ্টিযোগ—আমিপাতার কস বা মাইটা তৈলে কিঞ্চিৎ ময় গরম করিয়া  
লাগাইবেক।

## ৫৮। সির রোগাধিকারে।

মুষ্টিযোগ—জিকুটের কুণি করিবেক এবং আদা বা সরসু বা দারচিনি  
বাটিয়া কপালে লেপ দিবেক, সরসু তৈলে কর্পূর মিশাইয়া বা ফিটকারি ও  
কর্পূর সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া নতু টানিবেক এবং খেতচন্দন ১০ তোলা ও  
সোড়া ১০ আনা জলদ্বারা বাটিয়া চান্দিত দিবেক, অর্ধ মাখা বেদনার ভূক

রাজের পাতার রস চান্দিতে দিবেক এবং শ্বেত অপরাঞ্জিতার মূলের রস মধ্যে কিঞ্চিৎ ছাগ দ্রব ও গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া নত টানিবেক কিম্বা বেদনা স্থানে লেবুর রস রংগের উপর মালিস করিবেক। পেট পরিষ্কার না থাকিলে হরীতকী বাটা সেবন করিবেক।

### ৫৯। চক্ষুরোগ।

মুষ্টিযোগ—স্তনের দ্রব ১ ফোটা মাত্রা বা সঠৈব লবণচূর্ণ বা হরিদ্রারচূর্ণ বা রসদ ইহার যে কোনটাই হয় ১ রতি মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক পরিষ্কার জলে মিশাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ১ ফোটা করিয়া দিবসে ২। ৩ বার দিবেক ফুলা ও বেদনার স্থানে বাহিরে হরীতকী বা রক্তচন্দন বা রসদ বা আফিং বা ধুতুরা পাতা জলে বাটিয়া গরম করিয়া লেপ দিবেক। বাহ্যে কণা থাকিলে হরীতকী ও সঠৈব লবণ বাটা সেবন করিবেক এবং পুনঃপাতা পাতার দ্রব বাটিয়া অঞ্জন দিলে গোটা ভাল হয়, উক্ত পাতা মধুসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে জল পরা ভাল হয়। উক্ত পাতা গাভীর ঘূতে বাটিয়া অঞ্জন দিলে ফুল পরা ও ছানি ভাল হয় এবং চক্ষু যাতনা থাকিলে কতক দিবস স্নান বন্ধ রাখিবেক।

### ৬০। রাত কাণ।

মুষ্টিযোগ—আম্বলিপাতার রস বা পানের রস ও মধু ২। ৩ ফোটা চক্ষুর তিতরে সন্ধ্যাকালে দিবেক এবং গাভীর ঘূত হাত পায়ে ও চক্ষুর পাতার উপরে মালিস করিবেক।

### ৬১। দস্তুরোগ।

মুষ্টিযোগ—মাড়ি ফুলা ও বেধা থাকিলে ত্রিকুটের কুলি করিবে পরে হরীতকীর চূর্ণ বা গোলমরিচ ও কাহুরের চূর্ণ লাগাইবে। কতনা রক্তপরিলে নিসিন্দা বা কংবুল বা চাষলি ইহার যে কোন পাতা হয় সিদ্ধ জলে ফিটকারী বা পুখুরা খয়ের চূর্ণ মিশাইয়া কুলি করিয়া পরে মোহাগার থৈ বা মাজুলের চূর্ণ মধু বা স্বতসহ মিশাইয়া লাগাইবেক। নচেৎ অস্ত্র করাইবে।

## ৬২। নদগা রোগ।

মুষ্টিযোগ—কাল তুলসী পাতা বা মুক্তবর্সি পাতার রস ২।৪ ফোটা।  
 মাসিকার ভিতরে দিবেক বা কালিজিরার পুটলী করিয়া বা নিসাদল ও তিজা  
 কলিচূর্ণ ১টা শিশিতে ভরিয়া ঘ্রাণ লইবেক এবং মধুকাদি পাচন—বাসকছাল,  
 যষ্টিমধু, পীপই বা তাহার মূল, গোল মরিচ ইহাদের কাণ মিশ্রি এক্ষেপে  
 সেবন। খুকি কাশে জিকুটের চূর্ণ মধু মিশ্রি সহ চাটনি দিবেক। বুক ও  
 মাথা বেদনা থাকিলে সরিষা তৈলে কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবেক ও উহা  
 নাকে টানিবেক ও জিকুটের কুলি করিবেক।

## ৬৩। শ্বেত ও রক্ত প্রদর।

মুষ্টিযোগ—অশোক ছাল বা বেড়েলা পাতা বা কাটা খুইয়ার মূল বা আম  
 ছাল বা বজ্রডুমুর ইহার যে কোনটাই হয় রস ক্ষিপ্রা কাণ ১ তোলা মাত্রা  
 দুধ ও চিনি সহ সেবন এবং দারুয়াদি পাচন—দারু হরিদ্রা, রসাজন চূর্ণ,  
 বাসক, মুগা, চিরতা, বেল গুট, রক্ত চন্দন, নীল বা লাল উৎপল ইহাদের  
 কাণ মধু এক্ষেপে সেবন। তলপেটে বেদনা থাকিলে ঘেয়ের ভূসীর পুলটাস  
 বা ভারপিন তৈল মালিস করিয়া প্রথম জলের শেক দিবেক। প্রস্রাব আনা  
 ও অল্প প্রস্রাব বা বন্ধ থাকিলে তিসি সিদ্ধ জল বা গুরচির রস বা মেহেন্দী  
 পক্তার রস ইহাদের যে কোনটাই হয় রস ২ তোলা চিনি সহ বা পোড়ার  
 চূর্ণ ৮০ আনা চিনি সহ সেবন। যোনি দ্বারা রক্তপাতে ২৩ নম্বরে শাহাং  
 লিখা আছে তাহা করিবেক।

## ৬৪। সাধক বন্ধা, মৃত বৎসা, অকালে প্রসব না হওয়া।

মুষ্টিযোগ—ওলট কমলের মূল বা আপাঙ্গের মূল বা আম ছাল বা মেথি  
 ইহার যে কোনটাই হয় বাটা ১০ আনা, গোল মরিচ চূর্ণ সহ বা গুলুগুল ৬  
 রতি বা হিং ১০ রতি ঋতুকালে সেবন এবং গর্ভানন্দ পাচন—বালা, অতইস,  
 যোণা, মোচরস, ইন্দ্রযব ইহাদের কাণ ঠাণ্ডা করিয়া সেবন আর মৃত বৎসা  
 রোগে ১টা বৎসর যদি স্বামী সহবাস না কবে তবে ঔষধের নিষ্প্রয়োজন।

## ৬৫। গর্ভ দৌষ নিবারণ।

মুষ্টিযোগ—শ্বেত আকন্দরমূল চূর্ণ ৬ রতি ও একবর্ণের গাভীর দুগ্ধ আধ পোয়া, বা পলাসের মূল চূর্ণ ১০ আনা গাভীর ভোল ঘৃতসহ সেবন। নতুবা নাগেশ্বর ফুলের চূর্ণ ৮০ আনা গাভীর দুগ্ধ সহ খাওয়ার পর পুরুষ সংসর্গে গর্ভবতী হয়।

## ৬৬। গর্ভিণীর জ্বর।

মুষ্টিযোগ—তুলসী পাতা বা বাসক পাতা বা গুলঞ্চ ইহাদের যে কোন-টাই হয় বমিশ্রি প্রক্ষেপে সেবন এবং গর্ভচন্দনাদি পাচন—রক্ত চন্দন, অনন্ত মূল, কিসমিস, লোণ ছাল ইহাদের ক্কাথ চিনি প্রক্ষেপে সেবন। জ্বর বিরামে অতঃপর ৩ গোল মরিচ চূর্ণ সমভাগ ১০ রতি বা নাটার শস্ত ৩ গোল মরিচ চূর্ণ সমভাগ ১০ রতি সেবন। মাথা বেদনা থাকিলে ত্রিকুটের কুলি করিবে এবং জলপটী বা দারচিনি বাটার লেপ দিবেক। বমি ও পীণাস থাকিলে সপ ও ধৈনের জল সেবন। আমরক্ত পেটের গীড়া থাকিলে গন্ধবাদালিঙ্গার পাতার রস চিনি সহ সেবন।

## ৬৭। প্রসব বেথা নির্ধারণ।

লক্ষণ—প্রবল বেথা এক প্রকার মন্দ নহে, থাকিবার মুহূর্ত্ত বেথা তাহাতে ২৪ ঘণ্টা অভীত কিম্বা ইহার পূর্বে যদি রক্তস্রাব হইয়া শেষ জল ভাঙ্গিয়া সন্তান খাদে পরিবার উপক্রম বোধ করিলে দারচিনি টাটা ৮০ আনা বা আমলতাসের গুদা ১০ তোলা অন্ন জলে ১৫ মিনিট কাল তিজাইয়া পরে কচলাইয়া ছাকিয়া সেবন। অসহ বেথা থাকিলে আফিং ১১ রতি সেবন এবং ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ সেবন এবং পেটের উপর তৈল ও জল একত্র মিশাইয়া মালিস করিবেক এবং বাহি না হইলে অর্দ্ধ ছটাক বা তাহার অর্দ্ধেক ক্যাষ্টেল তৈল সেবন এবং রিটার ফলের শস্ত বাটার পুটলি ঈষৎ উষ্ণ করিয়া বোনিতে লাগাইয়া রাখিলে শীঘ্র বেথা বৃদ্ধি হইয়া সন্তান প্রসব হয় প্রসবের পর হেভাল বেথা হইলে ১১ রতি আফিং সেবন রক্তক্ষয় ভাঙ্গিলে তলপেটে

ভারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক বা ঘেয়ের ভূসির পুলটিস দিবেক বা গনমজুরের মূল ও গোলমরিচের কাণ সেবন।

### ৬৮। ঔমুজ ঘরে সস্তানের রংধরা ও

স্তনের দুগ্ধ পান না করা।

মুষ্টিযোগ—আদার মাত বা জিকুটের চূর্ণ অন্ন মাত্রা মধুসহ চাটনি বা আদা বা তুলসী পাতা বা দ্রোণ পুষ্পের পাতা ইহার যে কোনটাই হয় রস সিকি তোলা মিছরি বা সন্ধৈব লবণসহ বা তেলা পোকার লাদি ১টী বা ১টী রিঠার খসা স্তনের দুগ্ধে বাটিয়া সিকি তোলা মাত্রা সেবনে বসি ও কফ নিঃসরণ হইয়া ভাল হয় এবং ঘরে গন্ধকের ধূয়া দিবেক ও কালজরন্তি বা দানাচেচনি পাতার রসে কটু তৈল বা সরষু তৈলে কাকুর মিশাইয়া বা কালভুলসী পাতার রসে স্তনের দুগ্ধসহ গাড়ে লেপ দিবেক কোষ্ঠি বদ্ধ ও পেট ফাশা থাকিলে কাষ্ট্রেল তৈলে মধু মিশাইয়া অন্ন চাটীতে দিবেক বা কাষ্ট্রেল তৈল পেটের উপর মালিস করিবেক বা ঐ তৈল পানের বটুতে লইয়া গুহের ভিতরে দিবেক।

### ৬৯। সূতিকারোগ।

মুষ্টিযোগ—নাটার শস্ত বা ডোগার চূর্ণ ৬ রতি মাত্রা গোলমরিচসহ বা তৈল বাটা ১/০ আনা সন্ধৈব লবণসহ সেবন এবং সূতিকা দশ মূল পাচন—সাইলানি, শিষ্টানি, বৃহতী, কণ্টাকারী, গোক্ষুর, নিম্বাঝিটিকি, গন্ধবাদালিয়া, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ, মুখা, ইহাদের কাণ সেবন। তলপেটে বেদনা ও ক্লেশ বদ্ধ থাকিলে ঘেয়ের ভূসির পুলটিস বা ভারপিন তৈল মালিস করিয়া গরম জলের শেক দিবেক বা গণমজুরের মূল ও গোলমরিচ ইহার কাণ সেবন। আমরক ও পেটের পীড়া থাকিলে ১৭ নম্বরে বাহা লিখিত সেই মত করিবেক।

### ৭০। স্তনের দুগ্ধ শুখাইলে।

মুষ্টিযোগ—ছাতিমানছাল বাটার লেপ বা এড়ুপাতা সিদ্ধ জলে স্তনধোত করিবেক বা খেত সরিষা ১/০ আনা ও বৃহতীর মূল বাটা ১/০ আনা বা কাটা



খুইয়ারপাতা ১০০ টা / পোয়া দুধে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১/৮ পোয়া ছাকিয়া সন্তানের মাতা সেবন করিবেক ।

### ৭১। স্তনের দুধ জোয়ারিলে ।

মুষ্টিযোগ—অতইস চূর্ণ বা নিমের ডোগা বা নাটার ডোগা বা শস্ত বাটা ৬ রতি গোলমরিচ চূর্ণসহ সেবন এবং দশমূল পাচন—সন্তানের মাতা সেবন করিবেক, স্তন বেদনা ও ফুলা থাকিলে কালিজিরা বাটা বা ছোণপুপের পাতার রসে চুণা মিশাইয়া বা আফিং বা ধুতুরা পাতার লেপ দিবেক এবং ছাগলের ছোট বাচ্চাকে সন্তানের মাতার স্তনের দুধপান করাইতে পারিলে উপকার দর্শে ।

### ৭২। শিশু সন্তানের শয্যায় মূত্র ভ্যাগ ।

মুষ্টিযোগ—তেলাকুচের মূলের বা ডালা ও পাতার রস ১০ তোলা চিনি সহ বা লালকেছরছার মূল ও সুপারির চূর্ণ সমভাগ ১ রতি সেবন ।

### ৭৩। শিশু সন্তানের দন্ত উঠার সময় পেটের পীড়া ও জ্বর ।

মুষ্টিযোগ—সকৈব ধন্য বা মধুদ্বারা দাঁতের মারির উপর মার্জন করিবেক বা অঙ্গ করিয়া দিবেক এবং সোলকাশাডি বা ঐ বিচি সিদ্ধ জল ১০ তোলা বা মোথা বাটা ১ রতি জলদ্বারা সেবন এবং স্তনের দুধে তুলা ভিজাইয়া চানিডে দিবেক । থুকিকাস থাকিলে অতইস বা তুলসীর মঞ্জুরি বা আফিং-  
নের মূলবাটা বা আদার মাত ইহার যে কোনটাই হয় মধুসহ চাটনি, বাহুবন্ধ বা পেটকাপা থাকিলে কাষ্ট্রেল তৈলে অল্প তারপিন তৈল মিশাইয়া পেটের উপর মালিস করিয়া গরম জলের সেক বা ঘোঁর ভূষির পুন্টিস দিবেক ইহাতে উপকার না হইলে কাষ্ট্রেল তৈল ২৪। ২৫ ফুটা মধ্যে ১ ফুটা তারপিন তৈল মিশাইয়া দুধ বা গরম জলসহ সেবন করিবেক ।

### ৭৪। সর্বপ্রকার কীটাদি দংশন ।

মুষ্টিযোগ—তারপিন তৈল বা বিশককরবি পাতা বা বিলাতী আলু বা বাদালিয়া মোথার গাছ বা থানকুনিপাতা বা মাথা তামাক বা রেউচিনি বা

পানের বোটা বাটিয়া বা লবণ জল বা মধু ইহার বে কোনটাই হউক ক্ষত স্থানে মালিস করিবেক ।

#### ৭৫ । সর্প, শিয়াল ও কুকুর দংশন ।

মুষ্টিযোগ—ঝাপিটেপারির মূল ১ তোলা গোলমরিচ ২০টি আতপ চাউল ধোয়া জল এক ছটাকসহ বাটিয়া সেবন । সাপে কাটার উপরে দড়ির বান দিবেক ও কুকুরে কাটার স্থানে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ করিয়া আগুন বা বারুত ভরিয়া জ্বলাইয়া দিবেক ।

#### ৭৬ । পারার দোষ নিবারণ ।

মুষ্টিযোগ—গন্ধক চূর্ণ ৬ রতি বা কালা তুলসী পাতার রস এক ছটাক বা নাটা গাছের চিড়েগার নির্জলা রস অর্দ্ধ ছটাক সেবন এবং নবকার্ষিক পাচন—গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদির, সোমাল, ইহার কাথ গুলুল চূর্ণ প্রক্ষেপে সেবন আর গন্ধ বৃহতীর ভাপরা লইবেক ।

#### ৭৭ । হাম ।

মুষ্টিযোগ—হরিদ্রাচূর্ণ ১ রতি, উচ্ছ পাতা কিম্বা তুলসী পাতার রসসহ সেবন এবং পাচন—নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, বাসক ছাল ইহাদের কাথ সেবন ।

#### ৭৮ । জল বসন্ত ।

মুষ্টিযোগ—নিমছালের রস ১ তোলা লোহা দাগ করিয়া ৩ রতি গোরান্ন চূর্ণসহ বা কপূর ১ রতি জলদ্বারা সেবন এবং কলমি শাকের রস গায়ে বর্দনে বেদনা ভাল হয় ।

#### ৭৯ । বসন্ত ।

মুষ্টিযোগ—বাসিজল মধুসহ সেবনে বসন্তের গুটির জ্বালা দূর হয় বা কলমি শাকের রস গাত্রে মাখিলেই গাজাল দূর হয় বা কুজাক গোলমরিচ

সমভাগ মোট ১/০ আনি চূর্ণ বাসিজলসহ সেবনে আর ণ্ডট উঠিয়া বসিয়া গেলে কাঞ্চন বৃক্ষের ছালের কাথ সেবনে উপকার হয় আর সমস্ত বসন্ত প্রকাশের পর ক্ষত স্থান শুষ্ক করার জন্য নিম্নপাতা ও হরিদ্রা বাটা শরীরে মাখিয়া স্নান করাইবেক পরে হরিদ্রাচূর্ণ মাখনসহ মাগিসে যা ও শরীরের দাগ মিটিয়া যায়।

—•—

১০। বিষ সেবনে বিষাক্ত হইলে তাহার চিকিৎসা।

১। আফিংদ্বারা বিষাক্ত হইলে বমনকারক ঔষধ দিবেক যথা সালফেট অফ জিঙ্গ ( স্বেত তুইতা ) ১৫ রতি বা তুইতাঃ ৪ রতি বা রাইসরিয়ারচূর্ণ ১/০ আনি বা আকন্দমূল চূর্ণ ১/০ আনি বা লবণ ২৥ তোলা অন্ন জলের সহিত সেবন করাইয়া পরে যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণজল সেবন করাইবে যে পর্য্যন্ত পরিষ্কার ও আফিংয়ের গন্ধ না থাকে। সহজে বমন না হইলে জুজুবি বা কলা গাছের মেহি মাইজ গলার ভিতর দিয়া বমনের সাহায্য করিবে। মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে কোনমতেই রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে না দুই জনে ধরিয়া অনবরত হাটাইবে সময় ২ চিমটা কাটা ও বেতের বারি দিবে বাহাতে নিদ্রা না হয়, বিষনাশার্ধ মাজুকল বা চা বা কাফী ইহার কোন ১টা বা সকলগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া গাঢ় কাণ্ড সেবন করাইবে এবং সেয়কা বা লেবুর রস বা তেঁতুল গুলিয়া সেবন করাইবে। অবসন্ন হইলে ব্রাণ্ডী ৥ তোলা বা নিসাদল ৩ রতি চুণার জলসহ আবশ্যকমতে ১ বা ২ ঘণ্টাস্থর সেবন করাইবে। বৃকে পেটে পারে বিলাতী, রাই বা আদা, সুরিবা, সজনা ছাল সমভাগে বাটীয়া পটা দিবে।

২। কুচিলা বা তৎবীৰ্য্য ঠীকনিয়াদ্বারা বিষাক্ত হইলে—উক্ত বমনকারক ঔষধাদি দ্বারা পূর্বোক্তরূপে বমন করাইবে তৎপরে বিষনাশার্ধ মাজুকল এবং চা ইহার কোন একটি বা উভয়টী পূর্বোক্তরূপে সিদ্ধ করিয়া গাঢ় কাথ বা টেনিক এসিড ঠাণ্ডাজলে মিশাইয়া সেবন করাইবে। এই বিষ সেবনে ধমুটকার লক্ষণ উপস্থিত হইলে ১০ রতি আফিং বা কাফুরের জল বা গাঁজার ধূমপান বা তামাক পাতা সিদ্ধ জল সেবন করাইবে অবসন্ন অবস্থায় পূর্বোক্ত-রূপে ব্রাণ্ডী বা নিসাদল চুণের জলসহ সেবন করাইবে।

৩। সম্বলকার অর্থাৎ দারমুজ এক হরিতালদ্বারা বিযাক্ত হইলে—বমন কারক ঔষধ অর্থাৎ খেত ভুঁটিয়া ১৫ রতি বা ইসীকেক । আনা বা আকলমূল চূর্ণ ৮ আনা বা লবণ ২১ তোলা ও উষ্ণজল যথেষ্ট পরিমাণে পূর্বোক্তরূপে পুনঃ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বিষনাশার্থ চুণারজল দিবে এবং হাসের ডিম্বের খেতবর্ণ পদার্থ দ্রুগে বা জলে মিশাইয়া সেবন তৎপরে বরফ সেবন করাইবে, অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডী বা কাকুরের জল বা নিসাদল চুণার জলসহ সেবন এবং বুকে পেটে পারে রাই বা আদা সরিষা ও সজনা ছালের গুটি দিবে কিম্বা আফিং অল্প জলে মিশাইয়া গুহ্বায়ে পিচকারি দিবে।

৪। জরপালদ্বারা বিযাক্ত হইলে—যদি হজম না হইয়া পুকে তবে উপরোক্ত বমন কারক ঔষধাদি দ্বারা বমন করাইয়া বিষনাশার্থ ৩ দফার নিয়মমত ডিঙ্ক, বরফ, চুণার জল দিবে এবং লেবুর রস দিবে এবং আফিং ১ রতি মাত্রায় ১।২ ঘণ্টায় সেবন বা পূর্বোক্তরূপে গুহ্বায়ে পিচকারি দিবে, অবসন্ন অবস্থায় পূর্বোক্তরূপ উত্তেজক ব্রাণ্ডী প্রভৃতি সেবন করাইবে ও বুকে পেটে পারে পূর্বোক্তরূপ রাই প্রভৃতি গুটি দিবে, ইহা দ্বারা জ্বালাপ হইলে যদি অধিক দাস্ত হয় তবে লেবুর রস সেবনে অংশ প্রতিকার হয়।

৫। মিঠা বিষদ্বারা বিযাক্ত হইলে—উপরোক্ত বমন কারক ঔষধ ও যথেষ্ট পরিমাণ উষ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে। অধিকক্ষণ পর চিকিৎসাধীন হইলে কাষ্টেল তৈল দ্বারা বার্জ করাইয়া পূর্বোক্তরূপ আফিং সেবন ও পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করাইবে অবসন্ন অবস্থায় ব্রাণ্ডী ও নিসাদল চুণার জলসহ পূর্বোক্তরূপে প্রয়োগ করিবে এবং বুকে, পেটে, পাঁয়ে, বিলাতী রাই বা আদা, সরিষা, ইজিনার ছাল প্রভৃতির গুটি দিবেক।

## ৮১। পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা।

১। সর্বপ্রকার জর রোগে। পথ্য—সাপ্ত, এরাকট, খই, মিছরী, বাতাসা, দাড়িম, পানিকল, গরম জল নীতল করিয়া পান, ইক্ষু, কিস্মিস ইত্যাদি হিতজনক। জরের হ্রাস অনুসারে—দুগ্ধ সাপ্ত, উষ্ণদুগ্ধ সুগের বু, কটী প্রভৃতি। ৩। ৪ দ্বিদেশ পর্যন্ত জরশূন্য ও মানিশূন্য থাকিলে পুরাতন

তত্বুলের অন্ন, ক্ষুদ্র মংস্তের ঝোল ব্যবস্থা। অরোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

অপথ্য—নূতন তত্বুলের অন্ন, সর্বপ্রকার অন্ন দ্রব্য, মৈথুন, শীতল জলে স্নান, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অতিক্রোধ এবং হিমলাগান প্রভৃতি অত্যন্ত অপকারক।

২। সর্বপ্রকার কামরোগে। পথ্য—পুরাতন তত্বুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা প্রভৃতির ডাল, পটোল, ডুমুর, মোচা, কচি বেগুন, কটী, ক্ষুদ্র জীবিত মংস্ত, মাংসের ঘূষ, ছাগ দুগ্ধ, ঘৃতপক্ক বাজনাদি উপকারী। সহ হইলে ছাগমাংস খাইতে পারেন।

অপথ্য—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য সকল, শাক, অন্ন, দধি, কলায়ের ডাল, নারিকেল, মলমূত্রের বেগ ধারণ, লঙ্কার বাল, চরস, গাঁজা না তামাকের ধূমপান, উচ্চশব্দোচ্চারণ, রাত্রিজাগরণ, হিমলাগান, সর্বপ্রকার ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি অত্যন্ত অপকারক।

৩। প্রস্রাব রোগে। পথ্য—পুরাতন তত্বুলের অন্ন, বেগুন, পোটল, ঝিঙে, মানকচু, থোড়, মোচা, কাঁচা মুগ, মসুর এবং বুটের ডাল, অন্ন পরিমাণে ক্ষুদ্র মংস্ত খাইতে পারেন। স্নান সহমত।

অপথ্য—সর্বপ্রকার অন্নদ্রব্য, লঙ্কার বাল, অধিক দুগ্ধ, অধিক মংস্ত, অধিক মিষ্ট, মৈথুন, রোদ্র ও অগ্নির তাপ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৪। ধাতু দৌরলা, শিরোরোগ, চক্ষু ও কর্ণ রোগ প্রভৃতিতে। পথ্য—পুরাতন তত্বুলের অন্ন, ঝোহি তাদি মংস্ত, ছাগ মাংস, ঘৃতপক্ক তরকারী, দুগ্ধ, মাখন ইত্যাদি হিতজনক। স্নান সহমত।

অপথ্য—লঙ্কার বাল, অধিক লবণ, অগ্নির উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক অন্ন, অতিরিক্ত মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

৫। উপদংশ ও সর্বপ্রকার ক্ষতরোগে। পথ্য—পুরাতন তত্বুলের অন্ন, মুগ, মসুর বা অড়হর ডাইলের ঘূষ, অন্ন আলু, পটোল, ওড়, মানকচু, ডুমুর, উচ্ছে, কপি প্রভৃতি তরকারী; একান্ত ইচ্ছা হইলে ক্ষুদ্র জীবিত মংস্ত অন্ন পরিমাণে খাইতে পারেন। তরকারী ইত্যাদিতে ঘৃত ব্যবহার করা কর্তব্য।

অপথ্য—শাক, অন্ন, দধি, লঙ্কার বাল, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট কুমড়া, কলায়ের

ডাল, দিবানিড্রা, রাত্রিজাগরণ শীতল জল পান, মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৬। বাতরক্ত, কুষ্ঠ এবং চর্মরোগে। পথ্য—পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, অড়হর বা ছোলার ডাইল, ঝিঙে, উচ্ছে, হেলেঞ্চা, ডুমুর, তিক্তবস্ত, যুতপাক তরকারী ব্যবহার করিবেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—নূতন চাউলের অন্ন, কলায়ের ডাইল, মংস্ত ও মাংস, শাক, অন্ন, দধি, নিষ্ট কুমরা, পেঁয়াজ, রসুন, শুড়, ছন্ধ, লঙ্কার ঝাল, মৈথুন, রৌদ্র ও অগ্নির তাপ লাগান নিষিদ্ধ।

৭। অর্শ ও ভীষ্মন্দ্র প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, বুট ও অড়হরের ডাইল, আলু, পটোল, মানকচু, ডুমুর, ক্ষুদ্র মংস্তের ঝোল অন্ন পারমাণে খাইতে পারেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—গুরুপাক ও তীক্ষ্ণদীর্ঘ্য দ্রব্য সকল, কলায়ের ডাইল, দধি, লাউ, অন্নদ্রব্য, মূত্রাদির বেগ ধারণ, স্ত্রী সহবাস অহিতজনক।

৮। শোথ ও উদরী প্রভৃতিতে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগের ডাইল, বেগুন, পটোল, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা, রাত্রিতে ভাত না খাইয়া ছন্ধসাণ্ড বা রুটী খাইতে পারেন। পীড়া অনেক দিনের হইলে তরকারী ইত্যাদি আহার না করিয়া, কেবল ছন্ধ ও ভাত খাইবেন। লবণ বত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল।

অপথ্য—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, লবণ, শীতল জলপান, দিবানিড্রা, স্নান প্রভৃতি অনিষ্টকর।

৯। বহুমূত্র, মূত্রকুচ্ছ ও ঝাণ্ডী প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিত মংস্তের ঝোল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মাখন, ছন্ধ, অন্নের মধ্যে কাশীজি লেবুর রস খাইতে পারেন। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—শাক, অন্ন, দধি, কলায়ের ডাইল, গুরুপাক দ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, দিবানিড্রা ও মৈথুন প্রভৃতি অনিষ্টকর।

১০। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয় ও প্রেহণী প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মহুর ডাইলের ঘূষ, কই, মাগুর প্রভৃতি জীবিত মংস্তের ঝোল, কচি বেগুন, গন্ধভাদালে, ঘোষ প্রভৃতি হিতজনক। ক্ষুধা কম থাকিলে রাত্রে এরা রুট বা বালি খাইবেন।

১১। মীহা, বকুং ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মসুরের বা বুটের ডাইল, আলু, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু, কই, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্তের ঝোল, অল্পের মধ্যে কাগজি লেবুর রস। রাজ্যে ভাত না খাইয়া রুটী, হুগ্গসাণ্ড বা এরাকট খাওয়া কর্তব্য। মীহাদি রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক।

অপথ্য—শাক, অন্ন, দধি, স্নাতপক্কদ্রব্য, হিম লাগান, অধিক পরিশ্রম, মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

১২। কুমি প্রভৃতি রোগে। পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কই, মাগুর ইত্যাদি ক্ষুদ্র জীবিত মৎস্তের ঝোল, পটোল, উচ্ছে ডুমুর, বেগুন, বেতের আণা, মানকচু প্রভৃতি তরকারী। কুমি রোগে তিক্ত বস্তু বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—অধিক মিষ্টদ্রব্য, শুকপাক দ্রব্য, দধি, স্নাত, মাংস, দিবা নিদ্রা মলমূত্রের বেগ ধারণ অপব্যয়ক। এই গীড়ার কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৩। বাতব্যাধি ( বায়ুরোগ ) উন্মাদ, মুচ্ছা, অপস্রা প্রভৃতি রোগে। বায়ু রোগক্রান্ত ব্যক্তি পক্ষে স্বাদু অন্ন ও লবণ রস সংযুক্ত মিশ্র ও পুষ্টিকর পানাহার, তিল তৈল ব্যবহার, প্রত্যহ জ্রোত্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে উত্তমরূপে স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, ইচ্ছার অনুকূল বিষয় সকল, বিশুদ্ধ আমোদ সন্তোষ ও জীবন চিন্তন পরমোপকারক। হৃৎপিণ্ড তীক্ষ্ণবীজ [ লঙ্কার ঝালাদি ] বিদাহী [ ভাজা পোড়া ] কক্ক, শ্রমজনক কর্ম, উবেগ, ক্রোধ, শোকাদি, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয়, অস্বাদি বাতন ভ্রমণ, বেগধারণ, রাজি জাগরণ এবং মৈথুনাদি নিষিদ্ধ। এতে ও বৈকালে পুরাতন তণ্ডুল, রোহিতাদি স্নমৎস্তের ঝোল, মাংসের ঘূষ, ডুমুর, পটোল, মানকচু, কুম্মাও প্রভৃতি তরকারী, কাঁচা মুগ ও কলাইএর ডাইল প্রভৃতি জ্বদোষ হুগ্গ, নবনীত, ঘোল দধি, দ্রাক্ষা, দাড়িধ, পক্ক আত্র, পেঁপে আতা প্রভৃতি স্নফল, যব, গোধূম, ছোলা এবং স্নাত ময়দা স্জি শুচিনিতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য স্থপথ্য ও উপকারক।

১৪। আমবাত ( অর্থাৎ বাতের পীড়া ) ও বাত প্রৈয়িক পীড়া মাজে।

পুরাতন তুলা, কুলখ, কলাই, মুগ, দ্রুতাদি জীর্ণ মদ্য, ছাগাদি মাংসের যুষ, রোহিতাদি মংস্ত, পটোল, বেগুন, করোলা, সজিনার ডাঁটা, রসুন, আদা, তিল, উষ্ণ জল, তিক্ত দ্রব্য ও শ্বেদক্রিয়া ইত্যাদি উপকারী। কফজনক এবং গুরুপাক দ্রব্যের আহার ও পান, মংস্ত, শুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট, মাষকলাই, পূর্ববায়ু, বেগরোধ, রাজি জাগরণ ইত্যাদি অপকারী। এই পীড়ায় ফ্রানেল কাপড় ব্যবহার করা কর্তব্য।

বাতের পীড়ার প্রথমাবস্থাতে বিশেষতঃ অন্ন থাকিলে অন্নোহার নিষিদ্ধ। মিছরি, ফুকা কটী, পঁড়িকটী বা দুগ্ধ সাগু ব্যবস্থা করিবেন। গরম জল শীতল করিয়া পান। স্নান নিষিদ্ধ। প্রাচীন বাতের পীড়ার দিবায় অন্ন ও রাজিতে কটী ব্যবহার করিবেন।

১৫। কোষ বৃদ্ধি ও শ্লীপদ প্রভৃতিতে। দাউদখানি চাউলের অন্ন, কটী, মুগযুষ, সারসংবাসমুহ, পটোল, আলু, রসুন, পুনর্গবা মানকচু, সজিনার ডাঁটা, আদা, পুরাতন সূরা ও উষ্ণজল শীতল করিয়া পান এবং শুষ্ক ও লঘু আহার প্রভৃতি হিতজনক।

গুরুপাক অন্ন, দধি, গুরুকদলীকল, অধিক মিষ্ট, শীতল জল ব্যবহার, পর্য্যটন দিমা নিদ্রা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। কোষ বৃদ্ধিতে লাংওট ব্যবহার কর্তব্য। এই পীড়ায় প্রাতে অন্ন ও সন্ধ্যায় কটী বা লুচি ব্যবহার করা কর্তব্য।

১৬। অন্নপিত্ত, শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও আনাহ প্রভৃতি রোগে। পুরাতন তুলায় অসিদ্ধ অন্ন, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুম্ভাণ্ড, আমলকী, কেশুর, ঈশদ্রব, বিট ও সচল লবণ, ড্রাক্সা, নারিকেল শস্ত, ডাবের জল, ইক্ষু, লবঙ্গ, বড় এলাইচ এবং মিষ্ট সুগন্ধ ফল প্রভৃতি উপকারক। অন্নপিত্ত বা শূলের পীড়া প্রাণী থাকিলে অন্নাদি আহার বন্ধ করিয়া দিবাতে এবং রাত্রিতে কেবল মাত্র যবের মণ্ড ও দুগ্ধ বা দুগ্ধবাণী অথবা দুগ্ধ এই আহার করিবেন। পীড়ার হ্রাস অনুসারে দিবায় অন্ন রাত্রিতে দুগ্ধ এই, যব বা বাণীর মণ্ড, কুম্ভার, ঠিঠাই, রসকরা ও আমলকীর মোরবা হিতকর। এই পীড়ায় আহার কালে বা আহারের অন্তরণ পদের জল খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে জল খাওয়া কর্তব্য। অন্নের মধ্যে পাতি বা কাগজ



দশমূর্ণ—বিবহাণ, নাওসোণা, গাছারি, পারইল, গৈনারি, ছালা  
পিঠানি, বৃহতী, কণ্টীকারী, গন্ধুর।

ত্রিকুট—তুণ্ডি, পিপলি, গোলমরিচ।

ত্রিফলা—আমলকি, হরীতকী, বহেরা।

মানখণ্ড—মচরাচর দুই ভাগ শুক মানের গুঁড়া ও এক ভাগ চাউঃ  
গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত দ্রবের ১৯ গুণ জলে পাক করিলে ম  
খণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কিম্বা অঙ্গুর কোন এরো  
হটলে তিন ভাগ মানচূর্ণ ও একভাগ চাউলের গুঁড়া দেওয়া যায়।  
শোথ ও উদরি রোগে উপকারী।

৮৩। ব্রহ্মসামুদ্রের ঐশ্বর্য সেরনের মাত্রা।

২০ হইতে ৩০ পূর্ণমাত্রা।

১৬ " ১২ পূর্ণমাত্রা ৪ ভাগের ৩ ভাগ।

৯ " ১৫ " অর্দ্ধ মাত্রা।

৬ " ১০ " শিকি মাত্রা।

২ " ৫ " ৮ ভাগের ১ ভাগ।

১ বৎসরের মাত্রা ১৬ ভাগের ১ ভাগ।

১ লালকে ১ রক্ত বলে, ৬ রক্তিতে ১ আনা হয়।









